ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

СПРАВОЧНИК

СВОЙСТВА

ПРИМЕНЕНИЕ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

СПРАВОЧНИК

СВОЙСТВА
ПРИМЕНЕНИЕ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Под редакцией М. А. КЛЮЕВА

Москва
«Русская книга»
1993

Отредактировал: ledi24

52.81
Л43

Под редакцией *М. А. Клюева*

Составители:
*М. А. Клюев, Н. М. Богданова, О. А. Волков,
В. Я. Ермакова, Т. Ф. Иванова, Р. С. Скулкова*

Художник *В. П. Коршунов*

Лекарственные средства: свойства, применение,
Л43 противопоказания: Справочник/Под ред. М. А. Клюева.— М.: Русская книга, 1993.— 576 с.

В справочнике даны краткие описания лекарственных препаратов, выпускаемых отечественной промышленностью и закупаемых за рубежом. Приведены русские, латинские и химические названия препаратов, их синонимы, состав сложных лекарственных форм; показания и противопоказания к применению в медицинской практике; способы применения и дозы; формы выпуска, сроки годности, условия хранения, название страны-импортера или известной фирмы. Статьи представлены в алфавитном порядке по русскому наименованию препаратов.

Л $\frac{4401000000-105}{M-105(03)93}$ инф. 92 **52.81**

ISBN 5—268—01206—1

© Составление: М. А. Клюев, Н. М. Богданова, О. А. Волков, В. Я. Ермакова, Т. Ф. Иванова, Р. С. Скулкова, 1993 г

Отредактировал: ledi24

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

В большинстве государств мира медицинские и фармацевтические работники, а также население широко информированы о лекарственных средствах, которые выпускаются их собственными и иностранными фирмами, благодаря изданию многочисленных каталогов и справочников, систематически устраиваемым симпозиумам по различным разделам медицины, организации выставок и распространению рекламных проспектов. Доступность и возможность приобретения необходимых информационных материалов безусловно способствуют рациональному использованию лекарств.

В странах СНГ насчитывается почти 3 тысячи наименований лекарственных средств. Примерно 60 процентов из них назначается врачами и отпускается только по рецептам, что должно исключить самолечение. Однако некоторые лекарства можно применять и самим, но применять грамотно, располагая определенными знаниями.

Огромную просветительскую работу в этом плане проводит Министерство здравоохранения Российской Федерации через Центр фармацевтической и медико-технической информации, кабинеты фармацевтической информации и аптечные справочные бюро, функционирующие во всех регионах.

Тем же целям призван служить и настоящий

Отредактировал: ledi24

справочник, в который вошло свыше 2 тысяч наименований препаратов отечественного и зарубежного производства; более 80 из них — новые. Аннотации расположены в алфавитном порядке, содержат сведения о фармакологическом действии, показаниях к применению, способах применения и дозах, побочных действиях, противопоказаниях, формах выпуска, условиях хранения, сроках годности, стране или фирме-поставщике.

Справочник снабжен предметным указателем и двумя тематическими указателями — по фармакотерапевтическим группам и по основным заболеваниям, что облегчает выбор нужного препарата.

Авторский коллектив и издательство с благодарностью примут все замечания и предложения читателей, учтут их в дальнейшей работе по совершенствованию справочника.

Отредактировал: ledi24

ПРЕПАРАТЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В СПРАВОЧНИК

Абомин[1] 19
Авелизин 19
Ависан 20
Авоксин 20
Агапурин 442
Агиолакс 21
Адалат 459
Адебит 125
Адельфан-эзидрекс 21
Аденил 476
Адиазин 415
Адипозин 21
Адиурекрин 22
Адиуретин-СД 22
Адонис-бром 22
Адрезон 227
Адреналина гидротартрат 23
— **гидрохлорид** 22
Адриабластин 23
Адриамицин 23
Адроксон 24
Адумбран 303
«Аевит» 24
Аекол 24
Азактам 25
Азалептин 25
Азатиоприн 26
Азафен 26
Азлин 27
Азлоциллин 27
Азота закись 27
Азтреонам 25
Аира корневище 28
Аймалин 28
АКТГ 227
Актиномицин D 136
Актовегин 28
Алантон 29
Александрийский лист **390**
Алкеран 385
Аллапинин 29
Аллоксим 30
Аллопуринол 30
Аллохол 31
Алмагель 31
— **А** 31
Алором 32
Алоэ линимент 32
— **с железом сироп** 32
— **сок** 32
— **таблетки** 32
— **экстракт жидкий** 33
— **экстракт для инъекций** 33
Алпизарин 33
Алтея корень 33
Алупент 57
Альбумин 34
Альбуцид 419
Альвезин «Новый» 34
Альгипор 34
Альдактон 95
Альдомет 169
Альцид-В 35
Амедин 35
Аметоптерин 273
Амидопирин 36
— **с бутадионом таблетки** 36
Амизил 37
Амикацин 37
Аминкин 37
Амилнитрит 37
Аминазин 37
Аминалон 38
Аминокапроновая кислота 38
Аминон 39
Аминосол 39
Аминофиллин 537
Аминохинол 39
Амиридин 40
Амитал 528
«Амитетравит» 55
Аммиака раствор 40
Аммифурин 40
Аммония хлорид 41
Амобарбитал 528
Ампиокс 41
Ампициллина натриевая соль 41
— **тригидрат** 42
Амфоглюкамин 42
Амфотерицин В 43
— **мазь** 43
Анабазина гидрохлорид 43
Анавенол 44
Анальгин 44
Анандрон 44
Анаприлин 45
Анафранил 45
Ангинин 298, 328
Ангиотензинамид 46
Андаксин 266
Андекалин 47
«Андипал» 47
Аневрин 433
Анестезин 47
«Анестезол» суппозитории 48
Аниса плоды 48
Антабус 433, 527
Антелепсин 48
Антеовин 49
Антипирин 49
«Антипсориатикум» мазь 49
«Антиструмин» 49
Антитанил 152
Антифомсилан 50
Антиформ 50
Антрасенин 389
«Анузол» суппозитории 50
Апизартрон 50
Апилак 50
— **мазь** 51
Апилепсин 222
«Апифор» 51
Апоморфина гидрохлорид 51
Апонти 52
Апрессин 52
Апрофен 52
Аралии настойка 53
Ардуан 53
Аренарин 53
Армин 53
Арники настойка 53
Арпенал 54

[1] Жирным шрифтом выделены основные названия препаратов, светлым — некоторые синонимы.

Отредактировал: ledi24

Артан 327, 508
Артепарон 54
Аскорбиновая кислота 55
«Аскорутин» 55, 106
«Аскофен» 55
L-Аспарагиназа 56
Аспарагинат калия-магния 56
«Аспаркам» 56
Аспизоль 57
Астемизол 122
«Астинивит» 55
Астмопент 57
АТ-10 424
Атровент 58
Атропина сульфат 58
АТФ 283
«Ауробин» мазь 59
Ацеклидин 59
«Ацесоль» 59
Ацетилсалициловая кислота 60
Ацетилхолина хлорид 60
Ацетилцистеин 60
Ацидин-пепсин 61
Ацидипрол 222
Ацидотест 61
Ацикловир 100
«Аэровит» 61
«Аэрон» 62

Багульника болотного трава 62
Бактисубтил 62
Бактрим 62
Бализ-2 63
Бальзам «Золотая звезда» 63
Вальзам Шостаковского 99
Баноцид 163
Баралгин 63, 406
Барбариса обыкновенного листьев настойка 64
Барбитал 64
Барбитал-натрий 64
Бария сульфат для рентгеноскопии 65
Батиловый спирт 65
Батилол 65
Батриден 65
Безамидин 66
«Бекарбон» 66
Бекломет 66
Бекотид 66
Белевое масло 67
Беллазон 67
«Беллалгин» 67
«Белластезин» 67
«Беллатаминал» 68
«Беллоид» 68
Беломет 124
Белустин 68
Белый мышьяк 281
Бемегрид 68
Бемитил 69
Бенальгин 69
Бенемицин 374
Бенетазон 70
Бензамил 72
Бензилбензоат медицинский 70
Бензилпенициллина соль натриевая 70
— **калиевая** 71
— **новокаиновая** 71
Бензобамил 72
Бензогексоний 72
Бензоилбарбамил 72
Бензойная кислота 72
Бензокаин 47
Бензонал 72
Бензотэф 73
Бенфотиамин 73
Берберина бисульфат 74
Березы почки 74
Берлофен 74
Бородуал 74
Бероксан 75
Беротек 75
«Бесалол» 75
Бессмертника песчаного цветки 76
Беталок 76
«Бетиол» суппозитории 77
Бефунгин 77
Бийохинол 77
«Бикарминт» 78
Бикарфен 78
Биклин 37
Билигнин 78
Билигност 79
Билиграфин 79
Билимин 79
Билоптин 79
Билтрицид 80
Биосед 80
Биоциклин 168
Бисакодил 80
Бисальвон 87
Бисекурин 81
Бисептол 62
Бисмоверол 81
Бифидумбактерин сухой 82
Бификол сухой 83
Бициллин-1 83
Бициллин-5 84
Блемарен 84, 401
Блеомицетин 85
Блеоцин 85
«Бом-Бенге» мазь 85
Бонафтон 85
Борная кислота 213
Боромептол 86
Боярышника плоды и цветки 86
Бриканил 86
Бриклин 37
Бриллиантовый зеленый 87
Бринердин 231
Бромгексин 87
Бромизовал 87
Бромкамфора 87
Бромокриптин 327
Бромурал 87
Бронхолитин 88
Бруламицин 88
Брунеомицин 88
Брусники лист 89
Бруфен 175
Бузины черной цветки 89
Букарбан 89
Буметамид 91
Буренекс 91
Бурова жидкость 90
Бутадион 90
Бутадион (мазь) 90
Бутамид 90
Бутилокситолуол 151
Бутироксан 91
Буфенокс 91
Буформин 125

Ваготил 92
Вазелиновое масло 92
Валерианы корневище с корнями 92
Валидол 93
Валиум 391

Отредактировал: ledi24

Валокордин 223
Валокормид 93
Вамин 94
Василька синего цветки 94
Венорутон 450
Вентер 94
Вермокс 95
Верографин 445
Веронал 64
Веронал-натрий 64
Верошпирон 95
Верпамил 470
Вибрамицин 168
Вигератин 95
Видехол 96
«Викаир» 96
«Викалин» 96
Викасол 97
Вилозен 97
Вилькинсона мазь 98
Винбластин 376
«Винизоль» аэрозоль 98
Винилин 99
Винкапан 99
«Винкатон» 99
«Винканор» 99
Винкристин 99
Виомицин 473
Випраксин 100
«Випросал В» мазь 100
Виролекс 100
Вискальдикс 103
Вискен 104
Вискоза гемостатическая 105
Вистмута нитрат основной 105
Витайодурол трифосаденин 105
Витамин А 370
— B_1 433
— B_2 372
— B_3 198
— B_6 341
— B_{12} 506
— B_{15} 198
— B_c 474
— C 55
— D_2 523
— D_3 310
— E 440
— K_1 97
— P 105
— PP 296
— U 271
Витафтор 106
Витогепат 107
«Вицеин» 105
Водяного перца экстракт жидкий 107
Вольтарен 320
Вулнузан 107

ГАБА 38
Галазолин 107
Галантамина гидробромид 108
Галаскорбин 108
Галидор 108
Галоперидол 109
«Гальманин» 109
Гамибазин 109
Гаммакортен 143
Гаммалон 38
Ганглерон 109
Гарамицин 117
Гастал 110
Гастрофарм 110
Гастроцепин 111
«Гексавит» 111
Гексализ 111
Гексаметилентетрамин 112
Гексамидин 112
Гексафосфамид 112
Гексенал 113
Гелевин 113
Гелиомициновая мазь 114
Гематоген 114
Гемацель 114
Гемитон 216
Гемодез 115
Гемодез-Н 115
«Гемостимулин» 116
«Гендевит» 116
Гентамицина сульфат 117
Гепарин 117
«Гепарокд» мазь 118
«Гептавит» 118
Герфонал 118
Гиалуронидаза 245
Гибитан 494
Гигронний 118
Гигротон 314
Гидифен 45
Гидреа 119
Гидрокортизон 120
Гидроксикарбамид 119
Гидроксимочевина 119
Гидролизин (Л-103) 120
Гидроперит 121
Гилуритмал 28
ГИНК 177
«Гиоксизон» мазь 121
«Гипозоль» аэрозоль 121
Гипотиазид 122
Гипофенат 74
Гисманал 122
Гистазол 123
Гистамин 123
Гистидина гидрохлорид 123
Гистодил 124
Гифотоцин 124
Глаувент 124
Глауцина гидрохлорид 124
Глибенкламид 259
Глибутид 125
Гливенол 125
Гликвидон 129
Глина белая 126
Глицериновые суппозитории 126
Глицерофосфат 126
Глицирам 126
Глудантан 127
«Глутамевит» 127
Глутаминовая кислота 128
Глюгицир раствор 128
Глюкоза 128
Глюкофаг 164
Глюренорм 129
«Глюферал» таблетки 129
Гоматропина гидробромид 130
Гонадотропин менопаузный 131
— **хорионический** 130
«Гордокс» 223
Горицвета весеннего трава 131
Горца перечного трава 131

Отредактировал: ledi24

— почечуйного трава 131
— птичьего трава 132
Горчичники 132
Горькая соль 257
Госсипол 132
Гравимун 132
Грамицидин С 133
Грамицидиновая паста 133
Грамурин 133
Грандаксин 134
Гриб березовый 517
Гризеофульвин 134
Грицин 134
Грудной эликсир 135
Гумизоль 135
Гутталакс 135

Дактиномицин 136
Даларгин 136
Далацин-Ц 136
Дамилена малеинат 137
Даназол 138
Дановал 138
Датискан 139
Девясила корневище и корень 139
Дегмин 139
Дегмицид 140
Дезаминоокситоцин 140
Дезоксикортикостерона ацетат 140
— триметилацетат 141
Дезоксипеганина гидрохлорид 141
Дезоксирибонуклеаза 142
Дезокситоцин 140
«Декамевит» 142
Декамин 143
Декарбазин 148
Декарис 143
Дексазон 143
Дексаметазон 143
Дексаметазон-офтан 144
Дексона 144
Дектроза 128
Делагил 145
Демасорб 156
Де-Нол 145
«Дента» капли 146
Депакин 222
Депаркин 158
«Деперзолон» мазь 146
Депостат 146
«Дермазин» мазь 146
Дерматол 147
Дерматоп 147
«Дермозолон» мазь 147
Десферал 148
Детицен 148
Детская присыпка 148
Диазепам 368, 391
Диазолин 149
Диакарб 149
Диамокс 149
Диане 149
«Диафеин» 150
Диафенилсульфон 150
Диафиллин 537
Дибазол 150
Дибунол 151
Диваскан 152
Дигален-нео 152
Дигестал 467
Дигидротахистерол 152
Дигидроэрготамин 152
Дигидроэрготоксин 153
Дигитоксин 153
Дигоксин 153
Дидепил 154
Дикаин 154
Диклофенак-натрий 320
Диксафен 155
«Дикумарин» 292
Димебон 155
Димедрол 155
Димеколин 156
Димексид 156
Диметпрамид 157
Димефосфон 157
Димэстрол 157
Динезин 158
Диоксидин 158
Диоксоний 159
Дионин 534
Дипидолор 159
Дипин 159
Дипироксим 160
Диплацина дихлорид 160
Дипразин 160
Дипромоний 161
Дипрофен 161
Дипрофиллин 161
«ДИСОЛЬ» — солевой раствор для инъекций 162
Дитетрациклиновая глазная мазь 162
Дитилин 162
Дитразина цитрат 163
Дитэк 163
Дифацил 406
Дифезил 164
Дифенин 164
Дифентоин 164
Диформин-ретард 164
Дифосфотиамин 218
Дихлотиазид 122
Дицинон 165, 532
Диэтиксим 165
Диэтон 166
Добезилат кальция 167
Добутамин 166
Добутрекс 166
ДОКСА 140
Доксацин 168
Доксиум 167
Доксициклина гидрохлорид 168
Долотин 206
Домопон 318
L-Допа 240
Допамекс 169
Допан 168
Допегит 169
Допмин 169
Дофамин 169
Дроперидол 170
Дуба кора 170
«Дуплекс» 171
Душицы трава 171

Желатинол 171
Железа лактат 171
Желудочные таблетки с экстрактом красавки 171
Желудочный сок натуральный 172

Отредактировал: ledi24

Желчь медицинская консервированная 172
Женьшеня настойка 172
Жостера (крушины слабительной) плод 172

Задитен 172
Заманихи настойка 173
Зверобоя трава 173
Зеленина капли 173
Зиксорин 173
Зимозан 174
Зитазонium 174
Золототысячника трава 174
Зубные капли 175

Ибупрофен 175
Изадрин 175
«Изаман» 176
Изафенин 176
Изобарин 176
Изодибут 176
Изоланид 500
Изониазид 177
Изонитрозин 177
Изоптин 470
Изофиллин 161
ИМАП 177
Имехин 178
Имифос 179
Имодиум 179
Имуран 26
«Ингакамф» 179
«Ингалипт» 179
Индерал 45
Индигокармин 180
Индовазин 180
Индометацин 180
Инказан 181
Инмекарб 181
Инозие F 371
Инсулин Ново НМ 182
—»— **илетин II** 184
—»— **хумулин** 184
Интал 187
Интенкордин 204
Интенсаин 204
Интерлок 187
Интерферон человеческий лейкоцитарный 188
«Ируксол» мазь 188
Ионол 151
Исипен 188
Исмелин 176
Ихтиол 189
Йод 190
Йодамид 190
Йодинол 191
Йодолипол 191
Йодонат 191
Йодопирон 192
Йодоформ 192
Йопагност 192
Йофендилатум 535

Кавинтон 192
Казеина гидролизат 193
Каланхоэ сок 193
Календулы цветки 193
Калефлон 194
Калий марганцовокислый 195
Калимин 194
Калипсол 194
Калия бромид 195
— **йодид** 195
— **оротат** 195
— **перманганат** 195
— **хлорид** 195
Каломель 379
Кальмагин 196
«Кальцекс» 196
«Кальцитар» 196
«Кальцитонин» 196
Кальцитрин 196
Кальциферол 523
Кальция глицерофосфат 197
— **глюконат** 197
— **карбонат осажденный** 198
— **лактат** 198
— **пангамат** 198
— **пантотенат** 198
— **хлорид** 199
«Каметон» аэрозоль 199
«Камфомен» аэрозоль 199
Камфоний 200
Камфора 200
Канамицина моносульфат 201
— **сульфат** 201
Канестен 215
Каноксицел 202
Капли «Дента» 146
— Зеленина 173
— зубные 175
— нашатырно-анисовые 291
Капотен 202
«Капсин» 203
«Капситрин» 203
Каптоприл 202
Капуста морская 203
Карбенициллина динатриевая соль 203
Карбидин 204
Карбокромен 204
Карболен 205
Кардиовален 205
Карловарская соль искусственная 205
Карминомицин 205
Карнитина хлорид 206
Каротолин 207
Карфециллин 207
Касторовое масло 207
Катапресан 216
Катахром-офтан 207
Кафиол 208
«Квадевит» таблетки 208
Квалидил 208
Квасцы жженые 209
Кватерон 209
Кверцетин 209, 106
Кебузоне 210
Келфизин 415
Кенакорт 209
Кеналог-40 210
Керецид 322
Кетазон 210
Кеталар 194, 211
Кетамин 211
Кетоконазол 319
Кетофенилбутазон 210
Кефзол 212
Кефлекс 503
Кефлин 503
Кинекс 417
Кинилентин 213
Кислота аминокапроновая 38
— **аскорбиновая** 55

Отредактировал: ledi24

— **ацетилсалициловая** 60
— **бензойная** 72
— **борная** 213
— **глутаминовая** 128
— **липоевая** 249
— **мефенаминовая** 274
— **мышьяковистая** 281
— **никотиновая** 296
— **салициловая** 382
— **фолиевая** 474
— **хлористоводородная** 495
Клафоран 214
Климактерин 214
Клиндамицин 136
Клион-Д 214
Клион инъекции 214
Клобазам 479
Клозапин 25
Кломипрамин 45
Кломифенцитрат 215
Клостильбегит 215
Клостридиопентидаза 219
Клотримазол 215
Клофелин 216
Коамид 217
Кобамамид 217
Кодеин 217
Кодеина фосфат 217
«Кодтерпин» 218
Кокаина гидрохлорид 218
Кокарбоксилаза 218
Колибактерин сухой 219
Колимицин 292
Коллагеназа 219
Коллализин 219
Колларгол 220
Колхамин 220
Компламин 232
Компливит 221
Конвафлавин 221
Конвулекс 222
Контрацептин Т 222
Контрикал 223
Конферон 223
Конькова мазь 223
Кора дуба 170
— крушины 232
Корвалол 223
Корватон 394
Коргард 224
Коргликон 224
Корданум 224
Кордарон 225
Кордиамин 226
Кордигит 226
Коребером 226
Коринфар 459
Кортизона ацетат 227
Кортикотропин 227
Кортинефф 228
«Кортомицетин» мазь 229
Котарнина хлорид 229
Кофеин 229
Кофеин-бензоат натрия 229
«Кофетамин» 230
Кофицил 230
Крапивы лист 230
Красавки препараты 231
Краснитин 56
Кризанол 231
Кристепин 231
Кровоостанавливающие карандаши 232
Кровохлебки корневище и корни 232
Крушины кора 232
Ксавин 232
Ксантинола никотинат 232
Ксероформ 233
Кукурузные рыльца 233
Купренил 233
Курантил 234

Лагохилус опьяняющий 234
Лазикс 487
«Лактасол» раствор 234
Лактин 235
Лактобактерин сухой 235
Лактофлавин 372
Ламидон 175
Ламинарид 236
Ландыша настойка 236
Лантозид 236
Лапчатки корневище 237
Левамин-70 237
Левзеи экстракт жидкий 237
«Левомизоль» аэрозоль 238
Левомеколь 238
Левомицетин 238
Левомицетина стеарат 239
— **сукцинат натрия** 239
Левопа 240
Леворин 240
Леворина натриевая соль 241
«Левосин» мазь 241
Легалон 241
Ледин 242
Лейкоген 242
Лекозим 242
Лекопаин 242
Лепонекс 25
Лесненефрил 243
Либексин 244
Либриум 492
Лив-52 244
«Ливиан» аэрозоль 244
Лидаза 245
Лидокаин 10% для инъекций 245
Лизоцим 245
Ликвиритон 246
Ликорина гидрохлорид 246
Лимонника китайского настойка 246
Линетол 246
Линимент бальзамический (по Вишневскому) 247
— **нефти нафталанской** 293
— **«Санитас»** 247
— **«Фогем»** 474
Линкомицина гидрохлорид 247
Лиобил 247
Липамид 248
Липантил 248
Липиодол 191
Липоевая кислота 249

Отредактировал: ledi24

Липостабил 249
Липофундин 250
Липоцеребрин 250
Липы цветки 251
Лист александрийский 390
— брусники 89
— кассии 390
— крапивы 230
— мать-и-мачехи 262
— подорожника 346
— сенны 390
— толокнянки 440
— трилистника водяного 444
— шалфея 518
— эвкалипта 519
Литалир 119
Лития карбонат 251
— оксибутират 251
«Лифузоль» аэрозоль 252
Лобелина гидрохлорид 252
«Лобесил» 252
Ломустин 68
Лопресор 253
Лоринден А 253
— С 254
Лофенал 254
Льна семя 255
Людиомил 255
Люминал 461
Лютенурин 256
Ляпис 390

Магнезия белая 257
— жженая 257
Магния карбонат основной 257
— окись (жженая) 257
— сульфат 257
Магурлит 257
Мадопар 258
Мадрибон 414
Мажептил 258
Мазь бутадионовая 90
— Вилькинсона 98
— Вишневского 247
— гелиомициновая 114
— «Гепаросид» 118
— «Гиоксизон» 121
— «Деперзолон» 146
— «Дермазин» 146
— «Дермозолон» 147
— дитетрациклиновая 162
— «Ируксол» 188
— Конькова 223
— «Кортомицетин» 229
— «Левосин» 241
— мафенида ацетат 262
— «Мегосин» 262
— «Микозолон» 276
— нафталанная 290
— оксолиновая 314
— октициловая 315
— от обморожения 259
— преднизолоновая 353
— «Пропосеум» 360
— «Псориазин» 364
— родокелоновая 373
— ртутная серая 379
— Рыбакова 401
— скипидарная 400
— солидоловая 401
— «Сульфодекортэм» 419
— «Супореф» 420
— теброфеновая 424
— «Фастин» 457
— флореналевая 473
— цинковая 510
— «Эфкамон» 538
Малины плоды 259
Маннинил 259
Маннит 259
Маннитол 259
Мараславин 260
«Мареллин» 260
Марена красильная 261
Марля кровеостанавливающая 261
Масло анисовое 48
— беленное 67
— вазелиновое 92
— камфорное 200
— касторовое 207
— ментоловое 266
— облепиховое 308
— шиповника 518
— эвкалиптовое 519
Мать-и-мачехи лист 262
Мафенида ацетат мазь 262
Мебикар 262
Мегафен 37
«Мегосин» мазь 262
Медвежье ушко лист 440
Мединал 64
Медротестрона пропионат 263
Мезапам 263
Мезатон 264
Мезим-форте 264
Мексамин 265
Мелипрамин 265
Меллерил 405
Мелликтин 265
Меновазин 266
Ментол 266
Мепробамат 266
Мерказолил 267
Меркаптопурин 267
Местерон 263
Метазид 268
Метандиол 270
Метандростенолон 268
Метациклина гидрохлорид 268
Метацил 271
Метацин 269
Метеразин 269
Метиландростендиол 270
Метилдигидротестостерона пропионат 263
Метилдопа 169
Метиленовый синий 270
Метилметионинсульфония хлорид 271
Метилморфин 217
Метилсалицилат 271
Метилтестостерон 271
Метилурацил 271
Метилэргометрин 272
Метиндион 272
Метиндол 180
Метионин 272
Метипред 273
Метисазон 273
Метоклопропамид 502

Отредактировал: ledi24

Метотрексат 273
Метралиндол 181
Метформина гидрохлорид 164
Мефенамина натриевая соль 274
Мефенаминовая кислота 274
Мидантан 275
Мидокалм 275
Миелобромол 275
Миелосан 276
«Микозолон» мазь 276
Микосептин 276
«Микройод» 277
Микрофоллин-форте 277
Микроцид 277
Миодил 535
Мио-релаксин 162
Миофедрин 277
Мисклерон 278
Митрошина жидкость 278
Модитен-депо 278
Можжевельника плоды 278
Мозольная жидкость 279
Мономицин 279
Морфина гидрохлорид 279
Мочевина 280
Мукалтин 280
Мукартрин 280
«Мукосальвин» 61
Муравьиный спирт 281
Мыло зеленое 281
— **калийное** 281
Мышьяковистая кислота 281
Мышьяковистый ангидрид 281
Мятное масло 266
Мятные таблетки 266
Мяты перечной листья 281

Надолол 224
Наком 282
Нанипрус 282
Напроксен 283
Напросин 283
Наркотан 482
Настойка аралии 53
— **арники** 53
— **боярышника** 86
— **валерианы** 92
— **женьшеня** 172
— **заманихи** 173
— **календулы** 193
— **лагохилуса** 234
— **ландыша** 236
— **лимонника китайского** 246
— **листьев барбариса** 64
— **мяты** 281
— **перца стручкового** 334
— **пиона** 337
— **пустырника** 364
— **софоры японской** 405
— **стальника** 407
— **стеркулии** 409
— **чилибухи** 518
— **эвкалипта** 519
Натриевая соль усниновой кислоты 288
Натрия аденозинтрифосфат 283
— **арсенат** 284
— **бензоат** 284
— **бромид** 284
— **гидрокарбонат** 284
— **гипосульфит** 288
— **йодид** 285
нуклеинат 285
— **оксибутират** 285
— **пара-аминосалицилат** 288
— **салицилат** 288
— **тиосульфат** 288
— **усинат** 288
— **флуорат** 289
— **хлорид** 289
Натулан 289
«Нафтальгин» 290
Нафтамон 290
Нафтизин 290
Нафтифин 468
Нашатырно-анисовые капли 291
Нашатырный спирт 40
«Нашатырь» 41
Наяксин 291
Невиграмон 291
Неграм 291
Нембутал натрия 533
«Нео-анузол» суппозитории 292
Неодикумарин 292
Неозепам 298
Неомицина сульфат 292
Неробол 268
Нероболил 293, 462
Неулептил 293
Нефть нафталанская рафинированная 293
Ниаламид 294
Нибиол 299
Нигедаза 294
Низорал 294
«Никоверин» 295
Никодин 295
Никотинамид 295
Никотиновая кислота 296
Никофлекс 296
Никошпан 297
Нилутамид 44
Нистатин 297
Нитазол 297
Нитразепам 298
Нитроглицерин 298
Нитроксолин 299
Нитро-мазь 299
Нитро-мак ретард 420
Нитроинг 299
Нитропруссид натрия 282
Нитросорбид 300
Нитрофунгин 300
Ниттифор 300
Ниурон 299
Нифедипин 459
Ницерголин 391
Нобриум 263
Новаин 206
Новалдин 44
Новикова жидкость 301
Новодрин 175
Новоиманин 301
Новокаин 301
Новокаинамид 302
«Новомигрофен» 302
Нозепам 303
5-НОК 299
Нолицин 303

Отредактировал: ledi24

Нонахлазин 303
Нон-овлон 304
Ноотропил 339
Норадреналина гидротартрат 304
Норакин 305
Норколут 305
Норсульфазол 306
Норсульфазол-натрий 306
Норэтистерон 306, 305
Нофелан 307
Но-шпа 307
Нуредал 294

Обзидан 45
«Облекол» пленка 307
Облепиховое масло 308
«Овидон» 308
Одуванчика корень 308
Оксазил 308
Оксафенамид 309
Оксациллина натриевая соль 309
Оксидевит 310
Оксикарбамид 119
Оксикобаламин 311
«Оксикорт» аэрозоль 313
Оксилидин 312
Оксипрогестерона капронат 312
Окситоцин 312
Оксиферрискорбон натрия 312
Оксицелодекс 313
«Оксициклозоль» аэрозоль 313
Оксодолин 314
Оксолиновая мазь 314
Октицил 315
Октициловая мазь 315
Окупрес-Е 318
Олеандомицина фосфат 315
Олететрин 316
Оливомицина натриевая соль 316
Олиметин 317
Ольхи соплодия (ольховые шишки) 317
Омаин 220
Омнадрен-250 317
Омнопон 318
Оптимол, глазные капли 318
Орабет 90
Ораза (гранулы) 318
Оранил 89
ОРАП 318
Орнид 319
Ороназол 319
Ортофен 320
«Осарбон» 321
Осарсол 321
«Осарцид» 321
Отривин 107
Офлоксацин 422
Офтан-IDU 322
Офтан-катахром 207
Офтан-пилокарпин 336

Павестезин 322
Палин 322
Памба 322
Панангин 56
«Пангексавит» 323
Панзинорм-форте 323
Панкреатин 323
Пантенол аэрозоль 324
Пантогам 324
Пантокрин 324
Пантопон 318
Пантоцид 325
Папаверина гидрохлорид 325
Папазол 326
Папоротника мужского экстракт густой 326
Паратиреоидин 326
Парацетамол 326
Паркопан 327, 508
Парлодел 327
Пармидин 328
Партусистен 75, 328
ПАСК-натрий 288
Пасомицин 328
Пассифлоры экстракт жидкий 329
Паста грамицидиновая 133
— **Теймурова** 426
— **цинковая** 510
Пастушьей сумки трава 329
Патомицин 395
Пафенцил 329
Пахикарпина гидройодид 330
«Пектусин» 330
Пелентан 292
Пелоидин 330
Пелоидодистиллят 331
Пенициллamин 233
Пенициллиназа 331
Пентагастрин 331
«Пенталгин» 331
Пентамин 332
Пентацин 332
«Пентовит» 332
Пентоксил 332
Пентоксифиллин 442
Пентрексил 41
Пепсидил 333
Пепсин 333
Перитол 333
Пертуссин 334
Перца водяного трава 334
— **экстракт жидкий** 334
— **стручкового настойка** 334
Перцовый пластырь 334
Петилия 335
Пижмы цветки 335
Пикамилон 335
Пилокарпина гидрохлорид 336
Пилокарпин-офтан 336
Пинабин 336
Пиона настойка 337
Пиопен 203
Пиоцид 337
Пиперазина адипинат 337
Пипольфен 160
Пипортил L 337
«Пирабутол» 36
Пиразидол 338
Пиразинамид 434
«Пираменн» 338
Пирантель 338
Пирацетам 339
Пиривитол 341

Отредактировал: ledi24

Пиридитол 339
Пиридоксальфосфат 340
Пиридоксина гидрохлорид 341
Пиридон 341
Пиркофен 341
Пирогенал 342
Пиромекаин 342
Пирроксан 342
Питуитрин 343
Плазмол 343
Плаквенил 343
Плантаглюцид 344
Пластырь перцовый 334
— **свинцовый простой** 388
— — **сложный** 388
— **эпиляционный** 523
Платифиллина гидротартрат 344
Плаценты взвесь 344
— **экстракт** 345
Пленка коллагеновая 345
— **фибринная изогенная** 345
Подорожника лист 346
Подофиллин 346
Полиамин 347
Полиглюкин 347
Полимиксина «В» сульфат 347
— **«М» сульфат** 348
Полиненроя 349
Полиспонин 349
«Полифер» 349
Полудан 350
Полькортолон 209, 210
Полыни горькой трава 350
Постинор 351
Почечный чай 351
Празиквантель 80
Празозин 351
«Пратсиол» 351
Прегнин 352
Прегастрол 353
Преднан 353
Преднизолон 353
Преднизолонгемисукцинат 354
Преднизона ацетат 354
Препарат АСД 355
Пресоцил 355
Присыпка детская 148
Префизон 355
Префузин 355
Примахин 356
Примостат 146
Прогестерон 356
Продектин 328
Продигиозан 356
Резерпин 357
Прокаин 301
Прокаинамид 302
Прокто-гливенол 357
Проктоседил 358
Пролотестон 358
Проведол 358
Провазин 359
Пропер-мил 359
Пропилйодон 359
«Пропосол» аэрозоль 360
«Пропоцеум» мазь 360
Проспидин 360
Простенон 361
Простигмин 357
Протамина сульфат 361
Протаргол 362
Протеин 362
Протионамид 362
Псоберан 363
Псорален 363
«Псориазин» мазь 364
Пувален 364
Пурген 463
Пустырника трава 364
Пуфемид 364

Раверон 365
Радедорм 298
Рамнил 365
Рантарин 365
Рауназан 365
Раунатин 365
Рауседил 367
Ревеня корень 366
«Ревит» 371
Регидрон 366
Регитин 366, 463
Реглан 502
Регулакс 208
Резерпин 367
Резорцин 368
Резохин 145
Реладорм 368
Реланиум 391
Ремантадин 368
Реоглюман 368
«Реопирин» 36
Реополиглюкин 369
Ретаболил 370
«Ретард» 253
Ретинола ацетат 370
— **пальмитат** 371
Рибоксин 371
Рибонуклеаза 371
Рибофлавин 372
Рибофлавина мононуклеотид 372
Риванол 531
Ригевидон 372
Рингера-Локка таблетки 373
Риодоксол 373
Ристомицина сульфат 373
Ритмилен 374
Рифадин 374
Рифампицин 374
Родиолы экстракт жидкий 376
Розанол 376
Розевин 376
Ромазулан 377
Ромашки цветки 377
Ромпаркин 327, 508
Рондомицин 268
Ронидаза 377
Ротер 378
Ротокан 378
Роцефин 378
Ртути амидохлорид 379
— **дихлорид** 379
— **монохлорид** 379
— **окись желтая** 379
Рубидомицин 379
Рубомицина гидрохлорид 379
Рудотель 263
Рулид 380
Румалон 381
Рутин 106
Рябины плоды 381

Отредактировал: ledi24

Салазодиметоксин 381
Салазопиридазин 381
«Салнимент» 382
Салициламид 382
Салициловая кислота 382
Салол 460
Сальбутамол 382
Сальвин 383
Салюзид растворимый 383
«Санасол» 383
Сангвиритрин 384
Сандопарт 140
Санорин 290
Сапарал 384
Сарколизин 385
Сахарин растворимый 385
Сбор(ы) ветрогонный 386
— **витаминные** 386
— **грудные** 386
— **для возбуждения аппетита** 385
— **желудочный** 386
— **желчегонный** 386
— **мочегонный № 2** 386
— **потогонные** 387
— **противогеморроидальный** 387
— **слабительные** 387
— **успокоительный** 387
Свинца основного ацетат раствор 387
Свинцовый пластырь простой 388
— — **сложный** 388
«Седальгин» 388
Седуксен 391
Секуринина нитрат 388
Секуропен 27
Семаа 388
Сенаде 389
Сенадексин 389
Сензит 389
Сенкаталин 390
Сенны лист 390
Септрин 62
Сера осажденная 390
— **очищенная** 390
Серебра нитрат 390
Серебро коллоидное 220
Сермион 391
Серотонина адипинат 391
Сибазон 391
Сигетин 393
Сигмамицин 316
Сигнопам 394
Сиднокарб 394
Сиднофарм 394
Сиднофен 395
Сизомин 395
Сизомицина сульфат 395
Сикортен 396
Силаболин 397
Силибор 397
Силубин 125
Синактен-депо 398
Синалар 398
Синафлан 398
Синкумар 399
Синтомицина линимент 399
Синэстрол 399
Синюхи лазурной корневище с корнями 400
Сирепар 400
Сироп шиповника 518
Скипидарная мазь 400
Скополамина гидробромид 400
Смородины черной плоды 401
Сок алоэ 32
— **желудочный натуральный** 172
— **каланхоэ** 193
— **подорожника** 344
Солизим 401
«Солимок» 401
Солкосерил 28
Солодки (лакрицы) корень 402
Солутан 402
Соль карловарская 205
Солюсульфон 402
Солюсурьмин 403
Солютизон 403
Соматотропин человеческий для инъекций 403
Сомбревин 404
Сомилаза 404
Сонапакс 405
Сосновые почки 405
Софоры японской настойка 405
Софрадекс 405
Спазмолгон 406
Спазмолитин 406
Спиробромин 406
Спирт камфорный 200
— **мыльный** 407
— — **сложный** 407
— **нашатырный** 40
Спленин 407
Спофадазин 417
Стальника настойка 407
Статизоль 408
Стацепин 425
Стекловидное тело 409
Стелазин 448
Стеркулии настойка 409
Стефаглабрина сульфат 409
Стиптицин 229
Стрептаза 19, 409
Стрептодеказа для инъекций 410
Стрептокиназа 19
Стрептомицина сульфат 410
— **хлоркальциевый комплекс** 411
Стрептосалюзид 412
Стрептоцид 412
— **растворимый** 412
Стрихнина нитрат 413
Строфантин К 413
Стугерон 511
Сукральфат 94
Суксилеп 413
Сулема 379
Сульгин 414
Сульфадимезин 414
Сульфадиметоксин 414
Сульфазин 415
Сульфален 415
— **меглюмин** 416

Отредактировал: ledi24

Сульфамонометоксин 416
Сульфапиридазин 417
— **натрий** 417
Сульфапиримидин 415
Сульфасалазин 417
«Сульфатон» 418
Сульфацил-натрий 418
«Сульфодекортэм» мазь 419
Сульфокамфокаин 419
«Сунореф» 420
Суппозитории «Анестезол» 48
— **«Анузол»** 50
— **«Бетиол»** 77
— **глицериновые** 126
— **«Нео-анузол»** 292
— **с натрия гидрокарбонатом** 284
— **«Цефекон»** 505
Супрастин 420
Сургам 420
Сустак 420
Сустанит 420
Сустанон-250 317
Сушеницы топяной трава 421

Тавегил 421
Тагомед 124
Тазепам 303
Тактивин 421
Талинолол 224
Тамоксифен 174
Танин 422
«Тансал» 422
Таривид 422
Таурин 423
Тауфон 423
Тахистин 424, 152
Теброфеновая мазь 424
Тегретол 425
Тезана линимент 426
Теймурова паста 426
Темехин 426
Темпалгин 426
Теобромин 427
«Теодибаверин» 427
Теоникол 232
Теопэк 427
Теотард 200, 350, 500 428
«Теофедрин» 428
Теофиллин 428
«Тепафиллин» 429
Термопсиса трава 429
Терпингидрат 429
Террилитин 429
«Тестобромлецит» 430
Тестостерона пропионат 430
Тестэнат 431
Тетацин-кальций 431
Тетравит 431
Тетраолеан 316
«Тетрафолевит» 432
Тетрациклина гидрохлорид 432
Тетурам 433, 527
Тиамина бромид 433
— **хлорид** 434
Тиаминпирофосфат 218
Тибон 403, 436
— растворимый 403
Тизамид 434
Тизерцин 435
Тималин 435
Тимарин 435
Тимол 436
Тимоптик 318
Тиндурин 495
Тинидазол 436
Тиоацетазон 436
Тиодин 437
Тиопентал-натрий 437
ТиоТЭФ 438
Тиофосфамид 438
Тиреоидин 438
Тиреокомб 439
Тиреотом 439
Тмина плоды 439
Тобромицин 88
Токоферола ацетат 440
Толокнянки лист 440
Торекан 440
Торфот 441
Тофизопам 134
Тофранил 265
Тразикор 441
Трасилол 223
«Трацептин» 441
Тремблекс 442
Трентал 442
Триампур-композитум 443
Триамцинолона ацетат 210
Трибузон 70
Трибуспонин 443
Трийодтиронина гидрохлорид 443
Трилен 449
Трилистника водяного лист 444
Тримекаин 444
Триметазон 70
Триметин 444
Тринитон 21, 446
Тринитрат глицерина 298
Тринитролонг 444
Триоксазин 445
Триоламин 447
Триомбраст 445
Трипсин кристаллический 446
Триптизол 137
Трирезид-К 446
Трисамин 447
Трисбуффер 447
Триседил 447
«Трисоль» 447
Трифермент 448
Трифтазин 448
Трихлорэтилен 449
Трихомонацид 449
Трихопол 449
Трихоцид 297
Троксевазин 450
Тропафен 450
Тропацин 451
Труксал 496
Тубазид 177
Тубокурарин-хлорид 451
Туринал 451
Тусупрекс 452
Тыквы семя 452
Тысячелистника обыкновенного трава и цветки 452

Уголь активированный 205
— — **«КМ»** 205
Ультракаин 452
Ульфамид 454

Отредактировал: ledi24

«Ундевит» 454
«Ундецин» 454
Унитиол 454
Урбазон 273
Урегит 455
«Уробесал» 455
Урографин 445
«Уродан» 455
Уролесан 456
Уросульфан 456
Уротраст 445
Уротропин 112
Утициллин 207

Фалигност 456
Фали-лепсин 456
Фалиминт 457
Фанодорм 368
Фарингосепт 457
Фасижин 436
«Фастин» мазь 457
Феназепам 458
Фенасал 458
Фенацетин 458
Фенерган 160
Фенибут 458
Фенигидин 459
Феникаберан 459
Фенилин 460
Фенилсалицилат 460
Фенистил 421
Фенкарол 460
«Фенкортозоль» аэрозоль 461
Фенобарбитал 461
Феноболин 462
Феноксиметилпенициллин 462
Фенолфталеин 463
Фентанил 463
Фентоламин 463
Фенхеля плоды 164
Фепранон 464
Фепромарон 464
Феракрил 465
Ферамид 465
Фербитол 465
Ферезол 466
«Феррокаль» 466
«Ферроплекс» 466
«Ферроцерон» 467
Феррум Лек 467
Фестал 467
Фетанол 468
Фетимин 468
Фиалки трава 469
Фибринная пленка 469
Фибринолизин 469
ФиБС 469
Физостигмина салицилат 520
Финлепсин 425
Финоптин 470
Фитин 470
Фитолизин 470
Фитоменадион 471
«Фитоферролактол» 471
Флавинат 471
Флагил 449
«Флакарбин» гранулы 472
Флакумин 472
Фламин 473
Фловерин 473
Флореналевая мазь 473
Флоримицина сульфат 473
Флоринеф 228
Флуспирилен 177
«Флуцинар» мазь 398
Флюорокортизон ацетат 228
«Фогем» линимент 474
Фолацин 474
Фолиевая кислота 474
Фолликулин 475
Фонурит 149
Фопурин 475
Формалин 476
Формидрон 476
Фосфаден 476
Фосфакол 477
Фосфалюгель 477
Фосфобион 284
Фосфотиамин 478
Фосфэстрол 478
Фотрин 479
Френолон 479
Фризиум 479
Фтазин 480
Фталазол 480
Фтивазид 481
Фторафур 481
Фторацизин 481
Фторокорт 482
Фторотан 482
Фторурацил 482
Фубромеган 483
Фузидин-натрий 483
Фурагин 484
— растворимый 484
Фурагина натриевая соль 484
Фурадонин 485
Фуразолидон 485
Фурантрил 487
Фурапласт (с перхлорвинилом) 486
Фурацилин 486
Фуросемид 487

Хвоща полевого трава 488
Химопсин 488
Химотрипсин кристаллический 488
Хинидина сульфат 488
Хинина дигидрохлорид 489
Хиниофон 489
Хинозол 489
Хиноксидин 490
Хинотилин 490
Хиноцид 491
Хлодитан 492
Хлозепид 492
Хлоксил 493
Хлоракон 493
Хлоралгидрат 493
Хлорохин 145
Хлорамфеникол 238
Хлорбутин 494
Хлоргексидин биглюконат 494
Хлоридин 495
Хлористоводородная кислота 495
Хлорофиллипт 495
Хлороформ 496
Хлороцид С 239
Хлорпромазин 37
Хлорпропамид 496
Хлорпротиксен 496
Хлорталидон 314
Хлортрианизен 497
Хлорэтил 497
«Хлосоль» солевой раствор для инъекций 497
Хлофазолин 216
Холагол 498
Холевид 192

Отредактировал: ledi24

Холензим 498
Холестирамин 498
Холина хлорид 499
Холосас 499
Хонван 478
Хонсурид 499
Хориогонин 130
Хромолимфотраст 500

Целанид 500
Целиаза 500
Цепаридс 80
Цепорекс 503
Церебролизин 501
Церигель 501
Цернилтон 502
Церукал 502
Цефазолин натрия 212
Цефалексин 503
Цефалотин 503
«Цефамезин» 212
«Цефекон» суппозитории 505
Цефобид 505
Цефотаксим 214
Цианокобаламин 506
Цигерол 507
Циквалон 508
Циклодол 327, 508
Циклометиазид 508
Циклофосфан 508
Цимезоль аэрозоль 509
Циминаль 509
Цинка сульфат 511
Цинк-кортикотропин суспензия 510
«Цинкундан» 511
Циннаризин 511
Ципринол 511
Цистамина дигидрохлорид 512
Цистеин 512
Цистенал 513
Цитарабин 513
Цититон 514
Цитозар 513
Цитохром-С 514
Цитраль 515
«Цитрамон» 515
Цитроглюкофосфат 516
Цэфедрин 516

Чабреца трава 516
Чага — березовый гриб 517
Череды трава 517
Черемухи плоды 517
Черники плоды 517
Чилибухи настойка 518
Чистеца буквицветного экстракт 518

Шалфея листья 518
Шиповника масло 518
— **плоды** 518

Эвкалипта лист 519
«Эвкатол» капли 519
Эглонил 519
Эзерина салицилат 520
Экдистен 520
Экстракт алоэ жидкий 33
— **алтея сухой** 33
— **боярышника** 86
— **валерианы** 92
— **горицвета** 131
— **красавки** 231
— **крушины** 232
— **левзеи жидкий** 237
— **марены красильной сухой** 261
— **мужского папоротника густой** 326
— **пассифлоры** 329
— **плаценты** 345
— **чистеца буквицветного жидкий** 518
— **элеутерококка жидкий** 521
Эктерицид 520
Эленнум 492
Эметина гидрохлорид 521
Энап 521
Эндоксан 508
Энтеродез 523
Энцефабол 339
Эпилиновый пластырь 523
Эргокальциферол 523
Эргометрина малеат 524
Эрготал 524
Эрготамина гидротартрат 525
Эринит 525
Эритромицин 525
Эритромицина фосфат 526
Эритростимулин 467
Эрициклин 526
Эскузан 527
Эсперале 527
Эссенциале 527
Эстимал 528
Эстоцин 528
Эстрадиола дипропионат 528
Эстрадурин 529
Эстриол 529
Эстроген 529
«Эсфлазид» 529
Этаден 530
Этазол 530
Этазол-натрий 531
Этакридина лактат 531
Этамбутол 531
Этамзилат 532
Этамид 532
Этаминал-натрий 533
Этаперазин 533
Этацизин 533
Этиладрионол 468
Этилморфина гидрохлорид 534
Этилхлорид 497
Этимид 68
Этимизол 534
Этиодан 535
Этионамид 535
Этиотраст 535
Этмозин 536
Этоний 536
Эуноктин 298
Эуспиран 175
Эуфиллин 537
«Эфатин» 537
Эфедрина гидрохлорид 538
«Эфкамон» мазь 538
Эффортил 468

Юмекс 539

Ятрен 489

Отредактировал: ledi24

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

АБОМИН (Abominum). Препарат, получаемый из слизистой оболочки желудка телят и ягнят молочного возраста; содержит сумму протеолитических ферментов.

Фармакологическое действие. Обладает протеолитической активностью.

Показания к применению. Заболевания желудочно-кишечного тракта, сопровождающиеся нарушением переваривающей способности и понижением кислотности желудочного сока (гастриты, гастроэнтериты, энтероколиты и др.).

Способ применения и дозы. Внутрь во время еды по 1 таблетке 3 раза в день в течение 1—2 мес; при недостаточной эффективности разовую дозу увеличивают до 3 таблеток, а курс лечения продлевают до 3 мес. При острых гастритах, гастроэнтеритах, колитах назначают по 1 таблетке 3 раза в день в течение 2—3 дней.

Побочное действие. В отдельных случаях легкая тошнота, изжога.

Форма выпуска. Таблетки по 50 000 ЕД, в упаковке по 10 штук.

Условия хранения. В сухом прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

АВЕЛИЗИН (Awelysin). Синонимы: Streptokinasa, Streptasa.

Фармакологическое действие. Активирует фибринолитическую ферментную систему, расщепляет содержащийся в тромбах фибрин, в результате чего происходит тромболизис.

Показания к применению. Эмболия легочной артерии и ее ветвей; тромбоз артерий и эмболия периферических артерий при консервативном лечении; тромбоз поверхностных и глубоких вен конечностей; острый инфаркт миокарда в течение первых 12 ч; закупорка сосудов сетчатой оболочки глаз.

Способ применения и дозы. Внутривенно капельно, начиная с 100 000—250 000 МЕ в 50 мл изотонического раствора натрия хлорида в течение 30 мин (30 капель в минуту), затем 750 000 МЕ в 500 мл раствора (100 000 МЕ в час) и переходят на поддерживающие дозы. Лечение продолжают 16—18 ч под контролем содержания в крови фибриногена и тромбинового времени.

Побочное действие. Возможны неспецифические реакции на белок; головная боль, тошнота, легкий озноб; аллергические реакции; гематомы при внутримышечных инъекциях; кровотечения после пункции. Для предупреждения аллергических реакций рекомендуется одновременно с авелизином вводить внутривенно 50 мг преднизолона.

Противопоказания. Геморрагические диатезы, недавние кровотечения, выраженная гипертония, стрептококковый сепсис, язва желудка, септический эндокардит, тяжелая форма сахарного диабета, беременность. Препарат следует применять с осторожностью при тяжелых заболеваниях печени и почек, при активной форме туберкулеза.

Форма выпуска. По 250 000 МЕ во флаконе.

Условия хранения. В прохладном месте.

Отредактировал: ledi24

Срок годности 2 года.

Поставляется из Германии. Подобный отечественный препарат выпускается под названием «Стрептолиаза».

АВИСАН (Avisanum). Содержит сумму веществ, полученных из плодов амми зубной (Ammi Visnaga L.).

Фармакологическое действие. Обладает спазмолитическим свойством. Оказывает расслабляющее влияние на мускулатуру мочеточников.

Показания к применению. Спазм мочеточников, почечная колика.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,05—0,1 г 3—4 раза в день после еды в течение 1—3 нед.

Побочное действие. В отдельных случаях диспептические явления.

Форма выпуска. Таблетки, покрытые оболочкой, по 0,05 г, в упаковке по 25 штук.

Условия хранения. В сухом, защищенном от света месте.

Срок годности 4 года.

АВОКСИН (Avoxin).

Фармакологическое действие. Нетрициклический антидепрессант, представитель новой группы специфических ингибиторов «обратного захвата» (re-uptake) серотонина нейронами мозга. Не затрагивает норадренергические процессы. Не обладает ни стимулирующим, ни седативным действием, а также не влияет на психомоторные функции. Препарат практически не имеет антихолинергического действия, не вызывает ортостатическую гипотензивную реакцию, не оказывает влияния в клинически значимых пределах на деятельность сердечно-сосудистой системы. Успешно купирует суицидальные идеи после первой недели приема, в том числе и у больных пожилого возраста.

Показания к применению. Различные формы и степени депрессивных состояний или же аффективных расстройств, сопровождающихся стойким снижением фона настроения, психомоторными нарушениями и психосоматическими симптомами.

Способ применения и дозы. Начальная суточная доза —100 мг для однократного приема перед отходом ко сну. Поддерживающая доза обычно составляет 100 или 200 мг, а в отдельных случаях она может быть увеличена до 300 мг в сутки. Если суточная доза превышает 100 мг, лучше разделить ее на два приема — утром и вечером. Таблетки надо проглатывать целыми, запивая небольшим количеством жидкости.

Больным с нарушениями функции печени рекомендуется снижение начальной дозы препарата при регулярном наблюдении. Авоксин не следует назначать детям, женщинам, кормящим грудью. При беременности необходимо соблюдать все меры предосторожности. Проходя курс лечения, не стоит употреблять спиртные напитки.

Терапию ингибиторами МАО (моно-амино-оксидаза) надо прекратить за 14 дней до начала приема авоксина. При одновременном назначении авоксина и пропранолола нужно снизить дозировку пропранолола. Не отмечается взаимодействия авоксина с атенололом и дигоксином.

Побочное действие. Препарат хорошо переносится больными. Могут быть тошнота и рвота, носящие преходящий характер и не требующие отмены терапии. У больных с повышенной чувствительностью возможны сонливость, запоры, беспокойство, анорексия и тремор.

Противопоказания. Не установлены.

Форма выпуска. В упаковке 16 таблеток по 100 мг.

Срок годности 5 лет.

Поставляется фирмой «КРКА», Словения в сотрудничестве с фирмой «Duphar», Швейцария.

Отредактировал: ledi24

АГИОЛАКС (Agiolax). Гранулы, содержащие обогащенные слизистыми веществами семена подорожника блошного, плоды сенны остролистной и экстракт ромашки со стандартизированным содержанием азуленов.

Фармакологическое действие. Средство многокомпонентного послабляющего влияния на кишечник. Набухание семени подорожника ведет к физическому раздражению рецепторов кишечной стенки, неперевариваемые гемицеллюзы уже в высоких отделах толстой кишки формируют оптимальную консистенцию содержимого, а гликозиды сенны повышают чувствительность рецепторов кишечника.

Показания к применению. Запор, особенно его хронические формы; регуляция стула во время беременности, после родов, у лежачих больных, привыкание к долгим слабительным средствам; опорожнение при искусственном заднем проходе.

Способ применения и дозы. Обычно препарат принимают утром и вечером натощак по 1—2 чайной ложечки, не разжевывая, с 1 стаканом холодной воды или чая. После появления эффекта дозу уменьшают до 1 (или 1/2) чайной ложечки, при хорошем эффекте принимать 1/2 чайной ложечки только по утрам. При недостаточном эффекте интервал между приемами сократить до 6 часов. Для регуляции стула во время беременности препарат принимается вечером с горячей жидкостью не более 2 чайных ложечек.

Побочное действие. Не установлено.

Противопоказания. Кишечная непроходимость.

Форма выпуска. Оригинальная упаковка, содержащая 100 или 250 граммов гранул.

Условия хранения. В сухом прохладном месте.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Германии.

АДЕЛЬФАН-ЭЗИДРЕКС (Adelphane-Esidrex). В одной таблетке содержится резерпина 0,1 мг, дигидралазина 10 мг, гидрохлортиазида (гипотиазид) 10 мг. Синоним: тринитон.

Фармакологическое действие. Гипотензивный препарат.

Показания к применению. Все формы гипертонической болезни.

Способ применения и дозы. Внутрь по 1 таблетке 2—3 раза в день после еды.

Побочное действие. Боль в эпигастральной области, заложенность носа, брадикардия, сонливость.

Противопоказания. Тяжелая печеночная недостаточность.

Форма выпуска. Таблетки в упаковке по 100 штук, драже в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Индии.

АДИПОЗИН (Adiposinum). Препарат, получаемый из передней доли гипофиза убойного скота.

Фармакологическое действие. Способствует мобилизации жира из депо и последующему его сгоранию, активирует липолитические ферменты жировой ткани.

Показания к применению. Конституциональная форма ожирения.

Способ применения и дозы. Внутримышечно по 50 ЕД 2 раза в день в течение 10—20 дней (в сочетании с малокалорийной диетой).

Побочное действие. Задержка жидкости в организме, аллергические реакции.

Отредактировал: ledi24

Противопоказания. Сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, наклонность к гипертензии и аллергическим заболеваниям, нарушения функции печени и почек.

Форма выпуска. Во флаконах по 0,05 г с приложением ампулы растворителя (2 мл 0,5% раствора новокаина) в упаковке по 10 штук.

Условия хранения. При температуре не выше 16—18°С.

Срок годности 2 года.

АДИУРЕКРИН (Adiurecrinum). Сухой препарат, получаемый из задней доли гипофиза рогатого скота и свиней. Содержит антидиуретический гормон, близкий по строению к окситоцину (см.).

Фармакологическое действие. Антидиуретическое средство.

Показания к применению. Несахарное мочеизнурение, ночное недержание мочи.

Способ применения и дозы. Вводят внутриназально по 0,02—0,05 г порошка 2—3 раза в день. Детям дозы устанавливают в зависимости от возраста.

Побочное действие. Легкое раздражение глаз и полости рта (особенно у детей).

Противопоказания. Заболевания дыхательных путей и околоносовых пазух. Порошок не назначают детям в возрасте до 3 лет.

Форма выпуска. Порошок.

Условия хранения. Список Б. В сухом прохладном месте.

Срок годности 3 года.

АДИУРЕТИН-СД (Adiuretin-SD). Капли в нос. Водный раствор 1-дезамино-8-D-аргинино-вазопрессина 1:10 000 (1 мл содержит 0,1 мг).

Фармакологическое действие. Синтетический аналог натурального гормона задней доли гипофиза — вазопрессина. Обладает антидиуретическими свойствами. Будучи полипептидом, препарат подвергается разложению ферментами пищеварительного тракта. Препарат хорошо переносится больными.

Показания к применению. Несахарный диабет.

Способ применения и дозы. Закапывают в нос по 1—4 капли 2—3 раза в день. Число капель регулируют осторожным нажатием на капельницу.

Форма выпуска. Флаконы по 5 мл с капельницей.

Условия хранения. В прохладном темном месте.

Срок годности 2 года.

Поставляется из Чехо-Словакии.

АДОНИС-БРОМ (Adonis-Brom). Таблетки, покрытые оболочкой. Состав на 1 таблетку: массы «адонис-бром», содержащей 72,5 % калия бромида, экстракта адониса сухого активностью 36,5 ЛЕД в 1 г —0,345 г, вспомогательных веществ до получения таблетки массой не более 0,6 г.

Показания к применению. Неврозы сердца и легкие формы недостаточности кровообращения. Применяют в качестве успокаивающего средства по 1 таблетке 3 раза в день.

Форма выпуска. Таблетки, покрытые оболочкой, в упаковке 25 штук.

Условия хранения. В сухом месте.

Срок годности 2 года.

АДРЕНАЛИНА ГИДРОХЛОРИД (Adrenalini hydrochloridum). 1-1-(3,4-Диоксифенил)-2-метиламиноэтанола гидрохлорид. Синоним: Epinephrinum.

Фармакологическое действие. Стимулятор α- и β-адренорецепторов.

Отредактировал: ledi24

Показания к применению. Приступы бронхиальной астмы, гипогликемия вследствие передозировки инсулина, острые медикаментозные аллергические реакции, простая открытоугольная глаукома и др.; в качестве сосудосуживающего и противовоспалительного средства в оториноларингологической и офтальмологической практике.

Способ применения и дозы. Подкожно и внутримышечно, иногда внутривенно 0,3—1 мл 0,1 % раствора. При острой остановке сердца внутрисердечно; при глаукоме 1—2 % раствор в каплях.

Побочное действие. Тахикардия, нарушение ритма сердца, повышение АД; при ишемической болезни сердца возможны приступы стенокардии.

Противопоказания. Артериальная гипертония, выраженный атеросклероз, сахарный диабет, тиреотоксикоз, беременность, закрытоугольная глаукома. Адреналин нельзя применять при наркозе фторотаном (в связи с появлением аритмий).

Форма выпуска. 0,1 % раствор в ампулах по 1 мл, в упаковке 10 штук, во флаконах по 30 мл.

Условия хранения. Список Б. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

АДРЕНАЛИНА ГИДРОТАРТРАТ (Adrenalini hydrotartras). 1-1-(3,4-Диоксифенил)-2-метиламиноэтанола гидротартрат.

Показания и способ применения те же, что и для адреналина гидрохлорида.

Форма выпуска. Ампулы по 1 мл 0,18 % раствора, в упаковке 10 штук, порошок.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

АДРИАБЛАСТИН (Adriablastinum). Синоним: Adriamycin.

Фармакологическое действие. Антибиотик из группы антрациклинов. Обладает противоопухолевой активностью.

Показания к применению. Лимфосаркомы, лимфогранулематоз, острые лейкозы, рак молочной железы, легкого, злокачественные опухоли яичка, саркома мягких тканей и некоторые костные саркомы, нейробластома и опухоль Вильмса у детей, а также рак щитовидной железы и переходноклеточный рак мочевого пузыря.

Применение препарата в комбинации с другими цитостатическими средствами увеличивает процент успешного лечения.

Способ применения и дозы. Вводят внутривенно. Содержимое флакона разводят в 5 мл дистиллированной воды или изотонического раствора натрия хлорида. Курс лечения и дозы устанавливают в зависимости от локализации опухоли и переносимости препарата. Чаще адриабластин назначают по 60—75 мг/м^2 1 раз в 3—4 нед в комбинации с другими препаратами. Ослабленным больным рекомендуется вводить адриабластин 3 дня подряд в меньших дозах.

Во время лечения необходим тщательный гематологический контроль.

Побочное действие. Тошнота, рвота, стоматит, диарея, анорексия, алопеция, угнетение кроветворения, боль в области сердца, временное ухудшение данных ЭКГ, флебиты, дерматиты, аллергические реакции, кумулятивная кардиотоксичность.

Противопоказания. Тяжелые заболевания сердца и печени, а также значительные лейко- и тромбоцитопении (число лейкоцитов ниже $3 \cdot 10^9$/л и число тромбоцитов ниже $100 \cdot 10^9$/л).

Отредактировал: ledi24

Форма выпуска. Упаковка содержит 1 флакон (0,01 г) адриабластина в виде порошка и 1 флакон с 5 мл воды для инъекций.

Условия хранения. Обычные.

Срок годности 3 года.

АДРОКСОН (Adroxonum). Семикарбазон 1-метил-3-окси-2,3-дигидроиндол-5,6-хинона гидрат. Синонимы: Adrenoxyl, Chromadren, Sangostatin.

Фармакологическое действие. Гемостатическое средство.

Показания к применению. Паренхиматозные и капиллярные кровотечения; для профилактики послеоперационных кровотечений и гематом; при кровотечениях различной этиологии.

Способ применения и дозы. Подкожно и внутримышечно по 1 мл 0,025 % раствора 1—4 раза в день; иногда местно для смачивания марлевых тампонов.

Форма выпуска. Ампулы по 1 мл 0,025 % раствора, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 4 года.

«АЕВИТ» («Aevitum»). Масляный раствор, в 1 мл которого содержится 0,035 г ретинола ацетата (витамин А) и 0,1 г α-токоферола ацетата (витамин Е).

Применение. При атеросклеротических изменениях сосудов внутримышечно по 1 мл 1 раз в день в ранних стадиях заболевания в течение 20 дней, во II и III стадиях и при трофических нарушениях тканей 30—40 дней; внутрь по 1—2 капсулы 2—3 раза в день. Через 3—6 мес курс лечения можно повторить[1].

Противопоказания. Тиреотоксикоз, холецистит, недостаточность кровообращения III стадии.

Форма выпуска. Ампулы по 1 мл, в упаковке 10 штук, капсулы по 0,2 г, в упаковке 25 штук.

Условия хранения. В защищенном от света месте при температуре 5—10°С.

Срок годности 2 года.

АЕКОЛ (Aecol). Комбинированный препарат, в состав которого входят раствор ретинола ацетата в масле — 1,04 г, токоферола ацетат — 0,18 г, 2 метил-1,4-нафтохинон (витамин $К_3$) — 0,21 г, каратолин в масле — до 100 мл.

Фармакологическое действие. Нормализует метаболизм пораженной ткани, ускоряет процессы регенерации.

Показания к применению. Ранозаживляющее средство при лечении гнойно-некротических ран, трофических язв, инфицированных ожогов II и III степени, а также после аутодермопластики.

Способ применения и дозы. Применяют наружно в виде масляных повязок. Препарат наносят на пораженные участки кожи, предварительно очищенные от некротических налетов, затем накладывают повязку. Всю процедуру повторяют через день до появления грануляций и эпителизации.

Побочное действие. Возможны местные аллергические реакции.

Противопоказания. Не установлены.

Форма выпуска. Выпускают в виде маслянистой жидкости во флаконах из оранжевого стекла по 100 мл.

Условия хранения. В прохладном, защищенном от света месте

[1] Побочное действие не обнаружено.

Отредактировал: ledi24

АЗАКТАМ (Azactam). Синоним: азтреонам.

Фармакологическое действие. Первый синтетический монобактамовый антибиотик, обладающий бактерицидным воздействием на грамотрицательные микроорганизмы, но нейтральный к грамположительным микроорганизмам и анаэробам. Аналогичен аминогликозидам, однако в отличие от них может проявлять активность и в анаэробной среде. Препарат воздействует и на Pseudomonas aeruginosa, резистентный к пиперациллину, цефоперазону и аминогликозидам. В комбинации с пиперациллином, цефотаксимом или цефоперазином синергистически влияет на Enterobacteriaceae. У азактама высокая собственная эффективность и высокая степень резистенции к гидролизу, вызванному действием беталактамаз.

Показания к применению. Лечение тяжелых осложненных бактериальных инфекций, вне зависимости от локализации процесса в случае мультирезистентности возбудителей инфекции, но при чувствительности их к азтреонаму.

Способ применения и дозы. Может вводиться внутривенно и внутримышечно. Дозировка и способ введения препарата в организм должны подбираться в зависимости от степени чувствительности микроорганизма-возбудителя, тяжести инфекции и состояния больного.

Взрослые. Инфекции мочевых путей: 0,5—1 г каждые 8—12 часов. Тяжелые системные инфекции: 1—2 г каждые 8—12 часов. Очень тяжелые инфекции: 2 г каждые 6—8 часов. Максимальная рекомендуемая доза: 8 г в сутки.

В соответствующей более низкой дозировке препарат может назначаться больным с почечной недостаточностью, находящимся на гемодиализе, а также при тяжелых нарушениях функции печени. Дозировка уменьшается наполовину, когда клиренс креатинина составляет 10—30 мл/мин. Внутривенное введение препарата рекомендуется, когда больному необходимо одноразовое введение в одноразовой дозе, превышающей 1 г.

Дети. Обычная дозировка для детей старше 1 недели составляет 30 мг/кг каждые 6—8 часов. В случае тяжелых инфекций детям в возрасте 2 лет и старше вводят 50 мг/кг каждые 6—8 часов.

Для внутримышечного введения 1 г азактама растворяют не меньше чем в 3 мл воды; для внутривенного введения содержимое флакона разбавляют 6—10 мл воды. После добавления растворителя препарат надо сразу взболтать. Если весь флакон не расходуется за один раз, его можно хранить в холодильнике только 24 часа при 4—7°С. Азактам нельзя смешивать с другими препаратами или антибиотиками.

Побочное действие. Могут появиться местные реакции, кожные высыпания, ощущение тошноты и диаррея.

Противопоказания. Азактам противопоказан лицам с утвержденной аллергией на этот препарат; не рекомендован при беременности и в период лактации, так как проникает через плацентарный барьер и выделяется вместе с молоком.

Форма выпуска. Флаконы по 500 мг и по 1 г азтреонама и соответственно по 390 или 780 мг-L аргинина.

Срок годности 3 года.

Поставляется фирмой «КРКА», Словения в сотрудничестве с фирмой «E. R. Squibb & Sons Inc.», США.

АЗАЛЕПТИН (Asaleptinum). 8-Хлор-11-(4 метил-1-пиперазинил)-5Н дибензо-[b, e]-1,4-диазепин. Синонимы: лепонекс, клозапин.

Фармакологическое действие. Нейролептик с успокаивающим и ан-

Отредактировал: ledi24

типсихотическим эффектом, не вызывающий экстрапирамидных расстройств, оказывает мышечнорасслабляющее действие, потенцирует действие снотворных и анальгетических средств. Обладает периферическими и центральными холинолитическими свойствами.

Показания к применению. У взрослых при острых и хронических формах шизофрении, маниакальных состояниях, маниакально-депрессивном психозе, психомоторном возбуждении, различных психотических состояниях.

Способ применения и дозы. Внутрь после еды 2—3 раза в день. Разовая доза 0,05—0,2 г, суточная —0,2—0,4 г, высшая суточная доза 0,6 г. Дозу устанавливают индивидуально, начиная с небольших доз. При легких формах заболевания, а также больным с нарушениями функции почек и сердца, с цереброваскулярными расстройствами назначают более низкие суточные дозы (0,025—0,2 г).

Побочное действие. Возможны мышечная слабость, сонливость, спутанность сознания, сухость во рту, ортостатическая гипотензия, тахикардия, повышение температуры тела, нарушение аккомодации, в некоторых случаях — гиперсаливация.

Серьезным осложнением является гранулоцитопения, которая может достигать степени агранулоцитоза. При появлении этих симптомов лечение немедленно прекращают. При лечении требуется систематический контроль за кровью, вначале еженедельно, в дальнейшем — через 3—4 мес.

Противопоказания. Острый алкогольный и другие интоксикационные психозы, спазмофилия, эпилепсия, тяжелые заболевания печени, почек, сердечно-сосудистой системы, заболевания кроветворной системы, глаукома, аденома предстательной железы, атония кишечника, первые 3 мес беременности. Во время лечения азалептином недопустимо находиться за рулем транспортного средства или выполнять работу, требующую повышенного внимания и быстрой психической и двигательной реакции.

Форма выпуска. Таблетки по 0,025 г, в упаковке по 50 штук, и 0,1 г по 50 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

АЗАТИОПРИН (Azathioprinum). 6-(1′-Метил-4′-нитроимидазолил)-5′-меркаптопурин. **Синоним:** Imuran.

Фармакологическое действие. Иммунодепрессант, одновременно оказывает некоторое цитостатическое действие.

Показания к применению. Подавление реакции тканевой несовместимости при пересадке органов, ревматоидный артрит, системная красная волчанка, неспецифический язвенный колит и др.

Способ применения и дозы. Внутрь за 1—7 дней до операции и после в течение 1—2 мес по 4 мг/кг с последующим уменьшением дозы до 3—2 мг/кг; при других заболеваниях 1—1,5 мг/кг (кг· сут).

Побочное действие. Тошнота, рвота, потеря аппетита, при применении больших доз токсический гепатит. В процессе лечения необходим гематологический контроль.

Противопоказания. Лейкопения (3×10^9/л), тяжелые заболевания печени.

Форма выпуска. Таблетки по 0,05 г, в упаковке по 50 штук.

Условия хранения. Список А.

Срок годности 5 лет.

АЗАФЕН (Azaphenum). 2-(4-Метил-1-пиперазинил)-10-метил-3,4-диазафеноксазина дигидрохлорид.

Отредактировал: ledi24

Фармакологическое действие. Антидепрессант, дающий седативный эффект.

Показания к применению. Астенодепрессивные и тревожно-депрессивные состояния различной этиологии.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,025 г 4 раза в сутки, нередко суточные терапевтические дозы составляют 0,15—0,2 г.

Побочное действие. В редких случаях головокружение, тошнота, рвота.

Противопоказания. Одновременное применение с ингибиторами моноаминоксидазы.

Форма выпуска. Таблетки по 0,025 г, в упаковке по 250 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 5 лет.

АЗЛОЦИЛЛИН (Azlocillin Sodium). Полусинтетический бета-лактамный антибиотик группы ацилуреидопенициллинов. Синоним: секуропен, азлин.

Фармакологическое действие. Оказывает бактерицидное действие на большое число патогенных грамотрицательных, индолположительных и грамположительных микроорганизмов. Не устойчив в отношении бета-лактамаз. Доказан синергизм с аминогликозидными антибиотиками.

Показания к применению. Урогенитальные инфекции, септические состояния разного происхождения, инфекции костей и мягких тканей, респираторные, желчные, желудочно-кишечные инфекции, серозиты, инфицированные обширные участки ожогов и др. Для местного промывания в виде дренажа препарат назначают при остеомиелите, плевроэмпиеме, гнойных полостях, свищах.

Способ применения и дозы. Средняя суточная доза для взрослых — от 8 г (по 2 г —4 раза) до 15 г (по 5 г —3 раза), при тяжелых инфекциях допускается назначение 20 г в сутки (по 5 г —4 раза). Средняя суточная доза для новорожденных — по 100 мг/кг массы тела 2 раза; для грудных детей в возрасте до 1 года — по 100 мг/кг 3 раза; для детей в возрасте от 1 года до 14 лет — по 75 мг/кг 3 раза. Продолжительность лечения — не менее 3 дней после нормализации температуры и исчезновения клинических симптомов. Применяют в виде 10 % водного раствора, вводят внутривенно (струйно или капельно).

Побочное действие. В редких случаях легкие аллергические реакции, желудочно-кишечные расстройства.

Противопоказания. Сверхчувствительность к пенициллинам и цефалоспоринам.

Форма выпуска. Лиофилизированный порошок для приготовления инъекционного раствора во флаконах по 1 г по 10 штук в упаковке.

Условия хранения. В сухом, холодном и темном помещении.

АЗОТА ЗАКИСЬ (Nitrogenium oxydulatum).

Фармакологическое действие. Наркотическое средство.

Показания к применению. Для газового наркоза при хирургических вмешательствах; для обезболивания родов и длительного послеоперационного обезболивания.

Способ применения и дозы. В смеси с кислородом (70—80 % закиси азота и 20—30 % кислорода) с помощью специальных аппаратов для наркоза.

Побочное действие. Тошнота и рвота после наркоза.

Противопоказания. Необходима осторожность при выраженной гипоксии и нарушении диффузии газов в легких.

Форма выпуска. В металлических баллонах по 10 л.

Отредактировал: ledi24

Условия хранения. При комнатной температуре в закрытом помещении вдали от источников тепла.

Срок годности не ограничен.

АИРА КОРНЕВИЩЕ (Rhizoma Calami). Содержит эфирное масло (в неочищенном сырье 2 %, в очищенном 1,5 %), горькое вещество акорин, дубильные вещества.

Применение. Как средство, повышающее аппетит и улучшающее пищеварение, в виде настоя (10,0:200,0) по $^1/_4$ стакана 3 раза в день за 30 мин до еды. Служит сырьем для производства аирного масла.

Форма выпуска. Резаное корневище в упаковке по 100 г.

Условия хранения. В сухом прохладном месте.

Срок годности 3 года.

АЙМАЛИН (Ajmalinum). Алкалоид, содержащийся в некоторых видах раувольфии (Rauwolfia serpentine Benth. и др.). Синоним: Gilurytmal.

Фармакологическое действие. Обладает противоаритмической активностью.

Показания к применению. Различные нарушения ритма (предсердная и желудочковая экстрасистолия, пароксизмальная тахикардия и др.), аритмии, вызванные дигиталисной интоксикацией и при свежем инфаркте миокарда.

Способ применения и дозы. Внутримышечно 0,05—0,15 г/сут; для купирования острого приступа тахикардии внутривенно 2 мл 2,5 % раствора в 10 мл изотонического раствора натрия хлорида или 5 % раствора глюкозы. По устранении аритмии внутрь по 0,1 г 3—4 раза в день.

Побочное действие. Слабость, тошнота, рвота, понижение АД, аллергические реакции; при внутривенном введении — ощущение жара.

Противопоказания. Тяжелые нарушения проводящей системы сердца, выраженная сердечная недостаточность, гипотония, воспалительные изменения миокарда.

Форма выпуска. Таблетки, покрытые оболочкой, по 0,05 г, в упаковке по 20 штук; ампулы по 2 мл 2,5 % раствора, в упаковке по 10 штук.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности. Ампулы 1 год, таблетки 2 года.

АКТОВЕГИН (Actovegin). Комбинированный препарат; 1 ампула содержит депротеинизированный гемодериват из телячьей крови (соответствует 80 мг сухого веса), р-пропиловый эфир гидроксибензойной кислоты (0,34 мг), р-метиловый спирт гидроксибензойной кислоты (1,26 мг), воду для инъекций (до 2 мл.) Синоним: солкосерил.

Фармакологическое действие. Безбелковый экстракт телячьей крови улучшает поглощение кислорода на клеточном уровне и способствует накоплению питательных веществ в клетке. Тем самым ускоряются процессы, связанные с высоким потреблением энергии, например заживление ран. Это ведет к увеличению кровотока в ишемизированных областях.

Показания к применению. Нарушения церебрального метаболизма и кровообращения (черепно-мозговые травмы), периферического артериального и венозного кровообращения; заболевания артерий, язвы голени; трансплантация кожных покровов, ожоги; осложнения при заживлении ран — инфицированные раны, пролежни; лучевые повреждения кожи и слизистой (профилактика и лечение).

Способ применения и дозы. Актовегин вводится внутривенно, внутриартериально или внутримышечно. В первых двух случаях, в зависи-

Отредактировал: ledi24

мости от тяжести заболевания, начальная доза составляет 10—20 мл или дополнительно с инфузией. Для поддерживающей терапии назначается 2—4 мл ежедневно либо несколько раз в неделю. При внутримышечном применении медленно вводится не более 5 мл, так как раствор обладает гипертоническими свойствами. Актовегин не следует применять вместе с другими инфузионными растворами, кроме изотонического физиологического раствора и 5 % раствора глюкозы. Инфузионный раствор имеет легкий желтоватый оттенок, а различная интенсивность цвета в разных партиях обусловлена исходным материалом, что, однако, не влияет на действие препарата и на его переносимость.

Побочное действие. У пациентов, предрасположенных к сверхвосприимчивости, могут быть вызваны аллергические реакции (крапивница, неожиданное ощущение жара, повышение температуры, шок).

Противопоказания. Аллергия на актовегин или подобные препараты.

Форма выпуска. По 5 ампул в коробке.

Условия хранения. При температуре не выше 25°С, в темном месте, не доступном детям.

Срок годности 5 лет.

Поставляется фирмой «КРКА», Словения.

АЛАНТОН (Alantonum). Сумма сесквитерпеновых лактонов селинанового типа (алантолактон и изоалантолактон), выделенных из корней девясила высокого.

Фармакологическое действие. Противовоспалительное средство.

Показания к применению. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, эрозивные гастриты и пилородуодениты.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,1 г 3—4 раза в день за 30 мин до еды. Курс лечения 4—6 нед, при нерубцующихся язвах — до 8 нед.

Побочное действие. Усиление изжоги и боли в животе.

Форма выпуска. Таблетки по 0,1 г, в упаковке 100 штук.

Условия хранения. В прохладном месте.

Срок годности 2 года.

АЛЛАПИНИН (Allapininum). Бромистоводородная соль алкалоида липпаконитина с примесью сопутствующих алкалоидов, получают из растения аконита белоустого (Aconitum leucostomum L.).

Фармакологическое действие. Оказывает антиаритмическое действие при предсердных и желудочковых нарушениях ритма сердца, обусловленных различными механизмами. Замедляет скорость проведения импульсов по предсердиям и системе Гиса— Пуркинье, не влияя на проведение импульсов по атриовентрикулярному узлу. Влияние на функцию синусового узла выражено незначительно. Препарат не обладает заметным отрицательным инотропным свойством, не вызывает артериальной гипотензии. Оказывает местноанестезирующее и седативное действие.

Показания к применению. Наджелудочковая и желудочковая экстрасистолия, пароксизмы мерцания и трепетания предсердий, пароксизмальная наджелудочковая тахикардия, в том числе синдром Вольфа — Паркинсона — Уайта; пароксизмальная желудочковая тахикардия.

Способ применения и дозы. Таблетки, предварительно измельчив, принимают внутрь за 30 мин до еды, запивая теплой водой. Вначале назначают по 0,025 г каждые 8 ч. При отсутствии эффекта дозу увеличивают, назначая по 0,025 г каждые 6 ч. Возможно дальнейшее увеличение дозы до 0,05 г на прием каждые 6—8 ч. Продолжительность лечения зависит от состояния больного и характера нарушения ритма, может продолжаться до нескольких месяцев. Высшие дозы: разовая — 0,15 г, суточная —0,3 г.

Отредактировал: ledi24

Побочное действие. Возможны головокружение, ощущение тяжести в голове, диплопия. При выраженности этих явлений следует уменьшить дозу препарата. При длительном применении препарата возможна синусовая тахикардия. В этом случае назначают малые дозы β-блокаторов.

Противопоказания. Атриовентрикулярная блокада II степени и более высоких степеней, тяжелая печеночная и почечная недостаточность. При атриовентрикулярной блокаде I степени, нарушениях внутрижелудочковой проводимости, синдроме слабости синусового узла, а также при тяжелой недостаточности кровообращения аллапинин следует назначать под более тщательным врачебным контролем, начиная лечение в стационарных условиях, чаще осуществляя электрокардиографический контроль. Беременным аллапинин назначают лишь по жизненным показаниям.

Форма выпуска. В таблетках по 0,025 г, 30 таблеток в упаковке.

Условия хранения. Список Б. В сухом прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

АЛЛОКСИМ (Alloximum). N-аллил-2 пиридинальдоксамина бромид.

Фармакологическое действие. Реактиватор холинэстеразы.

Показания к применению. В комбинации с холинолитическими препаратами (атропин и др.) при отравлениях фосфорорганическими соединениями.

Способ применения и дозы. Вводят внутримышечно однократно или повторно в зависимости от тяжести отравления. Содержимое ампулы (0,075 г) растворяют в 1 мл воды для инъекций. При начальных признаках отравления вводят под кожу 2—3 мл 0,1 % раствора атропина сульфата и внутримышечно аллоксим в дозе 0,075 г на 60—80 кг массы тела больного. Если симптомы отравления не исчезают, через 2—3 ч вводят повторно препараты в тех же дозах.

При более тяжелых формах отравления вводят внутривенно 3 мл 0,1 % раствора атропина сульфата, через 5—6 мин внутривенное введение атропина в той же дозе повторяют до полного прекращения явлений бронхоспазма и развития симптомов атропинизации. Одновременно вводят аллоксим в дозе 0,075 г внутримышечно с интервалом между инъекциями 1—3 ч.

Разовая доза аллоксима 0,075 г, суточная —0,2—0,8 г. Суммарная доза составляет 0,4—1,6 г.

Препарат применяют в стационаре или в условиях скорой помощи.

Форма выпуска. В виде лиофилизированного порошка в ампулах по 0,075 г № 10 с приложением растворителя — вода для инъекций в ампулах по 1 мл.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте при температуре не выше 10°С.

Срок годности 2 года.

АЛЛОПУРИНОЛ (Allopurinolum). 4-Окси-пиразоло-(3,4-d)-пиримидин. Синонимы: Milurit, Apurin.

Фармакологическое действие. Ингибируя ксантиноксидазу, тормозит синтез мочевой кислоты, что способствует уменьшению содержания уратов в сыворотке крови и предотвращает их отложение в тканях.

Показания к применению. Для лечения и профилактики заболеваний, сопровождающихся гиперурикемией и образованием уратных камней (первичная и вторичная подагра, мочекаменная болезнь с обра-

Отредактировал: ledi24

зованием конкрементов, содержащих ураты, первичная и вторичная гиперурикемия).

Способ применения и дозы. Внутрь после еды по 0,1 г 3—4 раза в день, суточная доза может быть увеличена до 0,8 г (в 4 приема).

Побочное действие. В начале лечения обострение болезни, иногда диспептические явления, эозинофилия, кожные высыпания, лихорадка.

Противопоказания. Почечная недостаточность с нарушением выделительной функции, беременность.

Форма выпуска. Таблетки по 0,1 г, в упаковке по 50 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 5 лет.

АЛЛОХОЛ (Allocholum). Состав: желчи животной сухой 0,08 г, экстракта чеснока сухого 0,04 г, экстракта крапивы сухого 0,005 г, угля активированного 0,025 г, наполнителей достаточное количество.

Фармакологическое действие. Желчегонное средство.

Показания к применению. Хронические гепатиты, холангиты, холециститы, привычный запор.

Способ применения и дозы. Внутрь по 2 таблетки 3 раза в день после еды.

Противопоказания. Язвенная болезнь желудка; острая и подострая дистрофия печени; необходима осторожность при механической желтухе.

Форма выпуска. Таблетки, покрытые оболочкой, в упаковке по 10 штук и по 50 штук, по 10 штук для детей.

Условия хранения. В сухом, защищенном от света месте.

Срок годности 4 года.

АЛМАГЕЛЬ (Almagel). Состав: 5 мл препарата содержат 4,75 мл алюминия гидроокиси (гель), 100 мг магния гидроокиси, D-сорбит.

Фармакологическое действие. Антацидное, адсорбирующее, обволакивающее средство.

Показания к применению. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, острые и хронические гиперацидные гастриты, эзофагит и другие заболевания, сопровождающиеся повышенной кислотностью и протеолитической активностью.

Способ применения и дозы. Внутрь по 1—2 чайные ложки 4 раза в день за 30 мин до еды и перед сном.

Побочное действие. В отдельных случаях возможен запор.

Форма выпуска. Флаконы по 170 мл.

Условия хранения. В прохладном месте (замерзание не допускается).

Срок годности 5 лет.

Поступает из Болгарии.

АЛМАГЕЛЬ-А (Almagel-A). Состав: 5 мл препарата содержат 4,75 мл алюминия гидроокиси (гель), 100 мг магния гидроокиси, 100 мг анестезина, D-сорбит.

Лечебные свойства и дозы те же, что и у алмагеля.

Применяют при тех же заболеваниях, что и алмагель, в случаях, когда они сопровождаются болью, тошнотой и рвотой.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к анестезину

Форма выпуска. Флаконы по 170 мл.

Условия хранения. В прохладном месте (замерзание не допускается).

Срок годности 5 лет.

Поступает из Болгарии.

Отредактировал: ledi24

АЛОРОМ (Alorom). Линимент, содержащий сок алоэ, экстракт ромашки жидкий, экстракт календулы жидкий, масло касторовое, эмульгатор № 1, ментол и масло эвкалиптовое. Однородная густая масса светло-коричневого цвета со специфическим запахом.

Фармакологическое действие. Обладает противовоспалительными свойствами, способствует рассасыванию гематом и репарации тканей, снижает болевые ощущения.

Показания к применению. Используют в комплексной терапии при посттравматических артритах, плекситах, радикулитах, миозитах, миалгиях, полиартритах, тендовагинитах, наружных гематомах, для профилактики пролежней.

Способ применения и дозы. Наносят на кожу тонким слоем 2—3 раза в день, слегка массируя пораженные участки. Курс лечения от 5 до 15 дней. При необходимости курс лечения повторяют через 1—2-недельный перерыв.

Противопоказания. Не рекомендуется наносить на поврежденную кожу.

Условия хранения. В сухом прохладном месте.

Срок годности 2 года.

АЛОЭ ЛИНИМЕНТ (Linimentum Aloës). Состав: сока алоэ древовидного (консервированного) 78 г, масла касторового 10,1 г, эмульгатора № 1 10,1 г, масла эвкалиптового 0,1 г, кислоты сорбиновой 0,2 г, натрийкарбоксиметилцеллюлозы 1,5 г.

Показания к применению. Ожоги и для предупреждения и лечения поражений кожи при лучевой терапии.

Способ применения и дозы. Наносят тонким слоем 2—3 раза в сутки на пораженную поверхность и накрывают салфеткой.

Форма выпуска. Во флаконах по 50 г.

Условия хранения. В защищенном от света месте при температуре не выше 10°С (замораживание линимента не допускается).

Срок годности 2 года.

АЛОЭ С ЖЕЛЕЗОМ СИРОП (Sirupus Aloës cum Ferro). Состав: раствора хлорида закисного железа, содержащего 20% железа 135 г, кислоты хлористоводородной разведенной 15 г, кислоты лимонной 4 г, сиропа из сока алоэ древовидного до 1000 г.

Показания к применению. Гипохромные анемии.

Способ применения и дозы. По $^1/_2$—1 чайной ложки в $^1/_4$ стакана воды 3 раза в день. Курс лечения 15—30 дней.

Форма выпуска. По 100 г во флаконе.

Срок годности 2 года.

АЛОЭ СОК (Succus Aloës). Состав: сока из свежесобранных листьев алоэ 80 мл, спирта этилового 95% 20 мл, хлорбутанолгидрата 0,5 г.

Показания к применению. Гастриты, гастроэнтериты, энтероколиты, запоры.

Способ применения и дозы. Внутрь по 1 чайной ложке 2—3 раза в день за 30 мин до еды; при лечении гнойных ран, ожогов, воспалительных заболеваний кожи наружно.

Форма выпуска. Во флаконах по 100 г.

Условия хранения. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

АЛОЭ ТАБЛЕТКИ (Tabulettae Aloës abductae).

Применение. В комплексном лечении прогрессирующей близору-

Отредактировал: ledi24

кости, миопическом хориоретините по 1 таблетке 3—4 раза в день за 15—20 мин до еды. Курс лечения (1 мес.) через 3—6 мес. может быть повторен.

Форма выпуска. Таблетки по 0,05 г, покрытые оболочкой, по 20 штук.

Условия хранения. В сухом прохладном месте.

Срок годности 3 года.

АЛОЭ ЭКСТРАКТ ЖИДКИЙ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ (Extractum Aloës fluidum pro injectionibus).

Фармакологическое действие. Биогенный стимулятор.

Показания к применению. Заболевания глаз (прогрессирующая близорукость, миопический хориоретинит, блефарит, конъюнктивит, кератит, ирит, помутнение стекловидного тела и др.), язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, бронхиальная астма и др.

Способ применения и дозы. Под кожу ежедневно по 1 мл (максимальная суточная доза 3—4 мл), детям до 5 лет 0,2—0,3 мл, старше 5 лет — 0,5 мл. Курс лечения (15—50 дней) через 2—3 мес может быть повторен.

Противопоказания. Тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, беременность после 7 мес, острые желудочно-кишечные расстройства, далеко зашедший нефрозонефрит.

Форма выпуска. Ампулы по 1 мл, в упаковке по 10 штук.

Условия хранения. В темном прохладном месте.

Срок годности 3 года.

АЛОЭ ЭКСТРАКТ ЖИДКИЙ (Extractum Aloës fluidum). Водный экстракт из измельченных консервированных листьев алоэ.

Фармакологическое действие. Биогенный стимулятор.

Применение. Внутрь при тех же показаниях, что и для экстракта алоэ для инъекций, по 1 чайной ложке 3 раза в день в течение 30—45 дней. Курс лечения повторяют 3—4 раза в год.

Форма выпуска. Во флаконах по 100 мл.

Условия хранения. В темном прохладном месте.

Срок годности 1 год.

АЛПИЗАРИН (Alpisarinum). 2-С(β-D-глюкопиранозид)-1-3, 6, 7-тетраоксиксантон.

Фармакологическое действие. Обладает антивирусной активностью в отношении ДНК-содержащих вирусов группы герпеса.

Показания к применению. Простой герпес у взрослых.

Способ применения и дозы. Внутрь (независимо от приема пищи) и наружно. Внутрь по 0,1 г 3—4 раза в сутки в течение 5—10 дней. Одновременно назначают местные аппликации 5% мази на кожу, 2% мази — на слизистые оболочки. Мазь наносят на пораженные участки без повязки 2—3 раза в день. Курс лечения 10—30 дней. При рецидиве рекомендуются повторные курсы.

Противопоказания. Беременность и индивидуальная непереносимость.

Форма выпуска. Таблетки по 0,1 г, в упаковке по 20 штук; 2% мазь по 10 г и по 20 г; 5% мазь по 10 г и по 20 г.

Условия хранения. Таблетки в защищенном от света месте, мазь — в прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности. Мазь и таблетки 2 года.

АЛТЕЯ КОРЕНЬ (Radix Althaeae). Содержит слизь (до 35 %), аспарагин, бетаин, пектиновые вещества, крахмал.

Отредактировал: ledi24

Применение. Как отхаркивающее и противовоспалительное средство при заболеваниях дыхательных путей в виде настоя (3,0:100,0) по 1 столовой ложке 4—5 раз в день и экстракта в микстурах (6,0:200,0).

Форма выпуска. Резаный корень в упаковке по 100 г, экстракт сухой (Extractum Althaeae siccum).

Срок годности. Экстракт 2 года, корень 3 года.

АЛЬБУМИН (Albuminum). Белок человеческой плазмы. Применяют в виде 5%, 10% и 20% растворов, получаемых из плацентарной сыворотки («альбумин плацентарный») или плазмы донорской крови человека («альбумин из плазмы донорской крови»).

Фармакологическое действие. Поддерживает осмотическое давление в крови, повышает АД, способствует привлечению и удержанию тканевой жидкости в кровяном русле.

Показания к применению. Шок, ожоги, гипопротеинемия и гипоальбуминемия, поражения желудочно-кишечного тракта с нарушением питания.

Способ применения и дозы. Внутривенно капельно в разовой дозе 100—500 мл.

Побочное действие. Повышение температуры тела, боли в поясничной области, крапивница.

Противопоказания. Тромбозы, выраженная гипертония, продолжающееся внутреннее кровотечение.

Форма выпуска. Альбумин плацентарный выпускается во флаконах: 200 мл 5% раствора, 100 мл 10%, 50 мл 20% раствора; альбумин из плазмы донорской крови человека: 200 мл 5% раствора, 100 мл 10% раствора, 50 мл 20% раствора; 100 мл 20% раствора.

Условия хранения. При температуре от 2 до 8° С.

Срок годности. Растворы альбумина 5%, 10%, 20% — 5 лет; раствор альбумина плацентарного 5%, 10%, 20% — 3 года.

АЛЬВЕЗИН «НОВЫЙ» (Alvesin «Neu»). Инфузионный раствор, содержащий смесь аминокислот, сорбитола, ионов натрия, калия и магния.

Фармакологическое действие. Белковый препарат для парентерального питания.

Показания к применению. Заболевания, сопровождающиеся белковой недостаточностью, тяжелые ожоги, дистрофия у детей, пред- и послеоперационные периоды.

Способ применения и дозы. Препарат назначают внутривенно в виде медленных капельных вливаний в дозах, соответствующих величине потери белков, ежедневно по 1000—2000 мл взрослым и по 25—50 мл/кг детям. Во время продолжительных капельных вливаний добавляют аскорбиновую кислоту, рутин, витамины группы В по показаниям.

Противопоказания. Гиперкалиемия, тяжелые поражения печени и почек.

Форма выпуска. Флаконы по 500 мл.

Условия хранения. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

Поставляется из Германии.

АЛЬГИПОР (Algiporum). Гель лиофилизированный; комбинированный препарат, 1 г которого содержит: 0,7276 г альгина натрия, 0,2374 г глюконата кальция и 0,035 г фурацилина.

Фармакологическое действие. Стимулирует грануляцию тканей и процессы регенерации, способствует эпителизации, ускоряет очище-

Отредактировал: ledi24

ние ран, снижает их инфицированность. Всасывая раневой экссудат, превращается в гелеобразную массу.

Показания к применению. Поверхностные ожоги II—III степени, глубокие ожоги с влажным струпом и обильным отделяемым, вялотекущие послеожоговые раны и язвы, трофические язвы и пролежни.

Способ применения и дозы. Альгипор накладывают на раневую поверхность после ее туалета, так чтобы края листа на 0,5—1 см выходили за пределы пораженного участка, и фиксируют бинтом. Смену производят по мере его промокания и рассасывания (через 1—3 сут). Курс лечения зависит от течения раневого процесса и составляет от 1 до 10 перевязок.

Побочное действие. На отдельных участках альгипор не превращается в гелеобразную массу, а уплотняется, образуя корку, удаление которой безболезненно.

Форма выпуска. Выпускается в виде пористых листов толщиной 5—10 мм; размером 40·50 мм, 60·100 мм, 135·200 мм и 150·160 мм.

Условия хранения. В защищенном от света месте, не перегибая листов, предохраняя их от механических повреждений.

Срок годности 3 года.

АЛЬЦИД-В (Alcid-B). Комплексный препарат. Содержит сок солодки (0,38 г), экстракт ромашки (0,05 г), магния карбонат основной (0,2 г), алюминия гидроксид гель (0,1 г), кору крушины (0,03 г), плод кориандра (0,02 г) и плод фенхеля (0,01 г), натрия гидрокарбонат (0,1 г), висмута нитрат основной (0,1 г).

Фармакологическое действие. Противоязвенное действие очищенного экстракта лакричного корня с низким содержанием глицеризиновой кислоты сочетается с противоязвенным действием экстракта соцветия ромашки. Антацидные компоненты препарата понижают кислотность желудочного сока. Соединения висмута и алюминия оказывают вяжущее, адсорбирующее и антисептическое действие, образуя защитный слой на слизистой. Щелочной карбонат магния и кора крушины предупреждают возможные запоры.

Показания к применению. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, острые и хронические гиперацидные гастриты.

Способ применения и дозы. Назначают внутрь по 2 таблетки три раза в день за 0,5—1 час до еды. Таблетки необходимо разжевывать и глотать с небольшим количеством воды. В тяжелых случаях можно назначать по 2 таблетки 4 раза в день, принимая последние 2 таблетки перед сном. Больным рекомендуется не употреблять алкоголя, кофе, чая и не курить.

Противопоказания. При почечной недостаточности препарат принимается под постоянным врачебным контролем. Следует избегать приема препарата в больших дозах длительное время. Во избежание нарушения резорбции антибиотиков при их назначении лечение альцидом необходимо прекратить. Наличие в препарате висмута может вызывать незначительное окрашивание фекалий в серо-черный цвет.

Форма выпуска. Таблетки в алюминиевой фольге. 12 штук в упаковке, всего 60 таблеток.

Условия хранения. В сухом прохладном месте.

АМЕДИН (Amedinum). 2-Диметиламиноэтилового эфира фенилциклогексилгликолевой кислоты гидрохлорид.

Фармакологическое действие. Блокирует центральные и периферические м-холинореактивные системы, оказывает умеренное местноанестезирующее действие.

Показания к применению. Экстрапирамидные расстройства (бо-

Отредактировал: ledi24

лезнь Паркинсона, постэнцефалической паркинсонизм), заикание, связанное с повышенным тонусом речевой и дыхательной мускулатуры.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,0015 г 1—2 раза в день; при хорошей переносимости до 0,003 г 3 раза в день с последующим постепенным уменьшением дозы. Детям дозы устанавливают в соответствии с возрастом.

Побочное действие. Сухость во рту, нарушение аккомодации, головокружение, учащение пульса.

Противопоказания. Глаукома, мерцательная аритмия. Необходима осторожность при гипертонической болезни, заболеваниях сердца, печени, почек.

Форма выпуска. Таблетки в упаковке по 20 штук по 0,0015 г и по 0,003 г.

Условия хранения. Список А. В защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

АМИДОПИРИН (Amidopyrinum). 1-Фенил-2,3-диметил-4-диметиламинопиразолон-5. Синонимы: Pyramidonum, Amidazophen, Aminophenazonum, Novamidon.

Фармакологическое действие. Оказывает жаропонижающее, анальгезирующее и противовоспалительное действие.

Показания к применению. Головная боль, невралгии, артриты, миозиты, хорея, иногда острый суставной ревматизм.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,25—0,3 г 3—4 раза в день (при остром ревматизме до 2—3 г/сут).

Побочное действие. Возможны угнетение кроветворения (гранулоцитопения и агранулоцитоз), иногда анафилактические реакции и кожные высыпания.

Противопоказания. Болезни крови, индивидуальная непереносимость.

Форма выпуска. Порошок, таблетки по 0,25 г в упаковке по 6 штук, гранулы по 60 г во флаконах.

Сложные таблетки состава: амидопирин 0,25 г, кофеина-бензоат натрия 0,1 г в упаковке 6 таблеток; амидопирин 0,25 г и анальгин 0,25 г (пиранал) в упаковке 6 таблеток.

Все таблетки применяют при головной боли, невралгии, лихорадочных состояниях по 1 таблетке 2—3 раза в день.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности. Порошок 10 лет, гранулы 2 года, таблетки 8 лет, сложные таблетки 4 года.

АМИДОПИРИН 0,125 г, БУТАДИОН 0,125 г ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ, № 20 (Tabulettae Amidopyrini 0,125 g, Butadioni 0,125 g).

Фармакологическое действие. Оказывает противовоспалительное и анальгезирующее действие.

Применение. При невралгиях, ишиасе, люмбаго, миозитах, ревматоидных артритах, подагрическом артрите, болезни Бехтерева и др. назначают по 1 таблетке 3—4 раза в день.

Побочное действие. Задержка жидкости в организме, тошнота, рвота, боль в области желудка, учащение стула, кожные сыпи, зуд, крапивница, лейкопения, анемия, геморрагии.

Противопоказания. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, заболевания кроветворных органов, печени и почек, лейкопения, нарушения сердечного ритма.

Форма выпуска. Таблетки, покрытые оболочкой, в упаковке по 20 штук.

Отредактировал: ledi24

Аналогичные таблетки выпускаются за рубежом под названием «Реопирин» и «Пирабутол» в упаковке по 20 штук, а также в ампулах, содержащих 0,75 г натриевой соли бутадиона и 0,75 г амидопирина в 5 мл раствора. Реопирин в упаковке по 5 штук и пирабутол в упаковке по 10 ампул.

Срок годности. Таблетки 5 лет, ампулы 3 года.

АМИЗИЛ (Amizylum). 2-Диэтиламиноэтилового эфира бензиловой кислоты гидрохлорид. Синонимы: Actozine, Benactyzine, Lucidil.

Фармакологическое действие. Центральный холинолитик. Оказывает спазмолитическое, антигистаминное, антисеротониновое, местноанестезирующее, седативное и антипаркинсоническое действие.

Показания к применению. Неврозы и невротические расстройства, паркинсонизм; в качестве корректора нейролептической терапии для предупреждения экстрапирамидных расстройств.

Способ применения и дозы. Внутрь 0,001—0,002 г 3—4 раза в день, в отдельных случаях суточную дозу увеличивают до 0,01—0,012 г.

Побочное действие. Сухость и анестезия слизистой оболочки рта, тахикардия, расширение зрачков, диспептические явления; при передозировке и плохой переносимости головная боль, головокружение, эйфория, бессонница, галлюцинации.

Противопоказания. Глаукома.

Форма выпуска. Таблетки по 0,002 г, в упаковке 50 штук.

Условия хранения. Список А. В сухом прохладном месте.

Срок годности 4 года.

АМИКАЦИН (Amikacinum). Синонимы: амикин, биклин, бриклин.

Фармакологическое действие. Один из наиболее активных антибиотиков — аминогликозидов. Эффективен в отношении грамположительных и особенно грамотрицательных бактерий.

Показания к применению. Инфекции дыхательного, желудочно-кишечного и мочеполового тракта, инфекционные заболевания кожи и подкожной ткани, инфицированные ожоги, бактериемия, септицемия и неонатальный сепсис, эндокардит, остеомиелит, перитонит и менингит.

Способ применения и дозы. Внутривенно или внутримышечно. Вводят из расчета 10—15 мг/(кг·сут) в 2—3 приема.

Побочное действие и противопоказания такие же, как при применении других аминогликозидов.

Форма выпуска. Раствор в ампулах по 2 мл, содержащих по 100 мг или 500 мг амикацина сульфата.

Условия хранения. В защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

Поставляется из Югославии.

АМИЛНИТРИТ (Amylii nitras).

Применение. Как сосудорасширяющее средство при стенокардии и эмболии центральной артерии сетчатки; 2—3 капли наносят на кусок ваты или марли и вдыхают пары.

Противопоказания. Кровоизлияние в мозг, острый инфаркт миокарда, повышение внутричерепного давления, глаукома.

Форма выпуска. В ампулах по 0,5 мл, в упаковке по 10 штук; 0,5 мл ампулы с оплеткой № 10.

Условия хранения. Список Б. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 5 лет.

АМИНАЗИН (Aminazinum). 2-Хлор-10-(3-диметиламинопропил)-фенотиазина гидрохлорид. Синонимы: Chlorpromazine, Megaphen.

Отредактировал: ledi24

Фармакологическое действие. Нейролептик с выраженным седативным действием. Оказывает также противорвотное, гипотермическое, гипотензивное, антигистаминное действие, потенцирует действие снотворных, наркотиков, анальгетиков и противосудорожных средств.

Показания к применению. Психические заболевания, сопровождающиеся психомоторным возбуждением.

Способ применения и дозы. Внутрь после еды по 0,025—0,05 г 1—3 раза в день (при необходимости дозу увеличивают до 0,6 г/сут); внутримышечно 1—5 мл 2,5 % раствора; при остром психическом возбуждении внутривенно 2—3 мл 2,5% раствора в 20 мл 40% раствора глюкозы. Дозы для детей устанавливают в зависимости от возраста.

Высшая разовая доза для взрослых внутрь 0,3 г, суточная 1,5 г; внутримышечно разовая 0,15 г, суточная 0,6 г; внутривенно разовая 0,1 г, суточная 0,25 г.

Побочное действие. Гипотензия (вплоть до коллапса), экстрапирамидные нарушения, аллергические реакции, диспептические явления, гепатит.

Противопоказания. Заболевания печени и почек, нарушения функции желудка, сердечно-сосудистая декомпенсация, выраженная гипотония.

Форма выпуска. Драже по 0,025 г в упаковке по 30 штук; по 0,05 г в упаковке по 30 штук; таблетки по 0,01 г, покрытые оболочкой, в упаковке по 50 штук для детей; 2,5% раствор в ампулах по 1 мл в упаковке по 10 штук; по 2 мл; по 5 мл.

Условия хранения. Список Б. В сухом, защищенном от света месте.

Срок годности. Драже 5 лет, таблетки 2 года, ампулы 2 года.

АМИНАЛОН (Aminalonum). γ-Аминомасляная кислота. Синонимы: гаммалон, GABA.

Фармакологическое действие. Способствует нормализации динамики нервных процессов в головном мозге, повышает продуктивность мышления, улучшает память, оказывает мягкое психостимулирующее действие; благоприятно влияет на восстановление движений и речи после нарушения мозгового кровообращения. Малотоксичен.

Показания к применению. Нарушения функции центральной нервной системы (атеросклероз с нарушением кровообращения, ослабление памяти, головная боль, бессонница и головокружение при гипертонической болезни и др.); в педиатрии при отставании умственного развития.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,25—0,5 г 2—4 раза в день до еды (при необходимости суточную дозу увеличивают до 4 г); детям 0,5—2 г/сут. Длительность лечения от 2 нед до 4 мес.

Побочное действие. Возможны чувство жара, нарушение сна, рвота.

Форма выпуска. Таблетки по 0,25 г, в упаковке по 100 штук.

Условия хранения. В сухом, защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

АМИНОКАПРОНОВАЯ КИСЛОТА (Acidum aminocapronicum). ε-Аминокапроновая кислота. Синонимы: Aminocapron, Epsicapron.

Фармакологическое действие. Оказывает специфическое кровоостанавливающее действие при кровотечениях, связанных с повышением фибринолиза.

Показания к применению. Необходимость остановки кровотечений при хирургических вмешательствах и различных патологических состояниях, сопровождающихся повышением фибринолитической активности крови и тканей (после операций на легких, предстатель-

Отредактировал: ledi24

ной, поджелудочной и щитовидной железе; преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, заболевания печени, острые панкреатиты и др.).

Способ применения и дозы. Внутрь из расчета 0,1 г/кг через 4 ч. Суточная доза 10—15 г. При острой гипофибриногенемии вводят внутривенно (капельно) до 100 мл 5% раствора препарата; при необходимости вливания повторяют с промежутками 4 ч.

Побочное действие. В отдельных случаях головокружение, тошнота, понос, легкий катар верхних дыхательных путей.

Противопоказания. Склонность к тромбозу и эмболиям, заболевания почек с нарушением функции.

Форма выпуска. Порошок, 5% раствор препарата в изотоническом растворе натрия хлорида во флаконах по 100 мл; гранулы 60 г для детей.

Условия хранения. Порошок в сухом, прохладном месте; раствор 5% во флаконах при температуре от 0 до 20°С.

Срок годности. Порошок 5 лет, ампулы 3 года, гранулы 2 года.

АМИНОН (Aminon). 10% водный раствор 18 аминокислот (α-формы). Синоним: аминосол.

Фармакологическое действие. Белковый препарат для парентерального питания.

Показания к применению. Заболевания, сопровождающиеся белковой недостаточностью, а также в пред- и послеоперационном периоде, при тяжелых ожогах.

Способ применения и дозы. Назначается взрослым и детям старшего возраста в виде внутривенных капельных вливаний по 500—1000 мл в сутки. Введение одного литра препарата длится 6—8 часов.

Противопоказания. Гиперкалиемия, тяжелые поражения печени и почек. Мутные растворы вводить запрещено!

Форма выпуска. 10% раствор во флаконах по 500 мл.

Условия хранения. При температуре от 5 до 20°С в защищенном от света месте.

Срок годности 1 год 6 месяцев.

Поставляется из Финляндии.

АМИНОХИНОЛ (Aminochinolum). 7-Хлор-2-(2-хлорстирол)-4-(4 диэтиламино)-1-(метил-бутиламино)-хинолина трифосфат.

Показания к применению. Лямблиоз, кожный лейшманиоз, токсоплазмоз, неспецифический язвенный колит.

Способ применения и дозы. Внутрь, после еды. При лямблиозе взрослым 0,15 г 3 раза в день циклами по 5 дней с перерывом 5—7 дней. Проводят 2—3 цикла. Детям соответственно возрасту. При лейшманиозе взрослым 0,1—0,15 г 3 раза в день циклами по 10—15 дней с перерывом 5—7 дней. Проводят 2 цикла. Дозы для детей уменьшают соответственно возрасту. При токсоплазмозе (острый и хронический) взрослым 0,1—0,15 г 3 раза в день циклами по 7 дней (в сочетании с сульфадимезином) с перерывом 10—14 дней. Проводят 2—3 цикла. При неспецифическом язвенном колите (в комплексе с другими методами) 0,15 г 3 раза в день циклами по 5 дней с перерывом 4—7 дней. Проводят 3—4 цикла.

Побочное действие. Слабость, головокружение, головная боль, шум в ушах, диспептические явления, аллергическая сыпь, кожный зуд.

Форма выпуска. Таблетки по 0,25 г, в упаковке по 10 штук; таблетки по 0,05 г, в упаковке по 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В банках темного стекла.

Срок годности 5 лет.

Отредактировал: ledi24

АМИРИДИН (Amiridin). 9-амино-2, 3, 5, 6, 7, 8-гексагидро-1Н-циклопента[в]хинолина гидрохлорида моногидрат.

Фармакологическое действие. Стимулирует нервно-мышечную передачу импульсов и проведение возбуждения по нервам и гладким мышцам вследствие влияния на калиевые каналы возбудимой мембраны и угнетения активности холинэстеразы. Усиливает действие на гладкие мышцы ацетилхолина, адреналина, серотонина, гистамина и окситоцина.

Показания к применению. Невриты, полиневриты, полинейропатии, полирадикулонейропатии, бульбарные параличи и парезы, восстановительный период при органических поражениях центральной нервной системы с двигательными нарушениями, миастения и различные миастенические синдромы, в комплексной терапии демиелинизирующих заболеваний, а также в акушерской практике для родовозбуждения после амниотомии или дородового излияния околоплодных вод.

Способ применения и дозы. Внутрь 1—3 раза в день, подкожно или внутримышечно 1—2 раза в день. Разовая доза внутрь 0,01—0,2 г или 0,005—0,015 г парэнтерально. При поражениях периферической нервной системы, миастении и миастенических синдромах назначают внутрь по 0,01—0,02 г 1—3 раза в день в течение 1—2 месяцев или парэнтерально по 0,005—0,01—0,015 г в течение 20—30 дней. Для купирования миастенических кризов и проведения кратковременных курсов лечения больных с тяжелыми нарушениями нервно-мышечной передачи разовая доза может быть увеличена до 0,03 г введением 2 мл 1,5% раствора препарата однократно или 0,1—0,2 г внутрь (1—2 таблетки 5—6 раз в день). Для стимулирования родов вводят внутримышечно или подкожно однократно по 2 мл 0,5% раствора. При недостаточном эффекте инъекции повторяют 1—2 раза с часовым интервалом. Возможно применение препарата внутрь по 1 таблетке однократно, при недостаточном эффекте прием повторяют 1—2 раза с часовым интервалом.

Побочное действие. Гиперсаливация, брадикардия, головокружение, тошнота, рвота, кожно-аллергические реакции (зуд, сыпь). В этих случаях уменьшают дозу или отменяют препарат. Гиперсаливацию и брадикардию снижают холинолитиками (атропин и др.).

Противопоказания. Эпилепсия, экстрапирамидные заболевания с гиперкинезами, стенокардия, выраженная брадикардия, бронхиальная астма, склонность к вестибулярным расстройствам.

Форма выпуска. Таблетки по 0,02 г 20 штук в упаковке, ампулы по 1 мл 0,5% и 1,5% раствора по 10 штук в упаковке.

Условия хранения. Список Б. Ампулы и таблетки в сухом защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

АММИАКА РАСТВОР (Solutio Ammonii caustici). Синоним: нашатырный спирт.

Фармакологическое действие. При вдыхании возбуждает дыхательный центр (в больших концентрациях возможна рефлекторная остановка дыхания).

Применение. Для возбуждения дыхания и выведения больных из обморочного состояния наносят на вату или марлю для вдыхания.

Форма выпуска. 10% раствор в ампулах по 1 мл, в упаковке 10 штук; 10% раствор 10 мл.

Условия хранения. В прохладном месте.

Срок годности. Ампулы 5 лет; раствор во флаконах 2 года.

АММИФУРИН (Ammifurinum). Содержит смесь трех фурокумаринов: изопимпинеллина, бергаптена и ксантотоксина из семян амми большой (Ammi majus L).

Отредактировал: ledi24

Фармакологическое действие. Фотосенсибилизирующее средство.

Показания к применению. Витилиго, гнездная плешивость.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,02 г 1—4 раза в день; наружно (смазывают очаги поражения 2% раствором).

Побочное действие. Возможны головная боль, боль в области сердца и сердцебиение, диспептические явления.

Противопоказания. Гипертония, тиреотоксикоз, заболевания почек, печени, крови, сердца, центральной нервной системы; возраст до 5 лет.

Форма выпуска. Таблетки по 0,02 г, в упаковке 50 штук; 0,3% раствор во флаконах по 50 мл.

Условия хранения. Список Б. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

АММОНИЯ ХЛОРИД (Ammonii chloridum). Синонимы: «нашатырь», Acidamon.

Фармакологическое действие. Диуретическое и отхаркивающее.

Показания к применению. Отеки сердечного происхождения; бронхит, пневмония.

Способ применения и дозы. Внутрь после еды по 8—12 г/сут (в несколько приемов). Принимают в виде 2,5—5% водного раствора или порошка. Курс лечения (5—6 дней) при необходимости через несколько дней может быть повторен.

Побочное действие. Диспептические явления (тошнота, рвота, потеря аппетита).

Противопоказания. Острые поражения почек.

Форма выпуска. Порошок.

Условия хранения. В хорошо укупоренной таре в сухом месте.

Срок годности не ограничен.

АМПИОКС (ампиокс натрия) (Ampioxum). Смесь ампициллина натриевой соли и оксациллина натриевой соли в соотношении 2:1.

Фармакологическое действие. Обладает антибактериальным спектром входящих в состав препарата антибиотиков. Устойчив в отношении пенициллиназообразующих стафилококков.

Показания к применению. Тяжело протекающие инфекции (сепсис, эндокардит, послеродовая инфекция и др.), для профилактики и лечения послеоперационных осложнений и инфекций недоношенных и новорожденных и др.

Способ применения и дозы. Внутримышечно взрослым до 2 г/сут, детям соответственно возрасту от 10 до 50 мг/кг. Суточную дозу делят на 3—4 инъекции.

Побочное действие. Аллергические реакции, болезненность в месте введения.

Противопоказания. Необходима осторожность при наличии в анамнезе повышенной чувствительности к препаратам пенициллина.

Форма выпуска. Стерильный порошок во флаконах для инъекций по 0,1 г, по 0,2 г, по 0,5 г; капсулы по 0,25 г, в упаковке 20 штук.

Условия хранения. Список Б. В сухом, защищенном от света месте при комнатной температуре.

Срок годности. Капсулы 2 года, порошок для инъекций 1 год.

АМПИЦИЛЛИНА НАТРИЕВАЯ СОЛЬ (Ampicillinum-natrium). Натриевая соль 6-[D-(—)-α(аминофенилацетамидо)]-пенициллановой кислоты. Синонимы: Pentrexyl, Penbrock.

Фармакологическое действие. Полусинтетический пенициллин широкого спектра действия. Активен в отношении кокковых микроорга

Отредактировал: ledi24

низмов (стафилококки, не образующие пенициллиназу, стрептококки, пневмококки, гонококки и менингококки) и большинства грамотрицательных бактерий (E. coli, Salmonella, Shigella, Proteus mirabilis, H. influenzae и некоторые штаммы Kl. pneumoniae).

Быстро всасывается в кровь, проникает в ткани и жидкости организма. Выводится в основном почками. Не обладает кумулятивным свойством. Малотоксичен.

Показания к применению. Воспалительные заболевания дыхательных путей (пневмония, бронхит, фарингит и др.); урологические заболевания (пиелонефрит, цистит, простатит); кишечные инфекции (дизентерия, сальмонеллез, энтероколиты); септический эндокардит, менингит, рожистое воспаление и др.

Способ применения и дозы. Внутримышечно по 250—500 мг 4—6 раз в сутки; при тяжелых инфекциях суточная доза может быть увеличена до 10 г и более; детям в зависимости от возраста в суточной дозе: новорожденным 100 мг/кг, в возрасте до 1 года 50 мг/кг, от 1 года до 4 лет 50—75 мг/кг, старше 4 лет 50 мг/кг.

Побочное действие. Аллергические реакции.

Противопоказания. Аллергия к препаратам пенициллина, нарушение функции печени.

Форма выпуска. Во флаконах стерильный порошок в комплекте с растворителем по 0,25 г; по 0,5 г; порошок по 5 г во флаконе для суспензии; диски по 10 мкг, в упаковке по 100 штук.

Условия хранения. Список Б. В сухом, защищенном от света месте при комнатной температуре.

Срок годности препарата для инъекций 2 года, для суспензий 2 года.

По импорту препарат поступает под названием «Пентрексил» в капсулах по 250 мг и 500 мг в упаковках по 10 штук.

АМПИЦИЛЛИНА ТРИГИДРАТ (Ampicillinum trihydras). Тригидрат D (—) α-аминофенилацетамидопенициллановой кислоты.

Фармакологическое действие, показания к применению, противопоказания, побочное действие те же, что и для натриевой соли ампициллина.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,5 г каждые 4—6 ч, при тяжелых инфекциях до 10 г и более в сутки; детям до 13 лет 0,1—0,2 г/(кг·сут). Курс лечения 7—14 дней и более.

Форма выпуска. Таблетки по 0,25 г, в упаковке 24 штуки; капсулы по 0,25 г, в упаковке 6 штук.

Условия хранения. Список Б. В сухом, защищенном от света месте при комнатной температуре.

Срок годности. Капсулы 3 года, таблетки 2 года.

АМФОГЛЮКАМИН (Amphoglucaminum). Водорастворимый препарат антибиотика амфотерицина В. Смесь N-метилглюкаминовой соли амфотерицина В с N-метилглюкамином.

Фармакологическое действие. Активен в отношении дрожжеподобных грибов и возбудителей глубоких и системных микозов.

Показания к применению. Грибковые заболевания желудочно-кишечного тракта и внутренних органов.

Способ применения и дозы. Внутрь после еды 2 раза в день в течение 10—14 дней. Взрослым по 200 000—500 000 ЕД, детям в зависимости от возраста: до 2 лет — по 25 000 ЕД, от 2 до 6 лет — по 100 000 ЕД, от 6 до 9 лет — по 150 000 ЕД, от 9 до 14 лет — по 200 000 ЕД. При глубоких микозах препарат назначают в течение 3—4 нед. Курс лечения можно повторить через 5—7 дней.

Побочное действие. Нарушение функции почек.

Отредактировал: ledi24

Противопоказания. Индивидуальная непереносимость, заболевания почек с нарушением их функции.

Форма выпуска. Таблетки по 100 000 ЕД, в упаковке 40 штук.

Условия хранения. Список Б. В сухом месте при температуре 4°С.

Срок годности 1 год.

АМФОТЕРИЦИН В (Amphotericinum B). Синонимы: Amfostat, Fungizone.

Фармакологическое действие. Активен in vitro и in vivo в отношении не только дрожжеподобных грибов, но и многих возбудителей глубоких и системных микозов (гистоплазмоз, бластомикоз, криптококкоз, споротрихоз).

Плохо всасывается из желудочно-кишечного тракта и практически нетоксичен при введении внутрь. Как и другие полиеновые антибиотики, обладает значительной токсичностью при внутривенном введении.

Показания к применению. Грибковые заболевания, не поддающиеся лечению другими противогрибковыми средствами (гистоплазмоз, бластомикоз, криптококкоз, кандидосепсис и др.).

Способ применения и дозы. Внутривенно капельно в течение 4—6 ч с интервалом между введениями не менее 24 ч из расчета 250 ЕД/кг 2—3 раза в неделю. Общая доза препарата на курс лечения составляет 1 500 000—2 000 000 ЕД. Детям назначают по специальной схеме. Содержимое флакона (50 000 ЕД) растворяют в 10 мл воды для инъекций, затем раствор антибиотика переносят при помощи шприца во флакон, содержащий 450 мл стерильного 5% раствора глюкозы (растворяют ex tempore).

Побочное действие. Снижение аппетита, повышение температуры, головная боль, тошнота, рвота, снижение АД. Значительную опасность представляет нефротоксическое действие препарата.

Противопоказания. Индивидуальная непереносимость антибиотика, заболевания печени и почек.

Форма выпуска. Флаконы по 50 000 ЕД в комплекте с 5% раствором глюкозы (450 мл в стеклянном сосуде для кровезаменителей).

Условия хранения. Список Б. В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 4°С.

Срок годности 2 года.

АМФОТЕРИЦИН-В мазь (Unguentum Amphotericinum B). Содержит в 1 г 30 000 ЕД амфотерицина В. Препарат аналогичен амфотерицину В.

Способ применения и дозы. Мазь наносят тонким слоем на пораженные участки кожи 1—2 раза в день. Курс лечения не менее 10 дней.

Форма выпуска. В тубах по 15 г.

Условия хранения. Список Б. При температуре не выше 4°С.

Срок годности 2 года.

АНАБАЗИНА ГИДРОХЛОРИД (Anabasini hydrochloridum). α-Пиперидил-β-пиперидин.

Фармакологическое действие. Стимулятор дыхания. Уменьшает стремление к курению и облегчает тягостные для курильщиков явления, связанные с прекращением курения.

Показания к применению. Облегчить отвыкание от курения.

Способ применения и дозы. Внутрь или под язык, начиная с 1 таблетки каждые 2 ч (8 таблеток в день) в течение 5 дней, с 6-го по 12-й день по 1 таблетке через $2^1/_2$ ч (6 таблеток в день), с 13-го по 16-й день по 1 таблетке каждые 3 ч (4 таблетки в день), с 17-го по 20-й день по 1 таблетке через 5 ч (3 таблетки в день), с 20-го по 25-й день по 1—2 таб-

Отредактировал: ledi24

летки в день. С первого дня приема препарата необходимо прекратить курение.

Побочное действие. В начале лечения возможны тошнота, головная боль, повышение АД.

Противопоказания. Атеросклероз, выраженное повышение АД, кровотечения

Форма выпуска. Таблетки по 0,003 г, в упаковке 120 штук. Порошок используется для производства «Гамибазина».

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте во флаконах оранжевого стекла.

Срок годности $2^1/_2$ года.

АНАВЕНОЛ (Anavenol).

Фармакологическое действие. Венотоническое средство для лечения хронических венозных заболеваний.

Показания к применению. Хроническая венозная недостаточность, дополнительное лечение язв голени и тромбофлебитов.

Способ применения и дозы. В течение недели назначают по 20 капель 3—4 раза в день или по 2 драже 3 раза в сутки после еды. На протяжении 2—3 мес назначают поддерживающую дозу —20 капель 2—3 раза в день после еды.

Противопоказания. Кровоточивость.

Форма выпуска. Капли по 25 мл во флаконе, драже в упаковке по 60 штук.

Условия хранения. В темном месте при температуре 10—25°С.

Срок годности. Драже и капли 3 года.

Поставляют из Чехо-Словакии.

АНАЛЬГИН (Analginum). 1-Фенил-2,3-диметил-4-метиламинопиразолон-5-N-метансульфат натрия. Синонимы: Novaldin, Salpyrine.

Фармакологическое действие. Анальгезирующее, жаропонижающее и противовоспалительное средство.

Применение. При лихорадочных состояниях, ревматизме, хорее, боли различного происхождения и др. внутрь по 0,1—1 г 2—3 раза в день; внутримышечно и внутривенно по 1—2 мл 25% или 50% раствора 2—3 раза в день.

Высшая разовая доза для взрослых внутрь 1 г, суточная 3 г.

Форма выпуска. Порошок, таблетки, в упаковке по 10 штук по 0,1 г с риской для детей и по 0,5 г; 25% раствор в ампулах по 1 мл, в упаковке по 10 штук; 50% раствор в ампулах по 1 мл и по 2 мл, в упаковке по 10 штук.

Сложные таблетки состава: анальгин 0,25, амидопирин 0,25 г и кофеин бензоат натрия 0,1 (анапирин), в упаковке по 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности. Порошок и таблетки 5 лет, ампулы 3 года, сложные таблетки 4 года.

АНАНДРОН (Anandron). Синоним: Nilutamide.

Показания к применению. Метастазирующий рак предстательной железы при наличии или отсутствии местного процесса, в комбинации с хирургической или химической кастрацией.

Способ применения и дозы. Лечение анандроном следует начинать непосредственно после хирургической или химической кастрации. Исходная дозировка: 300 мг/день на протяжении 4 недель. Поддерживающая терапия: 150 мг/день.

Не исключено действие анандрона на микросомальные ферментные механизмы, в результате чего может понижаться метаболизм некоторых веществ в печени. К таким веществам относятся антивитамин К,

Отредактировал: ledi24

фенитоин, пропранолол, хлордиазэпоксид, диазепам и теофиллин. Выделение их из организма замедляется и концентрация в крови возрастает. Если одновременно проводится лечение антивитаминами К, то рекомендуется внимательно проверять свертывающую способность крови и при необходимости снижать дозировки этих препаратов из-за потенцирующего действия анандрона.

Лечение следует прекратить при наличии симптомов со стороны органов дыхания, если рентгенография грудной клетки обнаруживает признаки интерстициального заболевания легких; при необъяснимых абдоминальных болях и симптомах со стороны органов пищеварения, особенно когда появляются признаки желтухи и увеличивается уровень трансаминаз сыворотки в 3 раза по сравнению с верхним пределом нормы; при необъяснимом снижении гемоглобина (менее 2 г/100 мл).

Рекомендуется в течение первых трех месяцев лечения ежемесячно проводить подсчет форменных элементов крови.

Надо избегать потребления спиртного, управления транспортными средствами и прочими машинами. Водителям и лицам, работающим на различных установках, требуется обращать внимание на возможные нарушения зрения.

Побочное действие. Трудность аккомодации глаз. В ходе клинических испытаний (в сочетании с хирургической или химической кастрацией) отмечались случаи импотенции, потеря либидо и горячие приливы. Может появиться интерстициальный легочный синдром, исчезающий при прекращении лечения. Эффект типа антабуса. Умеренный подъем трансаминаз сыворотки (СГОТ или СГПТ). Умеренное снижение гемоглобина на протяжении первых недель лечения. Тошнота и рвота.

Противопоказания. Тяжелая степень печеночной недостаточности. Тяжелая анемия, не связанная с карциномой, по поводу которой проводится лечение.

Форма выпуска. 50 и 100 таблеток по 50 мг в упаковке.

Срок годности 2 года.

Производитель — фирма «Roussel Uclaf», Франция.

АНАПРИЛИН (Anaprilinum). 1-Изопропиламино-3-(1-нафтокси)-2-пропанола гидрохлорид. Синонимы: Inderal, Obsidan, Propranolol.

Фармакологическое действие. β-Адреноблокатор.

Показания к применению. Аритмии (синусовая и пароксизмальная тахикардия, мерцательная тахиаритмия, экстрасистолия); стенокардия; феохромоцитома (в последнем случае применяют вместе с α-адреноблокаторами).

Способ применения и дозы. Внутрь за 15—30 мин до еды по 10 мг 3 раза в день с последующим постепенным увеличением дозы до 20—40 мг 3—4 раза в день (иногда до 200 мг/сут).

Побочное действие. Слабость, брадикардия, гипотония, симптомы недостаточности и кровообращения, бронхоспазм, тошнота, понос, ухудшение сна.

Противопоказания. Свежий инфаркт миокарда, атриовентрикулярная блокада II и III степени, выраженная недостаточность кровообращения, бронхоспазм, сенная лихорадка.

Форма выпуска. Таблетки по 0,01 г и 0,04 г в упаковке по 100 штук.

Из Германии препарат поставляется под названием «Обзидан» в ампулах по 5 мл 0,1% раствора, в упаковке по 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности. Таблетки 3 года, ампулы 5 лет.

АНАФРАНИЛ (Anafranil). Кломипрамина гидрохлорид. Синонимы: кломипрамин, гидифен.

Отредактировал: ledi24

Фармакологическое действие. Высокоактивный быстродействующий антидепрессант. Диапазон действия распространяется на всю симптоматику депрессивного синдрома, особенно на характерные признаки — психомоторную заторможенность, пониженное настроение, состояние тревоги. Считают, что в основе механизма действия лежит способность торможения обратного захвата норадреналина и серотонина соответствующими нейронами. Более интенсивно, чем другие трициклические антидепрессанты, тормозит обратный нейрональный захват серотонина.

Показания к применению. Депрессии различной этиологии и с различной симптоматикой (эндогенные, реактивные, невротические, дарвированные, инволюционные), депрессии при шизофрении и психопатии, депрессивное настроение реактивного, невротического и психопатического генеза, навязчивые состояния и фобии.

Способ применения и дозы. Способ применения и дозу подбирают индивидуально, в зависимости от состояния больного. Внутрь в начале лечения назначают по 1 драже 2 раза в день. Дозу постепенно повышают до 4—6 драже в сутки в конце первой недели лечения. В тяжелых случаях суточная доза может быть увеличена. После получения отчетливого антидепрессивного эффекта переходят на поддерживающую дозу, которая составляет в среднем 2—4 драже в сутки. Внутримышечно вначале вводят 1—2 ампулы в сутки. Каждый день дозу увеличивают на 1 ампулу, доводя суточную дозу до 4—6 ампул. После наступления улучшения внутримышечное введение постепенно сокращают и одновременно переводят больного на прием препарата внутрь в поддерживающих дозах. Внутривенно, в виде капельных инфузий, препарат вводят в количестве 2—3 ампул (50—75 мг), предварительно растворив в 250—500 мл изотонического раствора натрия хлорида или 5% раствора глюкозы, в течение 1,5—3 часов 1 раз в сутки. Вливание следует проводить утром в соответствии с суточным ритмом депрессии. После вливания необходимо тщательное наблюдение за больным. По достижении эффекта обычно в течение первой недели инфузионную терапию продолжают еще 3—5 дней, а затем переводят больного на прием препарата внутрь поддерживающими дозами.

Побочное действие. Сухость во рту, нарушение аккомодации, задержка мочеиспускания, потливость, мелкий тремор, головокружение, ортостатическая гипотония, кожные аллергические реакции, аритмия, бессонница, временные состояния спутанности и усиление страха. В редких случаях отмечены нарушения функции печени, гиперпирексия, судороги. В большинстве случаев эти явления проходят самостоятельно или при уменьшении дозы.

Противопоказания. Сверхчувствительность к трициклическим антидепрессантам, беременность. Относительные противопоказания: глаукома, сердечная недостаточность, аритмии, повышенная склонность к судорогам, расстройства мочеиспускания.

Форма выпуска. Драже по 0,025 г 30 штук в упаковке, ампулы по 2 мл 0,25% раствора 10 штук в упаковке.

Условия хранения. Список Б. Драже хранят при комнатной температуре, ампулы — в прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности. Драже и ампул 5 лет.

Поставляется из Франции.

АНГИОТЕНЗИНАМИД (Angiotensinamidum). L-аспарагинил-L-аргинил-L-валил-L-тирозил-L-валил-L-гистидил-L-пролил-L-фенилаланина ацетат. Синоним: Hypertensin.

Отредактировал: ledi24

Фармакологическое действие. Оказывает прессорное действие, обусловленное увеличением периферического сопротивления сосудов, особенно артериол малого калибра, способен сокращать гладкую мускулатуру матки, кишечника, мочевого и желчного пузыря, усиливает секрецию альдостерона и увеличивает высвобождение катехоламинов.

Показания к применению. Шоковое состояние, особенно при изоволемическом шоке, связанном с вазомоторным коллапсом (посттравматический и послеоперационный шок, шок при интоксикациях, комах и инфекционных заболеваниях), а также при инфаркте миокарда, сердечной тампонаде, массивной легочной эмболии и т. д.

Способ применения и дозы. Вводят внутривенно капельно с начальной скоростью 5—20 мкг/мин. В тяжелых случаях начальная скорость может составлять 50—60 мкг/мин. При достижении систолического давления 90—110 мм рт. ст. скорость инфузии уменьшают до 1—3 мкг/мин в зависимости от состояния больного. Препарат можно вводить длительно.

Побочное действие. Брадикардия, которая купируется атропином.

Противопоказания. Гиповолемический шок. Осторожность следует соблюдать у больных с нарушениями сердечного ритма.

Форма выпуска. Ангиотензинамида лиофилизированная форма 0,001 г (1 мг) для инъекций.

Срок годности 2 года.

АНДЕКАЛИН (Andecalinum). Очищенный экстракт поджелудочной железы.

Фармакологическое действие. Расширяет периферические кровеносные сосуды, понижает АД.

Показания к применению. Облитерирующий эндартериит, болезнь Рейно, вяло заживающие раны, спазмы сосудов головного мозга, нарушение кровообращения в сетчатке глаза, склеродермия, начальные стадии гипертонической болезни.

Способ применения и дозы. Внутримышечно 1 раз в день 10—40 ЕД (в зависимости от тяжести состояния) в течение 2—4 нед; после 2—3-месячного перерыва курс лечения повторяют. Внутрь перед едой по 2 таблетки 3 раза в день. Через 6—10 дней доза может быть увеличена постепенно до 9—12 таблеток в день.

Побочное действие. Аллергические реакции.

Противопоказания. Повышение внутричерепного давления.

Форма выпуска. Во флаконах по 40 ЕД в комплекте с растворителем для инъекций; таблетки 15 ЕД, покрытые оболочкой, в упаковке по 50 штук.

Условия хранения. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности. Ампулы и таблетки 2 года.

«АНДИПАЛ» («Andipalum»). Состав: анальгина 0,25 г, дибазола 0,02 г, папаверина гидрохлорида 0,02 г, фенобарбитала 0,02 г.

Применение. Как болеутоляющее, сосудорасширяющее и спазмолитическое средство по 1 таблетке 2—3 раза в день.

Форма выпуска. Таблетки в упаковке по 10 штук.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности 2 года.

АНЕСТЕЗИН (Anaesthesinum). Этиловый эфир пара-аминобензойной кислоты. Синонимы: бензокаин, Aethylis aminobenzoas, Benzocain.

Фармакологическое действие. Местноанестезирующее средство.

Применение. Внутрь при боли в желудке, повышенной чувствительности пищевода по 0,3 г 3—4 раза в день; наружно в виде 5—10%

Отредактировал: ledi24

мази и присыпок при крапивнице и заболеваниях кожи, сопровождающихся зудом, для обезболивания язвенных и раневых поверхностей; в свечах по 0,05—0,1 г при заболеваниях прямой кишки (трещины, зуд, геморрой); в виде 5—20% масляного раствора для анестезии слизистых оболочек.

Противопоказания. Индивидуальная повышенная чувствительность.

Форма выпуска. Порошок; таблетки по 0,3 г, в упаковке по 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В сухом прохладном месте.

Срок годности. Порошок 10 лет, таблетки 4 года.

«АНЕСТЕЗОЛ», СУППОЗИТОРИИ РЕКТАЛЬНЫЕ («Anaesthesolum» suppositoria). Состав: анестезина 0,1 г, дерматола 0,04 г, окиси цинка 0,02 г, ментола 0,004 г, жировой основы 2 г.

Применение. Для уменьшения зуда, боли и спазмов при геморрое по 1—2 суппозитория в день.

Форма выпуска. В упаковке по 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В прохладном месте.

Срок годности 2 года.

АНИСА ПЛОДЫ (Fructus Anisi vulgaris). Содержат эфирное масло (1—3%), в состав которого входит анетол (до 80%); жирное масло, белковые вещества.

Применение. Как отхаркивающее и слабительное средство в виде настоя (1 чайная ложка плодов на стакан кипятка) по $^1/_4$ стакана 3—4 раза в день за 30 мин до еды, а также в виде масла анисового по 2—3 капли на прием (отхаркивающее).

Форма выпуска. В упаковке по 50 г, масло анисовое (Oleum Anisi).

Срок годности. Плоды 3 года, масло контролируется ежегодно.

АНТЕЛЕПСИН (Antelepsin).

Фармакологическое действие. Противоэпилептический препарат из группы бензодиазепинов. Наряду с ярко выраженным антиконвульсивным и ослабляющим напряжение мышц действием антелепсин обладает гипногенным и анксиолитическим свойством.

Показания к применению. В качестве средства, влияющего на частоту припадков, антелепсин часто эффективен, когда терапия классическими противоэпилептическими препаратами безуспешна.

Способ применения и дозы. В зависимости от клинических проявлений, переносимости препарата и возраста больного рекомендуются суточные дозы антелепсина, распределяемые на 3—4 разовых приема: для грудных детей —0,001—0,003 г, детей раннего возраста —0,002—0,006 г, детей школьного возраста —0,003—0,006 г, для взрослых — 0,003—0,008 г. В период лечения антелепсином запрещается употребление алкоголя.

Побочное действие. Возможны расстройства координации движений при ходьбе, раздражительность, депрессия, утомляемость, особенно в первые 2 мес лечения. Степень этих нарушений определяется схемой назначения препарата. Побочное действие заметно уменьшается, если на начальном этапе лечения назначают минимальные дозы, которые затем увеличиваются, чтобы обеспечить необходимый лечебный эффект.

Форма выпуска. Таблетки по 0,001 г, в упаковке 50 штук.

Условия хранения. Обычные.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Германии.

Отредактировал: ledi24

АНТЕОВИН (Anteovin). Комбинированный препарат, содержащий левоноргестрел и этинилэстрадиол.

Фармакологическое действие. Бифазный противозачаточный гормональный препарат, тормозящий овуляцию.

Показания к применению. Предупреждение беременности.

Способ применения и дозы.. Внутрь по одной таблетке в день, желательно вечером с 5-го дня от начала менструации в течение 21 дня, затем 7-дневный интервал, после которого вновь в течение 21 дня по 1 таблетке в день, пока необходимо предупреждение беременности. Вначале принимают 11 белых таблеток (одна содержащих 0,05 мг левоноргестрела и 0,05 мг этинилэстрадиола), а затем 10 розовых (0,125 мг левоноргестрела и 0,05 мг этинилэстрадиола). Интервал между приемом разных таблеток не должен превышать 36 часов.

Побочное действие. Диспептические явления, напряженность груди обычно уменьшаются или прекращаются при последующих курсах.

Противопоказания. Особую осторожность следует проявить при варикозном расширении вен, эпилепсии, гипертонии, сахарном диабете, психических заболеваниях с депрессией. При планировании беременности препарат отменяют за 3 месяца.

Форма выпуска. Упаковки по 21 таблетке (11 белых и 10 розовых).

Условия хранения. Обычные.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Венгрии.

АНТИПИРИН (Antipyrinum). 1-Фенил-2,3-диметилпиразолон-5. Синонимы: Analgesin, Phenazonum.

Фармакологическое действие. Анальгезирующее, жаропонижающее и противовоспалительное средство.

Показания к применению. Невралгии, ревматизм, хорея, простудные заболевания.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,25—0,5 г (детям старше 6 мес. по 0,03—0,25 г) 2—3 раза в день. Иногда применяют местно в виде 10—20% растворов для смачивания тампонов как кровоостанавливающее средство.

Побочное действие. При повышенной индивидуальной чувствительности возможны кожные высыпания.

Форма выпуска. Порошок, таблетки, в упаковке по 10 штук по 0,1 г с риской и по 0,25 г.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности. Порошок и таблетки 4 года.

«АНТИПСОРИАТИКУМ», МАЗЬ (Unguentum «Antipsoriaticum»). Состав: трихлорэтилена химически чистого 1 часть, вазелина 40 000 (или 100 000) частей.

Показания к применению. Хронические формы псориаза.

Способ применения и дозы. Втирают в очаги поражения 1 раз в день в течение 6 дней; после однодневного перерыва лечение повторяют 3—4 раза.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к препарату, поражения печени и почек, раздражение кожных покровов, обширное распространение процесса.

Форма выпуска. В упаковке по 50 г 1:40 000 и 1:100 000.

Условия хранения. Список А. В прохладном месте.

Срок годности 2 года.

«АНТИСТРУМИН» («Antistruminum»). Состав: калия йодида 0,001 г, пудры сахарной 0,0983 г.

Отредактировал: ledi24

Применение. Для предупреждения эндемического зоба по 1 таблетке 1 раз в неделю; при диффузных формах зоба по 1—2 таблетки в день 2—3 раза в неделю.

Форма выпуска. Таблетки в упаковке по 100 штук.

Условия хранения. В банках оранжевого стекла.

Срок годности 2 года.

АНТИФОМСИЛАН (Antifomsilanum). Раствор поли-[3-(диметил)-(метилоксиметил)]-силоксана в эфире. Синоним: антиформ.

Фармакологическое действие. Пеногаситель.

Показания к применению. В оксигенераторах аппаратов искусственного кровообращения для гашения пены крови.

Способ применения и дозы. С баллона снимают предохранительный колпачок. Нажимают пальцем (до отказа) на распылительную головку и наносят препарат равномерным слоем на поверхность пеногасительной камеры с расстояния 25—30 см. Поверхность камер покрывают препаратом за 30 мин до заполнения аппарата кровью, а при необходимости также во время искусственного кровообращения. В случае засорения распылительной головки необходимо прочистить распылительное отверстие стерильной иглой или мандреном.

Побочное действие. Попадание в кровь большого количества антифомсилана может привести к силиконовой эмболии сосудов.

Форма выпуска. Выпускается во флаконах в стерильном виде.

Условия хранения. В сухом помещении при температуре до 20°С на расстоянии не менее 2 м от действующих отопительных приборов. Баллон предохраняют от ударов, механических повреждений и от воздействия прямых солнечных лучей. Препарат огнеопасен.

Срок годности 3 года.

«АНУЗОЛ», СУППОЗИТОРИИ РЕКТАЛЬНЫЕ (Suppositoria «Anusolum»). Состав: экстракта красавки 0,02 г, ксероформа 0,1 г, цинка сульфата 0,05 г, глицерина 0,12 г, жировой основы 2 г.

Применение. Как спазмолитическое, болеутоляющее средство при геморрое и трещинах заднего прохода по 1 суппозиторию 2—3 раза в день.

Форма выпуска. В упаковке по 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В прохладном месте.

Срок годности 2 года.

АПИЗАРТРОН (Apisarthron). Препарат пчелиного яда.

Применение. В качестве болеутоляющего и противовоспалительного средства при миозитах, невралгиях и полиартритах для растирания.

Форма выпуска. Мазь в тубах по 20 г.

Условия хранения. В сухом месте.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Германии.

АПИЛАК (Apilacum). Сухое вещество нативного маточного молочка.

Фармакологическое действие. Биогенный стимулятор.

Показания к применению. Гипотрофия и анорексия (у детей грудного и раннего возраста), гипотония, нарушение питания у реконвалесцентов, невротические расстройства, нарушения лактации в послеродовом периоде, себорея кожи лица.

Способ применения и дозы. Детям от 0,0025 г до 0,005 г в виде суппозиториев 3 раза в сутки в течение 7—15 дней. Взрослым сублингвально по 0,01 г 3 раза в день в течение 10—15 дней; при себорее кожи лица кремы, содержащие 0,6 % препарата.

Отредактировал: ledi24

Побочное действие. При повышенной индивидуальной чувствительности нарушения сна.

Противопоказания. Болезнь Аддисона, идиосинкразия к препарату

Форма выпуска. Порошок, состоящий из 7 частей лиофилизированного маточного молочка и 93 частей молочного сахара, таблетки по 0,01 г, в упаковке по 25 штук, суппозитории, в упаковке по 10 штук по 0,005 г и по 0,01 г.

Условия хранения. В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 8°С.

Срок годности. Порошок и суппозитории 2 года, таблетки 3 года.

«АПИЛАК» МАЗЬ (Unguentum «Apilacum»). Содержит 3% апилака.

Показания к применению. Себорея кожи лица, себорейная и микробная экзема, кожный зуд, нейродермит, опрелость.

Способ применения и дозы. Мазь наносят на пораженные участки кожи от 2 до 10 г 1—2 раза в день. При отсутствии аллергической реакции срок лечения до 2 мес.

Форма выпуска. В тубах по 50 г

Условия хранения. Обычные.

Срок годности 2 года.

«АПИФОР» («Apiphorum»). Таблетки, содержащие 0,001 г лиофилизированного пчелиного яда.

Фармакологическое действие. Противовоспалительное и болеутоляющее средство.

Показания к применению. Полиартриты, миозиты, радикулит, заболевания периферических сосудов (эндартериит и др.), келоидные рубцы после ожогов и др.

Способ применения и дозы. Путем электрофореза (1 таблетку непосредственно перед употреблением растворяют в 20 мл дистиллированной воды) с обоих полюсов при силе тока 10 мА. Курс лечения 15—20 процедур.

Побочное действие. При повышенной чувствительности аллергические реакции.

Противопоказания. Индивидуальная непереносимость пчелиного яда, заболевания печени, почек, поджелудочной железы, надпочечников, диабет, новообразования, тяжелые инфекционные заболевания, сепсис, кахексия, декомпенсация сердечно-сосудистой системы, заболевания крови.

Форма выпуска. Таблетки по 0,001 г, в упаковке по 25 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

АПОМОРФИНА ГИДРОХЛОРИД (Apomorphini hydrochloridum).

Фармакологическое действие. Избирательно влияет на рвотный центр.

Применение. Как рвотное средство, а также при хроническом алкоголизме для выработки реакции отвращения к алкогольным напиткам подкожно по 0,2—0,5 мл 1% раствора.

Противопоказания. Тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания легких, сопровождающиеся кровотечением, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.

Форма выпуска. Порошок, ампулы 1% раствора по 1 мл, в упаковке по 10 штук.

Условия хранения. Список А.

Срок годности. Порошок 5 лет, ампулы 2 года.

Отредактировал: ledi24

АПОНТИ (Aponti). Свободный от фенилаланина специальный гидролизат из коровьего молока, включающий соли кальция, калия, магния, железа, цинка, марганца, натрия, фтора, йода, тироксин, витамины.

Фармакологическое действие. Средство балансирующей диеты для дополнительного питания детей и подростков, страдающих фенилкетонурией.

Показания к применению. Фенилкетонурия у детей и подростков.

Способ применения и дозы. Принимается внутрь во время еды, предварительно смешивается с пищей. Дозирование зависит от веса пациента и его индивидуальной восприимчивости. Суточное количество устанавливается врачом, делится на 3—5 приемов.

Форма выпуска. Упаковка 250 г.

Срок годности 5 лет.

Поставляется Германией.

АПРЕССИН (Apressinum). 1-Гидразинофталазина гидрохлорид. Синонимы: Apresoline, Hydralazine.

Фармакологическое действие. Понижает АД, оказывает адреноли-тическое и симпатолитическое действие.

Показания к применению. Гипертоническая болезнь, в том числе злокачественная гипертония. Более эффективен при ранних стадиях заболевания. Применяются при эклампсии. Показан при почечной недостаточности.

Способ применения и дозы. Внутрь после еды. Начальная доза 0,01 г 2 раза в сутки с постепенным увеличением до 0,025 г 4 раза в день. Курс лечения несколько недель с постепенным уменьшением дозы.

Побочное действие. Тахикардия, боль в области сердца, головокружение, головная боль, ортостатический коллапс, тошнота, рвота, сыпь, отеки различной локализации, потливость, слезотечение, повышение температуры. При длительном приеме иногда развивается синдром, напоминающий системную красную волчанку.

Противопоказания. Выраженный атеросклероз.

Форма выпуска. Таблетки, покрытые оболочкой, в упаковке по 20 штук по 0,01 г и по 0,025 г.

Условия хранения. Список Б. В хорошо укупоренной таре.

Срок годности 4 года.

АПРОФЕН (Aprophenum). β-Диэтиламиноэтилового эфира 1,1-дифенилпропионовой кислоты гидрохлорид.

Фармакологическое действие. Оказывает выраженное периферическое и центральное холинолитическое действие.

Показания к применению. Эндартериит, ангиоспазмы, слабость родовой деятельности, спастическая дискинезия желудочно-кишечного тракта, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, спастические колиты, холециститы.

Способ применения и дозы. Внутрь после еды по 0,025 г 2—4 раза в день; подкожно или внутримышечно 0,5—1 мл 1% раствора. Высшая разовая доза для приема внутрь 0,03 г, суточная 0,06 г.

Побочное действие. Сухость во рту, нарушения аккомодации, головокружение, чувство опьянения, слабость, сонливость.

Противопоказания. Глаукома.

Форма выпуска. Таблетки по 0,025 г, в упаковке по 10 штук, ампулы по 1 мл 1% раствора, в упаковке по 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности. Таблетки 4 года, ампулы 3 года.

Отредактировал: ledi24

АРАЛИИ НАСТОЙКА (Tinctura Araliae). Настойка (1:5) на 70% спирте из корней (Aralia Manshurica Rupp. et Maxim.).

Применение. Как стимулятор центральной нервной системы при гипотонии, астении, депрессивных состояниях по 30—40 капель 2—3 раза в день.

Противопоказания. Бессонница, повышенная нервная возбудимость, гипертоническая болезнь.

Форма выпуска. Во флаконах по 50 мл.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

АРДУАН (Arduan). Состав: 1 ампула содержит 4 мг лиофилизированного бромида пипекурия. 1 ампула растворителя содержит 4 мл 0,85% хлорида натрия.

Фармакологическое действие. Недеполяризующий миорелаксант средней продолжительности действия.

Показания к применению. Всевозможные общехирургические, кардиохирургические, травматологические и другие хирургические вмешательства, при которых необходимо достичь полного расслабления мускулатуры.

Способ применения и дозы. Применяют только в стационарных условиях. Начальная доза 0,05 мг/кг. Повторно назначают половинную дозу.

Побочное действие. Умеренная преходящая брадикардия.

Противопоказания. Тяжелая миастения, беременность.

Форма выпуска. Лиофилизированный порошок во флаконе по 0,004 г в комплекте с растворителем.

Условия хранения. В прохладном месте.

Срок годности 2 года.

Поставляется из Венгрии.

АРЕНАРИН (Arenarinum).

Фармакологическое действие. Обладает антибактериальной активностью и стимулирует регенеративные процессы в тканях глаза.

Показания к применению. При термических и химических ожогах глаз, эрозиях и язвах роговицы различного происхождения.

Способ применения и дозы. 1% мазь аренарина закладывается за нижнее веко глаза 3—4 раза в сутки ежедневно в течение 6—8 дней.

Форма выпуска. В виде 1% мази, в упаковке по 10 г.

Условия хранения. В посуде из оранжевого стекла в прохладном месте.

Срок годности 2 года.

АРМИН (Arminum). Этиловый, п-нитрофениловый эфир этилфосфоновой кислоты.

Фармакологическое действие. Активный антихолинэстеразный препарат.

Показания к применению. Миотическое и противоглаукомное средство.

Способ применения и дозы. В виде глазных капель (0,01% раствор) по 1—2 капли 2—3 раза в день.

Форма выпуска. Во флаконах по 10 мл 0,01% раствора.

Условия хранения. Список А. В защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

АРНИКИ НАСТОЙКА (Tinctura Arnicae). Извлечение 1:10 на 70% спирте из цветков арники.

Отредактировал: ledi24

Применение. Как гемостатическое средство в акушерской и гинекологической практике при недостаточном обратном развитии матки и воспалительных заболеваниях, а также в качестве желчегонного средства по 30—40 капель 2—3 раза в день до еды.

Форма выпуска. Во флаконах по 40 мл.

Условия хранения. В защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

АРПЕНАЛ (Arpenalum). γ-Диэтиламинопропилового эфира дифенилуксусной кислоты гидрохлорид.

Фармакологическое действие. Оказывает блокирующее действие на н- и м-холинореактивные системы.

Показания к применению. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, пилороспазм, желчнокаменная болезнь, почечная и печеночная колика, бронхиальная астма, паркинсонизм и др.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,05—0,1 г 2—4 раза в день. Курс лечения 3—4 нед.

Побочное действие. Головокружение, головная боль, чувство опьянения, сухость во рту, нарушение аккомодации.

Противопоказания. Глаукома.

Форма выпуска. Таблетки по 0,05 г, в упаковке по 50 штук.

Условия хранения. Список Б. В сухом, защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

АРТЕПАРОН (Arteparon). Мукополисахарид эфира серной кислоты.

Фармакологическое действие. Благодаря своему биохимическому сходству с мукополисахаридами хряща распространяется в пораженной хрящевой ткани, прерывая деградацию основного вещества в результате конкурентного торможения ферментной системы, разлагающей протеогликан. Нормализует трофику хрящевой ткани.

Показания к применению. Артроз тазобедренного, коленного и малых суставов, дегенеративные заболевания позвоночника и дегенеративные изменения хряща коленной чашечки, последующее лечение после удаления мениска, ограничение подвижности в плечевом суставе.

Способ применения и дозы. Вводят внутримышечно, подкожно по 1 мл два раза в неделю с промежутками в 3—4 дня на протяжении 7—8 недель (всего 15 инъекций). При необходимости повторения лечение проводят не раньше, чем через 3 месяца. Для стабилизации результата лечения можно делать отдельные инъекции с промежутками от одной до нескольких недель. В основном препарат вводится глубоко внутриягодично. При периартропатии вводят по 1 мл в суставную капсулу 2 раза в неделю с промежутками в 3—4 дня на протяжении 2—3 недель. Острые воспалительные процессы в суставах перед применением внутрисуставных инъекций артепарона следует лечить специфическими противовоспалительными средствами. Повышение вышеприведенной дозировки не рекомендуется.

Побочное действие. Сенсибилизация. Через несколько минут и часов после инъекции могут появиться головная боль, испарина, тошнота, тахикардия, одышка, что требует немедленной отмены препарата. Возможны тромбоэмболические процессы как следствие повышенной аггрегации тромбоцитов иммунологического генеза. Отмечена перекрестная сенсибилизация с гепарином и гепариноидами. В отдельных случаях наблюдается обратимое выпадение волос. В редких случаях возможны кожная геморрагия и кровотечение из слизистых. После первых инъекций

Отредактировал: ledi24

в сустав могут отмечаться временные реакции в нем. Следует опрашивать больного о переносимости предыдущих инъекций.

Противопоказания. Повышенная опасность кровотечения, геморрагический диатез.

Форма выпуска. Ампулы по 1 мл 5% раствора по 5 штук в упаковке.

Условия хранения. В прохладном темном месте.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Германии.

АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА (Acidum ascorbinicum). γ-Лактон-2, 3-дегидро-L-гулоновой кислоты. Синоним: витамин С.

Фармакологическое действие. Имеет важное значение для жизнедеятельности организма. Участвует в регуляции окислительно-восстановительных процессов, углеводного обмена, свертывания крови, нормальной проницаемости капилляров, образования стероидных гормонов, синтеза коллагена и проколлагена. Повышает устойчивость организма к инфекциям.

Показания к применению. Авитаминоз и гиповитаминоз С (профилактика и лечение). Геморрагические диатезы. Кровотечения (носовые, легочные, печеночные, маточные и др.). Инфекционные заболевания. Интоксикации. Заболевания желудочно-кишечного тракта (ахилия, язвенная болезнь, энтероколиты). Для профилактики и лечения цинги. Болезнь Аддисона. Повышенная физическая и умственная нагрузка.

Способ применения и дозы. Для профилактики внутрь 0,05—0,1 г 1 раз в сутки взрослым. Для лечения взрослым 0,05—0,1 г 3—5 раз в день. Парентерально вводят в виде аскорбината натрия по 1—3 мл 5% раствора. Разовая доза не выше 0,2 г, суточная 0,5 г. Детям назначают внутрь для профилактики по 0,02—0,03 г/сут; для лечения по 0,05—0,1 г 1—2 раза в день, парентерально 1—2 мл 5% раствора в день в течение 2—3 нед.

Побочное действие. Угнетение инсулярного аппарата поджелудочной железы, глюкозурия, угнетение синтеза гликогена.

Противопоказания. Тромбофлебиты, наклонность к тромбозам.

Форма выпуска. Порошок; драже по 0,05 г в упаковке по 200 штук; таблетки для витаминизации пищи по 0,5 г и по 2,5 г; таблетки аскорбиновой кислоты по 0,025 г с глюкозой массой по 3 г в упаковке по 10 штук для детей; таблетки аскорбиновой кислоты по 0,1 г и глюкозы по 0,877 г, в упаковке по 30 штук; ампулы 5% раствора, в упаковке по 10 штук по 1 мл, по 5 мл; ампулы 10% раствора, в упаковке по 10 штук по 1 мл, по 2 мл, по 5 мл.

Комплексные таблетки: «Аскорутин» в упаковке по 50 штук. «Астинивит» в упаковке по 50 штук, «Амитетравит» в упаковке по 40 штук, таблетки аскорбиновой кислоты с витамином Р (из черноплодной рябины и цитрусовых) в упаковке по 50 штук.

Условия хранения. В сухом, прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности. Порошок 3 года, ампулы $1^1/_2$ года, таблетки по 0,025 г и 0,1 г 3 года; по 0,5 и 2,5 г 2 года, с глюкозой 1 год; с фолиевой кислотой 3 года, «Аскорутин» 4 года, «Астинивит» 2 года, с витамином Р из черноплодной рябины 1 год, из цитрусовых 2 года, «Амитетравит» 4 года.

«АСКОФЕН» («Ascophenum»). Состав: кислоты ацетилсалициловой 0,2 г, кофеина 0,04 г, фенацетина 0,2 г.

Применение. В качестве болеутоляющего и жаропонижающего средства по 1 таблетке 2—3 раза в день.

Форма выпуска. В упаковке по 6 штук.

Отредактировал: ledi24

Условия хранения. Список Б.
Срок годности 4 года.

L-АСПАРАГИНАЗА (L-Asparaginasum). Ферментный антилейкемический препарат. Синоним: краснитин.

Фармакологическое действие. Цитостатическое средство, оказывает угнетающее влияние на лейкопоэз.

Показания к применению. Острый лимфобластный лейкоз, лимфосаркомы.

Способ применения и дозы. Вводят внутривенно (струйно или капельно), предварительно растворив препарат в изотоническом растворе натрия хлорида. Разовая доза для взрослых и детей 200—300 МЕ/кг. Курсовая доза для взрослых 300 000—400 000 МЕ; для детей курсовую дозу подбирают индивидуально в соответствии с массой тела. Длительность курса лечения 3 нед.

Противопоказания. Беременность, заболевания печени, почек, поджелудочной железы и центральной нервной системы с нарушением их функции.

Форма выпуска. Во флаконах по 10 000 МЕ.

Условия хранения. Список Б. При температуре не выше 10°С.

Срок годности 2 года.

АСПАРАГИНАТ КАЛИЯ-МАГНИЯ (Kalium-Magnesium Asparaginat). Состав: DL-аспарагиновой кислоты 1,516 г, гидроокиси калия 0,39 г, окиси магния 0,1116 г, сорбитола 2 г на 100 мл раствора для вливания.

Фармакологическое действие. Сердечное средство.

Показания к применению. Сердечная недостаточность, недостаточность гипоксически пораженного сердца при нагрузке, стенокардия, инфаркт миокарда, гликозидная интоксикация, нарушение сердечного ритма (прежде всего тахикардии и экстрасистолии). Предварительное и последовательное лечение больных при кардиохирургических вмешательствах, в качестве вспомогательного средства при остановке сердца и кровообращения.

Способ применения и дозы. Дозировка зависит от показаний. В среднем в день вводят капельно внутривенно (скорость 20—25 капель в 1 мин) 300—600 мл. Лечение проводят в течение 3—10 дней.

Противопоказания. Острая почечная недостаточность, анурия, поражение канальцев почек, гиперкалиемия.

Форма выпуска. Пластмассовая упаковка по 500 мл.

Условия хранения. В сухом месте.

Срок годности 2 года.

Поставляется из Германии.

«АСПАРКАМ» («Asparcamum»). Близок по составу и действию к панангину. Смесь калия аспарагината и магния аспарагината по 0,175 г

Фармакологическое действие. Устраняет электролитный дисбаланс в организме, способствует проникновению ионов калия и магния во внутриклеточное пространство.

Показания к применению. Сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, аритмия, гипокалиемия.

Способ применения и дозы. По 1—2 таблетки 3 раза в день после еды в течение 3—4 нед. Курс лечения можно повторить.

Побочное действие. У больных, страдающих анацидным гастритом или холециститом, могут возникнуть неприятные ощущения или жжение в подложечной области.

Противопоказания. Острая и хроническая недостаточность почек,

Отредактировал: ledi24

гиперкалиемия, нарушение атриовентрикулярной проводимости (блокада).

Форма выпуска. Таблетки, в упаковке 50 штук.

Из Венгрии этот препарат поступает под названием **панангин** — драже в упаковке по 50 штук и ампулы по 10 мл в упаковке по 5 штук.

Срок годности. Таблетки и драже 3 года, ампулы 2 года.

АСПИЗОЛЬ (Aspisol). Сухой препарат для инъекционных растворов, содержащий лизин-моно-(ацетил-салицилат).

Фармакологическое действие. Оказывает обезболивающее, противовоспалительное и жаропонижающее действие.

Показания к применению. Болевой синдром, требующий парэнтерального введения анальгезирующего средства — послеоперационные, посттравматические, ревматические боли в мягких тканях и суставах, периартрит, радикулиты, злокачественные заболевания, висцеральные боли (почечные и желчные колики — вместе со спазмолитиками), острый панкреатит, гипертермия церебрального, инфекционного и неопластического генеза, послеоперационная лихорадка, тромбоэмболические и воспалительные заболевания сосудов (например, при тромбофлебите).

Способ применения и дозы. Разведение порошка прилагаемым растворителем производится перед инъекцией. Раствор вводится внутримышечно. 1 флакон содержит 0,9 г сухого препарата, что соответствует 0,5 г ацетилсалициловой кислоты и 0,1 г глицина. 1 ампула с растворителем содержит 5 мл воды для инъекций. При сильных болях возможно введение содержимого 2 флаконов. При повторном применении не следует превышать суточную дозу в 10 флаконов. Обычная суточная доза для детей грудного возраста и старше составляет 10—25 мг ацетилсалициловой кислоты на 1 кг массы тела, что соответствует 0,1—0,25 мг готового раствора для инъекции. Эта суточная доза может быть разделена на 2—3 приема.

Побочное действие. Возможны аллергические реакции и приступы астмы, возможны желудочно-кишечные кровотечения.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к салицилатам, геморрагический диатез, последние 4 недели беременности, а также при поражениях почек, язве желудка и двенадцатиперстной кишки. Не следует лечить одновременно кортикоидами, метотрексатам, сахароснижающими пероральными средствами, антикоагулатами.

Форма выпуска. Коробка с 5 флаконами по 1 г сухого вещества и 5 ампулами по 5 мл растворителя.

Условия хранения. В прохладном месте.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Германии.

АСТМОПЕНТ (Astmopent). 1-(3,5-Диоксифенил)-2-(изопропиламино)-этанола-1 сульфат. Синоним: Alupent.

Фармакологическое действие. Стимулятор β-адренорецепторов. Оказывает выраженное избирательное бронхорасширяющее действие

Показания к применению. Для купирования приступов бронхиальной астмы; при атриовентрикулярной блокаде.

Способ применения и дозы. Для ингаляций в виде аэрозоля 1—2 вдыхания в момент приступа; при атриовентрикулярной блокаде внутривенно по 0,5—1 мл 0,05% раствора или по 1—2 мл внутримышечно.

Побочное действие. Возможны сухость во рту, тошнота, при внутривенном введении понижение АД.

Форма выпуска. 1,5% раствор для аэрозоля по 20 мл.

Условия хранения. Список Б.

Поставляется из Польши; из Югославии поступает под названием

Отредактировал: ledi24

алупент в ампулах по 1 мл 0,05% раствора, в упаковке по 6 штук.

Срок годности. Аэрозоль 2 года, алупент в ампулах 5 лет.

АТРОВЕНТ (Atrovent). Синонимы: Normosecretol, Norsecrolo.

Фармакологическое действие. Препарат защищает от агентов, вызывающих сужение бронхов (например, сигаретный дым, холодный воздух и вещества, приводящие к сужению бронхов), и снимает спазм бронхов вследствие подавления рефлекторной бронхоконстрикции, связанной с влиянием блуждающего нерва.

Показания к применению. Для лечения и профилактики дыхательной недостаточности при хроническом обструктивном заболевании дыхательных путей, хронический обструктивный бронхит при наличии эмфиземы или без нее, бронхиальная астма легкой и средней степени тяжести, особенно у больных с сопутствующими заболеваниями сердца и кровообращения, бронхоспазм при хирургических операциях, а также после них. В качестве дополнительного средства при назначении β-адренергических препаратов, производных ксантина или кортикостероидов при названных заболеваниях.

Способ применения и дозы. Для взрослых и детей старше 3 лет рекомендуется следующая схема. Для профилактики дыхательной недостаточности при хроническом обструктивном бронхите и астме по 1—2 дозы аэрозоля несколько раз в день (в среднем 1—2 дозы аэрозоля 3 раза в день).

При дыхательной недостаточности легкой и средней степени тяжести можно проводить дополнительную ингаляцию с помощью 2—3 доз аэрозоля.

Побочное действие. В отдельных случаях появляется сухость во рту. Если препарат в связи с неосторожным обращением попадает в глаза, изредка могут наблюдаться легкие обратимые нарушения аккомодации.

Противопоказания. В первые 3 мес беременности препарат может применяться лишь при достаточно веских показаниях.

Форма выпуска. Дозированный аэрозоль (15 мл) с мундштуком (300 доз аэрозоля).

Условия хранения. В сухом прохладном месте.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Югославии и Германии.

АТРОПИНА СУЛЬФАТ (Atropini sulfas). Сульфат атропинового эфира d,l-троповой кислоты.

Фармакологическое действие. Обладает м-холинолитической активностью. Блокирует м-холинореактивные системы организма.

Показания к применению. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, пилороспазм, желчнокаменная болезнь, холецистит, спазмы кишечника и мочевых путей, печеночная, почечная колика, бронхиальная астма; в офтальмологии для расширения зрачка и др.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,00025—0,001 г 1—2 раза в день, под кожу по 0,25—1 мл 0,1% раствора, в офтальмологии 1—2 капли для инстилляций 1% раствора.

Высшая разовая доза 0,001, суточная 0,003 г.

Побочное действие. Сухость во рту, сердцебиение, расширение зрачков, нарушение аккомодации, атония кишечника, головокружение, тахикардия, затруднение мочеиспускания.

Противопоказания. Глаукома.

Форма выпуска. Порошок, ампулы по 1 мл 0,1% раствора, в упаковке по 10 штук, 1% раствор (глазные капли) во флаконах по 5 мл; пленки глазные по 0,0016 г в упаковке по 30 штук.

Отредактировал: ledi24

Условия хранения. Список А.

Срок годности. Порошок 10 лет, ампулы 5 лет, глазные пленки и капли 2 года.

«АУРОБИН» МАЗЬ (Unguentum «Aurobini»). Состав: 0,04 г капроната преднизолона, 0,4 г лидокаина гидрохлорида, 0,4 г g-пантенола и 0,02 г триклозана.

Фармакологическое действие. Уменьшает проницаемость и усиливает тонус сосудистой стенки прямой кишки.

Показания к применению. Воспалительные процессы промежностной области (например, зуд заднего прохода, экзема и дерматит промежности, геморроидальные узлы, трещина заднего прохода).

Способ применения и дозы. Наносить тонкий слой мази 2—4 раза в день на пораженный участок тела.

При внутренних геморроидальных узлах необходимо вводить в прямую кишку мазь 2—4 раза в день.

Побочное действие. При продолжительном применении возможны атрофия кожи, гипертрихоз. При лечении внутренних геморроидальных узлов в случае передозировки наблюдается невыраженная брадикардия.

Противопоказания. Вирусная инфекция.

Форма выпуска. В тубах по 20 г.

Условия хранения. В сухом прохладном месте.

Срок годности 2 года.

Поставляется из Венгрии.

АЦЕКЛИДИН (Aceclidinum). Синоним: Glaucostat.

Фармакологическое действие. Активное холиномиметическое средство, преимущественно оказывающее влияние на м-холинорецепторы. Особенность препарата — сильное миотическое действие.

Показания к применению. Для устранения послеоперационной атонии желудочно-кишечного тракта и мочевого пузыря; в офтальмологии для сужения зрачка и понижения внутриглазного давления при глаукоме.

Способ применения и дозы. Под кожу по 1—2 мл 0,2% раствора. Высшая разовая доза 0,004 г, суточная 0,012 г. В офтальмологии применяют 3% и 5% глазную мазь.

Побочное действие. Возможны слюнотечение, потливость, понос.

Противопоказания. Стенокардия, атеросклероз, бронхиальная астма, эпилепсия, гиперкинезы, беременность, желудочные кровотечения.

Форма выпуска. Ампулы по 1 мл 0,2% раствора, в упаковке 10 штук, по 2 мл, порошок; 3% мазь в упаковке по 20 г и 5% мазь в упаковке по 20 г.

Условия хранения. Список А.

Срок годности. Порошок 5 лет, ампулы 2 года, мазь 1 год.

«АЦЕСОЛЬ» — СОЛЕВОЙ РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ (Solutio «Acesolum» pro injectionibus). Состав: натрия ацетата 2 г, натрия хлорида 5 г, калия хлорида 1 г, воды для инъекций до 1 л.

Фармакологическое действие. Уменьшает гиповолемию, сгущение крови и метаболический ацидоз; улучшает капиллярное кровообращение; положительно влияет на функцию сердца и почек; оказывает дезинтоксикационное действие.

Показания к применению. Острая дизентерия, пищевая токсикоинфекция, холера Эль-Тор (Инаба), а также как средство, устраняющее обезвоживание и интоксикацию организма.

Способ применения и дозы. Внутривенно (струйно или капельно).

Отредактировал: ledi24

Струйно — в количестве, соответствующем 7—10% массы тела больного в течение 1—2 ч; капельно — со скоростью 40—120 капель в минуту в течение 24—48 ч. Вводимый раствор должен иметь температуру 38—40°С.

Форма выпуска. Во флаконах по 400 мл.

Условия хранения. При комнатной температуре.

Срок годности 2 года.

АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА (Acidum acetylsalicylicum). Салициловый эфир уксусной кислоты. Синонимы: Aspirinum, Ruspirin.

Фармакологическое действие. Оказывает жаропонижающее, обезболивающее и противовоспалительное действие.

Показания к применению. Артриты, артралгии, невралгии, миалгии, головная боль, мигрень.

Способ применения и дозы. По 0,25—1 г после еды 3—4 раза в день.

Побочное действие. Аллергические реакции, при длительном применении анемия, возможно ульцерогенное действие.

Противопоказания. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.

Форма выпуска. Порошок, таблетки в упаковке по 10 штук по 0,25 г и по 0,5 г; по 0,1 г для детей.

Таблетки ацетилсалициловой кислоты 0,25 г с кофеином 0,05 г в упаковке по 10 штук.

Условия хранения. В защищенном от света месте.

Срок годности. Порошок 5 лет, таблетки 4 года.

АЦЕТИЛХОЛИНА ХЛОРИД (Acetylcholini choridum). N-(2-Ацетоксиэтил)-N, N, N-триметиламмония хлорид. Синонимы: Acecoline, Citocholine и др.

Фармакологическое действие. Возбуждает все холинореактивные системы организма, что сопровождается понижением АД, расширением кровеносных сосудов, замедлением сердечного ритма, усилением сокращения гладкой мускулатуры внутренних органов, повышением секреции потовых, слезных и бронхиальных желез, сужением зрачков.

Показания к применению. В основном в лабораторной практике, иногда как сосудорасширяющее средство при спазмах периферических сосудов, эндартериите, перемежающейся хромоте, спазмах артерий сетчатки и др.; при проведении фармакологических и физиологических исследований.

Способ применения и дозы. Подкожно и внутримышечно по 0,05—0,1 г 1—3 раза в день. Высшая разовая доза 0,1 г, суточная 0,3 г.

Побочное действие. При передозировке понижение АД, брадикардия и нарушение сердечного ритма, профузный пот, миоз, резкое усиление перистальтики кишечника.

Противопоказания. Стенокардия, атеросклероз, бронхиальная астма, эпилепсия.

Форма выпуска. По 0,2 г сухого вещества в ампулах емкостью 5 мл, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности 10 лет.

АЦЕТИЛЦИСТЕИН (Acetylcystein). N-Ацетил-L-цистеин. Синонимы: Acetein, Fluimucil.

Фармакологическое действие. Оказывает муколитическое действие, разжижает мокроту и облегчает ее отделение.

Отредактировал: ledi24

Показания к применению. Заболевания дыхательных путей (бронхиты, пневмонии, бронхоэктазии, муковисцидоз).

Способ применения и дозы. Ингаляции по 2—5 мл 20% раствора 3—4 раза в день по 15—20 мин.

Побочное действие. Возможна тошнота.

Противопоказания. Необходима осторожность при бронхиальной астме.

Форма выпуска. 20% раствор по 5 мл; 5% раствор по 10 мл, в упаковке по 10 штук. Препарат под названием «Мукосальвин» в ампулах по 2 мл 20% раствора в упаковке по 5 штук поступает из Германии.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности. Раствор 20% 4 года, 5%—2 года, мукосальвин в ампулах —5 лет.

АЦИДИН-ПЕПСИН (Acidin-pepsinum). Состав: пепсина 1 часть, бетаина гидрохлорида 4 части.

Фармакологическое действие. Способствует перевариванию пищи в желудке.

Показания к применению. Гипо- и анацидные гастриты, ахилия, диспепсия.

Способ применения и дозы. Внутрь во время или после еды в $^1/_4$—$^1/_2$ стакана воды по 1—2 таблетки 3—4 раза в день; детям (в зависимости от возраста) от $^1/_4$ таблетки до 1 таблетки 3—4 раза в день.

Форма выпуска. Таблетки по 0,25 г, в упаковке 50 штук.

Условия хранения. Обычные.

Срок годности $1^1/_2$ года.

АЦИДОТЕСТ (Acidotest). Комплект, состоящий из драже (драже содержит 0,05 г 2,4-диамино-4′-этокси-азобензола) и 2 таблеток (таблетка содержит 0,2 г кофеина бензоата натрия).

Показания к применению. Как диагностическое средство для определения кислотности желудочного сока.

Способ применения и дозы. После опорожнения мочевого пузыря больной принимает 1—2 таблетки и через час исследуют мочу; затем больной принимает 3 драже и через $1^1/_2$ ч исследуют вторую пробу мочи. Обе пробы разбавляют до объема 200 мл, подкисляют хлористоводородной кислотой и проводят колориметрическое исследование при помощи цветной шкалы, прилагаемой к комплекту.

Форма выпуска. В упаковке по 10 штук.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Венгрии.

«АЭРОВИТ» («Aerovitum»). Состав: ретинола ацетата 0,00227 г (6600 МЕ), тиамина хлорида 0,002 г (или тиамина бромида 0,0258 г), рибофлавина мононуклеотида 0,002 г, пиридоксина гидрохлорида и кальция пантотената по 0,01 г, цианокобаламина 0,025 мг, кислоты аскорбиновой 0,1 г, токоферола ацетата 0,02 г, никотинамида 0,015 г, рутина 0,05 г, кислоты фолиевой 0,5 мг.

Фармакологическое действие. Поливитаминный препарат.

Показания к применению. Для предупреждения витаминной недостаточности особенно у лиц, подвергающихся вибрации, укачиванию, перегрузкам и т. д. Можно назначать с целью профилактики атеросклероза.

Способ применения и дозы. По 1 таблетке в сутки. При длительных перегрузках или пониженной энергетической ценности пищевого рациона назначают по 2 таблетки в сутки.

Форма выпуска. Таблетки, покрытые оболочкой, в упаковке 30 штук.

Отредактировал: ledi24

Условия хранения. В сухом, защищенном от света месте при комнатной температуре.

Срок годности 2 года.

«АЭРОН» («Aeronum»). Состав: скополамина камфорнокислого 0,0001 г, гиосциамина камфорнокислого 0,0004 г.

Фармакологическое действие. Обладает м-холинолитической активностью.

Показания к применению. Для профилактики и лечения морской болезни и приступов болезни Меньера: для уменьшения слюноотделения при стоматологических операциях.

Способ применения и дозы. Внутрь по 1 таблетке на прием.

Побочное действие. Сухость во рту, нарушение аккомодации, сердцебиения.

Противопоказания. Глаукома.

Форма выпуска. Таблетки в упаковке по 10 штук.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности 4 года.

БАГУЛЬНИКА БОЛОТНОГО ТРАВА (Herba Ledi Palustris). Содержит эфирное масло (1—2%), в состав которого входит ледол; гликозид арбутин, дубильные вещества.

Применение. В качестве отхаркивающего и бактерицидного средства при хроническом бронхите и других заболеваниях легких, сопровождающихся кашлем, коклюше в виде настоя (10:200) по 1 столовой ложке 3 раза в день.

Форма выпуска. Побеги в упаковке по 75 г.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности 3 года.

БАКТИСУБТИЛ (Bactisubtil). Синонимы: Bacitracin, Orobicin, Subticetin. Чистая сухая культура бациллы штамма iP 5832 с вегетативными спорами в количестве не менее 1 млрд в одной капсуле.

Фармакологическое действие. Энтероантисептическое средство.

Показания к применению. Понос у грудных детей и взрослых, колит, энтерит, сопровождающийся поносом, нарушения ферментации (метеоризм).

Способ применения и дозы. Назначают ежедневно детям до 3 лет по 3—4 капсулы; от 3 до 12 лет — по 4—6 капсул. При диареях — по 4—6 капсул ежедневно независимо от возраста.

Форма выпуска. Капсулы в упаковке по 16 штук.

Условия хранения. В сухом прохладном месте.

Срок годности 3 года.

Поставляется из Югославии.

БАКТРИМ (СУСПЕНЗИЯ) (Bactrim). Синонимы: Biseptol, Septrin.

В состав суспензии (из расчета на 5 мл) входят следующие вещества: сульфаметоксазол-3-(п-аминобензолсульфамидо)-5-метилизоксазол — 0,2 г; триметоприм — 2,4-диамино-5-(3,4,5-триметоксибензил)-пиримидин —0,04 г.

Фармакологическое действие. Сочетание сульфаметоксазола и триметоприма обеспечивает высокую эффективность в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе устойчивых к сульфаниламидным препаратам. Бактрим быстро всасывается при приеме внутрь. Максимальная концентрация в крови отмечается через 1—3 ч и сохраняется в течение 7 ч.

Показания к применению. Септицемия, инфекции дыхательных,

Отредактировал: ledi24

мочевыводящих путей и желудочно-кишечного тракта, вызванные чувствительными к препарату микроорганизмами и др.

Способ применения и дозы. Назначают внутрь после еды (утром и вечером). Дозы устанавливают в зависимости от возраста ребенка: от 6 нед до 5 мес — по $^1/_2$ чайной ложки 2 раза в день; от 6 мес до 5 лет — по 1 чайной ложке 2 раза в день; от 5 до 12 лет — по 2 чайные ложки 2 раза в день.

Побочное действие. Тошнота, рвота, аллергические реакции, лейкопения и агранулоцитоз. Лечение проводят под контролем картины крови.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к сульфаниламидным препаратам.

Форма выпуска. Суспензия (сироп) во флаконах по 100 мл.

Условия хранения. Список Б. В сухом прохладном темном месте.

Срок годности 3 года.

Поставляется из Югославии.

БАЛИЗ-2 (Balysum-2). Препарат (0,8% водный раствор), получаемый путем ферментации определенных штаммов микроорганизмов (сахаромицетов).

Фармакологическое действие. Обладает антибактериальной активностью в отношении стафилококков, в меньшей степени протея и синегнойной палочки; стимулирует репаративные процессы в ране, способствует отторжению некротических тканей, разжижает гной.

Показания к применению. Раны, свежие и инфицированные ожоги, посттравматические остеомиелиты, трофические язвы различной этиологии, флегмоны, абсцессы, фурункулы, карбункулы; при аутотрансплантации тканей.

Способ применения и дозы. Обильно смачивают салфетки и наносят на раны, неплотно бинтуют. Препаратом можно промывать раны с помощью ирригатора. Применяют 1—2 раза в день. Сроки лечения 7—40 дней в зависимости от характера процесса.

Побочное действие. Возможно местное раздражающее действие (болезненность). В этих случаях накладывают на несколько минут салфетку, смоченную 2% раствором новокаина.

Форма выпуска. По 400 мл во флаконах.

Условия хранения. При температуре от 4 до 8°С.

Срок годности 2 года.

БАЛЬЗАМ «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА» (Balsamum «Stella auraria»). Содержит масла: гвоздичное, эвкалиптовое, мятное, корицы.

Показания к применению. Респираторные заболевания, грипп, головная боль, головокружение, насморк, укусы насекомых.

Способ применения и дозы. При головной боли, головокружении втирать бальзам в лобной, височной, затылочной областях; при простуде, гриппе, респираторных заболеваниях рекомендуется растворить небольшое количество бальзама в горячей воде для ингаляции; при укусах насекомых намазать место укуса и слегка втереть.

Форма выпуска. В упаковке по 4 г.

Условия хранения. Обычные.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Вьетнама.

БАРАЛГИН (Baralginum).

Состав:	*1 табл.*	*1 амп.*
натрия фенил-диметил-пиразолон-метиламинометансульфония (анальгин) . . .	0,5 г	2,5 г

Отредактировал: ledi24

п-пиперидино-этокси-карбометокси-бензофенона гидрохлорида	0,005 г	0,01 г
дифенил-пиперидиноэтил-ацетамид-бромметилата	0,1 мг	0,1 мг

Фармакологическое действие. Оказывает выраженное спазмолитическое и болеутоляющее действие.

Показания к применению. Спазмы гладкой мускулатуры, особенно почечная колика, спазмы мочеточников, тенезмы мочевого пузыря, печеночная колика, спазмы желудка и кишечника.

Способ применения и дозы. Внутрь по 1—2 таблетки 3 раза в день, в тяжелых случаях — внутривенно медленно 5 мл.

Побочное действие. Возможны аллергические реакции, при длительном применении гранулоцитопения (требует отмены препарата).

Форма выпуска. Таблетки, в упаковке 20 штук, ампулы по 5 мл, в упаковке 5 шт.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Югославии.

БАРБАРИСА ОБЫКНОВЕННОГО ЛИСТЬЕВ НАСТОЙКА (Tinctura foliorum Berberidis vulgaris). Спиртовое извлечение 1:5 на 40% спирте.

Фармакологическое действие. Вызывает сокращение гладкой мускулатуры матки и сужение сосудов, несколько ускоряет свертываемость крови. Оказывает умеренное желчегонное действие.

Показания к применению. Атонические кровотечения в послеродовом периоде и при субинволюции матки, а также кровотечения, вызванные воспалительными процессами.

Способ применения и дозы. Внутрь по 30—40 капель 2—3 раза в день в течение 2—3 нед.

Противопоказания. Беременность.

Форма выпуска. Во флаконах по 50 мл.

Условия хранения. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

БАРБИТАЛ (Barbitalum). 5,5-Диэтилбарбитуровая кислота. Синонимы: веронал, Aethybarbital, Barbitural.

Фармакологическое действие. Успокаивающее и снотворное средство.

Показания к применению. Бессонница, психомоторное возбуждение.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,3—0,5 г. Высшая разовая доза для взрослых 0,5 г, суточная 1 г; для детей 0,25 г.

Побочное действие. Общая слабость, головная боль, тошнота. Вызывает привыкание.

Противопоказания. Заболевания печени и почек с нарушением выделительной функции.

Форма выпуска. Порошок.

Срок годности 10 лет.

БАРБИТАЛ-НАТРИЙ (Barbitalum-natrium). 5,5-Диэтилбарбитурат натрия. Синонимы: мединал, веронал-натрий, Barbital sodium, Barbitalum natricum.

Фармакологическое действие. Снотворное и успокаивающее средство.

Показания к применению. Бессонница, нервное возбуждение.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,3—0,75 г/сут, детям по

Отредактировал: ledi24

0,025—0,25 г. Иногда препарат вводят подкожно или внутримышечно по 5 мл 10% раствора или per rectum по 0,5 г.

Побочное действие. Вызывает привыкание.

Противопоказания. Заболевания печени и почек с нарушением выделительной функции.

Форма выпуска. Порошок; таблетки по 0,3 г в упаковке по 6 штук.

Условия хранения. Список В.

Срок годности. Порошок 6 лет, таблетки 5 лет.

БАРИЯ СУЛЬФАТ ДЛЯ РЕНТГЕНОСКОПИИ (Barii sulfas pro roentgeno, Barium sulfuricum).

Показания к применению. Как контрастное средство для диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Способ применения и дозы. Внутрь до 100—150 г в виде взвеси.

Форма выпуска. Порошок в упаковке по 100 г.

Срок годности не ограничен.

БАТИЛОЛ (Batilolum). α-Октадециловый эфир глицерина, или 3-(октадецилокси)-1,2-пропандиол. Синоним: батиловый спирт.

Фармакологическое действие. Стимулирует эритро- и лейкопоэз. Тормозит уменьшение числа лейкоцитов и снижение уровня гемоглобина в крови при лучевом воздействии на организм и способствует быстрому их восстановлению. Малотоксичен.

Показания к применению. Для предупреждения и лечения лучевой болезни при рентгено- и радиотерапии.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,02 г за 30 мин до еды с начала лучевой терапии для профилактики осложнений 2 раза в день, при лучевой болезни 3—4 раза в день. Курс лечения 4—6 нед при периодическом исследовании крови (1 раз в 7—10 дней). Детям дозу уменьшают в соответствии с возрастом.

Форма выпуска. В таблетках по 0,02 г, в упаковке 50 штук.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности 5 лет.

БАТРИДЕН (Batridenum). 1,1′6′,7,7′-Гексаокси-3,3′-диметил-5,5′ диизопропил-8,8′ диформил-2,2′-дилафтилиден-дибарбитуровая кислота.

Фармакологическое действие. Иммунодепрессор, оказывающий лимфоцитотоксическое действие. При длительном применении увеличивает время выживания почечных аллотрансплантатов.

Показания к применению. У взрослых после аллотрансплантации почек в комплексе с иммунодепрессивной терапией (в сочетании с кортикостероидами).

Способ применения и дозы. Внутрь (в 2—4 приема) в раннем послеоперационном периоде в дозе 1,5—6 мг/(кг·сут) (100—400 мг/сут) с последующим уменьшением дозы в позднем посттрансплантационном периоде до 1,5—4 мг/(кг·сут) (100—200 мг/сут). Доза 6 мг/кг (400—500 мг/сут) не является максимально переносимой и при необходимости может быть увеличена при обязательном контроле за содержанием лейкоцитов и лимфоцитов в периферической крови. Минимальная суточная доза 1,5 мг/кг при строгом контроле за состоянием трансплантата.

Побочное действие. Высокие дозы батридена могут вызвать инфекционные осложнения (нагноение операционной раны, бронхолегочная инфекция, инфекция мочевыводящих путей). Для профилактики септических осложнений в раннем послеоперационном периоде назначают антибиотики широкого спектра действия.

Возможно потенцирование действия гипотензивных препаратов, в

Отредактировал: ledi24

связи с этим в первые сутки необходимо 3—4 раза в день измерять у больного АД.

Не следует сочетать препарат с иммураном, циклофосфаном, метотрексатом во избежание усиления побочного действия.

Противопоказания. При инфекционных и гнойных заболеваниях, источниках «скрытой» инфекции.

Форма выпуска. Таблетки по 0,1 г, в упаковке по 50 штук.

Условия хранения. Список Б. В банках из оранжевого стекла в сухом, защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

БЕЗАМИДИН (Bezamidin). Препарат, обладающий гиполипемическим действием.

Фармакологическое действие. Снижает повышенное содержание липидов крови, особенно триглицеридов и холестерина, как фракцию ЛПОНП, так и фракцию ЛПНП и повышает фракцию ЛПВП.

Показания к применению. Все виды гиперлипопротеинемий (исключая тип 1, который лечится только соблюдением диеты).

Способ применения и дозы. Одна таблетка безамидина три раза в день после еды. При достижении хорошего терапевтического эффекта доза может быть снижена до 2 таблеток в день (одна после завтрака, одна после обеда). Во время лечения больной должен строго соблюдать диету, назначенную в соответствии с типом его гиперлипопротеинемии.

Побочное действие. Иногда бывают такие нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта, как потеря аппетита, тошнота, чувство тяжести. Очень редко наблюдаются миозит и аллергические реакции.

Поскольку безафибрат усиливает действие антикоагулянтов кумаринового типа, доза их при курсе лечения должна устанавливаться в зависимости от протромбинового времени.

Противопоказания. Заболевания печени (за исключением жирового перерождения печени, которое является частым синдромом, сопровождающим гипертриглицеридемию), желчного пузыря с/без холелитиаза, тяжелая почечная недостаточность, беременность и период кормления.

Форма выпуска. В упаковке 50 таблеток по 200 мг безафибрата.

Срок годности 5 лет.

Поставляется фирмой «КРКА», Словения.

«БЕКАРБОН» («Becarbonum»). Состав: экстракта красавки 0,01 г, натрия гидрокарбоната 0,3 г.

Применение. При спазмах кишечника и повышенной кислотности желудочного сока по 1 таблетке 2—3 раза в день.

Форма выпуска. В упаковке по 6 штук.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности 3 года.

БЕКЛОМЕТ (Beclomet). Синоним: Becotide.

Фармакологическое действие. Бекломет — ингаляционный кортикостероидный препарат для местного воздействия на слизистую оболочку дыхательных органов, обладающий противовоспалительным свойством. Препарат не купирует приступ бронхиальной астмы, так как действие его развивается через несколько дней при условии регулярного применения. Можно применять в комбинированной терапии с бронходилататорами, интапом, антибиотиками и др.

Показания к применению. Кортикоидозависимая бронхиальная астма, бронхиальная астма в случае недостаточного эффекта бронходилататоров и интала.

Способ применения и дозы. Применяют только по назначению

Отредактировал: ledi24

врача по 1—2 ингаляции 3—4 раза в сутки с интервалом не менее 4 ч (не более 8 ингаляций в сутки). В тяжелых случаях до 12—16 ингаляций. Детям назначают с осторожностью, по 1—2 ингаляции 2—4 раза в сутки только *под контролем взрослых.*

Противопоказания. С осторожностью назначают детям, женщинам в период беременности, а также больным туберкулезом.

Форма выпуска. В аэрозольной упаковке по 10 мл (200 разовых доз).

Условия хранения. Хранить в прохладном месте, но не допускать замораживания.

Срок годности 3 года.

Поставляется из Финляндии.

БЕЛЕННОЕ МАСЛО (Oleum Hyoscyami). Состав: листьев белены, высушенных и крупноизмельченных, 100 г, спирта 95% или 70% достаточное количество, раствора аммиака достаточное количество, масла подсолнечного 1000 г.

Применение. При невралгиях, ревматизме наружно для растираний per se или в смеси с хлороформом, скипидаром и др.

Форма выпуска. Ангро.

Условия хранения. В прохладном месте.

Срок годности 5 лет.

БЕЛЛАЗОН (Bellazonum). Состав: пара-ацетаминобензальдегида изоникотиноилгидразона (ИНГА-17) 75 мг, суммы алкалоидов красавки 25 г.

Фармакологическое действие. Оказывает центральное холинолитическое действие, снимает мышечное напряжение, уменьшает дрожание при паркинсонизме.

Показания к применению. Паркинсонизм.

Способ применения и дозы. Внутрь по 3—4 драже в день с постепенным повышением дозы до 16 таблеток в сутки. Курс лечения 3—4 мес.

Побочное действие. Сухость во рту, тошнота, головокружение, расширение зрачков, тахикардия, затруднение мочеиспускания.

Противопоказания. Глаукома.

Форма выпуска. Драже в упаковке по 50 штук.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности 3 года.

Поставляется из Болгарии.

«БЕЛЛАЛГИН» («Bellalginum»). Состав: анальгина 0,25 г, анестезина 0,25 г, экстракта красавки 0,015 г, натрия гидрокарбоната 0,1 г.

Применение. Как спазмолитическое, антацидное и аналгезирующее средство при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, сопровождающихся повышенной кислотностью, спазмами гладкой мускулатуры, болью, внутрь по 1 таблетке 2—3 раза в день после еды.

Форма выпуска. В упаковке по 10 штук.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности 3 года.

«БЕЛЛАСТЕЗИН» («Bellasthesinum»). Состав: анестезина 0,3 г, экстракта красавки 0,015 г.

Показания к применению. Гастралгии, спазмы кишечника.

Способ применения и дозы. Внутрь по 1 таблетке 2—3 раза в день.

Форма выпуска. Таблетки в упаковке по 12 штук.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности 3 года.

Отредактировал: ledi24

«БЕЛЛАТАМИНАЛ» («Bellataminalum»). Состав: фенобарбитала 0,02 г, эрготамина тартрата 0,0003 г, суммы алкалоидов красавки 0,0001 г.

По составу и действию на организм аналогичен белласпону и ленбирену, выпускаемым за рубежом.

Показания к применению. Повышенная раздражительность, бессонница, климактерические неврозы, нейродермиты и вегетативная дистония.

Способ применения и дозы. Внутрь по 1 таблетке 2—3 раза в день.

Форма выпуска. Таблетки, покрытые оболочкой, в упаковке по 50 штук.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности 2 года.

«БЕЛЛОИД» («Belloid»). Состав: суммы алкалоидов белладонны 0,0001 г, эрготоксина 0,0003 г, дибутилбарбитуровой кислоты 0,03 г

Фармакологическое действие. Оказывает успокаивающее адреналитическое действие.

Показания к применению. Функциональные расстройства вегетативной нервной системы, бессонница, повышенная раздражительность, синдром Меньера и др.

Способ применения и дозы. Внутрь по 1 драже 3—6 раз в сутки, после 7 дней лечения перерыв 3—4 дня.

Побочное действие. В отдельных случаях тошнота, рвота, понос, сухость во рту.

Форма выпуска. В упаковке по 50 штук.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности 3 года.

Поставляется из Венгрии.

БЕЛУСТИН (Belustin). Противоопухолевое цитостатическое средство типа алкилирующих нитромочевин. Синоним: ломустин.

Фармакологическое действие. Оказывает цитостатическое противоопухолевое алкилирующее действие в результате подавления отдельных ферментативных этапов синтеза ДНК.

Показания к применению. Применяют самостоятельно и в комбинации с другими препаратами при лечении первичных и вторичных церебральных опухолей, опухолей бронхов и легких, опухолей ЛОР-органов, ходжкиновых и неходжкиновых лимфом, миелом.

Способ применения и дозы. Назначается внутрь одномоментно в количестве 100—130 мг/м^2 с интервалом в 6 недель. В комбинированной химиотерапии доза снижается до 70—100 мг/м^2 при интервале 6 недель.

Побочные действия. Гематологические нарушения проявляются на всех форменных элементах крови и носят комулятивный характер. Следует ежедневно производить анализ крови, позволяющий определить необходимость в переливании крови. Расстройства пищеварения предупреждаются предварительным назначением противорвотных средств. Иногда наблюдаются стоматит, алопеция, аменорея.

Противопоказания. Нарушения кроветворения.

Форма выпуска. 5 капсул в упаковке, в каждой 0,04 г.

Условия хранения. Обычные.

Поставляется из Франции.

БЕМЕГРИД (Bemegridum). 2-Метил-2-этилглутаримид. **Синонимы:** Etimid, Glutamisol.

Фармакологическое действие. Возбуждает центральную нервную

Отредактировал: ledi24

систему, стимулирует дыхание и кровообращение. Антагонист барбитуратов и снотворных.

Показания к применению. Отравления барбитуратами, передозировка наркотическими веществами, для прекращения наркоза, вызванного барбитуратами, и др.

Способ применения и дозы. Внутривенно медленно 1—20 мл 0,5% раствора.

Побочное действие. При передозировке тошнота, рвота, мышечные подергивания, судороги.

Противопоказания. Психозы, психомоторное возбуждение.

Форма выпуска. Ампулы по 10 мл 0,5% раствора, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности 3 года.

БЕМИТИЛ (Bemithylum). 2-Этилтиобензимидазола гидробромид моногидрат.

Фармакологическое действие. Антопротектор, обладающий психоэнергизирующей и антигипоксической активностью. Повышает устойчивость организма к гипоксии, сохраняет и восстанавливает работоспособность при выполнении физических нагрузок.

Максимальный эффект после однократного приема достигается через 1—2 ч.

Показания к применению. Взрослым для лечения астенических расстройств у больных неврозами и различными неврозоподобными состояниями, в остром периоде и периоде ближайших последствий черепно-мозговых травм, нарушения мозгового кровообращения, а также после хирургических вмешательств.

Способ применения и дозы. Внутрь после еды по 0,25—0,5 г. Суточная доза 0,5—1 г. Курс лечения 15—30 дней или 2—3 последовательно проводимых курса длительностью по 3—5 дней с 2—3-дневными интервалами. Продолжительность курса зависит от лечебного эффекта. Во время лечения рекомендуется диета, богатая углеводами.

Побочное действие. Возможны тошнота, редко рвота, неприятные ощущения в области желудка и печени, гиперемия лица, насморк, головная боль.

Противопоказания. Индивидуальная повышенная чувствительность к препарату, гипогликемические состояния различной этиологии.

Форма выпуска. Таблетки, покрытые оболочкой, по 0,25 г, в упаковке 100 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

БЕНАЛЬГИН (Benalgin). Синонимы: Bebzydamin, Oxinazin.

Комбинированный препарат, содержащий анальгин, витамин B_1.

Фармакологическое действие. Обладает обезболивающим, противовоспалительным и антипиретическим свойством. Препарат оказывает благоприятное действие на воспалительные процессы периферической нервной системы.

Показания к применению. Миалгии, миозиты, невралгии, невриты, головная боль и другие болезненные состояния при простудных заболеваниях.

Способ применения и дозы. Назначают внутрь по 1—2 таблетки 2—3 раза в день.

Противопоказания. Острые аллергические состояния, агранулоцитоз, тромбоцитопения.

Форма выпуска. 20 таблеток.

Отредактировал: ledi24

Условия хранения. В сухом месте.
Срок годности 2 года.
Поставляется из Болгарии.

БЕНЕТАЗОН (Benetazon). Синонимы: трибузон, триметазон. Производное пиразолона.

Фармакологическое действие. Оказывает антифлогистическое, противоревматическое, аналгетическое и антипиретическое действие; урикозурическое действие наступает постепенно и продолжается долгое время.

Показания к применению. Воспалительные заболевания сосудистой системы, флебит, тромбофлебит, острый и хронический тромбоз вен, ревматические заболевания.

Способ применения и дозы. По 1 таблетке (250 мг) 4 раза в сутки. В зависимости от тяжести заболевания дозу можно увеличить до 1,5 г/сут, т. е. до 6 таблеток. Применять препарат следует после еды.

Противопоказания. Лейкопения, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, печеночная и почечная недостаточность, беременность.

Форма выпуска. Таблетки по 250 мг, в упаковке 30 таблеток.
Условия хранения. В сухом месте.
Срок годности 2 года.
Поставляется из Чехо-Словакии.

БЕНЗИЛБЕНЗОАТ МЕДИЦИНСКИЙ (Benzylii benzoas medicinalis). Бензиловый эфир бензойной кислоты.

Применение. При всех видах чесотки наружно в виде 20% водно-мыльной свежеприготовленной суспензии.

Форма выпуска. Во флаконах по 100 г.
Срок годности 3 года.

БЕНЗИЛПЕНИЦИЛЛИНА НАТРИЕВАЯ СОЛЬ (Benzylpenicillinum-natrium). Соль бензилпенициллиновой кислоты, продуцируемой различными видами плесневого гриба.

Фармакологическое действие. Оказывает бактерицидное действие; активен в отношении грамположительных микроорганизмов (стафилококки, стрептококки, пневмококки, коринебактерии дифтерии, анаэробные спорообразующие палочки, сибиреязвенные палочки), грамотрицательных кокков (гонококки, менингококки), спирохет и актиномицетов. Действует на микроорганизмы, расположенные внутриклеточно.

Максимальная концентрация в крови после внутримышечного введения наблюдается через 30—60 мин, при подкожном введении — через 60 мин; через 3—4 ч в крови обнаруживают лишь следы антибиотика.

Показания к применению. Заболевания, вызванные чувствительными к бензилпенициллину микроорганизмами: пневмония, септический эндокардит, сепсис, инфекции кожи, мягких тканей и слизистых оболочек, плеврит, перитонит, цистит, септицемия и пиемия, остеомиелит, дифтерия, скарлатина, гонорея, бленнорея, сифилис, сибирская язва, актиномикоз, в акушерско-гинекологической практике, при воспалительных заболеваниях уха, горла и носа и других заболеваниях.

Способ применения и дозы. Внутримышечно и подкожно при среднетяжелом течении инфекции 250 000—500 000 ЕД; суточные дозы 10 000 000—20 000 000 ЕД. При тяжелых инфекциях (сепсис, септический эндокардит, менингит и др.) вводят до 10 000 000—20 000 000 ЕД/сут; при газовой гангрене — до 40 000 000—60 000 000 ЕД. Детям до 1 года назначают 50 000—100 000 ЕД на 1 кг

Отредактировал: ledi24

массы тела, старше 1 года — по 50 000 ЕД/(кг·сут). При тяжелых инфекциях можно суточную дозу увеличить до 200 000—300 000 ЕД/кг; по жизненным показаниям — до 500 000 ЕД/кг. Суточную дозу распределяют на 4—6 введений. При внутривенном введении 1 000 000—2 000 000 ЕД растворяют в 5—10 мл воды для инъекций или изотонического раствора натрия хлорида, вводят 1—2 раза в сутки в сочетании с внутримышечными инъекциями; для внутривенного капельного введения разводят 2 000 000—5 000 000 ЕД в 100—200 мл изотонического раствора натрия хлорида или 5—10% раствора глюкозы.

Эндолюмбально в зависимости от характера заболевания вводят взрослым 5000—10 000 ЕД, детям — от 2000 до 5000 ЕД.

Разводят препарат из расчета 1000 ЕД на 1 мл.

Аэрозоли назначают 1—2 раза в сутки. 100 000—300 000 ЕД препарата разводят в 3—5 мл дистиллированной воды. Продолжительность ингаляции 10—30 мин.

Местно применяют в виде мази на ланолин-вазелиновой основе не менее 2 раз в день.

Побочное действие. Аллергические реакции: крапивница, повышение температуры, озноб, головная боль, боль в суставах, эозинофилия, отек Квинке, дерматиты, сывороточноподобные реакции (лихорадка, артралгия, лимфаденопатия), в редких случаях анафилактический шок.

Противопоказания. Аллергия к бензилпенициллину. Для эндолюмбального введения — эпилепсия.

Форма выпуска. Во флаконах по 250 000 ЕД, 500 000 ЕД и 1 000 000 ЕД.

Условия хранения. Список Б. В сухом месте при комнатной температуре.

Срок годности 3 года.

БЕНЗИЛПЕНИЦИЛЛИНА КАЛИЕВАЯ СОЛЬ (Benzylpenicillinum-kalium).

Фармакологическое действие, показания к применению, способ применения и дозы, а также побочное действие и условия хранения те же, что и для бензилпенициллина натриевой соли, но назначают препарат в основном внутримышечно, под кожу, а также местно (аэрозоли, глазные капли и мази). Эндолюмбально и внутривенно не вводят.

Форма выпуска. Во флаконах по 250 000 ЕД, 500 000 ЕД и 1 000 000 ЕД.

Срок годности 3 года.

БЕНЗИЛПЕНИЦИЛЛИНА НОВОКАИНОВАЯ СОЛЬ (Benzylpenicillinum-novocainum). Моногидрат новокаиновой соли бензилпенициллиновой кислоты. Синонимы: Biocillin, Crystacillin, Novocillin, Procain-penicillin.

Фармакологическое действие, показания к применению, побочное действие и условия хранения те же, что и для бензилпенициллина натриевой соли.

В отличие от него препарат медленно всасывается и при внутримышечном введении оказывает пролонгированное действие.

При растворении в воде образует суспензию. После инъекции суспензии терапевтическая концентрация в крови сохраняется до 12 ч.

Способ применения и дозы. Только внутримышечно 1—2 раза в сутки по 300 000—600 000 ЕД. Высшие суточные дозы для детей до 2 лет 50 000 ЕД/кг, от 2 до 7 лет 250 000 ЕД, от 7 до 14 лет 500 000 ЕД. Для введения надо пользоваться иглой диаметром 0,8 мм.

Форма выпуска. Во флаконах по 600 000 ЕД.

Срок годности 3 года.

Отредактировал: ledi24

БЕНЗОБАМИЛ (Benzobamylum). (1-Бензоил-5-этил-5-изоамилбарбитуровая кислота). Синонимы: бензамил, бензоилбарбамил.

Фармакологическое действие. Обладает противосудорожным седативным, снотворным и гипотензивным свойством. Менее токсичен, чем бензонал и фенобарбитал.

Показания к применению. Эпилепсия, преимущественно с подкорковой локализацией очага возбуждения, «диэнцефальная» форма эпилепсии, эпилептический статус у детей.

Способ применения и дозы. Внутрь после еды. Дозы для взрослых 0,05—0,2 г (до 0,3 г) 2—3 раза в сутки, для детей в зависимости от возраста от 0,05 до 0,1 г 3 раза в сутки. Бензобамил можно применять в комплексе с дегидратационной, противовоспалительной и десенсибилизирующей терапией. В случае привыкания бензобамил можно временно комбинировать с эквивалентными дозами фенобарбитала и бензонала с последующей заменой их вновь бензобамилом.

Эквивалентное соотношение бензобамила и фенобарбитала $2—2^1/_2$ г:1 г.

Побочное действие. Большие дозы препарата могут вызвать сонливость, вялость, понижение АД, атаксию, нистагм, затруднение речи.

Противопоказания. Поражение почек и печени с нарушением их функций, декомпенсация сердечной деятельности.

Форма выпуска. Таблетки по 0,1 г, в упаковке 100 штук.

Условия хранения. Список Б. В плотно закрытой посуде.

Срок годности $3^1/_2$ года.

БЕНЗОГЕКСОНИЙ (Benzohexonium). 1,6-Бис (N-триметиламмоний)-гексана дибензолсульфонат. Синоним: Hexamethonii benzosulfonas.

Фармакологическое действие. Ганглиоблокирующее средство.

Показания к применению. Спазм периферических сосудов, гипертоническая болезнь, гипертонические кризы, бронхиальная астма, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,1—0,2 г 2—3 раза в день; подкожно и внутримышечно 1—1,5 мл 2,5% раствора. Высшая разовая доза внутрь 0,3 г, суточная 0,9 г; подкожно разовая 0,075 г, суточная 0,3 г.

Побочное действие. Общая слабость, головокружение, сердцебиение. Большие дозы могут вызвать ортостатический коллапс, выраженный мидриаз, сухость во рту, атонию мочевого пузыря.

Противопоказания. Гипотония, тяжелые паренхиматозные поражения почек, печени, дегенеративные изменения в центральной нервной системе, тромбофлебиты.

Форма выпуска. Таблетки по 0,1 г, в упаковке по 20 штук; ампулы по 1 мл 2,5% раствора, в упаковке по 10 штук.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности. Ампулы 4 года, таблетки 5 лет.

БЕНЗОЙНАЯ КИСЛОТА (Acidum benzoicum).

Применение. Как антисептическое и фунгицидное средство в виде мазей и присыпок.

Форма выпуска. Порошок.

Условия хранения. В хорошо укупоренной таре.

Срок годности 10 лет.

БЕНЗОНАЛ (Benzonalum). 1-Бензоин-5-этил-фенилбарбитуровая кислота. Синоним: Benzobarbitalum.

Фармакологическое действие. Оказывает выраженное противосудорожное действие; в отличие от фенобарбитала не дает снотворного эффекта.

Отредактировал: ledi24

Показания к применению. Судорожные формы эпилепсии, в том числе кожевниковская эпилепсия, фокальные и джексоновские припадки.

Способ применения и дозы. Внутрь. Разовая доза для взрослых 0,1—0,3 г, суточная 0,8—1,2 г, для детей в зависимости от возраста разовая 0,025—0,2 г, суточная 0,15—0,6 г. Индивидуально устанавливают наиболее эффективную и переносимую дозу препарата. Можно применять в сочетании с другими противосудорожными средствами.

Побочное действие. Сонливость, атаксия, нистагм, дизартрия.

Противопоказания. Поражение почек и печени с нарушением их функции, декомпенсация сердечной деятельности.

Форма выпуска. Порошок, таблетки по 0,1 г, в упаковке 50 штук; 0,05 г, в упаковке 30 штук для детей.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности. Таблетки по 0,05 г 3 года; по 0,1 г 4 года, порошок 3 года.

БЕНЗОТЭФ (Benzotephum). N-Бензоил-N′, N″-диэтилентриамид фосфорной кислоты.

Фармакологическое действие. Противоопухолевый препарат; по активности аналогичен тиофосфамиду, но менее токсичен.

Показания к применению. В тех же случаях, когда показано лечение тиофосфамидом (рак яичников, молочной железы, рак легкого); при эпителиоме плевры и асците.

Способ применения и дозы. Вводят внутривенно по 24 мг в 20 мл изотонического раствора хлорида натрия 3 раза в неделю. На курс лечения 15—20 инъекций. Лечение прекращают при уменьшении числа лейкоцитов до $3 \cdot 10^9$/л и тромбоцитов до $100 \cdot 10^9$/л. При необходимости через 1—3 мес назначают повторный курс при условии восстановления картины крови. При раковом плеврите и асците препарат вводят в тех же дозах в полости после эвакуации экссудата.

Побочное действие. Лейкопения, тромбоцитопения, тошнота, рвота, а в больших дозах — панцитопения.

Противопоказания. Терминальная стадия болезни, резкое истощение организма, лейкопения и выраженная анемия, а также сопутствующие заболевания (активная форма туберкулеза, паренхиматозный гепатит, нефрит и тяжелая недостаточность кровообращения).

Форма выпуска. Стерильный порошок по 0,024 г во флаконах емкостью 20 мл.

Условия хранения. Список А. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 6 мес.

БЕНФОТИАМИН (Benphothiaminum). 2-Метил-4-амино-5-(1′-фосфат-3′-бензоилтио-4′-метилбут-3′-ен-4′-формамидометил)-пиримидин.

Фармакологическое действие. По свойствам близок к тиамину и кокарбоксилазе.

Показания к применению. Гиповитаминоз B^1 и авитаминоз B^1, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, ревмокардит, кардиопатии при хроническом тонзиллите, хроническая недостаточность кровообращения, экстрасистолическая аритмия, обострение хронического гепатита с признаками цирроза, сахарный диабет, дерматозы, функциональные расстройства нервной системы.

Способ применения и дозы. Внутрь 1—4 раза в день после еды в разовой дозе (для взрослых) 0,025—0,05 г. Дозы для детей от 1 года до 10 лет —0,01—0,03 г/сут, старше 10 лет — суточная доза 0,03—0,035 г Курс лечения 15—40 дней.

Отредактировал: ledi24

Форма выпуска. Таблетки по 0,025 г, в упаковке 100 штук.
Условия хранения. В сухом, защищенном от света месте.
Срок годности 3 года.

БЕРБЕРИНА БИСУЛЬФАТ (Berberini bisulfas). Алкалоид содержится в листьях и корнях барбариса.

Фармакологическое действие. Оказывает желчегонное действие.

Показания к применению. Желчнокаменная болезнь, холециститы, дискинезии желчных путей, хронический гепатит.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,005—0,01 г 3 раза в день перед едой. Курс лечения 2—4 нед.

Противопоказания. Беременность.

Форма выпуска. Таблетки по 0,005 г в упаковке по 50 штук.
Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.
Срок годности 3 года.

БЕРЕЗЫ ПОЧКИ (Gemmae Betulae). Содержат эфирное масло (3—8%), в состав которого входят сесквитерпеновый спирт бетулол (41—47%) и сложный эфир бетулола с уксусной кислотой (30—45%); флавоны, дубильные вещества, смолу.

Применение. В качестве мочегонного и дезинфицирующего средства при отеках почечного и сердечно-сосудистого происхождения в виде настоя по 1—2 столовые ложки 3 раза в день.

Форма выпуска. В упаковке по 100 г.
Условия хранения. В сухом прохладном месте.
Срок годности 2 года.

БЕРЛОФЕН (Berlophenum). Синоним: гипофенат. Состав (на 500 г): очищенного от фенилаланина гидролизата казеина 446 г, DL-триптофана 13,5 г, DL-метионина 13,5 г, L-тирозина 27 г, содержание азота — до 10%.

Фармакологическое действие. Отсутствие в составе берлофена фенилаланина создает предпосылки для заметного уменьшения или ликвидации симптомов фенилкетонурии в результате коррекции обмена веществ.

Показания к применению. Лечение детей, больных фенилкетонурией.

Способ применения и дозы. Суточную дозу дают в 2—3 приема перед едой (бо́льшую часть препарата назначают перед обедом). Дозу рассчитывают индивидуально по данным анализа крови на фенилаланин.

Форма выпуска. В упаковке по 500 г.
Условия хранения. В сухом прохладном месте.
Срок годности 3 года.
Поставляется из Германии.

БЕРОДУАЛ (Berodual).

Фармакологическое действие. Комбинированный препарат, обладающий бронхорасширяющим свойством.

Показания к применению. Для поддерживающей терапии и купирования приступов удушья, при хроническом обструктивном бронхите, эмфизематозном бронхите и бронхолегочных заболеваниях с бронхоспастическим компонентом, а также при хронической избыточной раздражимости бронхов, бронхиальной астме, в частности инфекционного характера.

Способ применения и дозы. Для профилактики и при длительном лечении вдыхают по 1—2 дозы аэрозоля 3 раза в день. При приступах удушья рекомендуется применять 2 дозы аэрозоля. При недостаточном эффекте вдыхают еще 2 дозы аэрозоля. Бородуал применяют только по рекомендации врача.

Отредактировал: ledi24

Побочное действие. При относительной или абсолютной передозировке, особенно при повышенной чувствительности, отмечают тремор пальцев, ощущение беспокойства или сердцебиение, сухость во рту. Если препарат по неосторожности попадает в глаза, развиваются легкие и обратимые нарушения аккомодации глаз.

Противопоказания. В первые 3 мес. беременности.

Форма выпуска. Дозированный аэрозоль по 15 мл (300 доз).

Условия хранения. В сухом прохладном месте, не допускается замораживание.

Срок годности 3 года.

Поставляется из Югославии.

БЕРОКСАН (Beroxanum). Смесь из двух фурокумаринов (ксантоксина и бергаптена), выделенных из пастернака посевного (Pastinaca sativa L.).

Фармакологическое действие. Фотосенсибилизирующее средство.

Показания к применению. Витилиго, гнездная плешивость.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,02 г 1—4 раза в день за 4, 3, 2 и 1 ч до облучения и местно (втирание 0,5% раствора в очаги поражения). На курс лечения 250—300 таблеток.

Побочное действие и противопоказания те же, что и при применении аммифурина.

Форма выпуска. Комплект, в который входят таблетки по 0,02 г № 50 и 0,5% раствор по 50 мл.

Условия хранения. Список Б. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности. Раствор и таблетки 2 года.

БЕРОТЕК (Berotec). Синоним: Partusisten. В одной дозе содержится 0,2 мг 1-(3,5-диоксифенил)-2[1-(4-оксибензил)-этил] аминоэтанола гидробромида.

Фармакологическое действие. Специфический бронхоспазмолитик с преимущественным воздействием на β_2-адренорецепторы бронхов. Действие наступает быстро и продолжается в среднем 8 ч. Наряду с бронхоспазмолитическим эффектом беротек стимулирует дыхание.

Показания к применению. Лечение и профилактика дыхательной недостаточности при бронхиальной астме, спастическом астмоидном бронхите, эмфиземе легких. Для купирования острого приступа бронхиальной астмы.

Способ применения и дозы. Для снятия острого приступа взрослым и детям школьного возраста назначают 1 дозу аэрозоля. Если через 5 мин дыхание не улучшается, ингаляцию можно повторить. Дальнейшее применение препарата возможно только через 3 ч. Для предупреждения приступа назначают по 1 дозе 3 раза в день, детям школьного возраста — по 1 дозе 2 раза в день.

Противопоказания. Беременным назначают с осторожностью.

Форма выпуска. Дозированный аэрозоль по 15 мл (300 доз) во флаконе.

Условия хранения. В прохладном месте, не допуская замораживания. Предохранять от действия прямых солнечных лучей и источников тепла.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Югославии.

«БЕСАЛОЛ» («Besalolum»). Состав: экстракта красавки 0,01 г, фенилсалицилата 0,3 г.

Отредактировал: ledi24

Показания к применению. Заболевания желудочно-кишечного тракта.

Способ применения и дозы. Внутрь по 1 таблетке 2—3 раза в день.

Форма выпуска. В упаковке по 6 штук.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности 4 года.

БЕССМЕРТНИКА ПЕСЧАНОГО ЦВЕТКИ (Flores Helichrysi arenarii). Содержат флавоновые гликозиды (салипурнозид, изосалипурнозид, кемпферол, апигенин), смолы, красящие вещества.

Фармакологическое действие. Препараты бессмертника песчаного оказывают желчегонное действие (усиление секреции желчи), ускоряют ток желчи, усиливают секреторную и двигательную функции желудочно-кишечного тракта.

Показания к применению. Желчнокаменная болезнь, хронические холециститы, дискинезии желчных путей, хронические гепатиты.

Способ применения и дозы. Внутрь в виде отвара из цветков (10,0:200,0) по $^1/_2$ стакана 2—3 раза в день в теплом виде за 30 мин до еды; сухой экстракт по 1 г 3 раза в день.

Форма выпуска. Высушенные цветки в упаковке по 50 г, сухой экстракт из цветков 10 г, 100 г.

Условия хранения. В сухом прохладном месте.

Срок годности. Цветки 2 года, экстракт 2 года.

БЕТАЛОК (Betaloc). Битартрат метопролола, спесикор.

Фармакологическое действие. Блокирует бета$_1$-адренорецепторы. Не обладает внутренней симпатомиметической активностью. Снижает повышенное артериальное давление в различном положении больного, не вызывая ортостатической гипотензии и нарушений электролитного баланса.

Показания к применению. Гипертоническая болезнь, при легкой и средней тяжести гипертонии в виде монотерапии, а в тяжелых случаях в комбинации с диуретиками и другими гипотензивными препаратами. Стенокардия, расстройства сердечного ритма (синусная тахикардия, пароксизмальная суправентрикулярная тахикардия), гиперкинетический синдром.

Способ применения и дозы. Дозируется индивидуально. При гипертонии назначают внутрь по 0,1—0,2 г в сутки на один прием либо разделив на два приема утром и вечером. В отдельных случаях доза может повышаться либо сочетаться с назначением других гипотензивных препаратов. При стенокардии принимают утром и вечером, разделив на две части суточную дозу 0,1—0,2 г. В тяжелых случаях суточная доза может быть увеличена до 0,3—0,4 г. При сердечных аритмиях назначают по 0,05 г утром и вечером и при необходимости суточную дозу доводят до 0,2—0,3 г.

Побочное действие. Утомляемость, нарушения сна, желудочно-кишечные расстройства, брадикардия, редко неспецифические кожные реакции и чувство холода в конечностях. При понижении дозировки перечисленные явления проходят самостоятельно. Передозировка вызывает выраженную гипотензию и брадикардию. В таких случаях назначают атропин либо в тяжелых случаях норадреналин, допамин.

Противопоказания. Антриовентрикулярная блокада II—III степени, сердечная недостаточность, кардиогенный шок, выраженная брадикардия (ниже 55 в мин) Следует избегать одновременного назначения с антагонистами кальция, с осторожностью использовать у больных, принимающих инсулин и страдающих астматическими состояниями.

Отредактировал: ledi24

При операциях метопролол должен отменяться не менее чем за 48 часов до наркоза.

Препарат должен отменяться медленно, поскольку резкое прекращение лечения может вызвать ухудшение состояния больных, особенно с ишемическим поражением сердца.

Форма выпуска. Упаковка содержит 20 таблеток по 100 мг.

Условия хранения. Обычные.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Венгрии.

«БЕТИОЛ» СУППОЗИТОРИИ (Suppositoria «Bethiolum»). Состав: экстракта красавки 0,015 г, ихтиола 0,2 г, жировой основы 1,185 г.

Применение. Как болеутоляющее и противовоспалительное средство при геморрое и трещинах заднего прохода по 1 суппозиторию 1—3 раза в день.

Форма выпуска. В упаковке по 10 штук.

Условия хранения. В прохладном месте.

Срок годности 2 года.

БЕФУНГИН (Befunginum). Полугустой экстракт, полученный из грибных наростов (березового гриба — чаги), образуемых на березах фитопатогенным паразитом Inonolus obliguus. К экстракту добавлены соли кобальта (1% хлорида или 1,5% кобальта сульфата).

Фармакологическое действие. Симптоматическое средство.

Показания к применению. Злокачественные опухоли различной локализации, а также хронические гастриты и дискинезии желудочно-кишечного тракта с преобладанием атонии.

Способ применения и дозы. Внутрь: 2 чайные ложки препарата разводят 150 мл подогретой кипяченой воды и принимают по 1 столовой ложке 3 раза в день за 30 мин до еды. Лечение проводят длительными курсами (3—5 мес) с перерывами между ними 7—10 дней.

Побочное действие. При длительном применении возможны диспептические явления.

Форма выпуска. Во флаконах по 100 г.

Условия хранения. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

БИЙОХИНОЛ (Bijochinolum). 8% взвесь йодвисмута хинина в нейтрализованном персиковом или оливковом масле.

Фармакологическое действие. Дает терапевтический эффект при спирохетозах, а также оказывает противовоспалительное и рассасывающее действие.

Показания к применению. Все формы сифилиса (в сочетании с препаратами пенициллина), несифилитические поражения центральной нервной системы (арахноэнцефалит, менингомиелит и др.), травмы черепа.

Способ применения и дозы. Внутримышечно в верхний наружный квадрант ягодицы двухмоментным способом. Перед инъекцией флакон подогревают в теплой воде и тщательно взбалтывают. При сифилисе вводят 2—3 мл 1 раз в 2—3 дня (из расчета 1 мл в день). Курсовая доза 40—50 мл. Высшая разовая доза для взрослых 3 мл (1 раз в 3 дня). Детям в соответствии с возрастом.

При неспецифических поражениях центральной нервной системы по 2 мл через день. Курсовая доза 30—40 мл в зависимости от стадии процесса.

Побочное действие. Возможны слюнотечение, появление темпо-

Отредактировал: ledi24

синей каймы по краю десен, гингивиты, стоматиты, дерматиты, висмутовая нефропатия, альбуминурия, полиневриты и неврит тройничного нерва.

Противопоказания. Возраст до 6 мес. Заболевания почек, печени, геморрагические диатезы, тяжелые формы туберкулеза, декомпенсация сердечной деятельности, гингивиты, стоматиты, повышенная чувствительность к хинину.

Форма выпуска. Во флаконах по 100 мл.

Условия хранения. Список Б. В прохладном, сухом, защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

«БИКАРМИНТ» («Bicarmintum»). Состав: натрия бората 0,4 г, натрия гидрокарбоната 0,4 г, натрия хлорида 0,2 г, ментола 0,004 г.

Применение. Как антисептическое и противовоспалительное средство для полосканий, промываний и ингаляций при воспалительных процессах верхних дыхательных путей (1—2 таблетки на $^1/_2$ стакана воды).

Форма выпуска. Таблетки в упаковке по 10 штук.

Условия хранения. В сухом, защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

БИКАРФЕН (Bicarphenum). Гидрохлорид хинуклидил-3-ди (орто-толил) карбинола.

Фармакологическое действие. Антиаллергический препарат, сочетающий противогистаминное и противосеротониновое действие.

Показания к применению. Острые и хронические аллергические заболевания — риносинусопатии, заболевание глаз (химическая, косметическая, лекарственная аллергия и др.), поллиноз, аллергические осложнения от применения лекарств, пищевых продуктов, средств бытовой химии. Аллергический и атопический дерматит, васкулит кожи, нейродермит, красный плоский лишай и др.

Способ применения и дозы. Внутрь после еды по 50—100 мг 2—3 раза в день. Средняя суточная доза 200—300 мг. При хорошей переносимости суточная доза может быть увеличена до 400 мг. Продолжительность лечения 5—15 дней; при необходимости курс лечения повторяют.

Побочное действие. Сухость слизистых оболочек полости рта, боль в эпигастральной области, диспептические явления, сонливость, повышение аппетита.

Противопоказания. Нельзя назначать при беременности, во время работы водителям транспорта и другим лицам, профессия которых требует быстрой психической и двигательной реакции.

Форма выпуска. Таблетки по 0,05 г, в упаковке 20 штук.

Условия хранения. Список Б. В сухом, защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

БИЛИГНИН (Biligninum). Модифицированный лигнин, получаемый из древесины растений.

Фармакологическое действие. При приеме внутрь связывает желчные кислоты в кишечнике, уменьшает их обратное всасывание и способствует их выведению с калом.

Показания к применению. Заболевания печени (холестатические гепатиты, билиарные циррозы, внепеченочные частичные нарушения оттока желчи) и другие заболевания, связанные с нарушением обмена

Отредактировал: ledi24

и повышением содержания желчных кислот и холестерина в крови.

Способ применения и дозы. Внутрь по 5—10 г (1—2 чайные ложки) 3 раза в день за 30—40 мин до еды, запивая водой. Курс лечения от 7 дней до 3 мес; при необходимости курс лечения повторяют.

Побочное действие. Возможны диспептические явления, проходящие при уменьшении дозы.

Противопоказания. У больных с полным нарушением желчеотделения.

Форма выпуска. Порошок по 75 г в упаковке.

Условия хранения. В сухом месте при комнатной температуре.

Срок годности 2 года.

БИЛИГНОСТ (Biligno stum). Натриевая соль бис(2,4,6-трийод-3-карбоксианилид) адипиновой кислоты. Синонимы: Adipiodonum, Biligrafin.

Применение. Контрастное средство для рентгенографии желчных путей и желчного пузыря.

Способ применения и дозы. Вводят внутривенно в течение 4—5 мин 20 мл раствора, подогретого до температуры тела. Через 20—25 мин можно получить изображение желчных ходов, а через 2—$2^1/_2$ ч — изображение желчного пузыря. Детям вводят по 0,5—0,75 мл/кг. Предварительно (с целью определения чувствительности организма к йоду) вводят 2 мл раствора.

Побочное действие. Головокружение, сердцебиение, рвота, иногда резкое снижение АД.

Противопоказания. Идиосинкразия к йоду, тяжелые заболевания печени, почек, щитовидной железы; декомпенсация сердечной деятельности.

Форма выпуска. Ампулы по 20 мл 50% раствора и тест-ампулы 1 мл в упаковке по 10 штук.

Условия хранения. В прохладном, защищенном от света месте. Ампулы с выпавшими кристаллами могут быть использованы после нагревания в случае отсутствия кристаллов после охлаждения.

Срок годности 1 год.

БИЛИМИН (Biliminum). Натриевая соль β (3-диметил-аминометиленимино-2,4,6-трийодфенил) пропионовой кислоты. Синонимы: билоптин, иоподат натрия, орографин-натрий.

Фармакологическое действие. Рентгеноконтрастное средство для пероральной холецистохолангиографии.

Показания к применению. Применяют в качестве рентгеноконтрастного вещества для диагностики заболевания желчного пузыря и желчевыводящих путей.

Способ применения и дозы. Внутрь, взрослому (массой тела 60—80 кг) в дозе 3—6 г (6—12 таблеток по 0,5 г). Для холецистографии — за 12—24 ч до рентгенологического исследования. Тучным больным дают 3 г препарата дважды: в 20 ч и в 22 ч. Для холецистохолангиографии — в дозе 3 г за 10—12 ч до рентгенологического исследования или 6 г за 2 ч до исследования. Препарат запивают чаем.

Побочное действие. Возможны скопления газов в кишечнике, ощущение давления в области желудка, неприятный вкус во рту, тошнота, редко — понос и рвота, кожные высыпания аллергического характера.

Противопоказания. Идиосинкразия к йодистым препаратам,

Отредактировал: ledi24

тиреотоксикоз, сердечно-сосудистая декомпенсация, тяжелые функциональные поражения печени и почек.

Форма выпуска. Таблетки по 0,5 г, в упаковке 6 штук.

Условия хранения. Список Б. В сухом, защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

БИЛТРИЦИД (Biltricid). Синоним: празиквантель, ценариде.

Фармакологическое действие. Противотрематодное средство.

Показания к применению. Шистосомозы, вызванные Schistosoma hemolobium s japonicum, s mansoni; инвазии, вызванные печеночной и легочной двуусткой.

Способ применения и дозы. Внутрь в таблетках 3 раза в день по 25 мг на 1 кг массы тела однодневно.

Побочное действие. Иногда могут наблюдаться боли в животе, тошнота, головная боль, крапивница и повышение температуры. Побочные явления носят в общем легкий и временный характер и не требуют коррекции.

Противопоказания. Не рекомендуют принимать в первые 3 месяца беременности и кормящим матерям. При сочетании трематодоза с нейроцистицеркозом лечение следует проводить в стационаре. Больным с головокружением после приема препарата на следующий день не рекомендуют заниматься работой, требующей особого внимания.

Форма выпуска. 100 штук таблеток по 0,6 г празиквантеля в упаковке.

Условия хранения. Обычные.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Германии.

БИОСЕД (Biossedum). Водный экстракт из травы очитка большого.

Фармакологическое действие. Биогенный стимулятор.

Показания к применению. Как вспомогательное средство, стимулирующее обменные процессы и тканевую регенерацию в офтальмологии, терапии, хирургии и стоматологии.

Способ применения и дозы. Внутримышечно ежедневно по 1—2 мл в течение 20—30 дней. Через 2—4 мес курс лечения может быть повторен. В офтальмологии одновременно вводят подконъюнктивально по 0,3—0,5 г в течение 10—25 дней или в виде инстилляции по 2 капли 4—5 раз в день, а также путем электрофореза (3—7 мин ежедневно до 20 процедур). В стоматологии — аппликации 1—2 раза в день, инъекции в ткань десен или электрофорез.

Побочное действие. Местные аллергические реакции у детей раннего возраста.

Противопоказания. Злокачественные новообразования, гастрит и язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, протекающие с ахилией.

Форма выпуска. Ампулы по 1 мл, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. В сухом, защищенном от света месте при комнатной температуре.

Срок годности 3 года.

БИСАКОДИЛ (Bisacodyl). 4,4-Диацетилоксидифенилпиридил-2-метан. Синоним: Dulcolax.

Фармакологическое действие. Относится к слабительным средствам. Раздражает рецепторы кишечника, а также усиливает выделение слизи и разжижение содержимого кишечника.

Отредактировал: ledi24

Показания к применению. Хронические запоры различной этиологии, в том числе у длительно лежащих больных, лиц пожилого и старческого возраста и др.

Способ применения и дозы. Назначают per os и per rectum. Взрослым по 1—3 драже на ночь или по 1—2 суппозитория ректально. Дозы для детей устанавливают в зависимости от возраста.

Побочное действие. Возможны спазмы желудочно-кишечного тракта.

Противопоказания. Острые воспалительные заболевания и варикозное расширение вен прямой кишки; индивидуальная непереносимость препарата.

Форма выпуска. Драже по 0,005 г, в упаковке 30 штук; свечи по 0,01 г, в упаковке 12 штук.

Условия хранения. В сухом прохладном месте, драже — в хорошо укупоренных флаконах.

Срок годности 3 года.

Поставляется из Польши.

БИСЕКУРИН (Bisecurin). Оказывает угнетающее влияние на гонадотропную функцию гипофиза, что тормозит овуляцию, а также улучшает функциональное состояние эндометрия.

Показания к применению. Эндометриоз, функциональные нарушения яичников, как контрацептивное средство по медицинским показаниям.

Способ применения и дозы. Внутрь по 1 таблетке, начиная с 5-го дня менструации в течение 21 дня. После 7-дневного перерыва курс лечения повторяют. Длительность лечения 6—9 мес; как противозачаточное используют исключительно по назначению врача.

Побочное действие. Тошнота, головная боль, увеличение массы тела.

Противопоказания. Длительное применение в юношеском возрасте, при беременности и лактации, выраженные нарушения функции печени, цереброваскулярные нарушения, рак молочной железы, фибромиома.

Форма выпуска. Таблетки в упаковке по 21 штуке.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Венгрии.

БИСМОВЕРОЛ (Bismoverolum). Взвесь основной висмутовой соли моновисмутвинной кислоты в нейтрализованном персиковом или оливковом масле.

Фармакологическое действие. Оказывает терапевтическое действие при спирохетозах.

Показания к применению. Все формы сифилиса.

Способ применения и дозы. Внутримышечно (в верхний наружный квадрант ягодицы) взрослым по 1,5 мл 1 раз в 3 дня (курсовая доза 16—20 мл), детям в зависимости от возраста по схеме.

Побочное действие. Возможны слюнотечение, появление темносиней каймы по краю десен, гингивиты, стоматиты, дерматиты, висмутовая нефропатия, альбуминурия, полиневриты, неврит тройничного нерва.

Противопоказания. Заболевания почек, печени, сахарный диабет, геморрагические диатезы, тяжелые формы туберкулеза, декомпенсация сердечной деятельности, гингивиты, стоматиты.

Форма выпуска. Во флаконах по 100 мл.

Отредактировал: ledi24

Условия хранения. Список Б. В сухом, прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 5 лет.

БИФИДУМБАКТЕРИН СУХОЙ (Bifidumbacterinum siccum). Высушенная взвесь живых бифидобактерий.

Фармакологическое действие. Обладает антагонистической активностью в отношении шигелл и других патогенных и условно-патогенных микробов.

Показания к применению. Острые кишечные инфекции (острая дизентерия, сальмонеллез, эшерихиоз, вирусная диарея), дисбактериоз кишечника, санация реконвалесцентов; хронические воспалительные заболевания тонкого и толстого кишечника (энтероколиты, колиты, в том числе неспецифический язвенный колит); кишечные дисфункции на фоне дисбактериоза кишечника, в том числе возникшего после длительной антибиотико-химиотерапии (применение особенно показано детям первого года жизни, в том числе недоношенным, ослабленным и с отягощенным преморбидным состоянием); длительная кишечная дисфункция, стафилококковая инфекция с поражением желудочно-кишечного тракта; при раннем переводе детей грудного возраста на искусственное вскармливание или вскармливаемых донорским молоком; при комплексном лечении детей, больных сепсисом, пневмонией и другими гнойно-инфекционными заболеваниями, особенно при наличии любых расстройств функции кишечника. Санация половых путей при воспалительных заболеваниях их и предродовой подготовке беременных «группы риска» с нарушением чистоты вагинального секрета до III—IV степени.

Способ применения и дозы. Препарат во флаконах применяют с первых дней жизни, а в таблетках — с 3-летнего возраста.

При кишечных заболеваниях внутрь за 20—30 мин до еды: детям первого полугодия жизни по 3 дозы 2 раза в день, детям от 6 мес и старше по 5 доз 2 раза в день; при хронических колитах и энтероколитах у взрослых по 5 доз 2—3 раза в день. Курс лечения при острых формах заболевания не менее 2 нед, в отдельных случаях в зависимости от клинических и лабораторных показателей — 3—4 нед и более; при затяжном и хроническом течении дизентерии, постдизентерийном колите и при длительной кишечной дисфункции — не менее 4—6 нед.

При отсутствии полной нормализации микрофлоры после окончания курса лечения назначают поддерживающую дозу препарата (половину дневной дозы) в течение 1 мес.

Курс лечения при неспецифическом язвенном колите, хронических колитах и энтероколитах до $1^1/_2$—2 мес.

В акушерско-гинекологической практике — интравагинально по 5—6 доз (флаконная форма) 1 раз в день в течение 5—8 дней.

Препарат разводят кипяченой водой перед применением из расчета 1 чайная ложка воды на 1 дозу. Таблетки принимают цельными или размельченными, запивая кипяченой водой.

Побочное действие. Не установлено.

Противопоказания. Бифидумбактерин при лечении антибиотиками принимать не рекомендуется.

Форма выпуска. Во флаконах по 5 доз, таблетки (1 таблетка — 1 доза) по 20 штук во флаконе.

Условия хранения. В сухом темном месте при температуре не выше 6°С. Хранение разведенного препарата не допускается.

Срок годности 12 мес.

Отредактировал: ledi24

БИФИКОЛ СУХОЙ (Bificolum siccum). Высушенная взвесь живых, совместно выращенных бифидобактерий и кишечной палочки штамма М-17.

Фармакологическое действие. Обладает антагонистической активностью в отношении многих патогенных и условно-патогенных микроорганизмов.

Показания к применению. Острая дизентерия при развитии выраженного дисбактериоза кишечника, сопутствующие заболевания желудочно-кишечного тракта, непереносимость химиотерапевтических препаратов; долечивание реконвалесцентов дизентерии, сальмонеллеза и смешанных кишечных инфекций в случае затяжного инфекционного процесса, а также постдизентерийный колит, затяжная и хроническая форма дизентерии, колиты и энтероколиты, неспецифический язвенный колит, вирусные диареи на фоне дисбактериоза.

Способ применения и дозы. Внутрь за 20—30 мин до еды: детям от 6 мес до 1 года — 1 доза 2 раза в день, от 1 года до 3 лет 2—5 доз 2 раза в день, старше 3 лет и взрослым — 3—5 доз 2 раза в день.

Курс лечения при острых формах не менее 2 нед, в зависимости от клинических и лабораторных показателей — 3—4 нед; при состоянии реконвалесценции — 21—30 дней, при постдизентерийном колите и длительной дисфункции кишечника — не менее 4—6 нед, при хронических колитах, энтероколитах и неспецифическом язвенном колите до 45—60 дней. При необходимости можно назначать повторные курсы лечения или поддерживающие дозы (половина суточной дозы) в течение 1—1$^1/_2$ мес.

Препарат разводят кипяченой водой комнатной температуры непосредственно перед приемом из расчета 1 чайная ложка воды на 1 дозу.

Таблетки применяют цельными или размельченными, запивая кипяченой водой. Лицам с повышенной кислотностью рекомендуется за 5—10 мин до приема препарата выпить $^1/_2$ стакана минеральной воды (боржом, ессентуки № 4 или № 17) или раствор гидрокарбоната натрия ($^1/_2$ чайной ложки на стакан воды).

Побочное действие. Не установлено.

Противопоказания. При лечении бификолом не рекомендуется принимать антибиотики.

Форма выпуска. Во флаконах по 5 доз и таблетки (1 таблетка — 1 доза) по 10 штук во флаконе.

Условия хранения. В сухом темном месте при температуре не выше 6°С. Хранение разведенного препарата не допускается.

Срок годности 1 год.

БИЦИЛЛИН-1 (Bicillinum-1). N, N'-Дибензилэтилендиаминовая соль бензилпенициллина. Синонимы: Benzathin-penicillin, Duapen.

Фармакологическое действие. По спектру антимикробного действия подобен бензилпенициллину. Вследствие плохой растворимости создает депо пенициллина в организме в течение длительного времени. Не оказывает кумулятивного действия. Малотоксичен.

Показания к применению. Заболевания, вызванные чувствительными к бензилпенициллину микроорганизмами, а также для профилактики и лечения ревматизма, сифилиса, гонореи и др.

Способ применения и дозы. Внутримышечно 300 000—600 000 ЕД 1 раз в неделю или 1 200 000 ЕД 2 раза в месяц. При ревматизме дозу увеличивают до 2 400 000 ЕД 2 раза в месяц. Детям вводят 1 раз в неделю из расчета 5000—10 000 ЕД/кг или 20 000 ЕД/кг 2 раза в месяц.

Отредактировал: ledi24

Побочное действие. Аллергические реакции.

Противопоказания. Бронхиальная астма, крапивница, сенная лихорадка, аллергические заболевания, а также повышенная чувствительность к препаратам бензилпенициллина.

Форма выпуска. Во флаконах по 300 000 ЕД и 600 000 ЕД.

Условия хранения. Список Б. В сухом прохладном месте.

Срок годности 3 года.

БИЦИЛЛИН-5 (Bicillinum-5). Смесь бициллина-1 и бензилпенициллина новокаиновой соли в соотношении 4:1.

Фармакологическое действие. По антимикробному действию аналогичен бензилпенициллину. Не обладает кумулятивным свойством. Малотоксичен. В первые часы после введения создается высокая концентрация препарата в крови, длительно сохраняющаяся в организме.

Показания к применению. Инфекции, вызванные чувствительными к бензилпенициллину микроорганизмами, при которых необходимо длительное воздействие на возбудителя.

Особенно показан для круглогодичной профилактики рецидивов ревматизма.

Способ применения и дозы. Внутримышечно взрослым 1 500 000 ЕД 1 раз в месяц, детям дошкольного возраста 600 000 ЕД 1 раз в 3 нед, детям старше 8 лет 1 200 000—1 500 000 ЕД 1 раз в месяц.

Побочное действие. Аллергические реакции.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к пенициллину и новокаину.

Форма выпуска. Во флаконах по 1 500 000 ЕД в комплекте с растворителем по 5 мл.

Условия хранения. Список Б. В сухом месте при комнатной температуре.

Срок годности 2 года.

БЛЕМАРЕН (Blemaren). Состав из расчета на 100 г гранул: кислота лимонная обезвоженная — 39,90 г, калия гидрокарбонат — 32,25 г, натрия цитрат обезвоженный — 27,85 г.

Фармакологическое действие. Способствует нейтрализации мочи, позволяет поддерживать pH в пределах 6,6—6,8, что создает оптимальные условия для повышения растворения мочевой кислоты. Длительное применение препарата приводит к растворению мочекислых камней и предотвращает их появление.

Показания к применению. Мочекаменная болезнь с преобладанием уратов, предупреждение образования мочекислых камней.

Способ применения и дозы. Дозы устанавливают индивидуально, в среднем 3—6 г (1—2 дозированных ложки) 2—3 раза в день после еды. Препарат разводят в воде или фруктовом соке. Лечение проводят под контролем pH мочи 3 раза в день с помощью индикатора, прилагаемого к препарату.

Побочное действие. Следует избегать щелочной реакции мочи (pH выше 7,0), так как это способствует образованию фосфатов.

Форма выпуска. В упаковке по 200 г с приложением дозированной ложки, контрольного календаря и индикатора для определения pH.

Условия хранения. В хорошо укупоренной таре в сухом месте.

Срок годности 3 года.

Поставляется из Германии.

Отредактировал: ledi24

БЛЕОМИЦЕТИН (Bleomycetinum). Синоним: Bleocin, Bleomycinum.

Фармакологическое действие. Антибиотик, обладающий противоопухолевой активностью.

Показания к применению. Плоскоклеточный рак кожи, включая рак наружных половых органов, особенно у мужчин; рак пищевода и слизистой оболочки рта, лимфогранулематоз в начальной стадии, предраковые состояния.

Способ применения и дозы. Вводят по 0,015 г внутривенно, внутримышечно и под кожу. В зависимости от локализации опухоли назначают от 1 до 7 инъекций в неделю.

Побочное действие. Тошнота, рвота, лекарственная пневмония, ломкость ногтей, выпадение волос, утолщение венозных стенок вокруг места инъекции, боль в области очага новообразования, головная боль, ухудшение мышления, частые позывы на мочеиспускание, сопровождающиеся болью.

Противопоказания. Беременность.

Форма выпуска. Во флаконах по 0,015 г.

Условия хранения. При комнатной температуре.

Срок годности 2 года.

«БОМ-БЕНГЕ», МАЗЬ (Unguentum «Boum-Benge»). Содержит: ментола 3,9 г (или масла мяты перечной 7,8 г), метилсалицилата 20,2 г, вазелина медицинского 68,9 г, парафина медицинского 7 г (на 100 г).

Фармакологическое действие. Обезболивающее и противовоспалительное средство.

Показания к применению. Инфекционный неспецифический полиартрит, артриты, экссудативный плеврит, эпидемическая плевродиния.

Способ применения. Втирание при болях, невралгии.

Форма выпуска. Мазь по 35 г в стеклянных банках или в тубах.

Условия хранения. В хорошо укупоренных банках, предохраняющих от действия света.

Срок годности 3 года.

БОНАФТОН (Bonaphtonum). (6-Бром-1,2-нафтохинон)

Фармакологическое действие. Обладает противовирусной активностью в отношении вируса герпеса простого и некоторых аденовирусов.

Показания к применению. Герпетический кератит, вирусные заболевания кожи (герпес простой, герпес опоясывающий и др.), герпетический стоматит, гингивит, герпес гениталий, остроконечные кондиломы и другие вирусные заболевания кожи и слизистых оболочек вирусного характера.

Способ применения и дозы. Принимают внутрь (таблетки), закладывают за веки (0,05% мазь) или наносят на слизистые оболочки полости рта (0,25% мазь), гениталий (0,5% и 1% мазь) и на кожу (0,5% и 1% мазь). Внутрь препарат принимают через 1 ч после еды, таблетку не разжевывают.

Побочное действие. При местном применении бонафтона возможны явления раздражения, проходящие после отмены препарата (мази). При приеме внутрь (таблетки) в случае поноса или головной боли препарат отменяют.

Форма выпуска. Таблетки по 0,1 г, покрытые оболочкой, растворимой в кишечнике, в упаковке по 50 штук и по 0,025 г, в упаковке по 50 штук для детей; 0,5% мазь в упаковке по 25 г, 0,05% мазь глазная по 10 г

Отредактировал: ledi24

Условия хранения. Список Б. Таблетки — в защищенном от света месте, мазь — в обычных условиях.

Срок годности 2 года.

БОРОМЕНТОЛ (Boromentholum). Состав: ментола 0,5 части, кислоты борной 5 частей, вазелина 94,5 части.

Применение. Как антисептическое и обезболивающее средство для смазывания кожи при зуде и невралгии, а также для смазывания слизистой оболочки носа при ринитах.

Форма выпуска. В упаковке по 5 г.

Условия хранения. В прохладном месте.

Срок годности 2 года.

БОЯРЫШНИКА ПЛОДЫ И ЦВЕТКИ (Fructus et Flores Grataegi). Плоды содержат флавоноиды (гиперозид, кверцетин, витексин), урсоловую и олеаноловую кислоты, каротиноиды, дубильные вещества, пектины, хлорогеновую и кофейную кислоты, сахар. Цветки — флавоноиды (кверцетин, кверцитрин), эфирное масло, ацетилхолин, холин и др.

Фармакологическое действие. Препараты боярышника усиливают сокращение сердечной мышцы и понижают ее возбудимость, улучшают кровообращение в сосудах сердца и мозга, повышают чувствительность сердца к действию сердечных гликозидов.

Показания к применению. Функциональные расстройства сердечной деятельности, гипертоническая болезнь, ангионеврозы, мерцательная аритмия, пароксизмальная тахикардия.

Способ применения и дозы. Внутрь за 30 мин до еды в виде настоя (1 чайная ложка на стакан кипятка) по 1 столовой ложке 2—3 раза в день, настойки по 20 капель 3 раза в день, жидкого экстракта по 20—30 капель 3—4 раза в день.

Форма выпуска. Плоды в упаковке по 50 г, настойка (Tinctura Grataegi) во флаконах по 25 мл; жидкий экстракт (Extractum Grataegi fluidum) во флаконах по 25 мл, цветки в упаковке по 100 г.

Условия хранения. В сухом прохладном месте.

Срок годности. Плоды и цветки — не установлен, настойка — 4 года, экстракт жидкий — 2 года.

БРИКАНИЛ (Bricanyl). Синонимы: Arubendol, Bricyn, Bricaril.

Фармакологическое действие. Стимулирует адренергические β-рецепторы трахеи и бронхов.

Показания к применению. Бронхиальная астма, хронический бронхит, эмфизема, заболевания легких, сопровождающиеся спазмом бронхов. Эффект наблюдается спустя 30 мин после подкожного введения и 2—3 ч после приема внутрь.

Способ применения и дозы. Взрослым препарат назначают по 1—2 таблетки внутрь 2—3 раза в день. Оптимальная разовая доза 2 таблетки. Под кожу вводят содержимое $^1/_2$ ампулы (максимально 4 раза в день). Препарат можно применять внутривенно. Детям в возрасте от 3 до 7 лет назначают по $^1/_4$—$^1/_2$ таблетки, от 7 до 15 лет — по $^1/_2$ таблетки, старше 15 лет — 1—2 таблетки 3 раза в день; под кожу вводят по 0,005 мг/кг массы тела 4 раза в день.

Побочное действие. Проявляется редко в виде тремора, который исчезает самостоятельно.

Форма выпуска. Таблетки по 2,5 мг, в упаковке 20 таблеток; ампулы по 0,5 мг 1 мл, в упаковке 10 ампул.

Отредактировал: ledi24

Условия хранения. Обычные.
Срок годности. Таблетки 3 года, ампулы 2 года.
Поставляется из Венгрии.

БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ (Viride nitens). Бис-(п-диэтиламино)-трифенилангидрокарбинола оксалат.

Фармакологическое действие. Антисептическое средство.

Показания к применению. Пиодермия, блефарит, мелкие повреждения кожи.

Способ применения и дозы. Наружно в виде 1—2% спиртовых и водных растворов.

Форма выпуска. Порошок; 1% спиртовой раствор во флаконах по 10 мл; 2% спиртовой раствор во флаконах по 10 мл.

Условия хранения. Спиртовой раствор в защищенном от света месте, вдали от источников тепла.

Срок годности. Порошок — не ограничен, раствор 2 года.

БРОМГЕКСИН (Bromhexin). N-Циклогексил-N-метил-N-(2-амино-3,5-дибромбензил)-аммония хлорид. Синоним: Bisolvon.

Фармакологическое действие. Повышает выделение секрета бронхиальными железами и уменьшает вязкость мокроты, что дает выраженный отхаркивающий эффект и облегчает дыхание. Препарат малотоксичен. Существенного влияния на кровообращение не оказывает.

Показания к применению. Острые и хронические воспалительные заболевания трахеи, бронхов, легких; бронхоэктатическая болезнь, пневмокониозы; в пред- и послеоперационном периоде; препарат используется при бронхографии.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,004—0,008 г 2—3 раза в день. Детям дозу определяют соответственно возрасту.

Противопоказания. Не установлены.

Форма выпуска. Драже, содержащее 0,004 г препарата; в упаковке 50 штук.

Условия хранения. Обычные.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Германии и производится у нас в стране.

БРОМИЗОВАЛ (Bromisovalum). N-(α-Бромизовалерианил)-мочевина. Синонимы: бромурал, Isobromil.

Фармакологическое действие. Оказывает успокаивающее и умеренное снотворное действие.

Показания к применению. Бессонница, нервное возбуждение.

Способ применения и дозы. Внутрь как успокаивающее по 0,3—0,6 г 2 раза в день; как снотворное по 0,6 г за 30—40 мин до сна; детям 0,03—0,2 г на прием.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к препаратам брома.

Форма выпуска. Порошок, таблетки по 0,3 г, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 5 лет.

БРОМКАМФОРА (Bromcamphora).

Фармакологическое действие. Оказывает успокаивающее влияние на центральную нервную систему, улучшает сердечную деятельность.

Показания к применению. Повышенная возбудимость нервной системы, неврастения, неврозы сердца.

Отредактировал: ledi24

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,25—0,5 г 2—3 раза в день, детям в зависимости от возраста по 0,05—0,25 г.

Форма выпуска. Порошок, таблетки по 0,25 г, в упаковке 30 штук.

Условия хранения. В защищенном от света месте.

Срок годности. Порошок и таблетки — 10 лет.

БРОНХОЛИТИН (Broncholytin). Сироп, содержащий эфедрина гидрохлорид, глауцина гидробромид, базиликовое масло.

Фармакологическое действие. Препарат оказывает бронхорасширяющее действие. Не вызывает угнетения дыхания, запора, привыкания.

Показания к применению. Острые и хронические бронхиты, трахеобронхиты, спастический и астматический бронхит, бронхиальная астма и коклюш.

Способ применения и дозы. Назначают внутрь взрослым по 1 столовой ложке 3—4 раза в день; детям старше 3 лет — по 1 чайной ложке 3 раза в день; детям старше 10 лет — по 2 чайные ложки 3 раза в день.

Противопоказания. Коронаросклероз, стенокардия, гипертиреоидные состояния.

Форма выпуска. Сироп во флаконах по 125 г.

Условия хранения. При комнатной температуре (от 20 до 25°С)

Срок годности 2 года.

Поставляется из Болгарии.

БРУЛАМИЦИН (Brulamycin). Синонимы: Nebicin, Tobra, Tobramycin.

Фармакологическое действие. Антибиотик аминогликозидной группы с широким спектром бактерицидного действия.

Показания к применению. Тяжелые бактериальные инфекции: пневмонии, пиелонефрит, простатит, перитонит, менингит.

Способ применения и дозы. Назначают внутривенно или внутримышечно в течение 7—10 дней. Суточная доза для взрослых 2—3 мг/кг.

Побочное действие. Нарушение функции почек.

Следует избегать совместного применения с ото- и нефротоксическими антибиотиками, фуросемидом и урегитом. При совместном назначении с нейромускулярными блокирующими веществами имеется опасность паралича дыхания.

Противопоказания. Аллергия к бруламицину.

Меры предосторожности. Из-за потенциальной токсичности, характерной для аминогликозидов, требуется тщательное наблюдение больных и систематический контроль за функцией почек.

Форма выпуска. Ампулы по 1 мл (40 мг), в упаковке 10 штук; ампулы по 2 мл (80 мг), в упаковке 10 штук.

Условия хранения. В обычных условиях при температуре не выше 25°С, в защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

Поставляется из Венгрии.

БРУНЕОМИЦИН (Bruneomycinum). Антибиотик, выделенный из культуры актиномицета Actinomyces albus var. bruneomycini. Идентичен зарубежным антибиотикам — стрептонигрину и руфохромомицину. В медицинской практике применяют натриевую соль брунеомицина.

Фармакологическое действие. Обладает отчетливой противоопухоле-

Отредактировал: ledi24

вой активностью. Оказывает значительное ингибирующее действие на кроветворение.

Показания к применению. Лимфогранулематоз, лимфосаркома, опухоль Вильмса и нейробластома.

Способ применения и дозы. Вводят внутривенно до 400 мкг через каждые 48—72 ч. Общая доза на курс составляет 3000—4000 мкг. Разовая доза для детей от 5 до 7 мкг/кг. Препарат вводят 2 раза в неделю.

Побочное действие. Возможны гипоплазия и аплазия кроветворения, понижение аппетита, тошнота, рвота, диарея, боль в желудке, гингивит, стоматит, нейродермит, алопеция.

Противопоказания. Терминальная стадия болезни, алейкемические и сублейкемические формы лейкоза, значительная тромбоцитопения, тяжелые нарушения функции почек.

Форма выпуска. Во флаконах по 0,0005 г.

Условия хранения. Список А. В защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

БРУСНИКИ ЛИСТ (Folium Vitis idaei). Содержит гликозид арбутин (6—9%), дубильные вещества, флавоноиды, урсоловую кислоту.

Применение. Как мочегонное и дезинфицирующее средство при заболеваниях мочевого пузыря и мочевых путей в виде настоя или отвара (10,0 : 200,0) по 1 столовой ложке 3—4 раза в день.

Форма выпуска. В упаковке по 100 г, брикет 50 г.

Условия хранения. В сухом прохладном месте.

Срок годности 3 года.

БУЗИНЫ ЧЕРНОЙ ЦВЕТКИ (Flores Sambuci). Содержит гликозид, оказывающий потогонное действие, флавоновый гликозид рутин, следы эфирного масла и др.

Применение. Как потогонное средство при простудных заболеваниях в виде настоя (2 чайные ложки цветков на 1 стакан кипящей воды) по 2 столовые ложки 5—6 раз в день.

Форма выпуска. В упаковке по 100 г.

Условия хранения. В сухом прохладном месте.

Срок годности не установлен.

БУКАРБАН (Bucarban). N-(пара-Аминобензолсульфонил)-N'-н-бутилмочевина. Синонимы: Carbutamide, Nadisan, Orabetic, Oranil.

Фармакологическое действие. Оказывает сахаропонижающее действие и слабое антибактериальное. Активнее бутамида, но и токсичнее его.

Показания к применению. При сахарном диабете средней тяжести больным старше 40 лет, особенно страдающим ожирением.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,5—1 г 1—3 раза в день через 30—40 мин после еды. При замене инсулина 10—20 ЕД соответствует 0,5 г букарбана.

Побочное действие. Диспептические явления, головная боль, аллергические реакции, лейкопения, тромбоцитопения, нарушения функции печени.

Противопоказания. Тяжелые формы диабета, детский и юношеский возраст, нарушения функции печени и почек, лейкопения, гранулоцитопения, оперативное вмешательство, аллергия к сульфаниламидным препаратам.

Форма выпуска. Таблетки по 0,5 г, в упаковке 50 штук.

Отредактировал: ledi24

Этот препарат под названием **оранил** (Oranil) в таблетках по 0,5 г в упаковке по 60 штук поступает из Германии.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности букарбана 5 лет, оранила — 3 года.

БУРОВА ЖИДКОСТЬ (Liquor Burovi). 8% раствор ацетата алюминия (Liquor alumini subacetatis 8%).

Фармакологическое действие. Вяжущее и противовоспалительное средство; в больших концентрациях слабый антисептик.

Применение. Для полосканий, примочек, спринцеваний, при воспалительных заболеваниях кожи и слизистых оболочек. Разводят в 10—20 раз.

Форма выпуска. Во флаконах 50 мл.

Условия хранения. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 5 лет.

БУТАДИОН (Butadionum). 1,2-Дифенил-4-бутилпиразолидиндион-3,5. Синонимы: Butalidon, Phenylbutazolum.

Фармакологическое действие. Аналгезирующее, противовоспалительное и жаропонижающее средство.

Показания к применению. Ревматизм, инфекционный неспецифический полиартрит, болезнь Бехтерева, узловатая эритема, малая хорея и др.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,1—0,15 г 4—6 раз в сутки per se и в комплексе с амидопирином.

Побочное действие. Тошнота, боль в области желудка (возможно изъязвление слизистой оболочки), кожные высыпания, невриты, анемия, гематурия и др.

Противопоказания. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, нарушение функции печени и почек, заболевания кроветворных органов, недостаточность кровообращения II—III стадии, аритмии.

Форма выпуска. Порошок, таблетки в упаковках по 10 штук по 0,05 г, покрытые оболочкой, и по 0,15 г.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 5 лет.

БУТАДИОН (МАЗЬ) (Unguentum Butadioni).

Фармакологическое действие. Противовоспалительное, противоревматическое действие мази определяется бутадионом.

Показания к применению. Поверхностные тромбофлебиты нижних конечностей, травматического, инфекционного, химического генеза, постинъекционные флебиты, воспаление геморроидальных узлов, ожоги I и II степени.

Побочное действие. Не наблюдается.

Противопоказания. Не выявлены.

Форма выпуска. Мазь в тубах по 20 г.

Условия хранения. Хранить при температуре не выше 15°С.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Венгрии.

БУТАМИД (Butamidum). N-(пара-Метилбензолсульфонил)-N'-н-бутилмочевина. Синонимы: Diabetol, Orabet, Tolbutamide.

Фармакологическое действие. Гипогликемизирующее средство.

Показания к применению. Сахарный диабет (легкая форма и

Отредактировал: ledi24

средней тяжести) у лиц старше 40 лет при давности заболевания не более 5 лет (особенно у страдающих ожирением).

Способ применения и дозы. Внутрь через 30—40 мин после еды по 0,5—1 г 1—3 раза в сутки. Высшая разовая доза 1,5 г, суточная 4 г.

Побочное действие. Возможны головная боль, диспептические явления, аллергические реакции (зуд, дерматиты), лейкопения, тромбоцитопения, нарушение функции печени. При гипогликемии дозу уменьшают.

Противопоказания. Предкоматозное и коматозное состояния, кетоацидоз, детский и юношеский возраст, беременность и лактация, острые инфекционные заболевания, нарушения функции печени и почек, лейкопения, тромбоцито- и гранулоцитопения, оперативные вмешательства, аллергические реакции на сульфаниламиды.

Форма выпуска. Таблетки в упаковках по 50 штук по 0,25 г и 0,5 г.

Условия хранения. Список Б. В сухом месте.

Срок годности 3 года.

БУТИРОКСАН (Butyroxanum). (6-[W-(3′-Фенилпирролидил-1′)-бутирил]-бензо-1,4-диоксана гидрохлорид.

Фармакологическое действие. Обладает адренолитической активностью, блокирует преимущественно α-адренорецепторы, обладает центральными н-холинолитическими свойствами.

Показания к применению. Абстинентный синдром при алкоголизме II стадии и полинаркомании, для купирования, предупреждения и лечения диэнцефальных и гипертонических пароксизмов, как симпатикотонического, так и смешанного характера, гипертоническая болезнь I и II стадии, аллергодерматозы (диффузный нейродермит, экзема, хроническая крапивница), сопровождающиеся приступами бронхиальной астмы, у больных с гипоталамическими поражениями постинфекционного генеза.

Способ применения и дозы. Внутрь, подкожно и внутримышечно. Внутрь принимают таблетки по 0,01 г 1—4 раза в день; парентерально вводят по 1—2 мл 1% раствора 1—4 раза в день.

Длительность приема препарата и дозы определяются индивидуально для каждого больного.

Высшие дозы для взрослых: разовая внутрь 0,04 г, в инъекциях 0,03 г; суточная внутрь 0,18 г, в инъекциях 0,15 г.

Побочное действие. Резкое понижение АД, брадикардия.

Противопоказания. Сердечная недостаточность, пониженное АД, абстинентный синдром III стадии алкоголизма.

Форма выпуска. Таблетки по 0,01 г, в упаковке по 50 штук; 1% раствор в ампулах по 1 мл, в упаковке по 10 ампул.

Условия хранения. Список Б. Таблетки и раствор в сухом, защищенном от света месте.

Срок годности. Раствор и таблетки 2 года.

БУФЕНОКС (Buphenoxum). (3-Бутиламино-4-фенокси-5-сульфамоилбензойная кислота). Синонимы: буметамид, буренекс.

Фармакологическое действие. Диуретик с натрийуретическим и калийуретическим действием. Мочегонный препарат с быстро наступающим и коротким действием. Выделение мочи начинается в течение первого часа и продолжается 4—6 ч. Максимальная концентрация препарата в плазме крови наблюдается через $1^1/_2$ ч. С мочой за сутки выделяется 65% буфенокса, с калом 6%.

Показания к применению. Застойные явления, связанные с сердеч-

Отредактировал: ledi24

ной недостаточностью, цирроза печени с явлениями гипертензии и отечно-асцитическим синдромом; гломерулонефриты, протекающие с нефротическим синдромом, гипертоническая болезнь в период стабилизации АД; эклампсия и отеки у беременных.

Способ применения и дозы. Внутрь (утром натощак). Дозы подбирают индивидуально в зависимости от тяжести заболевания и оказываемого эффекта. Разовая доза 0,001 г (1 мг). При отсутствии эффекта дозу увеличивают до 0,002 г (2 мг). Высшая суточная доза 0,003 г (3 мг). Принимать таблетки лучше в 2 приема с интервалом в 2—4 ч. В процессе лечения необходим контроль за уровнем мочеотделения, концентрацией натрия и калия в плазме крови.

Побочное действие. Гипокалиемия и гипохлоремический алкалоз. Слабость, жажда и сухость во рту. В редких случаях — диспептические явления.

Противопоказания. Острая печеночная недостаточность, печеночная кома, декомпенсированная форма сахарного диабета и подагра, гипокалиемия, первая половина беременности.

Форма выпуска. Таблетки по 0,001 г, в упаковке 50 штук.

Условия хранения. Список Б. В сухом, защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

ВАГОТИЛ (Vagothyl). 36% водный раствор полиметилен-метакрезолсульфоновой кислоты.

Фармакологическое действие. Оказывает выраженное бактерицидное действие, ускоряет эпителизацию поврежденной слизистой оболочки и кожи, оказывает местное трихомонацидное и сосудосуживающее действие.

Показания к применению. Эрозии вагинальной части и канала шейки матки, эрозии и папилломы уретры у женщин, вульвит, зуд влагалища; язвы, появившиеся после применения суппозиториев; кровотечения, вызванные биопсией или удалением полипов; трихомонадный вагинит, гипертрофия слизистой оболочки, язвы голени, ожоги III степени (для ускорения эпителизации).

Способ применения и дозы. Местно. Ватные тампоны, пропитанные препаратом, после предварительного туалета сухими марлевыми салфетками вводят во влагалище на 1—3 мин, затем вынимают и сухим тампоном удаляют остатки препарата. Спринцевание влагалища и остановка кровотечения производится раствором из 1—3 чайных ложек препарата на 1 л теплой воды.

Побочное действие. Нет. Хорошо переносится больными.

Форма выпуска. 36% раствор во флаконах по 50 мл.

Условия хранения. При комнатной температуре.

Срок годности 3 года.

Поставляется из Польши.

ВАЗЕЛИНОВОЕ МАСЛО (Oleum Vaselini).

Применение. При хронических запорах внутрь по 1—2 столовые ложки в день; наружно в детской практике. Используют также как основу для мазей.

Форма выпуска. Во флаконах по 25 мл и по 50 мл.

Условия хранения. В защищенном от света месте.

Срок годности не ограничен.

ВАЛЕРИАНЫ КОРНЕВИЩЕ С КОРНЯМИ (Rhizoma cum radicibus Valerianae). Содержит 0,5—2% эфирного масла (основная

Отредактировал: ledi24

составная часть которого — сложный эфир борнеола с изовалериановой кислотой), свободную изовалериановую кислоту, дубильные вещества, алкалоиды.

Фармакологическое действие. Препараты валерианы уменьшают возбудимость центральной нервной системы и оказывают спазмолитическое действие.

Показания к применению. Повышенная нервная возбудимость, бессонница, неврозы сердечно-сосудистой системы, спазмы желудочно-кишечного тракта.

Способ применения и дозы. Внутрь настой (6—20 г корня на 180—200 мл воды) по 1 столовой ложке 3—4 раза в день, детям (2,0 : 100,0) по 1 чайной ложке на прием; настойка по 20—30 капель 3—4 раза в день; экстракт густой в таблетках по 0,02—0,04 г на прием.

Форма выпуска. Корневище с корнями валерианы резаные в упаковке по 100 г или в брикетах по 75 г; настойка (Tinctura Valerianae) во флаконах по 30 мл, густой экстракт (Extractum Valerianae), таблетки, покрытые оболочкой, по 0,02 г в упаковке по 50 штук, жидкий экстракт (Extractum Valerianae fluidum) для приготовления микстур 1 : 2.

Условия хранения. В хорошо укупоренной таре, в защищенном от света месте при температуре от 12 до 15°С.

Срок годности. Корневище с корнями — 3 года, настойка и экстракт — 5 лет, таблетки — 2 года.

ВАЛИДОЛ (Validolum). Раствор ментола в ментиловом эфире изовалериановой кислоты.

Фармакологическое действие. Оказывает успокаивающее влияние на центральную нервную систему и рефлекторное сосудорасширяющее действие.

Показания к применению. Стенокардия, неврозы, истерия; морская болезнь (в качестве противорвотного средства).

Способ применения и дозы. Сублингвально по 0,06 г и по 0,05 г или 4—5 капель раствора на кусочек сахара.

Форма выпуска. Таблетки по 0,06 г, в упаковке по 10 штук; во флаконах по 5 мл; капсулы по 0,05 г, в упаковке 20 штук.

Условия хранения. В прохладном месте в хорошо укупоренных склянках.

Срок годности. Раствор 4 года, капсулы 2 года, таблетки — $1^1/_2$ года.

ВАЛОКОРМИД (Valocormidum). Состав: настойка валерианы — 10 мл, настойка ландыша — 10 мл, настойка красавки — 5 мл, натрия бромид — 4 г, ментол — 0,25 г, вода дистиллированная — до 30 мл.

Фармакологическое действие. Успокаивающее и спазмолитическое средство. По составу, действию и применению препарат сходен с каплями Зеленина.

Показания к применению. Сердечно-сосудистые неврозы, сопровождающиеся брадикардией.

Способ применения и дозы. Внутрь по 10—20 капель 2—3 раза в день.

Форма выпуска. Во флаконах по 30 мл.

Условия хранения. В защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

Отредактировал: ledi24

ВАМИН (Vamin). Комплекс из 18 аминокислот (аланин, аргинин, валин, аспарагиновая кислота и др.), углеводов (фруктоза, глюкоза) и электролитов (ионы натрия, калия, кальция, магния и хлора).

Фармакологическое действие. 1000 мл препарата полностью удовлетворяют суточную потребность организма взрослого человека в белках, углеводах и электролитах. При длительном внутривенном питании усваивается до 99% всего азота аминокислот, содержащихся в вамине.

Показания к применению. Заболевания, при которых пероральное питание недостаточно или невозможно.

Способ применения и дозы. Внутривенно капельно (40—65 капель в минуту) в течение 5—8 часов в объеме 1 г аминокислот на кг веса тела.

Противопоказания. Тяжелое поражение печени, уремия при невозможности диализа.

Форма выпуска. Флаконы 100 мл и 500 мл.

Условия хранения. В прохладном месте (5—25°С).

Поставляется из Швеции.

ВАСИЛЬКА СИНЕГО ЦВЕТКИ (Flores centaureae Cyani). Содержит гликозид цианин, цикорин, центаурин, пеларгонин, дубильные вещества, слизь.

Применение. Как диуретическое средство при отеках почечного и сердечного происхождения в виде настоя (10,0 : 200,0) по $^1/_4$ стакана 3 раза в день за 20 мин до еды.

Форма выпуска. Цветки в упаковке по 100 г.

Условия хранения. В сухом прохладном месте.

Срок годности 1 год.

ВЕНТЕР (Venter). Противоязвенное средство. Синоним: сукральфат.

Фармакологическое действие. Локальное. Вступая во взаимодействие с белками некротизированной ткани, формирует на месте язвы защитный слой, который предотвращает дальнейшее разрушающее действие пепсина, HCl и желчных солей. Вентер не способен нейтрализовать кислоту, но он ингибирует активность пепсина на 30%. Большая часть препарата не всасывается организмом, небольшие количества (3—5%) выводятся с помощью почек.

Показания к применению. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.

Способ применения и дозы. 4 таблетки либо 4 пакетика гранул в сутки: по 1 таблетке или пакетику гранул перед каждым приемом пищи (завтраком, обедом и ужином) и 1 таблетку или 1 пакетик гранул непосредственно перед отходом ко сну. Таблетку можно проглотить целиком, запив глотком воды, или, так же как и гранулы, размешать в $^1/_2$ стакана воды и выпить. Возможен прием вентера дважды в день — 2 таблетки или 2 пакетика гранул утром и вечером. Для заживления язвы продолжительность терапии обычно составляет 4—6 недель; при необходимости лечение может быть продолжено максимально до 12 недель.

Если требуется, в ходе терапии можно назначать антациды для ослабления болевого синдрома, однако их следует принимать за $^1/_2$ часа до или через $^1/_2$ часа после приема вентера. У больных, страдающих почечной недостаточностью, надо контролировать концентрации алюминия и фосфатов в сыворотке. Одновременный прием

Отредактировал: ledi24

тетрациклина может вызвать уменьшение его всасывания, что характерно для всех препаратов, содержащих алюминий.

Побочное действие. В редких случаях возможны запоры.

Противопоказания. Не рекомендуется назначать беременным женщинам и детям до 4 лет, так как механизм действия препарата еще недостаточно изучен.

Форма выпуска. Таблетки, содержащие 1 г сукральфата, в упаковке по 50 штук и гранулы по 1 г, в упаковке — 50 пакетиков.

Срок годности 5 лет.

Поставляется фирмой «КРКА», Словения и московским заводом «Акрихин».

ВЕРМОКС (Vermox). Метил-5-бензоил-2-бензимидазол-карбамат. Синонимы: Mebendazol, Nemasole, Antiox, Medosil и др.

Фармакологическое действие. Противоглистное средство. Около 95% препарата медленно выводится из организма с калом. Вермокс малотоксичен.

Показания к применению. Аскаридоз, энтеробиоз, анкилостомидоз и трихоцефалез.

Способ применения и дозы. При энтеробиозе — одномоментно внутрь 0,1 г; при анкилостомидозе и других глистных инвазиях (также и при смешанных) — внутрь по 0,1 г в течение 3 дней.

Побочное действие. Не установлено.

Противопоказания. Беременность. В процессе лечения недопустимо употребление алкогольных напитков.

Форма выпуска. Таблетки по 0,1 г, в упаковке 6 штук.

Условия хранения. Список Б. При температуре от 15 до 25°С.

Срок годности 3 года.

Поставляется из Венгрии.

ВЕРОШПИРОН (Verospiron). γ-Лактон 3-(3-оксо-7α-тиоацетил-17β-окси-4-андростен-17α-ил) пропионовой кислоты. Синонимы: Aldactone, SC-94-20, Spironolactone.

Фармакологическое действие. Оказывает выраженное мочегонное действие; существенно не влияет на почечное кровообращение и функцию почечных канальцев, не нарушает кислотно-основное состояние в организме.

Показания к применению. Отеки, вызванные сердечно-сосудистой недостаточностью; циррозы печени и другие заболевания, сопровождающиеся асцитом, отеками и др.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,075—0,3 г/сут. Взрослым обычно назначают 0,1—0,2 г в 2—4 приема. По улучшении состояния дозу постепенно уменьшают до 0,025 г.

Побочное действие. Головокружение, сонливость, дерматозы. Возможны гипонатриемия и гиперкалиемия.

Противопоказания. Острая почечная недостаточность.

Форма выпуска. Таблетки по 0,025 г, в упаковке 20 штук.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Венгрии.

ВИГЕРАТИН (Vigeratinum). Одна таблетка содержит лиофилизированный экстракт печени крупного рогатого скота в количестве, эквивалентном 10 г сырой печени и 4 ЕД панкреатина.

Фармакологическое действие. Дает умеренный липотропный, гепатозащитный и антианемический эффект.

Показания к применению. Хронические гепатиты, панкреатиты и гастриты с пониженной секреторной функцией.

Отредактировал: ledi24

Способ применения и дозы. Внутрь перед едой по 2—3 таблетки 3 раза в день в течение 3—4 нед. Курс лечения может быть продлен до $1^1/_2$ мес.

Побочное действие. Изжога, сухость во рту, тошнота.

Противопоказания. Гиперацидный гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки с повышенной кислотностью желудочного сока.

Форма выпуска. Таблетки, покрытые оболочкой, в упаковке 50 штук.

Условия хранения. В сухом месте при температуре не выше 20°С.

Срок годности 2 года.

ВИДЕХОЛ (Videcholum). Молекулярное соединение холекальциферола (витамин D_3) с холестерином.

Фармакологическое действие. Регулирует обмен кальция и фосфора, ускоряет всасывание кальция в кишечнике и реабсорбцию фосфора в почках, способствует формированию костного скелета и зубов, а также сохранению структуры костей.

Показания к применению. Профилактика и лечение рахита, остеомаляция и некоторые формы остеопороза.

Способ применения и дозы. Внутрь для профилактики рахита у доношенных детей по 30 000—40 000 МЕ/сут (в 2 приема) в течение 12—14 дней, у недоношенных детей — по 6250—10 000 МЕ/сут в течение 2 мес.

Для лечения рахита I степени суточная доза 10 000—15 000 МЕ (в 2 приема), на курс от 300 000—400 000 до 500 000—600 000 МЕ в течение 4—6 нед. При рахите II степени по 15 000—20 000 МЕ/сут 2 раза, на курс 600 000—800 000 МЕ в течение 4—6 нед. При рахите III степени назначают 800 000—1 200 000 МЕ на курс в течение 5—7 нед.

При костных заболеваниях применяют по 3000 МЕ/сут в течение $1^1/_2$ мес.

Побочное действие. Возможен понос.

Противопоказания. Гиперкальциемия, активные формы туберкулеза легких, желудочно-кишечные заболевания, болезни печени и почек, мочекаменная болезнь, органические поражения сердца в стадии декомпенсации.

Форма выпуска. 0,125% (25 000 МЕ в 1 мл) раствор в масле во флаконах по 10 мл.

Условия хранения. Список Б. В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 5°С.

Срок годности 2 года.

«ВИКАИР» («Vicairum»). Состав: висмута нитрата основного 0,35 г, магния карбоната основного 0,4 г, натрия гидрокарбоната 0,2 г, порошка корневищ аира 0,025 г, коры крушины мелкоизмельченной 0,025 г.

Применение. В тех же случаях и дозах, что и викалин.

Форма выпуска. Таблетки в упаковке по 100 штук.

Срок годности 5 лет.

По составу и действию на организм соответствует препарату ротеру, выпускаемому за рубежом.

«ВИКАЛИН» («Vicalinum»). Состав: висмута нитрата основного 0,35 г, магния карбоната 0,4 г, натрия гидрокарбоната 0,2 г, порошка

Отредактировал: ledi24

корневищ аира 0,025 г, порошка коры крушины 0,025 г, келлина 0,005 г, рутина 0,005 г.

Фармакологическое действие. Оказывает вяжущее, противокислотное и умеренное слабительное действие. Рутин обеспечивает некоторое противовоспалительное действие, а келлин — спазмолитический эффект.

Показания к применению. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки; гиперацидный гастрит.

Способ применения и дозы. Внутрь по 1—2 таблетки 3 раза в день после еды в $^1/_2$ стакана теплой воды. Курс лечения 1—3 мес.

Побочное действие. Иногда учащение стула.

Форма выпуска. Таблетки в упаковке по 100 штук.

Условия хранения. В сухом, защищенном от света месте.

Срок годности 5 лет.

ВИКАСОЛ (Vikasolum). 2,3-Дигидро-2-метил-1,4-нафтохинон-2-сульфонат натрия.

Фармакологическое действие. Синтетический водорастворимый аналог витамина К. Участвует в образовании протромбина. Способствует нормализации свертывания крови. При недостаточности его в организме развиваются геморрагические явления.

Показания к применению. Желтуха вследствие задержки поступления желчи в кишечник, острые гепатиты. Паренхиматозные и капиллярные кровотечения (применяется при подготовке к хирургическим операциям и после них). Кровотечения при язвах желудка и двенадцатиперстной кишки. Лучевая болезнь. Тромбопеническая пурпура. Упорные геморрондальные и носовые кровотечения. Последние месяцы беременности (для предупреждения кровоточивости у новорожденных). Геморрагическая болезнь у новорожденных. Продолжительные маточные ювенильные и преклимактерические кровотечения. Кровотечения при туберкулезе легких, септических заболеваниях, выраженной гипопротромбинемии, при применении антикоагулянтов — антагонистов витамина К: дикумарина, фенилина, пелентана и др.

При гемофилии и болезни Верльгофа викасол неэффективен.

Способ применения и дозы. Внутрь взрослым 0,015—0,3 г/сут; внутримышечно 0,01—0,015 г. Высшие дозы для взрослых внутрь: разовая 0,03, суточная 0,06 г; внутримышечно: разовая 0,015, суточная 0,03 г. Детям в возрасте до 1 года назначают 0,002—0,005 г, до 2 лет — 0,006 г, 3—4 лет — 0,008 г, 5—9 лет — 0,01 г, 10—14 лет — 0,015 г/сут в 2—3 приема 3—4 дня подряд; после перерыва на 4 дня курс лечения повторяют. Перед операцией препарат назначают за 2—3 дня. Роженицам дают суточную дозу сразу после прибытия в родильный дом, а затем, если роды не наступили, через 12 ч и через 24 ч. Доза для новорожденных не выше 0,004 г.

Противопоказания. Повышенная свертываемость крови. Тромбоэмболии.

Форма выпуска. Порошок, таблетки по 0,015 г, в упаковке по 25 штук, ампулы по 1 мл 1% раствора, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности. Порошок и ампулы 2 года, таблетки 3 года.

ВИЛОЗЕН (Vilosen). Небелковый низкомолекулярный экстракт вилочковой железы крупного рогатого скота.

Фармакологическое действие. Стимулирует пролиферацию и

Отредактировал: ledi24

дифференцировку Т-лимфоцитов, подавляет образование реагинов, а также развитие гиперчувствительности замедленного типа.

Показания к применению. Применяют у взрослых и детей старшего возраста при аллергических заболеваниях верхних дыхательных путей (поллиноз, инфекционно-аллергический риносинусит).

Способ применения и дозы. Применяют в виде капель в нос или ингаляции в суточной дозе 20 мг. В ампулу непосредственно перед применением добавляют 2 мл изотонического раствора хлорида натрия или кипяченой воды. Полученный раствор используют в течение суток путем закапывания в нос или однократной интраназальной ингаляции. Раствор вилозена закапывают по 5—7 капель в каждую половину носа 5 раз в день. При поллинозе прием препарата рекомендуется начинать при появлении первых клинических признаков заболевания или профилактически за неделю до появления клинических симптомов заболевания. Курс лечения продолжают обычно 14—20 дней, при необходимости его повторяют.

Противопоказания. Противопоказан при индивидуальной непереносимости.

Побочное действие. В первую неделю применения вилозена возможно кратковременное появление головной боли и увеличение заложенности носа.

Форма выпуска. Стерильный лиофилизированный порошок в ампулах по 0,02 г по 10 штук в упаковке.

Условия хранения. В защищенном от света месте при температуре не выше +20°С. Список Б.

Срок годности 1 год.

ВИЛЬКИНСОНА МАЗЬ (Unguentum Wilkinsoni). Состав: дегтя жидкого 15 частей, кальция карбоната 10 частей, серы очищенной 15 частей, мази нафталанной 30 частей, мыла зеленого 30 частей, воды 4 части.

Применение. Как антисептическое и антипаразитарное средство при чесотке и грибковых заболеваниях кожи.

Форма выпуска. В упаковке по 40 г.

Условия хранения. В прохладном месте.

Срок годности 2 года.

«ВИНИЗОЛЬ» («Vinisolum»). Аэрозольный препарат, содержит винилин — 15 г, линетол — 14,9 г, цитраль — 0,1 г и пропеллент — до 60 г.

Фармакологическое действие. Противовоспалительное, ранозаживляющее.

Показания к применению. Ожоги, трофические язвы, вяло заживающие раны (при общей площади поражения до 25 $см^2$).

Способ применения и дозы. Путем распыления на пораженную поверхность в течение 1—3 с с расстояния 20—30 см 2—3 раза в неделю; в тяжелых случаях препарат применяют ежедневно 2 раза в сутки.

Форма выпуска. В баллонах по 60 г.

Условия хранения. В сухом месте при комнатной температуре, вдали от огня и отопительных приборов. Баллоны следует предохранять от ударов и падений.

Срок годности 2 года.

Отредактировал: ledi24

ВИНИЛИН (БАЛЬЗАМ ШОСТАКОВСКОГО) [Vinylinum (Balsamum Schostakowsky)]. Поливинилбутиловый эфир.

Фармакологическое действие. Оказывает бактериостатическое действие, ускоряет эпителизацию и обладает ранозаживляющим свойством.

Показания к применению. Фурункулез, карбункулы, трофические язвы, гнойные раны, маститы, ранения мягких тканей, ожоги, отморожения и воспалительные заболевания, гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, колиты.

Способ применения и дозы. Наружно per se и в виде 20% раствора в маслах, а также в виде мази; внутрь спустя 5—6 ч после еды (в 23—24 ч) по 1 десертной ложке 1 раз в день в течение 18—20 дней.

Форма выпуска. Во флаконах по 100 г.

Условия хранения. В хорошо укупоренной таре.

Срок годности 5 лет.

ВИНКАПАН (Vincapanum). Препарат, содержащий сумму алкалоидов барвинка (Vinca minor L.).

Фармакологическое действие. Оказывает сосудорасширяющее (преимущественно на сосуды мозга), гипотензивное, седативное действие.

Показания к применению. Гипертоническая болезнь, спазмы сосудов мозга, неврогенная тахикардия и другие вегетативные неврозы, особенно у детей.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,005—0,01 г 2—3 раза в день, детям дозы устанавливают в зависимости от возраста.

Форма выпуска. Таблетки по 0,01 г по 50 штук.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности 2 года.

Поставляется из Болгарии.

В Венгрии выпускается аналогичный препарат под названием «Винкатон» в таблетках по 0,01 г № 50.

Отечественной промышленностью выпускается этот препарат под названием «Винканор» в таблетках по 0,02 г.

ВИНКРИСТИН (Vincristinum). Алкалоид из растения барвинок розовый (Vinca rosea, L.). Синоним: Oncovin.

Фармакологическое действие. Противоопухолевое средство.

Показания к применению. В комплексной терапии острого лейкоза, при лимфосаркоме, саркоме Юинга, нейробластоме, опухоли Вильмса, лимфогранулематозе, меланоме, раке молочной железы и других опухолях.

Способ применения и дозы. Внутривенно 1 раз в неделю в возрастающих дозах (от 0,05 до 0,15 мг/кг). При достижении ремиссии дозы уменьшают до 0,05—0,075 мг/кг в неделю.

Побочное действие. Выпадение волос, запор, бессонница, парестезии, атаксия, мышечная слабость, похудание, повышение температуры тела, лейкопения, реже — полиурия, дизурия, язвенные стоматиты, тошнота, рвота, потеря аппетита.

Форма выпуска. В ампулах по 0,5 мг с приложением растворителя, в упаковке по 10 штук.

Условия хранения. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

Отредактировал: ledi24

ВИПРАКСИН (Vipraxinum). Водный раствор яда гадюки обыкновенной.

Фармакологическое действие. Противовоспалительное, болеутоляющее и рассасывающее средство.

Показания к применению. Невралгия, артрит, миозит, хронические неспецифические моно- и полиартриты, радикулит и др.

Способ применения и дозы. Внутрикожно, подкожно и внутримышечно, начиная с 0,2 мл с постепенным повышением дозы до 1 мл. Курс лечения 10 инъекций.

Побочное действие. Индивидуальная повышенная реакция, быстро проходящая болезненность и отечность в месте введения.

Противопоказания. Активный туберкулез легких, лихорадочные состояния, кахексия, склонность к ангиоспазмам, нарушения функции печени и почек.

Форма выпуска. Ампулы по 1 мл, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список А. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

Поставляется из Венгрии.

«ВИПРОСАЛ В» МАЗЬ (Unguentum «Viprosalum B»). Состав: яда гадюки сухого 5 МЕ, 0,9% изотонического раствора натрия хлорида 8 г, эмульгатора № 1 8 г, парафина твердого 3 г, вазелина 7 г, камфоры 3 г, масла пихтового 3 г, глицерина 2 г, кислоты салициловой 1 г, воды дистиллированной 65 г.

Фармакологическое действие. Болеутоляющее и противовоспалительное средство.

Применение. Наружно в виде растираний при ревматической боли, невралгии, ишиасе, люмбаго и др.

Побочное действие. Возможны кожные аллергические реакции.

Форма выпуска. Мазь в тубах по 50 г.

Условия хранения. В прохладном месте.

Срок годности 2 года.

ВИРОЛЕКС (Virolex). Синоним: ацикловир.

Фармакологическое действие. Противовирусный препарат, проявляющий высокую активность против вирусов Herpes simplex типов 1 и 2 и вируса Varicella zoster.

После проникновения в клетку, пораженную вирусом, ацикловир подвергается фосфорилированию до уровня активного соединения ацикловира трифосфата. Первая стадия этого процесса зависит от присутствия тимидин киназы вируса Herpes simplex. Ацикловир трифосфат выступает в роли ингибитора и субстрата вирусной ДНК-полимеразы, предотвращая дальнейший синтез вирусной ДНК, не оказывая при этом никакого влияния на нормальные процессы, протекающие в клетке.

Спустя час после введения 5 мг/кг препарата в плазме отмечается высокая его концентрация — уровни в спинномозговой жидкости составляют 50% концентрации, отмечаемой в плазме. Продолжительность периода полураспада препарата в плазме у взрослых — около 2,9 часа, у маленьких детей — 3,8 часа.

Препарат выделяется из организма с помощью почек в основном в неизмененном виде. Единственный метаболит, обнаруживаемый в моче,— 9-карбоксиметилгуанин. Клиренс ацикловира выше, чем клиренс креатинина. Кроме клубочковой фильтрации, ацикловир выделяется из организма также и с помощью канальцевой секреции. С возрастом

Отредактировал: ledi24

показатели клиренса креатинина снижаются, снижается и продолжительность периода полураспада ацикловира.

У больных с хроническими нарушениями функции почек продолжительность периода полураспада составляет 19,5 часа. В ходе диализа уровень концентрации ацикловира снижается на 60%.

Показания к применению. Инфекции, вызванные вирусом Herpes simplex у больных с нарушениями иммунной системы, профилактика инфекций той же природы у больных с высокой степенью поражения имунной системы (иммунодепрессивная терапия при пересадке почек или костного мозга, при аплазии костного мозга, вызванной применением цитостатиков). Тяжелые формы первичного Herpes simplex genitalis, первичные и рецидивирующие инфекции, вызванные вирусом Herpes varicella zoster у больных без нарушения иммунитета. Энцефалит, вызванный вирусом Herpes simplex (фокальный и диффузный).

Порошок.

Способ применения и дозы.

Общая доза требует медленного капельного введения в течение одного часа.

Взрослые и дети старше 12 лет. У больных с нарушениями иммунитета при инфекциях, вызванных вирусом Herpes simplex, и у больных без нарушений иммунитета при инфекциях, вызванных вирусом H. varicella zoster, обычная дозировка составляет 5 мг/кг каждые 8 часов при условии нормального функционирования почек.

У больных с нарушениями иммунитета при инфекции, вызванной вирусом Varicella zoster, обычная дозировка составляет 10 мг/кг каждые 8 часов при условии нормального функционирования почек.

У больных с нарушениями функции почек дозировка должна подбираться согласно следующей схеме:

Клиренс креатинина	Дозировка
25—30 мл/мин	Обычная доза вводится каждые 12 часов
10—25 мл/мин	Обычная доза вводится каждые 24 часа
0—10 мл/мин	Половина обычной дозы вводится каждые 24 часа сразу же после диализа

Дети. В возрасте от 3 месяцев до 12 лет вводятся дозы в зависимости от площади поверхности тела: 5 мг/кг эквивалентно 250 мг/м^2.

При назначении препарата пожилым больным следует соблюдать особые меры предосторожности, рекомендуется наблюдение за уровнем клиренса креатинина.

Продолжительность лечения обычно составляет 5 дней. Введение препарата при инфекциях, вызванных вирусом Varicella zoster, осуществляется еще 3 дня после появления последних новых высыпаний. Вообще длительность лечения зависит от состояния больного и его реакции на это лечение.

Продолжительность профилактического введения препарата опре-

Отредактировал: ledi24

деляется в соответствии с продолжительностью периода риска; при пересадке органов она, как правило, составляет 6 недель.

Приготовление раствора для внутривенного введения. Содержимое каждого флакона с ацикловиром следует растворить в 10 мл стерильной дистиллированной воды или физиологического раствора. Приготовленный таким образом раствор может вводиться с использованием специальной нагнетающей аппаратуры.

Для капельного введения необходимо дальнейшее разведение (еще не меньше 50 мл): содержимое двух флаконов смешивается со 100 мл раствора для капельного введения. Если возникает необходимость в дозировке, превышающей 500 мг, то добавляется адекватное количество раствора для вливаний (физиологический раствор и лактатный раствор Рингера). Растворение и разведение препарата производят непосредственно перед употреблением, тщательно взбалтывая. Препарат не содержит никаких консервирующих соединений, поэтому неиспользованное количество порошка надо выбросить. Приготовленный раствор не следует хранить в холодильнике: он сохраняет стабильность при комнатной температуре 15°С — 25°С в течение 12 часов. Если раствор становится мутным или в нем появляются отдельные кристаллы, значит, применять его нельзя. pH приготовленного раствора составляет около 11.

Побочное действие. Возможно повышение уровней BLW и креатинина сыворотки крови. Вероятнее всего, оно зависит от максимальных уровней концентрации в плазме и степени гидратации организма. Чтобы избежать роста упомянутых показателей, внутривенное введение ацикловира должно сопровождаться адекватной гидратацией. Если во время терапевтического применения ацикловира наблюдается нарушение функции почек, необходимо обеспечить адекватную гидратацию и соответствующий подбор дозировки препарата. В очень редких случаях может возникнуть острая почечная недостаточность. Попадание ацикловира вместо сосуда в ткань способно привести к местному воспалению. Могут быть тошнота, рвота, усиление активности ферментов печени, снижение гематологических параметров и кожные высыпания.

Противопоказания. Гиперчувствительность к препарату, беременность (за исключением случаев, когда инфекция представляет угрозу для жизни).

Предупреждение. Пробенецид повышает уровень концентрации ацикловира в плазме и среднюю продолжительность периода его полуразложения.

Форма выпуска. Флаконы по 250 мг в упаковке по 5 штук.

Условия хранения. В темном прохладном месте.

Срок годности 3 года.

Таблетки.

Способ применения и дозы.

Взрослые. Для лечения инфекций, вызванных вирусом Herpes simplex, обычная доза составляет 1 таблетку (200 мг) 5 раз в день, каждые 4 часа. Ночью препарат не принимается. Для профилактики — 1 таблетка 4 раза в день, каждые 6 часов. Больным с высокой степенью поражения иммунной системы или с пониженным кишечным всасыванием дозу надо увеличить до 2 таблеток (400 мг) 4 раза в день.

Для лечения инфекций, вызванных вирусом Varicella zoster у больных с нормальным иммунитетом, назначаются 4 таблетки (800 мг) 5 раз в день, каждые 4 часа. Ночью препарат не принимается.

Дети. Доза для детей старше 2 лет одинакова с дозой для взрослых. Детям младше 2 лет нужна $^1/_2$ дозы взрослых. Больным с на-

Отредактировал: ledi24

рушением функции почек оральная доза уменьшается на 200 мг каждые 12 часов, если клиренс креатинина меньше, чем 10 мл/мин.

С *пожилыми больными* требуются особые меры предосторожности и наблюдение за уровнем клиренса креатинина.

Продолжительность лечения обычно 5 дней. Прием препарата при наличии вируса Varicella zoster не прекращается еще 3 дня после появления последних новых высыпаний. Продолжительность профилактического введения при пересадке органов составляет 6 недель.

Побочное действие. Не установлено.

Противопоказания. Гиперчувствительность к препарату, беременность (кроме крайне опасных ситуаций, угрожающих жизни).

Форма выпуска. Упаковки 20 и 100 таблеток по 200 мг.

Крем.

Показания к применению. Herpes simplex кожи и слизистой (herpes simplex labialis, herpes simplex genitalis).

Способ применения и дозы. Взрослым и детям крем наносится на пораженный участок кожи 5 раз в день, каждые 4 часа. Продолжительность лечения — 5 дней, в тяжелых случаях — 10.

Побочное действие. Иногда могут наблюдаться эритема, слабая сухость и шелушение кожи.

Противопоказания. Гиперчувствительность к препарату.

Форма выпуска. Тубы по 5 г 5% крема.

Глазная мазь.

Показания к применению. Кератит, вызванный вирусом Herpes simplex.

Способ применения и дозы. Взрослым и детям 1 см мази наносится на нижний конъюнктивальный мешок 5 раз в день, каждые 4 часа. Продолжительность лечения язвенных форм кератита составляет от 7 до 10 дней, а интерстициальных форм кератита — от 10 до 20 дней. Применение препарата следует продолжать в течение 3 дней после исчезновения последних симптомов заболевания.

Побочное действие. В месте нанесения мази может ощущаться незначительное жжение. Возможно проходящее поверхностное точечное нарушение целостности эпителия, не оставляющее никаких последствий.

Противопоказания. Гиперчувствительность к препарату.

Форма выпуска. Тубы по 4,5 г 3% глазной мази.

Виролекс производится фирмой «КРКА», Словения из активной субстанции фирмы «Wellcome Foundation Ltd.», Великобритания.

ВИСКАЛЬДИКС (Viscaldix). Состав: 1 таблетка содержит 10 мг пиндолола и 5 мг клопамида.

Показания к применению. Артериальная гипертензия.

Способ применения и дозы. При легких и среднетяжелых формах заболевания применяется самостоятельно, при тяжелых — назначается в комбинации с другими гипотензивными средствами. Обычно принимают по 1 таблетке утром ежедневно. Если после 1—2-недельного лечения желаемого эффекта не наступает, доза может повышаться до 2, а при необходимости и до 3 таблеток в сутки. Суточную дозу в 3 таблетки следует разделить на два приема (2 раза по 1,5 таблетки), утром и после обеда.

Вискальдикс применяется с осторожностью:

с симпатомиметическими препаратами, трициклическими антидепрессантами, ингибиторами МАО (уменьшение эффекта вискальдикса);

Отредактировал: ledi24

с симпатолитическими средствами, периферическими сосудорасширяющими препаратами (усиление гипотензивного эффекта);

с антидиабетическими препаратами, инсулином (усиление гипогликемического эффекта, при длительном лечении дозировка должна быть пересмотрена).

Прием вискальдикса необходимо прекратить за 48 часов до проведения общего наркоза.

В случае сердечной недостаточности лечение вискальдиксом надо начинать только после ее соответствующей компенсации препаратами сердечных гликозидов и диуретическими препаратами.

Во время лечебного курса требуется контролировать уровень калия, мочевой кислоты и сахара в крови. Передозировка может вызвать брадикардию, тошноту, рвоту, ортостатическую гипотензию, гипокалиемию, бронхоспазм. При бронхиальной астме внутривенно назначается аминофиллин (диафиллин) или изадрин; при брадикардии и резком снижении артериального давления внутривенно вводится 0,5—1 мг атропина или же внутривенно можно медленно ввести 25 мкг изопреналина, а также 500 мкг орципреналина (примерно со скоростью 5 мкг/мин).

Побочное действие. Легкое головокружение, усталость, расстройства пищеварения, изредка — кожные реакции, психические расстройства (депрессия, галлюцинации), при которых нет надобности прекращать лечение.

Противопоказания. Острый гломерулонефрит, тяжелая недостаточность функции печени и почек, тяжелая или не поддающаяся лечению гипокалиемия, гиперчувствительность к сульфаниламидным препаратам; сердечная недостаточность, не реагирующая на лечение сердечными гликозидами; легочное сердце; выраженная брадикардия; атриовентрикулярная блокада II и III степени; бронхиальная астма; эфирный и хлороформный наркоз.

Форма выпуска. Упаковка по 20 таблеток.

Условия хранения. В защищенном от света месте.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Венгрии.

ВИСКЕН (Visken). Синонимы: Pinloc, Pindolol.

Фармакологическое действие. Некардиоселективный β-адреноблокатор. Обладает внутренней симпатомиметической активностью. Оказывает антиангинальное, антиаритмическое и гипотензивное действие.

Показания к применению. Стенокардия, нарушения сердечного ритма, гиперкинетический синдром, гипертоническая болезнь.

Способ применения и дозы. В кардиологии — по 1 таблетке 3 раза в день, в более тяжелых случаях по 1 таблетке 4 раза в день. Препарат принимают спустя 30 мин после еды. При гипертонической болезни по 1 таблетке 2—3 раза в день. Максимальная доза — 3 таблетки 3 раза в день.

Побочное действие. В начале лечения могут наблюдаться брадикардия, спазм бронхов, аллергические реакции, головокружение, головная боль, сонливость, усталость, расстройства желудочно-кишечного тракта, тошнота, диарея. Побочное действие имеет временный характер, проходит самостоятельно.

Противопоказания. Декомпенсация сердечной деятельности, шок, синусовая брадикардия, легочное сердце, эфирный наркоз.

Форма выпуска. Таблетки по 5 мг, в упаковке 30 таблеток.

Условия хранения. При комнатной температуре.

Отредактировал: ledi24

Срок годности 5 лет.
Поставляется из Венгрии.

ВИСКОЗА ГЕМОСТАТИЧЕСКАЯ (Viscosum haemostaticum).
Фармакологическое действие. Кровоостанавливающий вискозный трикотажный материал, обработанный окислами азота.
Способ применения и дозы. В качестве местного гемостатического средства для остановки паренхиматозных и капиллярных кровотечений. Полностью рассасывается в организме в течение 15—20 дней, в связи с чем может быть оставлена в ране.
Противопоказания. Инфицированные раны.
Форма выпуска. Стерильные салфетки размером 5×10 см во флаконах.
Условия хранения. В прохладном, защищенном от света месте.
Срок годности 1 год.

ВИСМУТА НИТРАТ ОСНОВНОЙ (Bismuthi subnitras).
Применение. Как вяжущее, слабое антисептическое, закрепляющее средство при желудочно-кишечных заболеваниях внутрь по 0,25—1 г (детям по 0,1—0,5 г) на прием 4—6 раз в день за 15— 30 мин до еды.
Побочное действие. При длительном применении в больших дозах метгемоглобинемия.
Форма выпуска. Порошок.
Условия хранения. В укупоренной таре в защищенном от света месте.
Срок годности не ограничен.

ВИТАЙОДУРОЛ ТРИФОСАДЕНИН (Vita-iodurol triphosadenine).
Состав: АТФ (трифосаденин) 0,0027 г, кальция хлорид 0,3 г, магния хлорид 0,3 г, калия йодид 1,5 г, кислота никотиновая 0,03 г, цистеин 0,03 г, глутатион 0,006 г, тиамина хлорид (витамин B_1) 0,03 г, метил-п-оксибензоат 0,045 г, пропил-п-оксибензоат 0,02 г, наполнитель до 100 мл.
Фармакологическое действие. Препарат изотоничен слезной жидкости, устраняет раздражение роговицы глаза.
Показания к применению. Катаракта, офтальмит.
Способ применения и дозы. Закапывают по 1—2 капли в больной глаз утром и вечером.
Форма выпуска. В стерильных флаконах-капельницах, содержащих 15 мл препарата.
Условия хранения. В защищенном от света месте. После вскрытия флакона препарат применяют в течение 3 мес, если он остается прозрачным.
Срок годности 3 года.
Поставляется из-за рубежа.
Аналогичный препарат (глазные капли) под названием «Вицеин» (Viceinum) готовят ex tempore в аптеках во флаконах по 10 мл. Показания к применению и способ применения такие же, как при использовании витайодурола.

ВИТАМИН Р (Vitaminum P).
Фармакологическое действие. К группе витаминов Р относится ряд веществ — биофлавоноидов, обладающих свойством уменьшать проницаемость капилляров. Они совместно с аскорбиновой кислотой участвуют в окислительно-восстановительных реакциях, снижают

Отредактировал: ledi24

активность гиалуронидазы, предохраняют от окисления аскорбиновую кислоту и адреналин.

Из препаратов, содержащих витамин P_1, применяют: рутин, аскорутин, кверцетин.

Показания к применению. Гиповитаминоз и авитаминоз Р (профилактика и лечение). Заболевания, сопровождающиеся повышением проницаемости капилляров (геморрагические диатезы, кровоизлияния в сетчатку глаз, геморрагический васкулит, лучевая болезнь, септический эндокардит, ревматизм, гломерулонефриты, гипертоническая болезнь, аллергические заболевания, тромбоцитопеническая пурпура). Профилактика и лечение поражений капилляров при применении антикоагулянтов, салицилатов, мышьяковистых препаратов.

Препараты группы витамина Р. Рутин (Rutinum). 3-Рутинозид кверцетина.

Применение. Внутрь взрослым по 0,02—0,05 г 2—3 раза в день.

Форма выпуска. Порошок; таблетки по 0,02 г, в упаковке по 50 штук.

Условия хранения. В защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

«Аскорутин» («Ascorutinum»). Состав: аскорбиновой кислоты 0,05 г, рутина 0,05 г, глюкозы 0,2 г. Таблетки.

Применение. Внутрь по 1 таблетке 2—3 раза в день.

Форма выпуска. Таблетки в упаковке по 50 штук.

Условия хранения. В хорошо укупоренной таре в прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 4 года.

Кверцетин (Quercetinum). 3,4,7,3′,4′-пентаоксифлавон.

Применение. Внутрь взрослым по 0,02 г 3—5 раз в день. Курс лечения 5—6 нед.

Форма выпуска. Таблетки по 0,02 г, в упаковке по 25 штук.

Условия хранения. В сухом, защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

ВИТАФТОР (Vitaftorum). Состав: в 1 мг содержится натрия фторида 0,22 мг, ретинола пальмитата 0,36 мг, эргокальциферола 0,02 мг, кислоты аскорбиновой 12 мг с добавлением сорбита и других веществ.

Фармакологическое действие. Противокариозное средство.

Показания к применению. Кариес зубов у детей.

Применяется в комплексе лечебно-профилактических мероприятий у детей при кариесе зубов и для улучшения формирования тканей постоянных зубов. Назначают детям, проживающим в районах с недостаточным содержанием фтора (менее 1 мг/л) в питьевой воде.

Способ применения и дозы. Внутрь во время еды или через 10—15 мин после еды ежедневно 1 раз в день в течение 1 мес. После 2-недельного перерыва курс лечения повторяют. Повторные курсы проводят 4—6 раз в году с перерывом на летние месяцы. Разовая доза для детей от 1 года до 6 лет — $^1/_2$ чайной ложки, от 7 до 14 лет — 1 чайная ложка.

Противопоказания. При содержании фтора в питьевой воде свыше 1,5 мг/л и при явлениях А- и D-гипервитаминоза.

Форма выпуска. По 115 мл во флаконе темного стекла.

Условия хранения. В защищенном от света месте при температуре не выше 10°С.

Срок годности 2 года.

Отредактировал: ledi24

ВИТОГЕПАТ (Vitohepatum). Препарат печени крупного рогатого скота. Содержит в 1 мл 10 мкг цианокобаламина, фолиевую кислоту и другие антианемические вещества.

Показания к применению. Анемия Аддисона — Бирмера, макроцитарная анемия беременных и другие анемии, болезнь Боткина, хронические поражения печени, атрофические гастриты.

Способ применения и дозы. Внутримышечно по 1—2 мл в день. Курс лечения 15—20 инъекций. Повторные курсы через $1^1/_2$—2 мес.

Побочное действие. Аллергические реакции.

Форма выпуска. Ампулы по 2 мл (20 мкг цианокобаламина), в упаковке по 6 штук.

Условия хранения. В защищенном от света месте при температуре не выше 20°С. Замерзание недопустимо.

Срок годности 2 года.

ВОДЯНОГО ПЕРЦА ЭКСТРАКТ ЖИДКИЙ (Extractum Polygoni hydropiperis fluidum). Содержит рутин, кверцетин и другие флавоноловые производные, дубильные вещества.

Фармакологическое действие. Уменьшает проницаемость сосудов, повышает свертываемость крови.

Применяется в качестве кровоостанавливающего средства преимущественно при маточных кровотечениях по 30—40 капель 3—4 раза в день.

Форма выпуска. По 25 мл во флаконах.

Условия хранения. Обычные.

Срок годности $3^1/_2$ года.

ВУЛНУЗАН (Vulnusan). Стандартизованная эмульсия маточника Поморийского озера в касторовом масле и ланолине. Содержит макро- и микроэлементы (магний, кальций, калий, натрий, железо, марганец, медь, кобальт, молибден, цинк, висмут, хлор, йод, селен), а также коллоиды и другие вещества органического происхождения.

Фармакологическое действие. Ограничивает воспалительные процессы, стимулирует фагоцитоз и иммуногенез, активирует грануляцию и эпителизацию тканей.

Показания к применению. Инфицированные раны, абсцессы, язвы, поверхностные воспалительные процессы (дерматиты, фолликулиты, карбункулы).

Способ применения и дозы. Наружно в виде повязок ежедневно или через 2—3 дня.

Побочное действие. Аллергические реакции, болезненность после перевязки.

Противопоказания. Индивидуальная непереносимость препарата.

Форма выпуска. Тубы по 45 г.

Срок годности 2 года.

Поставляется из Болгарии.

ГАЛАЗОЛИН (Halazolini). 2(4-тетра-Бутил-2,6-диметилбензил)-имидазолина гидрохлорид. Синонимы: Otrivin, Xylomethazolin.

Фармакологическое действие. При местном применении способствует сужению сосудов носоглотки, уменьшает гиперемию и снимает воспалительные явления.

Показания к применению. Острые риниты различной этиологии, в том числе аллергический ринит и сенной насморк, ларингит, синуит, гайморит.

Способ применения и дозы. Путем инстилляций, по 1—2 капли

Отредактировал: ledi24

0,1% раствора в каждый носовой ход 1—3 раза в день; детям старше 1 года 1 раз в день по капле.

Побочное действие. Возможны слабое жжение и сухость слизистой оболочки носа, головокружение, головная боль, бессонница.

Противопоказания. Тахикардия, гипертония, выраженный атеросклероз.

Форма выпуска. Во флаконах по 10 мл 0,1% раствора.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности 2 года.

Поставляется из Польши.

ГАЛАНТАМИНА ГИДРОБРОМИД (Galantamini hydrobromidum). Гидробромид алкалоида галантамина, выделенный из клубней подснежника Воронова (Galanthus Woronowi A. Los). Синоним: Nivalin.

Фармакологическое действие. Активное антихолинэстеразное средство.

Показания к применению. Миастения, миопатия, чувствительные и двигательные нарушения, вызванные невритами; остаточные явления после полиомиелита; психогенная и спинальная импотенция, при необходимости как антидот миорелаксантов при анестезии и др.

Способ применения и дозы. Подкожно по 1 мл 0,5% раствора 1—2 раза в день; детям в зависимости от возраста 0,1—0,7 мл 0,25% раствора; как антидот вводят в вену (15—25 мг).

Побочное действие. При передозировке — слюнотечение, головокружение, брадикардия.

Противопоказания. Эпилепсия, гиперкинезы, стенокардия, брадикардия, бронхиальная астма.

Форма выпуска. Ампулы по 1 мл, в упаковке 10 штук 0,5% раствора.

Условия хранения. Список А. В защищенном от света месте.

Срок годности 4 года.

ГАЛАСКОРБИН (Galascorbinum). Комплексное соединение солей аскорбиновой и галловой кислот.

Фармакологическое действие. Обладает свойствами витаминов С и Р, оказывает вяжущее действие, обусловленное галлатом калия.

Применение. При гастритах и эзофагитах, гиповитаминозах С и Р внутрь по 0,5 г 3—4 раза в день. Наружно для лечения трещин, ожогов, лучевых поражений кожи 0,5—1% водный раствор.

Форма выпуска. Порошок; таблетки по 0,5 г, в упаковке по 10 штук.

Условия хранения. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности. Порошок 3 года, таблетки 2 года.

ГАЛИДОР (Halidor). 1-Бензил-1 (β-диметиламинопропокси)-циклогептана фуромид. Синоним: Bencyclamidum.

Фармакологическое действие. Спазмолитическое и сосудорасширяющее средство.

Показания к применению. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, спазмы мочевыводящих путей, холецистит, эндартериит, тромбангиит, спазмы сосудов мозга и коронарных сосудов.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,05—0,1 г 2—4 раза в день, внутримышечно (при необходимости внутривенно) по 1—2 мл 2,5% раствора. Курс лечения 15—20 дней.

Побочное действие. Диспептические явления, аллергические кожные реакции.

Отредактировал: ledi24

Противопоказания. Выраженные нарушения кровообращения и дыхания.

Форма выпуска. Таблетки по 0,1 г, в упаковке 50 штук, ампулы по 2 мл 2,5% раствора, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности. Таблетки 4 года, ампулы 3 года.

Поставляется из Венгрии.

ГАЛОПЕРИДОЛ (Haloperidol). 4-Фтор-4-1-[4-окси-4-(4'-хлор)-фенил-пиперидино]-бутирофенон. Синонимы: Aloperidin, Haldol.

Фармакологическое действие. Нейролептическое средство с выраженным антипсихотическим эффектом.

Показания к применению. Шизофрения, маниакальные, галлюцинаторные, бредовые состояния, острые и хронические психозы разной этиологии. В комплексной терапии при болевом синдроме, стенокардии, при неукротимой тошноте и рвоте.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,002—0,003 г в день, внутримышечно и внутривенно по 0,4—1 мл 0,5% раствора.

Побочное действие. Экстрапирамидные расстройства, при передозировке — бессонница.

Противопоказания. Органические заболевания центральной нервной системы, нарушение сердечной проводимости, заболевания почек с нарушением функции.

Форма выпуска. Таблетки в упаковках по 50 штук по 0,0015 г и по 0,005 г, ампулы по 1 мл 0,5% раствора, в упаковке 5 штук, во флаконах по 10 мл 0,2% раствора.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности. Таблетки 5 лет; ампулы, капли 2 года.

Поставляется из Венгрии.

«ГАЛЬМАНИН» («Galmaninum»). Состав: салициловой кислоты 2 части, окиси цинка 10 частей, талька 44 части, крахмала 44 части.

Применение. Как антисептическое и подсушивающее средство при потливости ног наружно в виде присыпки.

Форма выпуска. В упаковке по 50 г и по 50 г в пластмассовой коробке.

Срок годности 5 лет.

ГАМИБАЗИН (Gamibasinum). Антиникотиновая жевательная резинка с анабазина гидрохлоридом, применяется для облегчения отвыкания от курения.

Способ применения и дозы. По следующей схеме: по 1 резинке 4 раза в день в течение 4—5 дней; с 5—6-го по 8-й день — по 1 резинке 3 раза в день; с 9-го по 12-й день — по 1 резинке 2 раза в день; в дальнейшем до 20-го дня — по 1 резинке 1—2 раза в день. Можно проводить повторные курсы лечения.

Побочное действие. Неприятные вкусовые ощущения, тошнота, небольшая головная боль, головокружение, повышение АД. В этих случаях следует прекратить прием препарата.

Противопоказания. Кровотечение, выраженное повышение АД, атеросклероз.

Форма выпуска. Резинка, содержащая анабазина гидрохлорида 0,003 г, по 30 штук в упаковке.

Условия хранения. В сухом, защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

ГАНГЛЕРОН (Ganglerонum). γ-Диэтиламино-1,2-диметилпропилового эфира параизобутоксибензойной кислоты гидрохлорид. Синоним: Ganglefeni hydrochloridum.

Отредактировал: ledi24

Фармакологическое действие. Блокирует н-холинореактивные системы парасимпатических и симпатических вегетативных ганглиев и центральной нервной системы, оказывает миотропное спазмолитическое, слабое местнораздражающее и анестезирующее действие.

Показания к применению. Стенокардия, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, спастическая дискинезия желудочно-кишечного тракта и др.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,04 г 4 раза в день после еды; внутримышечно или подкожно по 1 мл 1,5% раствора 4 раза в день с постепенным повышением разовой дозы до 3 мл. Высшая разовая доза для взрослых внутрь 0,075 г, суточная 0,3 г; высшая разовая доза подкожно и внутримышечно 4 мл 1,5% раствора; суточная 12 мл 1,5% раствора.

Побочное действие. Головокружение; при попадании на слизистые оболочки быстро проходящее ощущение раздражения с последующей анестезией.

Форма выпуска. Капсулы по 0,04 г, в упаковке по 50 штук, ампулы по 2 мл 1,5% раствора, в упаковке по 10 штук.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности. Капсулы — 2 года, ампулы — не установлен.

ГАСТАЛ (Gastal). Комбинированный препарат, содержащий в одной таблетке 450 мг алюминия гидроокиси-магния карбоната геля и 300 мг магния гидроокиси. 10 мл (пакетик) суспензии содержит 900 мг алюминия гидроокиси-магния карбоната геля и 600 мг магния гидроокиси.

Фармакологическое действие. Гастал — буферный антацид, снижающий повышенную кислотность желудочного сока и устраняющий вызываемые ею нежелательные желудочные реакции (боли, изжогу и др.). Быстро наступающее и длительное (2 часа) действие обеспечивается составом и соотношением входящих в препарат компонентов, предупреждающих также и обстипацию.

Показания к применению. Повышенная кислотность желудочного сока (с изжогой или без нее) при: пептической язве желудка и двенадцатиперстной кишки, рефлюкс-эзофагите, остром и хроническом гастрите, раздражении слизистой желудка, вызванное курением, потреблением алкоголя, кофе, сладостей, различных приправ и т. д., у беременных, людей старческого возраста.

Способ применения и дозы. По 1—2 таблетки или по 10 мл суспензии 4—6 раз в день, примерно через 1 час (не ранее чем через 20 минут) после еды, а также вечером перед сном. При изжоге применяется в такой же дозировке независимо от времени приема пищи. Таблетки следует медленно сосать и ни в коем случае не глотать целиком. Суспензию обычно принимают в неразбавленном виде, но можно ее смешать с небольшим количеством воды или молока.

Побочное действие. Не отмечено.

Противопоказания. С осторожностью назначать при пониженном весе и кахексии. Препарат может усиливать эффекты леводопа, ацетилсалициловой кислоты и налидиксовой кислоты и, напротив, угнетать действие тетрациклинов, изониазида, пропранолола и препаратов железа.

Форма выпуска. 20 пластиковых пакетиков по 10 мл суспензии в каждом и 60 таблеток в упаковке.

Срок годности 5 лет.

Поставляется фирмой «Плива», Хорватия.

ГАСТРОФАРМ (Gastropharm). Содержит высушенные бактериальные тела Lactobacillus Bulgaricus и продукты его жизнедеятель-

Отредактировал: ledi24

пости, сахарозу. Основным компонентом является протеин (25—30%).

Фармакологическое действие. Стимулирует регенеративные процессы слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки, регулирует функцию желудочно-кишечного тракта.

Показания к применению. Гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.

Способ применения и дозы. Внутрь за 30 мин до еды по 1—2 таблетки 3 раза в день, при необходимости дозу увеличивают до 8—12 таблеток. Курс лечения 30 дней.

Форма выпуска. Таблетки, содержащие 2,5 мг действующего вещества, в упаковке по 6 штук.

Условия хранения. В прохладном месте.

Срок годности 2 года.

Поставляется из Болгарии.

ГАСТРОЦЕПИН (Gastrozepin).

Фармакологическое действие. Представляет собой блокатор, который действует на клетки слизистой оболочки желудка.

Показания к применению. Острые и хронические формы язвы желудка, двенадцатиперстной кишки, гастрит, повышенная кислотность желудка.

Способ применения и дозы. Таблетки по 50 мг применяют утром и вечером за 30 мин перед приемом пищи. Лечение проводят в течение 4 нед. без перерыва.

В ампулах препарат применяют как для внутримышечного, так и для внутривенного введения. Обычно вводят свежеприготовленный раствор (1 ампула) через каждые 12 ч.

Противопоказания. Не установлены.

Форма выпуска. Таблетки по 25 мг, в упаковке по 50 штук; комплект 5 флаконов по 10 мг гастроцепина с 5 ампулами растворителя по 2 мл.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Югославии.

«ГЕКСАВИТ» («Hexavitum»). Состав: ретинола ацетата 0,0017 г (5000 МЕ), тиамина бромида 0,0026 г, рибофлавина 0,002 г, никотинамида 0,015 г, пиридоксина гидрохлорида 0,002 г, аскорбиновой кислоты 0,07 г.

Применение. Для профилактики гиповитаминозов, при длительном лечении антибиотиками, а также работникам, труд которых требует повышенной остроты зрения, внутрь после еды по 1—3 драже в день. Детям до 1 года $^1/_2$ драже в день, от 1 до 3 лет по 1 драже в день, от 3 до 7 лет по 1 драже 2 раза в день и старше 7 лет по 1 драже 3 раза в день.

Форма выпуска. Таблетки, покрытые оболочкой, в упаковке 50 штук.

Условия хранения. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

ГЕКСАЛИЗ (Hexalyse). Сублингвальные таблетки, содержащие биклотимол (5 мг), хлорид декалиния (0,25 мг), лизоцим (5 мг), папаин (20 мг), кислоту В-глицирретиновую (5 мг).

Фармакологическое действие. Комбинированный препарат обладающий благодаря наличию биклотимола антисептическим и фунгицидным действием на многие грамположительные микробы. Лизоцим, физиологический защитный фактор, обладает антибактериальными и

Отредактировал: ledi24

противовирусными свойствами, растворяет слизисто-гнойные образования и облегчает их устранение. Папаин, протеолитический фермент, растворяет некротические ткани и облегчает местное очищение, оказывает противовоспалительное действие. В-глицирретиновая кислота оказывает местное противовоспалительное действие на раздраженные слизистые оболочки.

Показания к применению. Орально-фарингеальные заболевания. Вспомогательное стоматологическое средство.

Способ применения и дозы. Таблетка должна медленно растаять под языком, не раскусывать. Возможно использование подъязычно 6—8 таблеток за 24 час.

Форма выпуска. В упаковке 30 таблеток.

Условия хранения. Обычные.

Поставляется из Франции.

ГЕКСАМЕТИЛЕНТЕТРАМИН (Hexamethylentetraminum). Синонимы: Hexamina, Urisol, Urotropinum и др.

Фармакологическое действие. Антисептическое средство.

Показания к применению. Инфекционные заболевания мочевыводящих путей, холециститы, холангиты, аллергические кожные заболевания, заболевания глаз (иридоциклиты, кератиты), менингит, энцефалит, арахноидит.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,5—1 г на прием (детям по 0,1—0,5 г); внутривенно по 5—10 мл 40% раствора.

Форма выпуска. Порошок; таблетки по 0,5 г, в упаковке 10 штук; 40% раствор для инъекций в ампулах по 5 мл, в упаковке 10 штук и по 10 мл в упаковке по 10 штук.

Условия хранения. Растворы при температуре не выше 20°С.

Срок годности. Порошок и таблетки 10 лет, ампулы 5 лет.

ГЕКСАМИДИН (Hexamidinum). 5-Этил-5-фенилгексагидропиримидиндион-4,6. Синонимы: Lepsiral, Sertan.

Фармакологическое действие. Оказывает выраженное противосудорожное действие, по фармакологической активности близок к фенобарбиталу, но не обладает выраженным снотворным свойством.

Показания к применению. Эпилепсия различного генеза, преимущественно большие судорожные припадки (grand mal). При лечении больных с полиморфной эпилептической симптоматикой используют в комплексе с другими противосудорожными препаратами.

Способ применения и дозы. Внутрь 0,125 г 1 раз в день, затем суточную дозу повышают до 0,5—1,5 г.

Побочное действие. Зуд, кожные высыпания, легкая сонливость, головокружение, головная боль, атаксия, тошнота; при длительном лечении — анемия, лейкопения, лимфоцитоз.

Противопоказания. Заболевания печени, почек и кроветворной системы.

Форма выпуска. Таблетки по 0,25 г, в упаковке по 50 штук.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности. Таблетки 5 лет.

ГЕКСАФОСФАМИД (Hexaphosphamidum). N, N′-Ди-(этиленимид)-N″ циклогексиламид тиофосфорной кислоты

Фармакологическое действие. Цитостатик.

Показания к применению. При обострениях хронического миелолейкоза, лейкемические и сублейкемические формы заболевания, особенно случаи с выраженной гепато- и спленомегалией.

Способ применения и дозы. Внутрь. Дозы препарата строго индивидуализируются в зависимости от эффективности лечения и

Отредактировал: ledi24

действия на лейко- и тромбоцитопоэз. Обычно суточная доза для взрослых равна 20 мг (0,02 г). При числе лейкоцитов не выше $100 \cdot 10^9$/л прием препарата начинают с 10 мг в день, при отсутствии лейкопенического эффекта дозу увеличивают до 20 мг.

Курс лечения гексафосфамидом и курсовые дозы весьма вариабельны и определяются выраженностью клинического и цитостатического эффекта. Лечение гексафосфамидом больных, получавших другие цитостатические средства, следует начинать не ранее 1 мес после их отмены.

Побочное действие. Оказывает выраженное угнетающее действие на лейкопоэз и в меньшей степени на тромбоцитопоэз. При передозировке или повышенной индивидуальной чувствительности к препарату возможно развитие лейкопении, тромбоцитопении и сильное угнетение кроветворения.

Противопоказания. Терминальные стадии миелолейкоза и бластные кризы; сублейкемические формы лейкоза с числом лейкоцитов менее $30 \cdot 10^9$/л и тромбоцитов ниже $100 \cdot 10^9$/л, а также тяжелые сопутствующие заболевания (активный туберкулез, паренхиматозный гепатит, нефрит и др.).

Форма выпуска. Таблетки по 0,01 г, в упаковке по 100 штук.

Условия хранения. Список А. В защищенном от света месте при комнатной температуре.

Срок годности 2 года.

ГЕКСЕНАЛ (Hexenalum). 1,5-Диметил-5 (циклогексен-1-ил) барбитурат натрия. Синонимы: Evipan sodium, Hexobarbitalum natricum, Narconal.

Фармакологическое действие. Оказывает снотворное, а в больших дозах наркотическое действие.

Показания к применению. Для вводного и кратковременного наркоза; при небольших хирургических вмешательствах, болезненных перевязках, диагностических исследованиях.

Способ применения и дозы. Внутривенно медленно в виде 1—5% раствора. Доза для вводного наркоза 0,3—0,5 г; максимальная 1 г. Готовые растворы хранят не более 1 ч.

Побочное действие. Иногда угнетение дыхания и нарушение сердечной деятельности.

Противопоказания. Нарушения функции печени и почек, гипотония, гиповолемия, лихорадочные состояния, воспалительные процессы в носоглотке.

Форма выпуска. Во флаконах по 1 г для инъекций.

Условия хранения. Список Б. В сухом прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 1 год.

ГЕЛЕВИН. Порошок химически сшитого поливинилового спирта. Дренирующий сорбент.

Фармакологическое действие. Обладает мощным дренирующим, противоотечным и гемостатическим действием, высокой поглощающей способностью к биологическим жидкостям, купированию воспалительных изменений, ускоряет очищение раны и рост грануляционной ткани.

Показания к применению. Предназначен для лечения гнойных ран в фазе воспаления (в период сосудистых изменений и в период очищения раны от гнойно-некротических масс), трофических язв и ожоговых ран с осложненным течением.

Способ применения и дозы. Применяется в виде адсорбирующей повязки из сыпучего мелкозернистого порошка, насыпаемого непо-

Отредактировал: ledi24

средственно на раневую поверхность. Применение сорбента приводит к сорбции раневого экссудата и образованию мягкого гелеобразного слоя на раневой поверхности любой конфигурации, не раздражающего ткани раны. Останавливает капиллярные кровотечения за 15—60 сек при любых спектрах и видах микрофлоры, уменьшает уровень инфицирования, улучшает микроциркуляцию, обеспечивает хороший газо- и водообмен в ране и безболезненность перевязок.

Форма выпуска. Три типа стерильной упаковки сорбента дозами в 0,5, 1,0 и 2,5 г.

Условия хранения. В сухом прохладном месте.

Срок годности 2 года.

ГЕЛИОМИЦИНОВАЯ МАЗЬ (Unguentum Heliomycini). Действующее вещество мази — антибиотик гелиомицин, продуцируемый лучистым грибом Actinomyces flavochromogenes, var. heliomycini.

Фармакологическое действие. Гелиомицин оказывает сосудосуживающее действие и активен в отношении грамположительных микробов и некоторых вирусов; малотоксичен.

Показания к применению. Пиодермия, инфицированные экземы, пузырчатка новорожденных, варикозные трофические язвы, пролежни, трещины, риниты и др.

Способ применения и дозы. Мазь наносят на пораженные участки 1—2 раза в день в течение 5—7 дней и более. Повязку накладывают через 10—15 мин после нанесения мази. В носовые ходы вводят ватные тампоны с мазью на 20—30 мин.

Форма выпуска. 4% мазь по 10 г в тубах.

Условия хранения. При комнатной температуре.

Срок годности 2 года.

ГЕМАТОГЕН (Haematogenum). Препарат из дефибринированной крови убойного скота.

Фармакологическое действие. Оказывает противоанемическое действие.

Применение. При анемии, упадке питания внутрь в плитках по 1—2 доли на прием 2—3 раза в день.

Форма выпуска. В плитках по 50 г.

Условия хранения. В сухом месте при температуре от 5 до 10°С.

Срок годности 6 мес.

ГЕМАЦЕЛЬ (Haemaccel). Состав: 35 г разложенного полимеризированного желатина, 8,5 г хлористого натрия, 0,38 г хлористого калия и 0,7 г хлористого кальция в 1000 мл раствора.

Показания к применению. Шок любой этиологии и любой стадии, шок вследствие уменьшения объема плазмы: при посттравматическом или постоперационном кровотечении, при плазмопотере после ожогов, при обезвоживании после тяжелого шока и других его видов (анафилактический, аллергический, токсический и т. д.).

Гемацель применяется для стабилизации циркуляции крови во время наркоза, как профилактический препарат при подготовке к большим оперативным вмешательствам, в аппарате искусственного кровообращения, искусственной почке и для промывания изолированных органов.

Способ применения и дозы. Общее количество раствора, длительность вливания индивидуальны и определяются врачом. Струйное введение — 500 мл в течение 5—10 минут, капельное введение — количество и скорость определяются по показаниям.

Гемацель хорошо смешивается с другими растворами для внутри-

Отредактировал: ledi24

венных вливаний (раствор хлористого натрия, раствор Рингера, глюкозы и пр.), а также с кортикостероидами, миорелаксантами, барбитуратами, витаминами, противостолбнячной сывороткой и антибиотиками (пенициллин, тетрациклин, если растворены в воде). Цитратную кровь не стоит смешивать с гемацелем, так как в нем присутствует кальций, но переливание крови можно назначать до или после вливания гемацеля. Прописывая сердечные гликозиды, надо помнить, что наличие ионов кальция в гемацеле способно усилить действие сердечных гликозидов.

Противопоказания. Абсолютные противопоказания для введения гемацеля неизвестны, относительные — выраженная сердечная недостаточность, кардиогенный шок.

Форма выпуска. Пластиковые флаконы по 500 мл.

Срок годности 8 лет при хранении при комнатной температуре, 5 лет — в тропическом климате.

Производит фирма «Behringwerke», Германия.

ГЕМОДЕЗ (Haemodesum). Водно-солевой раствор, содержащий 6% низкомолекулярного поливинилпирролидона и ионы натрия, калия, кальция, магния, хлора.

Фармакологическое действие. Оказывает дезинтоксикационное действие (поливинилпирролидон связывает токсины, циркулирующие в крови); быстро выводится почками и частично через кишечник.

Показания к применению. Токсические формы острых желудочно-кишечных заболеваний, ожоговой болезни, при инфекционных заболеваниях и других патологических состояниях, сопровождающихся интоксикацией.

Способ применения и дозы. Внутривенно капельно до 300—500 мл, детям 5—10 мл/кг массы тела.

Побочное действие. При быстром введении возможны понижение АД, тахикардия, затруднение дыхания.

Противопоказания. Кровоизлияние в мозг, бронхиальная астма, острый нефрит.

Форма выпуска. Во флаконах по 100 мл, 200 мл и 400 мл.

Условия хранения. При температуре от 10 до 20°С. Замерзание не допускается.

Срок годности 5 лет.

ГЕМОДЕЗ-Н (Haemodesum-N). 6% раствор низкомолекулярного поливинилпирролидона, отличается от гемодеза более низкой молекулярной массой (8000 ± 2000) и более широким диапазоном применения. Гемодез-Н содержит ионы натрия, калия, кальция и хлора.

Фармакологическое действие. Гемодез-Н способствует освобождению организма от токсических веществ. Уменьшает содержание свободных жирных кислот, образующихся в избыточном количестве при инфаркте миокарда. Обладает диуретической активностью благодаря усилению почечного кровотока к повышению клубочковой фильтрации. Гемодез-Н малотоксичен, медленнее выводится почками (в течение 12—24 ч после введения).

Показания к применению. Токсические формы желудочно-кишечных заболеваний (дизентерия, диспепсия, сальмонеллезы и т. д.), особенно у детей; детские инфекционные заболевания, протекающие с интоксикацией; интоксикация различного происхождения (послеоперационная, раковая, лучевая, алкогольная, в связи с почечной и печеночной недостаточностью), ожоговая болезнь в стадии интоксикации (2—5-й день болезни); острая лучевая болезнь в период интоксикации (1—3-й день болезни); гемолитическая болезнь новорожден-

Отредактировал: ledi24

ных, внутриутробная инфекция и токсемия новорожденных (перитонит и непроходимость кишечника); отеки при токсикозе беременных, тиреотоксикоз, сепсис, хронические заболевания печени (гепатиты, гепатохолангиты, дистрофия печени).

Гемодез-Н используют также как антиаритмическое средство при остром инфаркте миокарда.

Способ применения и дозы. Гемодез-Н вводят внутривенно капельно. Доза препарата зависит от возраста больного и интенсивности интоксикации. Детям грудного взраста вводят из расчета 5—10 мл/кг. Максимальная разовая доза для них 70 мл; для детей от 2 до 5 лет — 100 мл; от 5 до 10 лет — 150 мл, от 10 до 15 лет — 200 мл. Для взрослых разовая максимальная доза — 400 мл.

Больным с крупноочаговым инфарктом миокарда, поступившим в 1-е сутки болезни, вводят 200 мл гемодеза-Н. В отдельных случаях (затянувшийся болевой приступ, тяжелые аритмии, кардиогенный шок или сочетание этих осложнений при сопутствующем сахарном диабете) препарат вводят повторно на 2-е сутки в той же дозе (200 мл).

Побочное действие. Возможно понижение АД. В этом случае необходимо прекратить введение препарата и ввести эфедрин, сердечные средства, хлорид кальция, полиглюкин.

Противопоказания. Сердечно-легочная декомпенсация, аллергия, кровоизлияние в головной мозг.

Форма выпуска. Флаконы, содержащие 100 мл препарата, 200 мл и 400 мл.

Условия хранения. При температуре от 0 до 20°С. Однократное и многократное замораживание не влияет на качество препарата. Флаконы с замерзшим раствором выдерживают при комнатной температуре до оттаивания и содержимое их перемешивают.

Срок годности 2 года.

«ГЕМОСТИМУЛИН» («Haemostimulinum»). Препарат изготовляют из лактата железа, глюкозы, сульфата меди и пищевого сухого альбумина.

Фармакологическое действие. Стимулятор кроветворения.

Показания к применению. Гипохромные анемии различной этиологии.

Способ применения и дозы. Внутрь во время еды по 0,25—0,5 г 3 раза в день (запивают разведенной хлористоводородной кислотой — по 10 капель на полстакана воды) в течение 3—5 нед.

Побочное действие. Возможна тошнота.

Противопоказания. Понос, рвота.

Форма выпуска. Таблетки по 50 штук.

Срок годности 3 года.

«ГЕНДЕВИТ» («Hendevitum»). Состав: ретинола ацетата 0,001 г (3300 МЕ), тиамина бромида 0,00194 г, рибофлавина 0,0015 г, цианокобаламина 10 мкг, фолиевой кислоты 0,0005 г, никотинамида 0,01 г, кальция пантотената 0,003 г, пиридоксина гидрохлорида 0,002 г, аскорбиновой кислоты 0,075 г, α-токоферола ацетата 0,005 г, эргокальциферола 250 МЕ.

Применение. Для профилактики витаминной недостаточности в период беременности и кормления внутрь по 1—2 драже в день после еды.

Форма выпуска. Таблетки, покрытые оболочкой, в упаковке по 50 штук.

Условия хранения. В прохладном сухом месте

Срок годности 2 года.

Отредактировал: ledi24

ГЕНТАМИЦИНА СУЛЬФАТ (Gentamycini sulfas). Антибиотик, продуцируемый Mycromonospora purpurea или Echinospora. Синоним: Garamycin.

Фармакологическое действие. Обладает широким спектром антимикробного действия, подавляя рост большинства грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов. Высокоактивен в отношении палочки сине-зеленого гноя. Быстро всасывается. Проникает через гематоэнцефалический барьер. Максимальная концентрация в сыворотке крови отмечается через 1 ч после инъекции. При повторном введении в дозе 0,4—0,8 мг/кг с интервалом 8 ч наблюдается кумуляция препарата. Выделяется из организма почками.

Показания к применению. Инфекции мочевыводящих путей (пиелонефрит, цистит, уретрит), дыхательного тракта (пневмония, плеврит, эмпиема, абсцесс легкого), хирургические инфекции (хирургический сепсис, перитонит), инфекции кожи (фурункулез, дерматит, трофические язвы, ожоги), вызванные возбудителями, устойчивыми к другим антибиотикам широкого спектра действия.

Способ применения и дозы. Внутримышечно. При инфекциях мочевыводящих путей разовая доза для взрослых составляет 0,4 мг/кг, суточная 0,8—1,2 мг/кг (вводят в 2—3 приема). При инфекциях других локализаций суточная доза 2,4—3,2 мг/кг. Курс лечения 6—8 дней. Местно применяют в виде 0,1% растворов, присыпок, мазей, а также путем ингаляций из расчета 4 мг/мл 4 раза в день.

Побочное действие. Может давать ототоксический, реже нефротоксический эффект.

Форма выпуска. Флаконы по 0,08 г (80 мг) активного вещества для инъекций; 0,1% мазь по 15 г; 0,3% раствор по 1,5 мл тюбик-капельница в упаковке по 2 штуки (глазные капли); 2,5% линимент в упаковке по 30 г.

Из Болгарии поставляются ампулы 4% раствора по 1 мл (40 мг) в упаковке по 10 штук и по 2 мл (80 мг).

Условия хранения. Список Б. В сухом помещении при комнатной температуре.

Срок годности всех форм 2 года.

ГЕПАРИН (Heparinum). Полисахарид, состоящий из глюкуроновой кислоты и глюкозамина. Синонимы: Thromboliquin, Vetren.

Фармакологическое действие. Антикоагулянт прямого действия.

Показания к применению. Для профилактики и лечения тромбоэмболических осложнений при инфаркте миокарда, операциях на сердце и кровеносных сосудах, тромбоэмболии легочных и мозговых сосудов, центральной вены сетчатки, тромбофлебитах конечностей.

Способ применения и дозы. Парентерально по 20 000—50 000 ЕД/сут (в зависимости от показаний). При поверхностном тромбофлебите, флебите после инъекций и травматической гематоме местно в виде мази.

Побочное действие. Возможны местное раздражающее действие, гематома и болезненность при парентеральном введении.

Противопоказания. Геморрагический диатез, лейкозы, анемия, повышенная проницаемость сосудов, полипы и злокачественные новообразования желудочно-кишечного тракта, язвенные заболевания, сопровождающиеся кровотечением, тяжелые нарушения функции печени и почек, операции на мозге и позвоночнике.

Форма выпуска. Флаконы (в 1 мл 5000 ЕД) по 5 мл, мазь в упаковке по 10 г.

Отредактировал: ledi24

Условия хранения. В прохладном, защищенном от света месте. **Срок годности** 3 года.

«ГЕПАРОИД» МАЗЬ (Unguentum «Heparoid»). Состав: в 30 г мази содержится 6000 ЕД гепарина.

Фармакологическое действие. Обладает антикоагуляционным свойством.

Показания к применению. Поверхностные тромбофлебиты, язвы конечностей, гематомы.

Способ применения и дозы. Слой мази наносят на пораженное место (и вокруг него) высотой 1 мм. Мазь слегка втирают в кожу и накрывают компрессной бумагой. Ежедневно или через день повязку меняют. При язве голени втирают мазь только вокруг пораженного места.

Противопоказания. Геморрагический диатез, гемофилия, тромбоцитопения.

Форма выпуска. Мазь в тубах по 30 г.

Срок годности 3 года.

Поставляется из Чехо-Словакии.

«ГЕПТАВИТ» («Heptavitum»). Состав: ретинола ацетата 0,009 г (26 400 МЕ), тиамин бромида 0,0129 г, рибофлавина 0,01 г, пиридоксина гидрохлорида 0,01 г, никотинамида 0,075 г, рутина 0,1 г, кислоты аскорбиновой 0,2 г.

Показания к применению. Поражения и заболевания кожи (отморожения, ожоги, вяло гранулирующие раны, экзема, туберкулез кожи и др.), псориаз, заболевания глаз (пигментный ретинит, гемералопия, кератомаляция, ксерофтальмия и др.).

Способ применения и дозы. Внутрь после еды по 1 таблетке 1—2 раза в день. Курс лечения 20 дней. Повторяют курс лечения через 1—3 мес.

Форма выпуска. Таблетки, покрытые оболочкой, по 20 штук в упаковке.

Условия хранения. В сухом, защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

ГЕРФОНАЛ (Gerphonal).

Фармакологическое действие. Антидепрессант.

Показания к применению. Депрессии различного характера, в том числе депрессии климактерического периода, реактивные депрессии с психомоторным возбуждением.

Способ применения и дозы. Дозировка препарата индивидуальна. Для стационарного лечения в зависимости от тяжести заболевания рекомендуются суточные дозы 200—400 мг, для амбулаторного лечения — 150—200 мг. Суточную дозу распределяют равномерно в течение суток.

Форма выпуска. Драже по 25 мг, в упаковке 50 штук.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Германии.

ГИГРОНИЙ (Hygronium). Диметиламиноэтилового эфира N-метил-α-пирролидинкарбоновой кислоты дийодметилат.

Фармакологическое действие. Ганглиоблокатор короткого действия.

Показания к применению. В анестезиологии для создания искусственной гипотонии.

Способ применения и дозы. Внутривенно (капельно) 0,1% раствор в изотоническом растворе хлорида натрия или 5% раствора глюкозы.

Отредактировал: ledi24

Побочное действие. Резкая гипотония.

Форма выпуска. Порошок по 0,1 г в ампулах емкостью 10 мл, в упаковке по 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте. **Срок годности** 2 года.

ГИДРЕА (Hydrea). Гидроксикарбамид. Синонимы: литалир, гидроксимочевина, гидроксикарбамид, оксикарбамид. Цитостатическое средство.

Фармакологическое действие. Вызывает задержку синтеза ДНК без нарушения синтеза РНК или протеина. Считают, что селективное антиметаболическое действие связано с нарушением ферментативной конверсии рибонуклеидов в дезоксирибонуклеотиды, возможно задерживается проникновение тимидина в ДНК.

Показания к применению. Основными показаниями являются хронический миелолейкоз и истинная полицитемия. Препарат может быть использован в составе комбинированного или комплексного лечения при опухолях головы и шеи, при меланоме кожи, при раке толстой и прямой кишки, при раке шейки матки, раке почки и предстательной железы. Вне онкологической практики гидреа применяются для лечения псориаза.

Способ применения и дозы. Капсулы принимаются до еды с небольшим количеством жидкости. При хроническом миелолейкозе доза гидроксимочевины определяется высотой лейкоцитоза и может колебаться от 6 капсул в сутки до 1 капсулы 2—3 раза в неделю. Обычная дневная доза 30—50 мг/кг массы с учетом количества лейкоцитов в крови: при гиперлейкоцитозе 150 000—200 000 и выше можно назначать 4—6 капсул в сутки (2000—3000 мг), при количестве лейкоцитов 50 000—100 000 достаточно 2—3 капсулы в сутки (1000—1500 мг), при лейкоцитозе 20 000—30 000 можно использовать 1—2 капсулы в сутки. При нормальном количестве лейкоцитов или небольшом лейкоцитозе (15 000—20 000 в 1 $мм^3$) можно назначать поддерживающую дозу по 1 капсуле через сутки или 2 раза в неделю. При больших размерах опухолевой массы (высокий лейкоцитоз, больших размеров селезенка) одновременно с гидреа необходимо назначать аллопуринол для предотвращения урекемии, поскольку снижение количества лейкоцитов наступает достаточно быстро, обычно уже спустя 8—10 дней от начала лечения и может достигнуть нормальных цифр в течение 2—4 недель. Препарат в отличие от других не дает первоначального роста лейкоцитоза, не обладает кумулятивным эффектом; при отмене гидреа количество лейкоцитов вновь начинает быстро увеличиваться и может достигнуть высоких цифр через 10—12 дней. При бластном кризе хронического миелолейкоза и острых лейкозов препарат практически не эффективен.

При эритремии (истинной полицитемии) гидреа назначают в дозе от 500 мг до 2000 мг в сутки до наступления нормализации показателей крови. После достижения ремиссии — поддерживающая терапия по 500 мг препарата ежедневно постоянно.

В противоопухолевой терапии солидных опухолей гидроксимочевина показана в случаях резистентности опухолей с основным лечебным препаратом, а также в том случае, когда последние не могут быть применены по каким-либо причинам. При монохимиотерапии используют два режима: 1. Режим непрерывной терапии — гидреа вводят ежедневно по 1—2 г/$м^2$ в сутки. Суточную дозу делят на 2—3 приема; 2. Режим прерывистой терапии — препарат вводят 1 раз в 3 суток в дозе 2—3 г/$м^2$. Во всех случаях лечение должно быть

Отредактировал: ledi24

остановлено при снижении лейкоцитов до 2500 или тромбоцитов до 100 тысяч клеток в 1 мм^3.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к гидреа, лейкоцитопения (меньше 3000/мм^3), тромбоцитопения (меньше 100 000/мм^3), беременность и период кормления грудью.

Побочное действие. Наиболее общим признаком проявления токсичности после длительного приема высоких доз гидроксимочевины является депрессия костного мозга, которая проявляется нейтропенией, поздней мегалобластной анемией и слабо выраженной тромбоцитопенией. Возможны атрофические дерматиты, пятнисто-папулезные высыпания на коже и даже частичная алопеция. В отдельных случаях возникают небольшая лихорадка, стоматиты, головокружения и головная боль.

Форма выпуска. Капсулы по 0,5 г, во флаконе 100 шт.

Условия хранения. При комнатной температуре, но не выше 20°С, в защищенном от света месте.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Германии.

ГИДРОКОРТИЗОН (Hydrocortisonum). 17-Оксикортикостерон.

Фармакологическое действие. Глюкокортикостероид. Аналогичен кортизону, но более активен.

Показания к применению. При артритах, в том числе ревматической этиологии, вводят в полость суставов (иногда внутримышечно) 0,2—0,3 мл; при острой недостаточности надпочечников внутривенно 25—50 мг; в офтальмологии (конъюнктивит, блефарит, дерматит век и др.), в виде 0,5% мази.

При внутримышечном введении побочное действие и противопоказания те же, что и для кортизона ацетата. Введение в полость суставов и наружное применение не вызывает общей отрицательной реакции.

Форма выпуска. Отечественные препараты: гидрокортизона ацетат 2,5% суспензия по 2 мл в упаковке по 10 штук, гидрокортизонгемисукцинат лиофилизированная форма по 0,025 г для инъекций в упаковке по 10 штук и по 0,1 г по 10 штук, 1% мазь по 10 г.

Условия хранения. Список Б.

Гидрокортизон гемисукцинат (Hydrocortisoni hemisuccinas) 0,1 г для инъекций. Поступает из разных стран.

Гидрокортизон ацетат суспензия 0,125 г в 5 мл для внутримышечных инъекций и 0,5% глазная мазь в упаковке по 2,5 г. Поступает из Венгрии.

Срок годности. Ампулы 3 года, суспензия 2 года, мазь $2^1/_2$ года.

ГИДРОЛИЗИН (Л-103) [Hydrolysinum (L-103)]. Продукт, получаемый при кислотном гидролизе белков крови крупного рогатого скота с добавлением глюкозы.

Фармакологическое действие. Белковый препарат для парентерального питания; оказывает также дезинтоксикационное действие.

Показания к применению. Заболевания, сопровождающиеся белковой недостаточностью (гипопротеинемия, истощение организма, интоксикация, лучевая и ожоговая болезнь, вялогранулирующие раны); операции на пищеводе и желудке.

Способ применения и дозы. Внутривенно капельно со скоростью не более 60 капель в 1 мин или через зонд в желудок и тонкий кишечник. Суточная доза препарата в зависимости от состояния больного 250—1500 мл.

Отредактировал: ledi24

Побочное действие. Возможны недомогание, тошнота, головная боль, жар, боль по ходу вены.

Противопоказания. Острая и подострая почечная и печеночная недостаточность, нарушение мозгового кровообращения, сердечно-сосудистая и сердечно-легочная недостаточность, тромбоэмболические заболевания.

Форма выпуска. Во флаконах по 450 мл.

Условия хранения. При температуре от 4 до 20°С.

Срок годности 5 лет.

ГИДРОПЕРИТ (Hydroperitum). Таблетки, содержащие комплексное соединение перекиси водорода (35%) с мочевиной.

Применение. Наружно (взамен перекиси водорода) как дезинфицирующее и дезодорирующее средство при воспалительных заболеваниях слизистых оболочек, кожи, некоторых гинекологических заболеваниях в виде промываний (1—4 таблетки на стакан воды).

Форма выпуска. Таблетки по 1,5 г, в упаковке по 6 штук.

Условия хранения. В защищенном от света месте, при температуре не выше 20°С.

Срок годности 2 года.

«ГИОКСИЗОН» МАЗЬ (Unguentum «Hyoxysonum»). В 1 г мази содержится: окситетрациклина гидрохлорида 0,03 г, гидрокортизона ацетата 0,01 г.

Фармакологическое действие. Оказывает антимикробное противовоспалительное действие.

Применение. При инфицированных экземах и ранах, гнойничковых заболеваниях кожи, эрозиях и т. д. смазывают пораженные участки 1—3 раза в день.

Побочное действие. В отдельных случаях аллергические кожные реакции.

Противопоказания. Туберкулез кожи, микоз, вирусные заболевания кожи, аллергические заболевания кожи.

Форма выпуска. В тубах по 10 г.

Условия хранения. В прохладном месте.

Срок годности 3 года.

«ГИПОЗОЛЬ» («Hyposolum»). Комбинированный пенный препарат. Состав (из расчета на 1 баллон): облепиховое масло 15 г, метилурацил 1 г, этазол-натрия 1 г, препарат ОС-20 1,65 г, эмульгатор Т-2 4,35, пропиловый эфир п-оксибензойной кислоты 0,05 г, спирт этиловый 95% 0,25 г, вода дистиллированная 26,7 г, дихлор-дифторметан (хладон-12) 5 г.

Фармакологическое действие. Оказывает противовоспалительное и стимулирующее действие на репаративные процессы в мягких тканях.

Показания к применению. Неспецифические вульвиты, кольпиты, эрозия шейки матки, проктиты, после диатермокоагуляции шейки матки, после удаления тела матки, при ранах прямой кишки после операций на прямой кишке и промежности.

Способ применения и дозы. Препарат наносят на пораженный участок нажатием на клапан распылительной насадки до упора в течение 1—2 с. Из баллона выбрасывается 7—14 мл пены. При вульвитах и кольпитах процедуру повторяют 1—2 раза в день; при эндоцервиците и эрозии шейки матки — 2—3 раза в неделю. Длительность лечения 2—3 нед. За 1 ч до введения препарата во влагалище проводят спринцевание отваром ромашки или череды. При

Отредактировал: ledi24

проктитах предварительно назначают очистительную клизму с отваром ромашки или календулы, затем вводят в прямую кишку аэрозольную пену в дозе 14—28 мл. Длительность лечения 2—3 нед.

Форма выпуска. В аэрозольных баллонах, снабженных клапаном непрерывного действия. Баллон содержит 55 г препарата.

Условия хранения. В прохладном, защищенном от света месте. Баллон предохраняют от падения, ударов и воздействия прямых солнечных лучей.

Срок годности 2 года.

ГИПОТИАЗИД (Hypothiazid) 6-Хлор-7-сульфамоил-3, 4-дигидро-1,2,4-бензотиадизин-1,1-диокись. Синонимы: дихлотиазид, Esidrex, Nefrix.

Фармакологическое действие. Активное диуретическое средство; оказывает также гипотензивное действие.

Показания к применению. Отеки при недостаточности кровообращения; циррозы печени с портальной гипертензией, гипертоническая болезнь, нефроз и нефрит; токсикозы беременных, глаукома.

Способ применения и дозы. Внутрь до еды по 0,025—0,05 г в день, в тяжелых случаях дозу увеличивают до 0,2 г в день. Препарат назначают 3—7 дней с последующим перерывом 3—4 дня. При гипертонической болезни применяют по 0,025—0,05 г в сочетании с другими гипотензивными средствами.

Побочное действие. Слабость, диспептические явления, дерматиты, гипокалиемия и гипохлоремический алкалоз.

Противопоказания. Недостаточность функции почек.

Форма выпуска. Таблетки в упаковке по 20 штук по 0,025 г и по 0,1 г.

Условия хранения. Список Б. В сухом месте.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Венгрии.

ГИСМАНАЛ (Hismanal). 1-[пара-фторбензил]-2-[1-]-параметоксифенетил[-4-пиперидил]амино/бензимидазол. Синоним: астемизол.

Фармакологическое действие. Антигистаминный препарат, блокирующий H_1-гистаминорецепторы.

Показания к применению. Симптоматическое лечение и предупреждение сенной лихорадки, аллергического ринита, аллергических кожных реакций, включая хроническую крапивницу.

Способ применения и дозы. Внутрь по 1 таблетке (10 мг) или 5 мл суспензии (10 мг) один раз в день утром за 30 мин до завтрака. Детям в возрасте 6—12 лет $^1/_2$ таблетки (5 мг) или 2,5 мл суспензии (5 мг) в день; детям младше 6 лет назначают 2 мг/10 кг массы тела в день.

Побочное действие. Препарат может повышать аппетит. В терапевтических дозах не обладает седативным действием и способностью усиливать эффект снотворных и алкоголя.

Противопоказания. Не назначают детям младше 2 лет, с осторожностью беременным, не рекомендуется во время кормления грудью.

Форма выпуска. Таблетки по 0,01 г по 30 штук в упаковке и в виде суспензии (1 мл-2 мг) во флаконе с содержанием 30 мл.

Условия хранения. При комнатной температуре.

Срок годности таблеток 5 лет, суспензии в невскрытом флаконе 3 года.

Поставляется из Бельгии.

Отредактировал: ledi24

ГИСТАЗОЛ (Histazol). Противоаллергическое средство.

Фармакологическое действие. Сильный антагонист гистаминных H_1-рецепторов пролонгированного действия. Не вызывает ни центрального седативного, ни антихолинергического эффекта. Способен предотвращать симптомы аллергической реакции в течение 24 часов, поэтому достаточно принимать его лишь один раз в сутки. Препарат полностью блокирует периферические H_1-рецепторы, не оказывая влияния на H_1-рецепторы в центральной нервной системе, так как с трудом проникает через гематоэнцефалический барьер. Гистазол быстро всасывается из желудочно-кишечного тракта. Максимальная концентрация в плазме достигается уже спустя 0,5—1 час после приема. Выделяется из организма в основном вместе с желчью в виде различных метаболитов.

Показания к применению. Может применяться для профилактики и лечения сезонного и годового аллергического ринита, аллергического конъюнктивита, хронической крапивницы и других аллергических реакций.

Способ применения и дозы. Взрослым и детям старше 12 лет — 1 таблетка один раз в день. Детям от 6 до 12 лет — $^1/_2$ таблетки (5 мг) один раз в день. Детям младше 6 лет — 0,2 мг/кг массы тела один раз в день. В очень тяжелых случаях в начале терапии суточная доза препарата может быть увеличена. Максимальный эффект достигается при приеме гистазола натощак.

Побочное действие. После длительного приема может отмечаться минимальное увеличение массы тела.

Противопоказания. Беременность.

Форма выпуска. Таблетки в упаковке — 20 штук по 10 мг, суспензия 30 мл (2 мг/мл).

Условия хранения. В сухом прохладном месте.

Срок годности 3 года.

Поставляется фирмой «КРКА», Словения в сотрудничестве с фирмой «Pharmaceutica», Бельгия.

ГИСТАМИН (Histaminum). β-Имидазолил-этиламин. В медицинской практике применяют гистамина дигидрохлорид.

Фармакологическое действие. Вызывает спазм гладкой мускулатуры, расширение капилляров и снижение АД, учащение сердечных сокращений, усиление секреции желудочного сока.

Показания к применению. Полиартриты, ревматизм, боль, вызванная поражением периферических нервов, аллергические заболевания; для диагностики и экспериментальных исследований.

Способ применения и дозы. Внутрикожно, подкожно и внутримышечно по 0,1—0,5 мл 0,1% раствора; для электрофореза 0,1% раствор препарата.

Побочное действие. При передозировке и повышенной чувствительности коллапс, шок.

Форма выпуска. Ампулы по 1 мл 0,1% раствора, в упаковке по 10 штук.

Условия хранения. В защищенном от света месте.

Срок годности 5 лет.

ГИСТИДИНА ГИДРОХЛОРИД (Histidini hydrochloridum). β-Имидазолил-этиламина гидрохлорид. Синонимы: Laristin, Stellidin.

Фармакологическое действие. Незаменимая аминокислота, превращающаяся в организме в процессе декарбоксилирования в гистамин.

Показания к применению. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, гепатит.

Отредактировал: ledi24

Способ применения и дозы. Внутримышечно по 5 мл 4% раствора в течение 25—30 дней (ежедневно), затем каждые 2—3 мес по 5—6 инъекций.

Форма выпуска. Ампулы по 5 мл 4% раствора, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. В защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

ГИСТОДИЛ (Histodil). Синонимы: Cimetidin, Tagamet, Belomet.

Фармакологическое действие. Антигистаминное средство. Препарат уменьшает секрецию хлористоводородной кислоты в желудке.

Показания к применению. Доброкачественная язва желудка и двенадцатиперстной кишки, рефлюкс-эзофагит, синдром Золлингера — Эллисона, неактивная фаза эрозивных желудочных геморрагий.

Способ применения и дозы. Назначают внутрь по 200 мг 3 раза в день во время еды и по 400 мг перед сном (1 г в день). Гистодил можно назначать внутримышечно или внутривенно. Вводить препарат следует медленно в дозе 200 мг (при необходимости инъекции повторяют через 4—6 ч).

Побочное действие. Головокружение, утомляемость, сыпь. Очень редки нефрит или острый панкреатит, проходящие при отмене препарата.

Противопоказания. Абсолютных противопоказаний нет. При беременности, в период лактации, при тяжелых заболеваниях печени, почек, кровообращения можно назначать лишь пониженные дозы с достаточной осмотрительностью.

Форма выпуска. Таблетки 200 мг, в упаковке 50 штук, ампулы по 2 мл 10% раствора, в упаковке 10 ампул.

Условия хранения. При комнатной температуре (15—25°С).

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Венгрии.

ГИФОТОЦИН (Hyphotocinum). Препарат гипофиза, максимально освобожденный от вазопрессина. Синоним: питуитрин М.

Фармакологическое действие. Оказывает окситоцическое действие.

Показания к применению. Слабая родовая деятельность, переношенная беременность, гипотонические послеродовые кровотечения; для нормализации инволюции матки после родов и аборта.

Способ применения и дозы. Внутримышечно в первом периоде родов по 0,2—0,4 мл 4—6 раз в день (через каждые 30 мин); во втором периоде родов до 1 мл или внутривенно капельно в 500 мл 5% раствора глюкозы или медленно в 40 мл 40% раствора.

Противопоказания. Несоответствие размеров головки плода и таза, рубцы и угрожающий разрыв матки, неправильное положение плода.

Форма выпуска. Ампулы по 1 мл (5 ЕД), в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

ГЛАУЦИНА ГИДРОХЛОРИД (Glaucini hydrochloridum). 4,5,7,8-Тетраметоксиапорфина гидрохлорид. Это алкалоид, выделенный из надземной части растения мачек желтый (Glaucinum flavum Grantz.). Синонимы: глаувент, Tussiglaucin.

Фармакологическое действие. Оказывает противокашлевое и гипотензивное действие. Не угнетает дыхание, не вызывает привыкания и пристрастия.

Отредактировал: ledi24

Показания к применению. Для успокоения кашля при заболеваниях легких и верхних дыхательных путей (бронхиты, пневмонии и др.). Особенно показан, если повышено АД.

Способ применения и дозы. Внутрь после еды по 0,05 г — 2—3 раза в день.

Побочное действие. Легкое кратковременное головокружение.

Противопоказания. Гипотония, инфаркт миокарда.

Форма выпуска. Таблетки, покрытые оболочкой, по 0,05 г, в упаковке 20 штук.

Условия хранения. Список Б. В темном сухом месте.

Срок годности 1 год.

ГЛИБУТИД (Glibutidum). 1-Бутилбигуанида гидрохлорид. Синонимы: адебит, силубин, буформин и др.

Фармакологическое действие. Гипогликемизирующее средство.

Показания к применению. Легкие формы сахарного диабета, сопровождающиеся ожирением, в сочетании с инсулином при инсулинорезистентных формах диабета, а также при резистентности к препаратам сульфомочевины; лабильное течение диабета.

Способ применения и дозы. Внутрь во время еды, начиная с 0,05—0,1 г/сут с последующим постепенным повышением дозы до 0,3 г. Поддерживающие дозы составляют 0,05—0,1 г утром и 0,05 г вечером. Доза препарата устанавливается врачом индивидуально под постоянным контролем за уровнем сахара в крови и моче.

Побочное действие. Потеря аппетита, тошнота, рвота, диарея, металлический вкус во рту, при длительном применении возможны слабость, похудание.

Противопоказания. Абсолютные показания к применению инсулина, отсутствие в организме эндогенного инсулина, коматозное состояние, ацидоз, инфекционные заболевания, альбуминурия на почве диабетической нефропатии, поражение печени, гангрена конечностей, беременность.

Форма выпуска. Таблетки по 0,05 г, в упаковке 50 штук.

Этот препарат под названием «Адебит» (Adebit) в таблетках по 0,05 г, в упаковке по 40 штук, поставляется из Венгрии.

Условия хранения. Список Б. В сухом месте.

Срок годности 3 года.

ГЛИВЕНОЛ (Glyvenol).

Фармакологическое действие. Синтетическое активное вещество, относится к классу глюкофуранозидов. Его специфическая роль — уменьшение проницаемости капилляров, а также выраженные противовоспалительные свойства. Он — антагонист целого ряда эндогенных веществ, обусловливающих процесс воспаления и возникновения боли, обладает антиаллергическим и антианафилактическим действием, усиливает защитные функции организма.

Показания к применению. Нарушения венозного кровообращения: ощущение усталости, напряжения и тяжести в ногах, отечность и болезненные явления после длительного стояния или сидения. Варикозное расширение вен: типичные симптомы заболевания, статические отеки, трофические поражения кожи, флебалгия. Геморрой. Дополнительное средство при флебите и перифлебите, варикозных язвах, застойных дерматозах.

Способ применения и дозы. Средняя суточная доза составляет 600—800 мг, то есть по 1 драже (200 мг) 3—4 раза в день или по 1 капсуле (400 мг) 2 раза в день. Драже и капсулы следует принимать во время либо после еды, не разжевывая, и не прерывать курса

Отредактировал: ledi24

в течение нескольких недель даже при исчезновении симптомов заболевания. Рекомендуется периодически повторять курс лечения при хронической нагрузке на нижние конечности, связанной с профессиональной деятельностью или работой по дому, особенно в теплое время года.

Побочное действие. Желудочно-кишечные расстройства и высыпания на коже. В последнем случае лучше отменить препарат и провести симптоматическое лечение.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к активному веществу гливенола.

Форма выпуска. Драже по 200 мг в упаковке по 20 и 100 штук; капсулы по 400 мг в упаковке по 20 и 100 штук.

Срок годности 5 лет.

Производитель — фирма «Сиба-Гейги», Швейцария.

ГЛИНА БЕЛАЯ (Bolus alba).

Применение. Как обволакивающее и адсорбирующее средство внутрь (10—100 г) при желудочно-кишечных заболеваниях (колика, энтериты); наружно в виде присыпок, мазей, паст при кожных заболеваниях.

Форма выпуска. Порошок.

Условия хранения. В хорошо укупоренной таре.

Срок годности не установлен.

ГЛИЦЕРИНОВЫЕ СУППОЗИТОРИИ РЕКТАЛЬНЫЕ (Suppositoria glicerini).

Применение. Как слабительное средство при запорах различной этиологии per rectum по 1 суппозиторию 1 раз в сутки через 15—20 мин после завтрака.

Побочное действие. При длительном применении неприятные ощущения в прямой кишке; иногда катаральный проктит.

Противопоказания. Трещины заднего прохода, обострение геморроя, опухоль прямой кишки.

Форма выпуска. Суппозитории в упаковке по 10 штук, содержащие глицерина по 2,46 г и (для детей) по 1,44.

Условия хранения. В прохладном месте.

Срок годности 2 года.

ГЛИЦЕРОФОСФАТ (Glycerophosphatum). Состав кальция глицерофосфата 10 частей, натрия глицерофосфата 2 части, сахара 88 частей.

Показания к применению. В качестве общеукрепляющего и тонизирующего средства при общем упадке питания, переутомлении, истощении нервной системы, рахите.

Способ применения и дозы. Внутрь по $^1/_2$—1 чайной ложке 2—3 раза в день.

Форма выпуска. Гранулы во флаконах по 100 г.

Условия хранения. В хорошо укупоренной таре.

Срок годности 5 лет.

ГЛИЦИРАМ (Glycyrramum). Монозамещенная аммонийная соль глицирризиновой кислоты, выделенной из корней солодки голой (Glycyrrhiza glabra L.).

Фармакологическое действие. Обладает противовоспалительными свойствами и оказывает стимулирующее влияние на кору надпочечников.

Отредактировал: ledi24

Показания к применению. Бронхиальная астма, аллергические дерматиты, экзема и другие заболевания.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,05—0,1 г 2—4 раза в день (за 30 мин до еды). Курс лечения от 2 нед до 6 мес. В тяжелых случаях разовая доза составляет 0,1 г 3—6 раз в день.

Противопоказания. Органические поражения сердца и нарушения функции печени и почек.

Форма выпуска. Таблетки по 0,05 г, в упаковке по 50 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

ГЛУДАНТАН (Gludantanum). Глюкуронил 1-аминоадамантана.

Фармакологическое действие. Дает лечебный эффект при паркинсонизме разной этиологии, в частности при нейролептическом и посттравматическом паркинсонизме.

Показания к применению. Различные формы паркинсонизма (особенно при нейролептическом и посттравматическом), а также в качестве корректора побочных эффектов, возникающих при применении нейролептических препаратов.

Способ применения и дозы. Внутрь при паркинсонизме по 0,2 г после еды 2—4 раза в день. Оптимальная суточная доза 0,8 г. Курс лечения 2—6 мес и более.

Побочное действие. Возможны изжога, тошнота, сухость во рту, головокружение, боль в области сердца, учащение сердцебиения, зуд кожи.

Противопоказания. Беременность, острые и хронические заболевания печени, почек и желудка.

Форма выпуска. Таблетки по 0,2 г, растворимые в кишечнике, в упаковке по 50 штук.

Условия хранения. Список Б. В сухом, защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

«ГЛУТАМЕВИТ» («Glutamevitum»). Состав: ретинола ацетата 0,001135 г (3300 МЕ), тиамина бромида 0,00258 г, рибофлавина 0,02 г, пиридоксина гидрохлорида 0,003 г, кислоты аскорбиновой 0,1 г, α-токоферола ацетата 0,02 г, никотинамида 0,02 г, кислоты фолиевой 0,00005 г, рутина 0,02 г, кальция пантотената 0,01 г, кислоты глутаминовой 0,25 г, железа сульфата закисного 0,01 г, меди сульфата 0,002 г, калия сульфата 0,0025 г, кальция фосфата 0,04 г.

Фармакологическое действие. Повышает работоспособность, резистентность организма и его адаптационные способности, положительно влияет на умственную работоспособность, уменьшает стрессовые реакции.

Показания к применению. Применяют в качестве лечебно-профилактического средства у взрослых, занятых тяжелым физическим трудом, при длительном умственном напряжении и интенсивных тренировках у спортсменов.

Способ применения и дозы. Внутрь через 15—30 мин после завтрака и обеда 2 раза в день. Разовая доза 1—3 таблетки, суточная — 2—6 таблеток. Для спортсменов 2—4 таблетки, при наиболее интенсивных нагрузках до 6 таблеток в день в течение 2—4 нед. Повторный курс назначают через 1—3 мес.

Форма выпуска. Таблетки, покрытые оболочкой, в упаковке по 30 штук.

Условия хранения. В сухом, защищенном от света месте при комнатной температуре.

Срок годности 2 года.

Отредактировал: ledi24

ГЛУТАМИНОВАЯ КИСЛОТА (Acidum glutaminicum). 2-Аминоглутаровая кислота.

Фармакологическое действие. Аминокислота, играющая важную роль в обмене веществ, особенно в белковом обмене.

Показания к применению. Заболевания центральной нервной системы, эпилепсия, психозы, реактивные состояния, сопровождающиеся депрессией, истощением и др.; в педиатрии при задержке развития, болезни Дауна, полиомиелите (острый и восстановительный период) и др.

Способ применения и дозы. Внутрь по 1 г 2—3 раза в день; детям 2—3 раза в день в зависимости от возраста: до 1 года по 0,1 г, от 1 года до 3 лет по 0,15 г, в возрасте 3—4 лет 0,25 г, 5—6 лет 0,4 г, 7—9 лет 0,5—1 г, 10 лет и старше 1 г на прием.

Побочное действие. Рвота, жидкий стул, возбуждение центральной нервной системы; при длительном применении возможны лейкопения, уменьшение содержания гемоглобина.

Противопоказания. Заболевания желудочно-кишечного тракта, кроветворных органов, повышенная возбудимость центральной нервной системы.

Форма выпуска. Порошок. Таблетки по 0,25 г, в упаковке по 40 штук, растворимые в кишечнике и покрытые оболочкой.

Условия хранения. В защищенном от света месте.

Срок годности. Порошок 5 лет, таблетки: покрытые оболочкой — 4 года, растворимые в кишечнике — 3 года.

ГЛЮГИЦИР РАСТВОР (Solutio Glugicirum). Состав в 1 л воды для инъекций натрия гидроцитрата (двузамещенного) 20 г и глюкозы 30 г (в пересчете на безводную).

Применение. Для консервирования крови.

Форма выпуска. Во флаконах по 10 мл; по 20 мл; по 50 мл; по 75 мл; по 100 мл.

Условия хранения. В защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

ГЛЮКОЗА (Glucosum). Синоним: дектроза, Dextrosum.

Фармакологическое действие. Источник легко усвояемого организмом ценного питания, повышающего энергетические запасы организма и улучшающего его функции.

Показания к применению. Гипогликемия, инфекционные заболевания, декомпенсация сердечной деятельности, заболевания печени, отек легких, геморрагические диатезы, шок, коллапс и др., а также для разведения сердечных гликозидов и пополнения организма жидкостью.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,5—1 г на прием; подкожно до 300—500 мл изотонического раствора; внутривенно (капельно) и в клизмах до 2 л изотонического раствора в сутки, внутривенно до 20—50 мл 40% раствора per se и с 1% раствором аскорбиновой кислоты; при отравлениях синильной кислотой с 1% раствором метиленового синего.

Форма выпуска. Порошок; таблетки по 0,5 г, в упаковке по 10 штук, по 1 г, в упаковке по 10 штук и по 50 штук; 5% раствор для инъекций во флаконах по 400 мл; 40% раствор в ампулах в упаковке по 10 штук по 10 мл и по 20 мл; во флаконах по 200 мл; 25% раствор по 20 мл; глюкоза 40% раствор с аскорбиновой кислотой 1% раствором по 20 мл в упаковке по 10 штук; 25% раствор с 1% раствором метиленового синего по 20 мл и по 50 мл в упаковке по 5 штук.

Отредактировал: ledi24

Срок годности. Порошок 5 лет, таблетки 4 года, растворы во флаконах 2 года, в ампулах 6 лет, с аскорбиновой кислотой 2 года, с метиленовым синим 10 лет.

ГЛЮРЕНОРМ (Glurenorm). 1-циклогексил-3-[(р-2-(3,4-дигидро-7-метокси-4,4-диметил-1,3-диоксо-2(1Н)-изохинолил]-этилфенилсульфонилмочевина. Синоним: гликвидон. Пероральный антидиабетический препарат.

Фармакологическое действие. Стимулирует секрецию инсулина бета-клетками островков Лангерганса поджелудочной железы. Быстродействующий препарат, назначаемый в тех случаях, когда регуляция углеводного обмена не достигается диетой, а инсулинпродуцирующие клетки способны к секреции инсулина.

Показания к применению. Сахарный диабет у больных среднего и пожилого возраста в тех случаях, когда назначение диеты недостаточно для того, чтобы обеспечить у них нормальный углеводный обмен; 95% препарата выделяется из организма через кишечник и 5% — через почки. Благоприятен при почечной недостаточности.

Способ применения и дозы. Глюренорм имеет широкий диапазон терапевтического действия: от $^1/_2$ таблетки (15 мг) до 4 таблеток (120 мг) в сутки. В обычных случаях средняя суточная доза составляет 45 мг в день. Суточная доза зависит от индивидуальных особенностей обмена у больных. Вместе с тем превышение суточной дозы в 4 таблетки (120 мг), как правило, не приводит к дальнейшему улучшению углеводного обмена. Суточные дозы глюренорма можно принимать однократно за завтраком либо делить на 2—3 приема в часы еды.

Противопоказания. Препарат не следует применять при диабете, сопровождающемся дефицитом инсулина, диабетической коме и прекоматозном состоянии, при выраженной декомпенсации обмена, сопровождающейся ацидозом и кетозом, при аллергии к сульфаниламидам, а также при беременности.

Побочные действия. В редких случаях могут наблюдаться гипогликемические реакции, аллергические кожные проявления, изменения картины крови или явления непереносимости со стороны желудочно-кишечного тракта.

Физическая нагрузка, потребление спиртных напитков, прием салицилатов, сульфаниламидов, бутадиона, противотуберкулезных препаратов, левомицетина, тетрациклинов, производных кумарина, ингибиторов МАО и бета-адреноблокаторов могут усилить гипогликемическое действие глюренорма. Напротив, пероральные контрацептивы, аминазин, симпатомиметики, кортикостероиды, гормоны щитовидной железы, никотиновая кислота ослабляют эффект препарата.

Форма выпуска. Таблетки по 30 мг, в упаковке 30 шт.

Условия хранения. Обычные.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Югославии, Германии и Индии.

«ГЛЮФЕРАЛ» ТАБЛЕТКИ (Tabulettae «Gluferalum»). В 1 таблетке содержится фенобарбитала 0,025 г, кофеин-бензоата натрия 0,005 г, бромизовала 0,07 г, глюконата кальция 0,2 г.

Фармакологическое действие. Противосудорожное средство.

Показания к применению. При эпилепсии и различных видах эпилептических абсансов (petit mal).

Способ применения и дозы. Внутрь после еды. Доза для взрос-

Отредактировал: ledi24

лых 2—4 таблетки на прием, максимальная суточная доза — 10 таблеток. Детям в зависимости от возраста — от $^1/_2$ до 1 таблетки на прием, максимальная суточная доза для детей до 10 лет — 5 таблеток. Прекращают прием таблеток постепенно, путем последовательного снижения дозы.

Побочное действие. В первые дни лечения — сонливость, при передозировке — головокружение, шаткость походки.

Форма выпуска. Таблетки, в упаковке 100 штук.

Условия хранения. Список Б. В сухом, защищенном от света месте.

Срок годности 5 лет.

ГОМАТРОПИНА ГИДРОБРОМИД (Homatropini hydrobromidum).

Тропинового эфира миндальной кислоты гидробромид.

Фармакологическое действие. Аналогичен атропину, но менее активен и действие его менее продолжительно.

Применение. В офтальмологии в виде 0,25—1% водных растворов для расширения зрачка и как средство, вызывающее паралич аккомодации (при исследовании глазного дна).

Побочное действие и противопоказания. Те же, что и при применении атропина сульфата.

Форма выпуска. Порошок, 0,25% раствор с метилцеллюлозой по 5 мл во флаконе (глазные капли) с приложением крышки-капельницы.

Условия хранения. Список А. В защищенном от света месте.

Срок годности. Порошок 5 лет, капли 3 года.

ГОНАДОТРОПИН ХОРИОНИЧЕСКИЙ (Gonadotropinum chorionicum).

Гормональный препарат, выделяемый из мочи беременных женщин. Синонимы: хориогонин, Gonabion.

Фармакологическое действие. Оказывает гонадостимулирующее (преимущественно лютеинизирующее) действие.

Показания к применению. Нарушения менструального цикла и бесплодие у женщин, связанные с отсутствием овуляции и недостаточностью желтого тела (при достаточной эстрогенной функции яичников); у мужчин — генетические нарушения с явлениями гипогенитализма, евнухоидизма; гипоплазия яичек, крипторхизм; адипозогенитальный синдром, гипофизарная карликовость с наличием полового инфантилизма и др.

Способ применения и дозы. Внутримышечно от 500 до 3000 ЕД ежедневно или 1—2 раза в неделю в зависимости от заболевания. Курс лечения от 5—6 дней до 6 нед.

Побочное действие. Аллергические реакции, чрезмерное увеличение яичек в паховом канале, что может препятствовать их дальнейшему опусканию.

Противопоказания. Воспалительные заболевания половой сферы, гормонально-активные опухоли половых желез, отсутствие половых желез (врожденное или после операции).

Форма выпуска. Во флаконах в упаковках по 3 штуки с приложением растворителя по 500 ЕД, 1000 ЕД, 1500 ЕД.

Условия хранения. В защищенном от света месте при температуре не выше 20°С.

Срок годности 2 года.

Отредактировал: ledi24

ГОНАДОТРОПИН МЕНОПАУЗНЫЙ (Gonadotropinum menopausalis).

Фармакологическое действие. Обладает свойствами гормона передней доли гипофиза фолликулостимулирующего действия: стимулирует рост яичников и созревание в них фолликулов.

Показания к применению. Бесплодие у женщин с гипофункцией яичников и ановуляторными циклами (первичная или вторичная аменорея центрального генеза, гипоменструальный синдром), синдром Шиена, синдром Киари — Фроммеля, бесплодие у мужчин эндокринного генеза (гипогонадотропный гипогонадизм, евнухоидизм).

Способ применения и дозы. Женщинам вводят внутримышечно по 75—150 ЕД в день (соответственно в 1 или 2 мл изотонического раствора хлорида натрия) в течение 10 дней или дольше. Мужчинам назначают 75 ЕД препарата в сочетании с гонадотропином хорионическим (1000—2000 ЕД). Оба препарата вводят внутримышечно через день на протяжении 90—120 дней.

Побочное действие. При чрезмерной стимуляции яичников их размеры могут увеличиться, при этом появляется боль в области таза и резко возрастает экскреция эстрогенов с мочой. У женщин, леченных гонадотропином менопаузным, возможна многоплодная беременность. При появлении симптомов гиперстимуляции яичников введение препарата прекращают.

Форма выпуска. Лиофилизированный порошок во флаконах по 75 ЕД в комплекте с растворителем.

Условия хранения. Список Б. В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 20°С.

Срок годности 2 года.

ГОРИЦВЕТА ВЕСЕННЕГО ТРАВА (Herba Adonidis vernalis). Адонис весенний, черногорка. Содержит сердечные гликозиды — К-строфантин-β, цимарин, адонитоксин; флавоновый гликозид адонивернит; сапонины.

Фармакологическое действие. Кардиотоническое средство. Сравнительно с препаратами наперстянки по систолическому и диастолическому эффекту менее активна, слабее действует на тонус блуждающего нерва.

Показания к применению. Хроническая недостаточность кровообращения (легкие формы).

Способ применения и дозы. В виде настоя (4,0 : 200,0—6 : 200,0) по 1 столовой ложке 3—4 раза в день до еды. Высшие дозы из расчета на сухую траву: разовая 1 г, суточная 5 г.

Форма выпуска. Резаная трава, экстракт горицвета сухой (Extractum Adonidis vernalis siccum) 100 г для приготовления настоя (4,0 : 200,0—6,0 : 200,0) в стеклянных банках.

Условия хранения. Список Б. Трава резаная в хорошо укупоренных банках или жестянках.

Срок годности. Активность проверяется ежегодно.

ГОРЦА ПОЧЕЧУЙНОГО ТРАВА (ПОЧЕЧУЙНАЯ ТРАВА) (Herba Polygoni persicariae). Содержит флавоноиды, гликозиды (гиперозид, авикулярин, кверцитрин), дубильные вещества, аскорбиновую кислоту, витамин К.

Применение. Как мягкое слабительное средство при атонических и спастических запорах и кровоостанавливающее при геморроидальных и маточных кровотечениях в виде настоя (10,0 : 200,0) по 1 столовой ложке 3 раза в день.

Форма выпуска. Трава резаная в картонных коробках по 100 г.

Отредактировал: ledi24

Условия хранения. В сухом проветриваемом помещении.
Срок годности 2 года.

ГОРЦА ПТИЧЬЕГО ТРАВА (трава спорыша) (Herba Polygoni avicularis). Содержит флавоноловые гликозиды — кверцетин, гиперозид, авикулярин; дубильные вещества.

Применение. В качестве противовоспалительного, способствующего отхождению конкрементов средства при камнях в почках и мочевом пузыре в виде настоя (10,0 : 200,0—15,0 : 200,0) по 2 столовые ложки 3 раза в день перед едой.

Форма выпуска. В упаковке по 100 г.
Условия хранения. В сухом прохладном месте.
Срок годности 3 года.

ГОРЧИЧНИКИ (Charta sinapis). Листы бумаги размером 8×12,5 см, покрытые обезжиренным порошком сарептской горчицы.

Фармакологическое действие. Раздражающее и отвлекающее средство.

Применение. В качестве раздражающего кожу и отвлекающего средства.

Форма выпуска. В упаковке по 10 штук.
Условия хранения. В сухом месте.
Срок годности 1 год.

ГОССИПОЛ (Gossipolum). [2-2-Ди(1,6,7-триокси-3-метил-5 изопропил-8-альдегидонафтил] — продукт, получаемый при переработке хлопчатника.

Фармакологическое действие. Обладает активностью в отношении различных штаммов вирусов, в том числе дерматотропных штаммов вируса герпеса.

Показания к применению. Опоясывающий лишай, простой пузырчатый лишай и псориаз.

Способ применения и дозы. Линимент госсипола наносят тонким слоем на пораженный участок кожи 4—6 раз в сутки. Лечение продолжается 5—7 дней.

Форма выпуска. В виде 3% линимента в банках оранжевого стекла по 20 г.
Условия хранения. В прохладном, защищенном от света месте.
Срок годности 2 года.

ГРАВИМУН (Gravimun). Препарат, содержащий лиофилизированную антисыворотку с антителами по отношению к человеческому хорионическому гонадотропину. Синонимы: Gravitest.

Показания к применению. Как иммунологический тест in vitro для выявления беременности, основанный на реакции торможения гемагглютинации.

Способ применения и дозы. Две ампулы с препаратом помещают в специальную подставку на твердой основе и добавляют в них по 0,2 мл утренней профильтрованной мочи. В одну ампулу вносят 0,4 мл раствора антисыворотки, в другую — 0,4 мл контрольного раствора; ампулы встряхивают в течение 1 мин и оставляют на 1 мин. Проба положительна, если на дне ампулы образуется ясное клеточное кольцо.

Форма выпуска. В ампулах по 5 мл с приложением контрольного раствора с подставкой для ампул.
Условия хранения. В прохладном месте.
Срок годности 1 год.
Поставляется из Германии.

Отредактировал: ledi24

ГРАМИЦИДИН С (Gramicidinum C). Продуцируется споровой палочкой Bacillus brevis, var. G—B. Синоним: Gramoderm.

Фармакологическое действие. Оказывает бактериостатическое и бактерицидное действие в отношении стрептококков, стафилококков, пневмококков, возбудителей анаэробной инфекции и других микробов.

Показания к применению. Поверхностные нагноительные процессы, инфицированные раны, язвенные поражения кожи, эрозия шейки матки, воспалительные заболевания уха, горла.

Способ применения и дозы. Только местно: промывания, орошения, повязки, тампоны. Содержимое ампулы разводят 1:100 в стерильной дистиллированной или кипяченой питьевой воде.

Форма выпуска. Ампулы по 5 мл 2% раствора; таблетки защечные 0,0015 г (1500 ЕД) по 10 штук в упаковке.

Условия хранения. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности. Ампулы 10 лет; флаконы 5 лет.

ГРАМИЦИДИНОВАЯ ПАСТА (Pasta gramicidini). Состав: 2% раствор грамицидина С 98,9 г, кислоты молочной 40% до получения пасты pH 3,5—4,5, эмульгатора № 1 150 г, воды дистиллированной до 1000 г.

Фармакологическое действие. Оказывает бактериостатическое и бактерицидное действие в отношении различной микрофлоры. Даже в слабых концентрациях убивает сперматозоиды. Устойчив к действию тканевых ферментов.

Показания к применению. Как контрацептивное средство, а также при воспалительных заболеваниях влагалища и шейки матки, свежих ожогах I и II степени, ожогах II и III степени в стадии грануляции, гнойных ранах мягких тканей, пиодермии.

Способ применения и дозы. Пасту наносят шпателем на стерильную марлевую салфетку, которую кладут на раневую поверхность; повязки меняют через 2—4 дня. В качестве контрацептивного средства 5—6 г препарата специальным шприцем вводят во влагалище.

Побочное действие. Небольшая болезненность в случае попадания препарата на ожоговую поверхность, лишенную эпителия.

Форма выпуска. Тубы по 30 г.

Условия хранения. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 1 год.

ГРАМУРИН (Gramurinum). Синоним: Acidum oxolinicum. Одна таблетка содержит 0,25 г оксолиновой кислоты.

Фармакологическое действие. Грамурин — химиотерапевтическое средство широкого спектра действия, обладающее антибактериальной активностью.

Показания к применению. Цистит, пиелонефрит, пиелит, пиелоцистит, бактериурия, профилактика инфекций при диагностическом вмешательстве (катетеризация, цистоскопия).

Способ применения и дозы. Назначают внутрь взрослым и детям старше 12 лет по 2 таблетки 3 раза в день, детям от 2 до 12 лет — по 1 таблетке 3 раза в день непосредственно после еды в течение 10 дней. Длительность лечения — не более 12 дней.

Противопоказания. Препарат не назначают беременным и детям до 2-летнего возраста.

Примечание. Больным, страдающим эпилепсией, а также при недостаточности функции печени и почек препарат следует назначать после проведения функциональных проб в уменьшенной дозе и с осторожностью.

Форма выпуска. Таблетки по 0,25 г, в упаковке 42 штуки.

Отредактировал: ledi24

Условия хранения. Обычные.
Срок годности 5 лет.
Поставляется из Венгрии.

ГРАНДАКСИН (Grandaxinum). 1-(3,4-Диметоксифенил)-5-этил-7,8-диметокси-4-метил-5Н-2,3-бензодиазепин. Синоним: Tofisopam.

Фармакологическое действие. По механизму действия препарат занимает промежуточное положение между малыми транквилизаторами и психостимуляторами, являясь психовегетативным регулятором. Не влияет на способность умственной концентрации и работоспособность, не обладает миорелаксирующим и кардиодепрессивным свойством.

Показания к применению. Заболевания, сопровождающиеся вегетативными расстройствами, напряжением: в малой психиатрии — при реактивной депрессии, апатии; при синдроме алкогольной абстиненции, при предделириозном и делириозном состоянии для лечения симптомов возбуждения и вегетативных расстройств.

Способ применения и дозы. Курсовое лечение по 1—2 таблетки 1—3 раза в день (0,05—0,3 г), в остальных случаях по 1—2 таблетки на прием.

Побочное действие. Нарушение функции желудочно-кишечного тракта, зуд, экзантема. При появлении экзантемы лечение отменяют.

С осторожностью назначают водителям транспорта и лицам, работающим на высоте.

Противопоказания. Не рекомендуется применять в первые 3 мес беременности.

Форма выпуска. Таблетки по 0,05 г, в упаковке 20 штук.
Условия хранения. Обычные.
Срок годности 5 лет.
Поставляется из Венгрии.

ГРИЗЕОФУЛЬВИН (Griseofulvinum). 7-Хлор-2′,4,6-триметокси-6′-метилгризен-2′-дион-3,4′. Синонимы: Biogrisin, Gricin.

Фармакологическое действие. Обладает фунгистатической активностью по отношению к разным видам дерматофитов (трихофитоны, микроспориумы, ахорионы, эпидермофитоны).

Показания к применению. Фавус, трихофития и микроспория волосистой части головы и гладкой кожи, эпидермофития гладкой кожи, онихомикозы, вызванные патогенными грибами, чувствительными к гризеофульвину.

Способ применения и дозы. Внутрь во время еды по 0,125 г 4 раза в день. При микроспории волосистой части головы доза может быть увеличена на 0,125—0,25 г. Дозы для детей уменьшают в соответствии с возрастом, и препарат назначают в виде суспензии внутрь перед едой по 1 чайной ложке или десертной ложке 2—4 раза в день. Линимент наносят тонким слоем на очаги поражения. Суточная доза не более 30 г. Лечение следует продолжать не менее 2 нед. после исчезновения клинических симптомов.

Побочное действие. Возможны головная боль, головокружение, дезориентация, тошнота, крапивница, эозинофилия, лейкопения, очень редко лейкоцитоз.

Противопоказания. Лейкопения, системные заболевания крови, органические заболевания печени и почек, порфириновая болезнь, злокачественные новообразования, беременность. Не следует назначать препарат амбулаторно водителям транспорта, летчикам, лицам, занятым на высотных работах.

Форма выпуска. Таблетки по 0,125 г, в упаковке по 10 штук,

Отредактировал: ledi24

суспензия (в 1 мл 0,015 г гризеофульвина) во флаконах по 100 г, порошок, 2,5% линимент по 30 г в банке темного стекла.

Условия хранения. Список Б. В сухом месте.

Срок годности. Порошок 4 года, таблетки $3^1/_2$ года, линимент 2 года, суспензия $1^1/_2$ года.

ГРУДНОЙ ЭЛИКСИР (ЛАКРИЧНЫЙ) (Elixir pectorale seu elixir cum extracto Glycyrrhizae). Состав: экстракта солодкового корня густого 20,7 г, масла эфирного анисового 0,34 г, аммиака водного 3,44 г, спирта этилового 20,41 мл, воды дистиллированной до 100 мл.

Применение. В качестве отхаркивающего средства при кашле по 20—40 капель на прием; детям на прием столько капель, сколько ребенку лет.

Форма выпуска. Во флаконах по 25 г.

Условия хранения. При комнатной температуре.

Срок годности 3 года.

ГУМИЗОЛЬ (Humisolum). Препарат морской (хаапсалуской) лечебной грязи.

Фармакологическое действие. Биогенный стимулятор.

Показания к применению. Хронические и подострые радикулиты, плекситы, невралгия, ревматический артрит (неактивная форма), инфекционный неспецифический полиартрит, артроз, хронические заболевания среднего уха, околоносовых пазух, фарингиты, риниты и др.

Способ применения и дозы. Внутримышечно по 1—2 мл 1 раз в день. Курс лечения 20—30 дней. Детям по 1 мл в течение 20—25 дней. При пародонтозе препарат можно применять методом электрофореза (15—20 сеансов через день).

Противопоказания. Острые лихорадочные заболевания, декомпенсированный порок сердца, выраженный атеросклероз и тиреотоксикоз, активная форма туберкулеза, нарушения функции печени и почек, опухоли, психозы.

Форма выпуска. Ампулы по 1 мл, в упаковке по 10 штук, по 2 мл, в упаковке по 10 штук, по 10 мл, в упаковке 10 штук для электрофореза.

Условия хранения. В защищенном от света месте.

Срок годности 1 год.

ГУТТАЛАКС (Guttalax). Сильнодействующее слабительное средство. Содержит двунатриевую соль 4,4-(2-пиколиден)-бисфенил серной кислоты 75 мг, метиловый эфир пара-оксибензойной кислоты 14 мг, 70% раствор сорбита 5 мл, деминерализованной воды до 10 мл.

Фармакологическое действие. Оказывает сильное и быстрое слабительное действие путем прямого стимулирования толстой кишки. Проходит желудок без изменений, не всасывается в тонком кишечнике, выделяется со стулом. Не вызывает привыкания.

Показания к применению. Все виды запоров, как атонические, так и спастические (особенно при запорах, связанных с диетой, неподвижностью, беременностью, чрезмерным весом и т. д.). Используется для облегчения опорожнения кишок у больных, страдающих геморроем, анальными трещинами, в послеоперационном периоде.

Способ применения и дозы. Взрослым назначают от 5 до 10 капель в небольшом количестве воды. При стойком запоре дозу можно увеличить до 15 капель и более. Детям от 2 до 12 лет рекомендуется от 2 до 5 капель в небольшом количестве воды. Гутталакс можно применять

Отредактировал: ledi24

в любое время суток (утром или перед сном). Эффект наступает через 6—10 часов.

Побочное действие. Отсутствует.

Противопоказания. Противопоказан при остром животе. Не рекомендуется назначать во время беременности.

Форма выпуска. Флакон, содержащий 10 мл препарата.

Условия хранения. В защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

Поставляется из Чехо-Словакии.

ДАКТИНОМИЦИН (Dactinomycinum). Синоним: актиномицин D. Антибиотик из группы актиномицинов.

Фармакологическое действие. Противоопухолевое средство.

Показания к применению. Хорионэпителиома матки, опухоль Вильмса, рабдомиосаркома, ретикулосаркома, саркома Юинга, лимфогранулематоз, тератобластома яичка, меланобластома.

Способ применения и дозы. Вводят внутривенно. Взрослым по 0,0005 г ежедневно в течение 5 дней или по 0,0005 г через день в течение 2—3 нед. Детям вводят из расчета 0,000015 г/кг. Повторные курсы лечения проводят через 2—3 нед при отсутствии токсических явлений.

Побочное действие. Тошнота, рвота, повышение температуры, стоматит, боль в животе, кожная эритема, алопеция, лейкопения, тромбоцитопения, панцитопения.

Противопоказания. Общее тяжелое состояние, лейкопения и тромбоцитопения, беременность, нарушение функции почек и печени.

Форма выпуска. 0,05% раствор (в реополиглюкине) для инъекций в ампулах по 1 мл.

Условия хранения. Список А. В защищенном от света месте при температуре не выше 10° С.

Срок годности 2 года.

ДАЛАРГИН (Dalargin). Гексапептид-тирозил-Д-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинин. Синтетический аналог эккефалинов, биологически активных веществ из класса эндогенных опиоподобных пептидов, оказывающих влияние практически на все функции органов пищеварительного тракта.

Фармакологическое действие. Предотвращает развитие дистрофических и атрофических изменений в слизистой желудочно-кишечного тракта и усиливает ее регенерацию, выделение защитных компонентов слизи желудка, снижает секрецию соляной кислоты, нормализует микроциркуляцию и лимфоток в зоне повреждения. Обладает антистрессорным действием, снижая уровень АКТГ и кортикостероидов в крови и тканях.

Показания к применению. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.

Способ применения и дозы. Вводят препарат внутривенно или внутримышечно по 1 мг, предварительно растворив в 1 мл изотонического раствора натрия хлорида. Курсовая доза составляет 30—50 мг. При необходимости разовая доза может быть увеличена до 2 мг, а суточная — до 5 мг.

Побочное действие. Возможно понижение артериального давления.

Противопоказания. Беременность, склонность к гипотонии.

Форма выпуска. Лиофилизированный порошок во флаконах или ампулах по 0,001 г в упаковке по 10 штук.

ДАЛАЦИН-Ц (Dalacin-C). Антибактериальный препарат для лечения смешанных инфекций. Синоним: клиндамицин.

Отредактировал: ledi24

Фармакологическое действие. Обладает широким спектром антимикробного действия, включающего аэробную и анаэробную микробную флору, смешанные инфекции.

Показания к применению. Тонзилитт, синусит, скарлатина, бронхит, пневмония, эмпиема, абсцесс легкого, фурункулы, абсцессы, раны кожи и мягких тканей, остеомиелит, септический артрит, эндометрит, тубоовариальные абсцессы, воспалительные заболевания органов малого таза (в том числе вызываемые зламидиями), перитонит, внутрибрюшной сепсис, септицимия, эндокардит, абсцесс периодонта, периодонтит.

Способ применения и дозы. В капсулах препарат назначается взрослым по 150—450 мг каждые 6 часов. Детям старше одного месяца назначают по 8—25 мг/кг в сутки в 3—4 приема в равных долях. Детям весом менее 10 кг назначают по 37,5 мг 3 раза в сутки (минимальная доза). При инфекциях, вызванных бета-гемолитическим стрептококком, лечение проводят как минимум 10 дней. Стерильный ампульный раствор клиндамицина взрослым при тяжелых инфекциях инфузируется в количестве 2400—2700 мг в сутки в 2—4 приема в равных дозах. Менее сложные инфекции лечат клиндамицином в дозах 1200—1800 мг в 3—4 введения в равных дозах. Не рекомендуется вводить препарат внутримышечно в разовой дозе более 600 мг. Новорожденным назначают из расчета 15—20 мг/кг в сутки в 3—4 введения, детям старше одного месяца — 20—40 мг/кг.

За один час инфузии не следует вводить более 1200 мг препарата мг/кг/сутки за 3—4 введения. Концентрация препарата в инфузионном растворе не должна быть больше 12 мг/мл, а темп 30 мг/мин.

Побочное действие. Боль в животе, тошнота, рвота, диаррея, эзофагит, гиперчувствительность (макулопапулярная сыпь, анафилактоидные реакции), желтуха, аномальные печеночные функциональные пробы, вагинит, дерматит, лейкопения и эозинофилия, тромбоцитопения, агранулоцитоз, нарушения сердечно-легочной деятельности, гипотония. При внутримышечном введении — местное раздражение, боль и формирование абсцессов; при внутривенном — тромбофлебит.

Противопоказания. Гиперчувствительность к клиндамицину или линкомицину. Не следует применять при менингите, с осторожностью назначают при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, печени и почек, беременности, в периоде кормления грудью. Препарат не сочетается с эритромицином, блокаторами нервно-мышечной проводимости, барбитуратами, ампициллином эуфиллином.

Форма выпуска. Далацин в капсулах (клиндамицина гидрохлорид) по 150 мг во флаконах по 16 штук и стерильный раствор (клиндамицина фосфат) в ампулах 15% по 2 мл в упаковке 10 штук.

Условия хранения. При комнатной температуре в темном месте.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Югославии и США.

ДАМИЛЕНА МАЛЕИНАТ (Damileni maleinas). 5(γ-Диметиламинопропилиден)-10,11-дигидро-дибензоциклогептана маленнат. Синонимы: триптизол, Amitriptylini maleas.

Фармакологическое действие. Антидепрессант с тимоаналептическим и седативным действием. Обладает холинолитическим свойством.

Показания к применению. Депрессивные и тревожно-депрессивные состояния различной этиологии (маниакально-депрессивный психоз, шизофрения, сенильные и инволюционные депрессии, невротические депрессивные реакции и другие формы депрессии).

Способ применения и дозы. Внутрь, после еды. Дозировка строго

Отредактировал: ledi24

индивидуальна. Средняя суточная доза 0,15—0,3 г, максимальная 0,45 г. Средняя разовая доза 0,05—0,1 г. В начале лечения обычно принимают 0,05 г 3 раза в день. Курс лечения зависит от течения депрессивного состояния и может продолжаться 1 год.

Побочное действие. Сухость во рту, расстройства аккомодации, мелкий тремор пальцев рук, лица, сонливость, головокружение, диспептические расстройства, дизартрия, нарушение сердечного ритма, тахикардия, задержка мочеиспускания, которые уменьшаются при снижении доз.

Противопоказания. Глаукома, аденома предстательной железы, атония мочевого пузыря. При назначении препарата после лечения больного ингибиторами моноаминоксидазы необходим перерыв не менее 2 нед.

Форма выпуска. Капсулы по 0,05 г в упаковке по 100 штук.

Этот препарат под названием «Амитриптилин» поставляется из Чехо-Словакии (в упаковке 100 таблеток), а под названием «Триптизол» из Югославии (в упаковке 100 таблеток).

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

ДАНОВАЛ (Danoval). Антигонадотропный препарат. Синоним: даназол.

Фармакологическое действие. Обладает способностью подавлять выделение гипофизарных гонадотропных гормонов ЛГ и ФСГ у мужчин и женщин. Действие препарата обратимо, и, таким образом, после прекращения его приема восстанавливается нормальная гормональная функция. Дановал лишен эстрогенного или прогестеронового действия, но при более высоких дозировках проявляет слабую, заторможенную андрогенную активность с сопутствующими анаболическими свойствами.

Показания к применению. Лечение эндометриоза с сопутствующим бесплодием, доброкачественных новообразований молочной железы (например, фиброкистозного мастита), первичной менорragии, предменструального синдрома, первичного преждевременного полового созревания, гинекомастии и других аналогичных эндокринных нарушений, при которых подавление секреции гипофизарных гонадотропных гормонов ЛГ и ФСГ будет иметь терапевтическое значение. Препарат также используется при лечении наследственного ангионевротического отека.

Способ применения и дозы. Для *взрослых* обычная дозировка от 200 до 800 мг в день, разделенная на 2—4 приема. При эндометриозе рекомендуется начальная дозировка 400 мг в день. Затем эту дозировку по мере необходимости можно увеличивать или уменьшать; продолжительность лечения составляет 6 месяцев и только в отдельных случаях прием препарата длится дольше. При заболеваниях молочной железы доброкачественного характера целесообразно принимать по 300 мг в течение 3—6 месяцев. При первичной менорragии и предменструальном синдроме эффективной признана дозировка 100—400 мг в день. При гинекомастии у мужчин ежедневная доза от 200 до 600 мг. При наследственном ангионевротическом отеке начальная дозировка — 600 мг в день с последующим снижением до 200 мг.

Для *детей* единственное показание при назначении препарата — преждевременное половое созревание, причем ежедневная дозировка зависит от возраста и состояния больного и колеблется в пределах от 100 до 400 мг.

Дановал нельзя принимать во время беременности из-за возмож-

Отредактировал: ledi24

ного андрогенного воздействия на плод. В процессе лечения важны периодический контроль активности ферментов печени, внимательное наблюдение за больными, страдающими тяжелыми формами сердечной и почечной недостаточности, сахарным диабетом. Следует соблюдать осторожность, имея дело с больными, которые принимают противосудорожные препараты и антикоагулянты, ибо дановал усиливает их действие.

Побочное действие. Угри, сальные волосы, сальная кожа, задержка жидкости, незначительный гирсутизм, приливы крови к лицу и приступы обильного потоотделения, уменьшение размера молочных желез. Огрубление тембра голоса. Тошнота, головокружение, эмоциональная лабильность, спазмы скелетных мышц, головная боль, сыпь, выпадение волос.

Противопоказания. Беременность, кормление грудью и порфирия.

Форма выпуска. Капсулы по 100 и 200 мг — 100 штук в упаковке.

Условия хранения. В сухом прохладном месте.

Срок годности 3 года.

Производится фирмой «КРКА», Словения в сотрудничестве с фирмой «Sterling-Winthrop Group Ltd.», Великобритания.

ДАТИСКАН (Datiscanum). Представляет смесь флавоноидов, основным компонентом которой является гликозид датисцин (3 рутинозид-3,5,7,2-тетраоксифлавона). Получают из травы датиски конопле-вой.

Фармакологическое действие. Спазмолитик.

Показания к применению. Заболевания желудочно-кишечного тракта, сопровождающиеся спазмом гладкой мускулатуры.

Способ применения и дозы. Внутрь за 15 мин до еды по 0,05—0,1 г 2—3 раза в день ежедневно в течение 10—20 дней.

Побочное действие. Аллергические реакции, головная боль, тошнота, боль в животе, понос.

Противопоказания. Индивидуальная непереносимость препарата.

Форма выпуска. Таблетки по 0,05 г, в упаковке 50 штук.

Условия хранения. В сухом, защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

ДЕВЯСИЛА КОРНЕВИЩЕ И КОРЕНЬ (Rhizoma et radix inulae). Содержит эфирное масло (1—3%), в состав которого входят сесквитерпеновые лактоны, инулин, смолы.

Применение. В качестве отхаркивающего и дезинфицирующего средства при заболеваниях верхних дыхательных путей в виде отвара (10,0 : 100,0) по 1 столовой ложке 3 раза в день.

Форма выпуска. В упаковке по 100 г, круглые брикеты по 5 г, в упаковке 6 штук.

Условия хранения. В сухом прохладном месте.

Срок годности не установлен.

ДЕГМИН (Degminum). Производное гексаметиленимина и высокомолекулярных спиртов.

Фармакологическое действие. Антисептик, оказывающий бактерицидное действие на грамположительные и грамотрицательные бактерии.

Применение. Для обработки рук хирурга и операционного поля. Ватные тампоны массой 1,5—2 г или поролоновые губки размером 6×4×2 см помещают в стеклянную, фарфоровую или эмалированную посуду (по 2 на каждого обрабатываемого) и заливают 1% водным раствором препарата (25 мл на тампон). Руки хирурга и операционное поле обрабатывают двумя тампонами (губками) по 3 мин каждым. После обработки раствором руки протирают насухо стерильным полотен-

Отредактировал: ledi24

цем и надевают стерильные перчатки. Если руки сильно загрязнены, их предварительно моют теплой водой с мылом (без щеток!) в течение 2—3 мин и тщательно ополаскивают от мыла.

Форма выпуска. Порошок.

Условия хранения. Рабочие растворы и препарат можно хранить в закрытой стеклянной, фарфоровой или эмалированной посуде не более года.

Срок годности 3 года.

ДЕГМИЦИД (Degmicidum). Жидкость, содержащая 30% дегмина.

Фармакологическое действие. Антисептик.

Применение. Для обработки рук хирурга и операционного поля в разведении 1 : 30 (на сырой питьевой воде) по той же методике, что и дегмин.

Форма выпуска. Во флаконах по 500 г.

Условия хранения. В хорошо укупоренной таре. Рабочий раствор может быть использован в течение 30 дней.

Срок годности 3 года.

ДЕЗАМИНООКСИТОЦИН (Desaminooxytocinum). Амид-β-меркаптопропионил-(L-тирозил-L-изолейцил-L-глутаминил-L-аспарагинил-L-цистеинил-L-пропил-L-лейцил-L-глицина). Синонимы: сандопарт, дезокситоцин.

Фармакологическое действие. Оказывает возбуждающее действие на гладкую мускулатуру матки, сокращает миоэпителиальные клетки молочной железы.

Показания к применению. В акушерстве и гинекологии для возбуждения и усиления родовой деятельности при ее первичной и вторичной слабости, для ускорения инволюции матки в послеродовом периоде и для стимуляции лактации.

Способ применения и дозы. Трансбуккально (за щеку). Таблетку закладывают за щеку попеременно с левой и правой стороны и держат во рту (не разжевывая и не проглатывая) до полного рассасывания. Рекомендуется применять таблетки повторно с промежутками 30 мин. Максимальная суммарная доза 500 ЕД (10 таблеток), в редких случаях 900 ЕД и больше. При отсутствии эффекта применение препарата повторяют через 24 ч. Для стимуляции лактации со 2-го по 6-й день послеродового периода по 25—50 ЕД ($^1/_2$—1 таблетка) за 5 мин до кормления ребенка 2—4 раза в сутки.

Противопоказания. Несоответствие размеров таза и плода, угрожающие разрывы матки, аномалия положения плода, слишком сильные схватки, после операции кесарева сечения и других операций на матке.

Форма выпуска. Таблетки, содержащие 50 ЕД, в упаковке по 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°С.

Срок годности 2 года.

ДЕЗОКСИКОРТИКОСТЕРОНА АЦЕТАТ (Desoxycorticosteroni acetas). Прегнен-4-ол-21-диона-3,20-ацетат. Синонимы: DOKCA, Decorton, Percorten.

Фармакологическое действие. Минералокортикостероид. Обладает свойствами гормона коры надпочечников.

Показания к применению. Болезнь Аддисона и временное понижение функции коры надпочечников (гипокортицизм); миастения, астения, аднинамия, общая мышечная слабость, гипохлоремия и др.

Способ применения и дозы. Внутримышечно от 0,005 г 3 раза в

Отредактировал: ledi24

неделю до 0,01 г ежедневно, при острой недостаточности коры надпочечников 4 раза в сутки. Высшие дозы внутримышечно для взрослых: разовая 0,01 г, суточная 0,025 г. Сублингвально по 2,5—5 мг ежедневно или через день.

Побочное действие. При передозировке отеки, повышение АД.

Противопоказания. Гипертоническая болезнь, сердечная недостаточность с отеками, атеросклероз, стенокардия, нефрит, цирроз печени.

Форма выпуска. Таблетки для сублингвального применения по 0,005 г, в упаковке 50 штук, ампулы по 1 мл 0,5% раствора в масле, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности. Таблетки и ампулы 5 лет.

ДЕЗОКСИКОРТИКОСТЕРОНА ТРИМЕТИЛАЦЕТАТ (Desoxycorticosteroni trimethylacetas). Прегнин-4-ол-21-диона триметилацетат. Синоним: Percorten-M.

Фармакологическое действие. Обладает минералокортикоидной активностью, задерживает в организме натрий и воду, усиливает выделение калия, повышает АД и благоприятно влияет на мышечный тонус.

Показания к применению. Болезнь Аддисона, относительная недостаточность коры надпочечников, диэнцефально-гипофизарная недостаточность (синдром Шихена, болезнь Симмондса), гипотонический синдром, астеническое состояние с гипотонией после инфекционных болезней или операций.

Способ применения и дозы. Внутримышечно 2,5% водную суспензию по 1 мл 1 раз в 2 нед. (под контролем АД и содержания калия и хлоридов в крови).

Противопоказания. Гипертония, сердечная недостаточность с застойными явлениями, заболевания почек с недостаточностью функции, цирроз печени.

Форма выпуска. 2,5% водная суспензия в ампулах по 1 мл, в упаковке по 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте, не допускается замораживание.

Срок годности 2 года.

ДЕЗОКСИПЕГАНИНА ГИДРОХЛОРИД (Desoxypeganini hydrochloridum). (2-3-Триметилен-3,4-дигидрохиназолина гидрохлорид).

Фармакологическое действие. Ингибитор холинэстеразы. Способствует восстановлению нервно-мышечной проводимости, нарушенной антидеполяризующими миорелаксантами. Повышает тонус гладкой мускулатуры и усиливает саливацию.

Показания к применению. Поражения периферической нервной системы (мононевриты, невриты, полиневриты) различной этиологии, заболевания с поражением передних рогов спинного мозга, последствия нарушения мозгового кровообращения (гемиплегии, гемипарезы), миастения и миопатоподобные синдромы различного генеза.

Способ применения и дозы. Вводят под кожу 1% водный раствор. Разовая доза для взрослых 0,01—0,02 г (1—2 мл 1% раствора). Суточная доза 0,05—0,1 г. Продолжительность курса 4—6 нед. в зависимости от эффекта.

Побочное действие. Брадикардия, слюнотечение, умеренная боль в конечностях, в первые минуты введения — ощущение жара и головокружение.

Противопоказания. Бронхиальная астма, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, стенокардия, эпилепсия, гиперкинезы, высокое АД.

Отредактировал: ledi24

Форма выпуска. В ампулах 1% раствор по 2 мл, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список А.

Срок годности 2 года.

ДЕЗОКСИРИБОНУКЛЕАЗА (Desoxyribonucleasa). Фермент, содержащийся в поджелудочной железе и слизистой оболочке кишечника. Синоним: Dornavac.

Фармакологическое действие. Разжижает гной, задерживает развитие вирусов (герпес, аденовирусы и другие вирусы, содержащие дезоксирибонуклеиновую кислоту).

Показания к применению. Герпетические кератиты и кератоувеиты, аденовирусные конъюнктивиты и кератиты, острые катары верхних дыхательных путей аденовирусной природы, необходимость уменьшения вязкости и улучшения эвакуации мокроты и гноя при бронхоэктатической болезни, абсцессах легких, ателектазах, пневмонии; в пред- и послеоперационном периоде больным с гнойными заболеваниями и туберкулезом легких назначают препарат в виде 0,2% раствора (2 мг в 1 мл) на изотоническом растворе хлорида натрия.

Способ применения и дозы. При заболеваниях глаз вводят под конъюнктиву ежедневно по 0,5 мл в течение 2—4 нед. или закапывают в глаз по 2—3 капли 0,2% раствора 3—4 раза в день или по 1—2 капли 0,05% раствора через $1^1/_2$—2 ч в течение дня. При острых катарах верхних дыхательных путей раствор закапывают в нос или применяют в виде аэрозоля; ингаляции по 10—15 мин назначают 2—3 раза в течение 2—5 дней (на ингаляцию применяют 3 мл 0,2% раствора). При заболеваниях легких вводят 3 мл раствора в дыхательные пути в виде аэрозоля (1 мл в течение 10—15 мин) 3 раза в день в течение 7—8 дней.

Побочное действие. Возможны аллергические реакции.

Форма выпуска. Во флаконах, содержащих 25 мг; 1 мг соответствует 5 единицам активности (ЕА).

Условия хранения. В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 20°С.

Срок годности 2 года.

«ДЕКАМЕВИТ» («Decamevitum»). Комбинированный препарат, содержащий (из расчета на одну таблетку) ретинола ацетата 0,002 г (6600 МЕ), токоферола ацетата 0,01 г, тиамина бромида 0,00258 г, рибофлавина 0,01 г, пиридоксина 0,02 г, фолиевой кислоты 0,002 г, рутина 0,02 г, метионина 0,2 г, цианокобаламина 0,0001 г, аскорбиновой кислоты 0,2 г, никотинамида 0,05 г.

Применение. Как лечебное средство при гиповитаминозах и авитаминозах, для улучшения обмена веществ в пожилом и старческом возрасте, при умственном и физическом истощении, при нарушении сна и аппетита, при умеренно выраженном атеросклерозе и гипертонической болезни, а также в период выздоровления после тяжелых заболеваний и при лечении антибиотиками и химиотерапевтическими средствами. Назначают по 1 таблетке декамевита 1—2 раза в день после еды. Курс лечения (20 дней), через 2—3 мес может быть повторен.

Форма выпуска. Таблетки, покрытые оболочкой, в упаковке по 20 штук.

Условия хранения. В прохладном сухом, защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

Отредактировал: ledi24

ДЕКАМИН (Decaminum). 1,10-Декаметилен-бис-(4-аминохинальдиний-хлорид). Синонимы: Decadin, Gargilon.

Фармакологическое действие. Обладает антибактериальной и противогрибковой активностью.

Показания к применению. Молочница рта, кандидозы кожи, ногтевых валиков и ногтей, эпидермофития стоп; воспалительные процессы в полости рта и глотке.

Способ применения и дозы. Местно. При грибковых заболеваниях кожи 0,5—1% мазь; при воспалительных заболеваниях полости рта и глотки и молочнице рта 1—2 карамели держат во рту (под языком или за щекой) до полного рассасывания, применяют через 3—5 ч; при тяжелых инфекциях через 2 ч.

Форма выпуска. Карамель по 0,00015 г, в упаковке по 100 г, мазь в упаковке по 30 г 0,5% и 1%.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности. Порошок 2 года, карамель 1 год, мазь 2 года.

ДЕКАРИС (Decaris). 2,3,5,6-Тетрагидро-6-фенилимидазо-(2,1,6)-тиазола гидрохлорид. Синонимы: Ascaridil, Ketrax.

Фармакологическое действие. Высокоэффективное противогельминтное средство широкого спектра действия. Однократный прием препарата специфически подавляет гликолиз у гельминтов, вызывая паралич мускулатуры и гибель паразитов.

Показания к применению. Аскаридоз, анкилостомоз, некатороз, стронгилоидоз, трихостронгилез, трихоцефалез, энтеробиоз. Декарис пригоден для изгнания тех глистов, которые удерживаются в организме хозяина при помощи своей мышечной деятельности, но неприменим для изгнания тех видов паразитов, которые прочно фиксированы на слизистой оболочке кишечника, а также для изгнания ленточных червей и большинства сосальщиков.

Способ применения и дозы. Назначают внутрь однократно после ужина перед сном взрослым по 0,15 г. Детям дозы устанавливают из расчета 2,5 мг/кг массы тела.

Побочное действие. Декарис хорошо переносится больными. В отдельных случаях возможны боль в животе, тошнота, рвота, понос, которые имеют умеренный характер и, как правило, не требуют медикаментозного лечения.

Противопоказания. Необходима осторожность при назначении беременным.

Форма выпуска. Таблетки по 0,15 г, в упаковке 1 штука и по 0,05 г, в упаковке 2 штуки.

Условия хранения. Список Б. В сухом месте при температуре 15—25°С.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Венгрии.

ДЕКСАМЕТАЗОН (Dexamethazonum). 9α-Фтор-16α-метилпреднизолон. Синонимы: гаммакортен, дексазон.

Фармакологическое действие. Обладает противовоспалительным и антиаллергическим свойством. Тормозит высвобождение АКТГ, мало влияет на уровень АД и водно-солевой обмен (в 35 раз активнее кортизона и в 7 раз активнее преднизона).

Показания к применению. Аддисонова болезнь, острый и подострый тиреоидит, гипотериоз, прогрессирующая офтальмопатия, связанная с тиреотоксикозом; некоторые гематобластозы (лейкоз, лимфосаркома и др.), аллергические заболевания (бронхиальная астма, сывороточная болезнь, дерматиты и др.), ревматизм, инфекционно-аллергиче-

Отредактировал: ledi24

ский полиартрит, заболевания соединительной ткани, аутоиммунные гемолитические анемии, тромбоцитопения, аплазия и гипоплазия кроветворения, агранулоцитоз. Применяют также для проведения пробы при дифференциальной диагностике гиперплазии и опухолей коры надпочечников.

Способ применения и дозы. Внутрь во время еды и после еды по 0,0005—0,001 г в день (в 2—3 приема). Суточная доза 0,002—0,003 г, в тяжелых случаях до 0,004—0,006 г.

В тяжелых случаях недостаточности надпочечников, шоковом и бессознательном состоянии вводят внутримышечно или внутривенно дексаметазон фосфат в виде натриевой соли в ампулах по 1 мл, содержащих 0,004 г препарата.

Побочное действие. Повышение АД, тахикардия, усиление белкового обмена с отрицательным азотистым балансом, возбуждение, бессонница и другие нарушения со стороны центральной нервной системы.

Противопоказания. Тяжелые формы гипертонической болезни и болезни Иценко — Кушинга, беременность, острый эндокардит, психозы, нефрит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, сифилис, активная форма туберкулеза, сахарный диабет

Форма выпуска. Таблетки по 0,0005 г, в упаковке 50 штук. Препарат для инъекций поставляется из Югославии, в упаковке 5 ампул.

Условия хранения. Список Б. В сухом, защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

ДЕКСАМЕТАЗОН-ОФТАН (Dexamethazon-oftan). Состав: дексаметазон-21-фосфат натрия 0,001 г, поливиниловый спирт 0,014 г, бензалкония хлорид 0,0002 г, натрия цитрат, натрия пиросульфид в необходимых количествах как стабилизатор, вода стерильная до 1 мл.

Фармакологическое действие. Основное действующее вещество препарата — дексаметазон, дающий выраженный противовоспалительный и антиаллергический эффект.

Показания к применению. Аллергические конъюнктивиты, кератоконъюнктивиты, кератиты, ириты, иридоциклиты, травмы, а также в восстановительный период после операции на роговице.

Способ применения и дозы. В виде глазных капель по 1—2 капли через 1—2 ч, затем 4—6 раз в сутки.

Побочное действие. Длительное применение может вызвать повышение внутриглазного давления, а при истончении роговой оболочки возможно ее прободение. В очень редких случаях может наблюдаться распространение Herpes simplex.

Противопоказания. Гнойные поражения глаз.

Форма выпуска. Во флаконах по 5 мл 0,1% раствора, 5 мл соответствуют 5 мг основного действующего вещества.

Условия хранения. В защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

Поставляется из Финляндии

ДЕКСОНА (Dexona). Комбинированный препарат, содержащий в 1 мл 0,1% дексаметазона фосфата натрия, 0,5% неомицина сульфата и 0,02% бензалкониума хлорида.

Фармакологическое действие. Оказывает противовоспалительное и антибактериальное действие.

Показания к применению. Блефарит, конъюнктивит, легкий и ост-

Отредактировал: ledi24

рый ирит, иридоциклит, инфекционные заболевания глаз, поверхностный и глубокий кератит, отит, опоясывающий лишай.

Способ применения и дозы. Закапывать одну или две капли раствора в глаза или уши каждый час в течение дня и каждые два часа в течение ночи.

Противопоказания. Туберкулезное поражение глаз, острый лишай симплекс, вирусные инфекции роговой и слизистой оболочек глаз, ветряная оспа. Острые гнойные инфекции слизистой оболочки и век глаз, вызванные стойкими к неомицину микроорганизмами. Глазные и ушные грибковые инфекции, перфорация барабанной перепонки, повышенная чувствительность к одному из составляющих препарат компонентов.

Форма выпуска. Раствор во флаконах по 5 мл.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

Поставляется из Индии.

ДЕЛАГИЛ (Delagil). 4-(1-Метил-4-диэтиламинобутиламино)-7-хлор-хинолина дифосфат. Синонимы: Chingamin, Chlorochin, Resochin.

Фармакологическое действие. Активен в отношении бесполых эритроцитарных форм всех видов плазмодиев малярии; оказывает угнетающее влияние на синтез нуклеиновых кислот, на активность некоторых ферментов и иммунные процессы.

Показания к применению. Различные формы малярии, коллагенозы, инфекционный неспецифический полиартрит, болезнь Бехтерева и др.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,25 г 1—2 раза в день, внутримышечно и внутривенно по 10—20 мл 5% раствора.

Побочное действие. Возможны тошнота, рвота, головокружение, шум в ушах, нарушение аккомодации, понижение остроты зрения, боль в животе, умеренная лейкопения. Быстрое внутривенное введение может вызвать коллапс.

Противопоказания. Нарушение функции печени и почек, выраженные поражения сердца с нарушением ритма.

Форма выпуска. Таблетки по 0,25 г, в упаковке 30 штук, ампулы по 5 мл 5% раствора, в упаковке 5 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Венгрии.

ДЕ-НОЛ (De-nol). Высушенный коллоидный раствор субцитрата висмута, включающий 120 мг окиси висмута в одной таблетке.

Фармакологическое действие. Под воздействием соляной кислоты в желудке препарат тонкой пленкой покрывает участки язвенного поражения слизистой, обеспечивая ее защиту.

Показания к применению. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.

Способ применения и дозы. По 2 таблетки в день за полчаса до завтрака и обеда в течение 4—8 недель.

Противопоказания. Тяжелые нарушения функции почек.

Побочное действие. Продолжительный прием больших доз препарата не рекомендуется, так как известны случаи возвратной энцефалопатии. Не следует одновременно использовать другие препараты висмута или употреблять алкоголь. Де-нол может вызывать снижение абсорбции тетрациклинов. Не следует за 0,5 часа до приема и 0,5 часа спустя употреблять молоко.

Форма выпуска. 112 таблеток в упаковке.

Условия хранения. Обычные.

Отредактировал: ledi24

Срок годности 5 лет
Поставляется из Голландии.

«ДЕНТА» КАПЛИ (Guttae «Denta»). Зубные капли. Состав: хлоралгидрата 33,3 г, камфоры 33,3 г, спирта этилового 95% до 100 мл.

Применение. Как болеутоляющее средство при зубной боли по 2—3 капли на ватке на больной зуб.

Форма выпуска. Во флаконах по 5 мл.

Условия хранения. Список Б. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 4 года.

«ДЕПЕРЗОЛОН» («Depersolon»). 21-(Дезокси-N-метил-N′-пиперазинил)-преднизолона гидрохлорид.

Фармакологическое действие. Противовоспалительное, антиаллергическое и противозудное средство.

Применение. При аллергических заболеваниях кожи, экземе, острых и хронических дерматитах наружно в виде 0,25% мази, 1—3 раза в день тонким слоем наносят на пораженные участки кожи.

Форма выпуска. Мазь 0,25% в упаковке по 10 г

Условия хранения. В прохладном месте.

Срок годности 2 года.

Поставляется из Венгрии.

ДЕПОСТАТ (Depostat). Синоним: Primostat.

Фармакологическое действие. Пролонгированный гестаген.

Показания к применению. Показан для консервативной терапии при аденоме предстательной железы и некоторых заболеваниях матки и молочных желез.

Способ применения и дозы. Вводят только внутримышечно 0,2 г (1 ампула) 1 раз в неделю, при недостаточной эффективности дозу можно удвоить (0,4 г). Назначают препарат мужчинам в течение 2—3 мес. При лечении аденомы предстательной железы контролируют функцию мочевого пузыря и почек. У женщин при хроническом течении болезни курс лечения проводят непрерывно в течение длительного времени.

Побочное действие. Возможны кашель, одышка, нарушение кровообращения.

Противопоказания. Герпес у беременных.

Форма выпуска. 5 шприц-ампул по 2 мл в упаковке.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Финляндии.

«ДЕРМАЗИН» МАЗЬ (Unguentum «Dermazin»). Синоним: Flamazine.

Фармакологическое действие. Химиотерапевтическое средство для местного применения. Действие мази определяется содержащимся в ней сульфадиазином серебра (1%).

Показания к применению. Дезинфицирует ожоговые раны, предотвращает процесс некротизации в глубину и ускоряет ранозаживление.

Лечебный эффект определяется способностью действующей субстанции мази пропитывать некротические массы и экссудат с постепенным освобождением серебра в концентрации, безвредной для неповрежденной ткани и токсичной для микробной клетки. Эта способность особенно ценна, поскольку антибиотики при их общем назначении не воздействуют на зону некроза ввиду исключения ее из системы кровообращения.

Отредактировал: ledi24

Способ применения и дозы. Мазь наносят на ожоговую поверхность слоем 2—4 мм 2 раза в сутки с последующим наложением стерильной и фиксирующей повязки. При необходимости число ежедневных аппликаций может быть увеличено.

Противопоказания. Не назначают недоношенным и новорожденным детям. Беременным препарат назначают только в тех случаях, когда площадь ожога превышает 20% всей площади тела и жизни больной угрожает реальная опасность. Мази назначают с осторожностью больным с повышенной чувствительностью к сульфаниламидным препаратам (особенно при сопутствующих заболеваниях печени и почек).

Форма выпуска. Тубы, содержащие 50 г мази.

Условия хранения. В сухом прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

Поставляется из Югославии.

ДЕРМАТОЛ (Dermatolum). Висмута галлат основной.

Применение. В качестве вяжущего, антисептического и подсушивающего средства, наружно при воспалительных заболеваниях кожи, слизистых оболочек (язвы, экземы, дерматиты) в виде присыпок, мазей, свечей.

Форма выпуска. Порошок.

Условия хранения. В защищенном от света месте.

Срок годности не ограничен.

ДЕРМАТОП (Dermatop). Состав: 1 г каждой лекарственной формы содержит 2,5 мг Prednicarbata.

Показания к применению. Экзема острая и хроническая, атопическая экзема (нейродермит, эндогенная экзема), псориаз, ожог первой степени.

Способ применения и дозы. Препарат наносится тонким слоем на пораженные участки кожи 1 или 2 раза в день, если это возможно — осторожно втирается. Композиции, содержащие дерматоп, не рекомендуется применять непрерывно больше 4 недель, особенно при беременности и в отношении маленьких детей. Когда дерматоп наносится на лицо, надо следить, чтобы мазь не попадала в глаза.

Побочное действие. В отдельных случаях местные реакции раздражения кожи — покраснение, жжение. Побочные эффекты, такие, как атрофия кожи, телангиэктазии или вызываемые стероидами угри, у больных, подвергавшихся лечению дерматопом, не отмечались.

Противопоказания. Специфические заболевания кожи — туберкулез, сифилис, varicella, реакции вакцинации, грибковые и бактериальные инфекции кожи, периоральные дерматиты.

Форма выпуска. Мазь, жировая мазь, крем — в тубах.

Срок годности 3 года.

Производится фирмой «Hoechst», Германия.

«ДЕРМОЗОЛОН» («Dermosolon»). Состав: преднизолона 0,025 г, 5-хлор-7-йод-8-оксихинолина 0,15 г, мазевой основы 5 г.

Применение. Как противовоспалительное и антимикробное средство при заболеваниях кожи (экземы, дисгидроз, язвы голени и др.) наружно.

Форма выпуска. В тубах по 5 г.

Условия хранения. В прохладном месте.

Срок годности 2 года.

Поставляется из Венгрии.

Отредактировал: ledi24

ДЕСФЕРАЛ (Desferal). Дефероксамин β-метансульфонат.

Фармакологическое действие. Способствует выведению из организма избытка железа почками.

Показания к применению. Гемохроматоз, острые отравления соединениями железа; для диагностических целей (определение патологического отложения железа).

Способ применения и дозы. Внутримышечно и внутривенно (капельно) по 500—1000 мг ежедневно.

Побочное действие. Возможны кожные высыпания, при быстром внутривенном введении — коллапс, при длительном введении — помутнение хрусталика.

Противопоказания. Беременность.

Форма выпуска. Жидкая субстанция во флаконах в пересчете на десферал 500 мг, в упаковке 10 штук.

Срок годности 4 года.

ДЕТИЦЕН (Deticen). Противоопухолевое цитостатическое средство, структурный аналог 5-амино-4-имидазол-карбоксамида. Флакон — ампула для инъекций содержит: декарбазин — 100 мг, лимонная кислота — 100 мг, маннитол — Н50 мг. Синоним: декарбазин.

Фармакологическое действие. Декарбазин сам по себе активностью не обладает, однако после N-деметелирования микросомами печени высвобождает диазометан, являющийся алкилирующим веществом, и главный метаболит —5-амино-4-имидазол-карбоксамид. Имеет двойной механизм противоопухолевого действия: подавляет синтез ДНК, подобно антиметаболитам, и присоединяется к уже сформировавшейся ДНК, подобно алкилирующим средствам.

Показания к применению. Самостоятельно может быть применен для лечения злокачественной меланомы и в комбинированной терапии по другим показаниям (например, при лечении ходжкиновой и неходжкиновой лимфомы).

Способ применения и дозы. В монотерапии препарат применяется циклами по 5—6 дней из расчета от 150 до 250 мг/м^2 в сутки с интервалами в 21 день между циклами, считая от последнего дня назначения. В комбинированной терапии препарат, как правило, назначают циклами по 4—5 дней из расчета 100 мг/м^2 сутки с интервалами в 21 день между циклами, считая от последнего дня назначения. Готовить раствор на одну дозу и использовать в течение 8 часов для хранения при температуре +20°С и в течение 72 часов в случае хранения при +4°С.

Побочное действие. Зависимая от дозы гранулоцитопения и тромбоцитопения; нарушения пищеварения (анорексия, тошнота, рвота, запоры), аменорея, азооспермия; астения, головные и мышечные боли, повышение температуры, боли в месте инъекции.

Противопоказания. Беременность и период кормления грудью.

Форма выпуска. 10 флаконов по 0,1 г с прилагаемым растворителем.

Условия хранения. В темном прохладном месте.

Срок годности 3 года.

Поставляется из Японии и Финляндии (фирма «Лейрас»).

ДЕТСКАЯ ПРИСЫПКА (Aspersio puerilis). Состав: крахмала 10 г, цинка окиси 10 г, талька 80 г.

Применение. Наружно при заболеваниях кожи.

Форма выпуска. В упаковке по 50 г.

Условия хранения. В сухом месте.

Срок годности 5 лет.

Отредактировал: ledi24

ДИАЗОЛИН (Diazolinum). 3-Метил-9-бензил-1,2,3,4-тетрагидрокарболина нафталин-1,5-дисульфонат.

Фармакологическое действие. Противогистаминный препарат.

Показания к применению. Различные аллергические заболевания.

Способ применения и дозы. Внутрь после еды по 0,05—0,2 г 1—2 раза в день; детям по 0,02—0,05 г 1—3 раза в день. Высшая разовая доза 0,3 г, суточная —0,6 г.

Побочные действия. Возможно раздражение слизистой оболочки желудка.

Противопоказания. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта.

Форма выпуска. Драже по 0,1 г, в упаковке 20 штук; драже по 0,05 г, в упаковке 20 штук; порошок.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности $3^1/_2$ года.

ДИАКАРБ (Diakarb). 2-Ацетиламино-1,3,4-тиазол-5-сульфамид. Синонимы: Diamox, Fonurit.

Фармакологическое действие. Активное диуретическое средство, подавляющее активность карбоангидразы.

Показания к применению. Отеки сердечного происхождения, нефрозы, циррозы печени, глаукома (для понижения внутриглазного давления), эпилепсия.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,125—0,25 г 1—3 раза в день.

Побочное действие. При длительном применении сонливость, парестезии в конечностях, которые исчезают при уменьшении дозы или отмене препарата.

Противопоказания. Болезнь Аддисона, повышенное выделение из организма ионов натрия и калия, склонность к ацидозу, острые заболевания печени и почек.

Форма выпуска. Таблетки по 0,25 г в упаковке по 24 штуки.

Условия хранения. В сухом месте.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Польши.

ДИАНЕ (Diane). Содержит 2 мг ципротеронацетата и 0,05 мг этинилэстрадиола. (В диане-35 последнего —0,035 мг.)

Фармакологическое действие. Антиандрогенный гормональный препарат.

Показания к применению. Явления андрогенизации у женщин (акне, себорея, легкие формы андрогенетической алопеции, гирсутизм), предупреждение беременности у женщин с явлениями андрогенизации.

Способ применения и дозы. Во время первого цикла лечения ежедневно принимают по 1 драже с 5-го по 25-й день менструального цикла, считая 1-й день менструации первым днем цикла. Затем после 5-дневного перерыва, во время которого появляется кровотечение, начинают принимать следующую упаковку (21 драже) препарата.

Побочное действие. Чувство давления в груди, боли в желудке, тошнота, головные боли, изменения веса тела и полового влечения, депрессивные состояния, хлоазма, промежуточные кровотечения. Сильные головные боли (мигрени), острые нарушения зрения, первые симптомы тромбофлебита или тромбоэмболических явлений, запланированные операции, длительная иммобилизация (в результате травмы и т. д.), появление желтухи, сильное увеличение артериального давления, беременность являются основанием для немедленной отмены препарата.

Противопоказания. Беременность, кормление грудью, поражения

Отредактировал: ledi24

печени, идиопатическая желтуха или тяжелый кожный зуд при беременности в анамнезе, синдромы Дубин-Джонсона и Ратара, рак грудной железы или эндометрия (даже после лечения), нарушения жирового обмена, пузырчатый дерматоз при беременности в анамнезе, отосклероз с ухудшением в ходе предшествовавших беременностей. Барбитураты, рифампицин, противоэпилептические средства снижают эффективность диане. Препарат, в свою очередь, может менять потребность в противодиабетических средствах.

Форма выпуска. Упаковка содержит 21 драже.

Поставляется из Индии.

«ДИАФЕИН» («Diapheinum»). Состав: **анальгина** 0,25 г, **амидопирина** 0,25 г, **кофеина-бензоата натрия** 0,05 г, **фенобарбитала** 0,02 г.

Применение. Как обезболивающее средство по 1 таблетке 2—3 раза в день.

Форма выпуска. Таблетки в упаковке по 6 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

ДИАФЕНИЛСУЛЬФОН (Diaphenylsulfonum). 4,4′-Диаминодифенилсульфон. Синонимы: Avlosulfon, Dapsone.

Фармакологическое действие. Оказывает антибактериальное действие. Активен в отношении различных бактерий, особенно микобактерий туберкулеза и лепры.

Показания к применению. Лепра, герпетиформный дерматит Дюринга.

Способ применения и дозы. Внутрь по ,05—0,1 г 2 раза в день. Лечение длительное, по специальной схеме.

Побочное действие. Общая слабость, понижение аппетита, диспептические явления, головокружение, головная боль, сердцебиение, боль в области сердца. В отдельных случаях цианоз, токсический гепатит, гипохромная анемия.

Противопоказания. Стойкие тяжелые нарушения функции печени и почек, заболевания органов кроветворения, декомпенсация сердечно-сосудистой системы, острые заболевания желудочно-кишечного тракта, органические заболевания нервной системы.

При применении диафенилсульфона противопоказан прием амидопирина и барбитуратов.

Форма выпуска. Порошок, таблетки по 0,05 г в упаковке по 300 г.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности. Порошок 5 лет, таблетки 3 года.

ДИБАЗОЛ (Dibazolum). 2-Бензилбензимидазола гидрохлорид. Синоним: Bendazoli Hydrochloridum.

Фармакологическое действие. Сосудорасширяющее, спазмолитическое и гипотензивное средство.

Показания к применению. Заболевания, сопровождающиеся спазмами кровеносных сосудов (стенокардия, гипертонический криз), гладкой мускулатуры внутренних органов (язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, спазмы желудочно-кишечного тракта); остаточные явления полиомиелита и др.

Способ применения и дозы. Внутрь per se и в комплексе с папаверином, теобромином, фенобарбиталом по 0,02 г 2—3 раза в день; подкожно 1—5 мл 1% раствора.

Побочное действие. В качестве гипотензивного средства с осторожностью следует назначать лицам пожилого возраста.

Отредактировал: ledi24

Форма выпуска. Порошок, таблетки в упаковке по 10 штук по 0,004 г с риской и по 0,02 г; ампулы 1% раствора, в упаковке 10 штук по 1 мл и по 5 мл; сложные таблетки следующего состава:

Дибазола	0,02 г	0,02 г	0,02 г
Теобромина	0,25 г	0,25 г	0,25 г
Папаверина гидрохлорида	—	—	0,02 г
Фенобарбитала	0,02 г	—	0,02 г
	№ 10	№ 10	№ 10

Условия хранения. Список Б.

Срок годности. Порошок 5 лет, таблетки и ампулы 3 года, сложные таблетки 4 года.

ДИБУНОЛ (Dibunolum). 2-6 Ди-трет-бутил-4-метилфенол. Синонимы: нонол, бутилокситолуол.

Фармакологическое действие. Ингибитор свободно-радикальных реакций, обладает свойствами антиоксиданта. Ингибирует синтез РНК. Обладает противоопухолевой активностью.

Показания к применению. Рак и папилломатоз мочевого пузыря в предоперационный период в комбинации с лучевой терапией опухолей мочевого пузыря, поздние лучевые повреждения мочевого пузыря, циститы, ожоги любой этиологии, незаживающие трофические и лучевые язвы, плохо рубцующиеся послеоперационные и травматические язвы.

Способ применения и дозы. В виде внутрипузырных инстилляций (10% линимент), при заболеваниях мочевого пузыря и наружно (5% линимент) при ожогах, ранах, язвах. Для внутрипузырного введения 10 г 10% линимента дибунола разводят 25—30 мл 0,25—1% раствора новокаина до консистенции, пригодной для внутрипузырного введения. Полученный раствор шприцем по катетеру вводят в предварительно опорожненный мочевой пузырь. Больной должен удержать дибунол в мочевом пузыре в течение 2—3 ч. Инстилляции проводят ежедневно в течение 10—15 дней, для противоопухолевого эффекта — не менее 25 дней.

При ожогах 5% линимент наносят тонким слоем на рану или повязку. Повязку меняют ежедневно или через день. Курс лечения 7—10 дней.

При лечении трофических и лучевых язв курс лечения 20—30 сут.

Побочное действие. Уретриты, простатиты, орхиэпидидимиты, возникающие в связи с многократной катетеризацией (препарат отменяют). При наружном применении — аллергические реакции, влажные некрозы.

Противопоказания. Рак мочевого пузыря при значительном прорастании опухоли в перивезикальную клетчатку и наличие метастазов (стадия Т4), массивная гематурия, азотемия, острый пиелонефрит, пузырно-мочеточниковый рефлюкс. Необходима осторожность при расположении опухоли в шейке мочевого пузыря.

Форма выпуска. В виде 5% линимента в банках по 25 г и в виде 10% линимента в тубах по 12 г.

Условия хранения. В прохладном, защищенном от света месте. Банки должны быть плотно закрытыми.

Срок годности 2 года.

Отредактировал: ledi24

ДИВАСКАН (Divaskan). Одна таблетка содержит 0,0025 г ипреназона.

Показания к применению. С профилактической целью при следующих формах мигрени: мигрень офтальмическая (классическая), мигрень с сопутствующим симптомом тошноты и других вегетативных расстройств, мигрень с ведущим симптомом головокружения.

Способ применения и дозы. Средняя доза для взрослых 1—2 таблетки 3 раза в день. Продолжительность лечения 6 мес.

Противопоказания. Беременность.

Форма выпуска. Таблетки по 0,0025 г, в упаковке 60 штук.

Условия хранения. Хранить в темном месте.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Германии.

ДИГАЛЕН-НЕО (Digalen Neo). Новогаленовый препарат, получаемый из листьев наперстянки ржавой (Digitalis ferruginea L.).

Фармакологическое действие. Кардиотоническое средство; усиливает систолу, увеличивает диастолу, урежает ритм сердечных сокращений.

Показания к применению. Хроническая недостаточность кровообращения I—III стадии, тахиаритмическая форма мерцания предсердий.

Способ применения и дозы. Внутрь преимущественно при легких формах сердечной недостаточности по 10—15 капель 2—3 раза в день.

Высшие дозы для взрослых внутрь: разовая 0,65 мл (20 капель), суточная 1,95 мл (60 капель).

Побочное действие. Следует учитывать индивидуально повышенную чувствительность и опасность кумулятивного эффекта.

Противопоказания. Выраженная брадикардия, полная атриовентрикулярная блокада, учащение приступов стенокардии.

Форма выпуска. Во флаконах (1 мл —5,4—6,6 ЛЕД или 0,9—1,1 КЕД) по 15 мл.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности контролируется ежегодно.

ДИГИДРОТАХИСТЕРОЛ (Dihydrotachisterolum). Синонимы: тахистин, антитанил.

Фармакологическое действие. Регулирует обмен кальция и фосфора, увеличивает абсорбцию кальция в кишечнике и экскрецию фосфора с мочой.

Показания к применению. Гипопаратиреоз (послеоперационный и идиопатический) и другие заболевания, сопровождающиеся нарушением фосфорно-кальциевого обмена, в том числе гипокальциемические судороги, тетания, спазмофилия, аллергические кожные реакции и др.

Способ применения и дозы. Внутрь после еды по 20 капель 3 раза в день ежедневно, в тяжелых случаях при устойчивом снижении содержания кальция в крови по 30 капель 3 раза в день. Суточная доза составляет 60—90 капель. Дозы подбирают индивидуально в зависимости от состояния больного и содержания кальция и фосфора в крови.

Побочное действие. Возможна тошнота.

Противопоказания. Повышенное содержание кальция в крови.

Форма выпуска. 0,1% раствор в масле во флаконах по 10 мл.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

ДИГИДРОЭРГОТАМИН (Dihydroergotamin). В медицинской практике применяют дигидроэрготамина метансульфонат. Синонимы: Diergotan, Dihydroergotamini Mesylas.

Отредактировал: ledi24

Фармакологическое действие. Антиадренергическое средство; понижает сосудистый тонус.

Показания к применению. Мигрень, коронароспазм, болезнь Рейно.

Способ применения и дозы. Внутрь по 10—20 капель в $^1/_2$ стакана воды 1—3 раза в день.

Побочное действие. При повышенной чувствительности диспептические явления.

Противопоказания. Выраженный атеросклероз, гипотония, органические поражения сердца, инфаркт миокарда, нарушения функции почек, старческий возраст.

Форма выпуска. Во флаконах по 10 мл 0,2% раствора.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности 3 года.

Поставляется из Чехо-Словакии.

ДИГИДРОЭРГОТОКСИН (Dihydroergotoxin). В медицинской практике применяют дигидроэрготоксина этансульфонат.

Фармакологическое действие. Антиадренергическое средство. Понижает АД и расширяет кровеносные сосуды.

Показания к применению. Гипертоническая болезнь, эндартериит, болезнь Рейно, мигрень, спазмы сосудов сетчатки.

Способ применения и дозы. Внутрь по 5 капель 2—3 раза в день. При необходимости дозу увеличивают до 20—40 капель 3 раза в день.

Побочное действие и противопоказания те же, что и для дигидроэрготамина.

Форма выпуска. Во флаконах по 10 мл.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

Поставляется из Германии.

ДИГИТОКСИН (Digitoxin). Гликозид, получаемый из различных видов наперстянки (Digitalis purpurea L., Digitalis Lanata Ehrh. и др.).

Фармакологическое действие. Оказывает сильное кардиотоническое действие, увеличивает силу сокращения мышцы сердца, уменьшает частоту сердечных сокращений; обладает выраженными кумулятивными свойствами, быстро всасывается из желудочно-кишечного тракта.

Показания к применению. Хроническая сердечная недостаточность с нарушением кровообращения II и III стадии.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,1 мг и per rectum по 0,15 мг 1—2 раза в день. Высшая разовая доза 0,5 мг, суточная 1 мг.

Побочное действие и противопоказания те же, что и для других препаратов наперстянки.

Форма выпуска. Таблетки по 0,0001 г, в упаковке 10 штук, суппозитории ректальные по 0,00015 г, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список А. В защищенном от света месте.

Срок годности. Таблетки 3 года, суппозитории 2 года.

ДИГОКСИН (Digoxinum). Сердечный гликозид, содержащийся в листьях наперстянки шерстистой (Digitalis Lanata Ehrh.).

Фармакологическое действие. Оказывает выраженное действие на систолу и диастолу, замедляет сердечный ритм, обладает диуретическим свойством, быстро выводится из организма, меньше кумулирует, чем дигитоксин.

Показания к применению. Недостаточность кровообращения I—III стадии. Для подготовки к операции и родам больных с заболеванием сердца.

Отредактировал: ledi24

Способ применения и дозы. Внутрь в таблетках в 1-й день в суточной дозе 1—1,25 мг (4—5 таблеток), на 2-й день в той же дозе или ее уменьшают до 0,75 мг (3 таблетки), на 3-й день 0,75 мг/сут. Внутривенно медленно по 0,25—0,5 мг в 10—20 мл 5%, 20%, 40% раствора глюкозы или изотонического раствора хлорида натрия.

Побочное действие. Тошнота, рвота, потеря аппетита, тахикардия, бигеминия.

Противопоказания. Выраженная брадикардия, полная атриовентрикулярная блокада, учащение приступов стенокардии, свежий инфаркт миокарда.

Форма выпуска. Таблетки в упаковке по 50 штук по 0,00025 г, по 0,0001 г для детей, ампулы по 1 мл 0,025% раствора в упаковке по 10 штук.

Условия хранения. Список А. В защищенном от света месте.

Срок годности. Ампулы 3 года, таблетки по 0,00025 г 5 лет, по 0,0001 г 2 года.

ДИДЕПИЛ (Didepil). Таблетки сложного состава:

	Для взрослых	*Для детей*
Прециклидина гидрохлорид	0,010 г	0,006 г
Фенобарбитал	0,025 г	0,020 г
Наполнители	0,139 г	0,099 г

Показания к применению. При конвульсивных состояниях и прежде всего при лечении эпилепсии (слабые и сильные приступы).

Способ применения и дозы. Детям до 3 лет от $^1/_2$ до 2 таблеток дидепила в день, средняя доза 1—$1^1/_2$ таблетки в день. От 3 до 8 лет 2—4 таблетки в день, средняя доза 2 таблетки в день. От 8 до 14 лет 3—6 таблеток в день, средняя доза 4 таблетки в день. Взрослым 2—6 таблеток в день, средняя доза 3—4 таблетки в день.

Форма выпуска. Таблетки для взрослых в упаковке 100 штук, для детей в упаковке 80 штук.

Условия хранения. В сухом проветриваемом помещении при температуре 20° С.

Срок годности 3 года.

Поставляется из Болгарии.

ДИКАИН (Dicainum). 2-Диметиламиноэтилового эфира парабутил-аминобензойной кислоты гидрохлорид. Синонимы: Tetracaini hydrochloridum, Pantocain, Rexocaine.

Фармакологическое действие. Сильное местноанестезирующее средство. По активности значительно превосходит новокаин и кокаин, но более токсичен. Хорошо всасывается через слизистые оболочки.

Показания к применению. Для перидуральной анестезии, а также для местной анестезии в офтальмологической и оториноларингологической практике.

Способ применения и дозы. Для перидуральной анестезии вводят 10—20 мл 0,3% раствора (дробными дозами по 3—5 мл). В офтальмологии применяют капли или смазывают слизистые оболочки 0,25%, 0,5%, 1% или 2% раствором. В оториноларингологии применяют 0,5% и 1% растворы.

Высшие разовые дозы: для перидуральной анестезии 0,075 г (25 мл 0,3% раствора), для анестезии верхних дыхательных путей 0,09 г (3 мл 3% раствора).

Отредактировал: ledi24

Побочное действие. Препарат очень токсичен, необходима осторожность при его применении.

Противопоказания. Возраст до 10 лет, общее тяжелое состояние больных.

Форма выпуска. Порошок, пленки глазные (0,00075 г) в упаковке по 30 штук.

Условия хранения. Список А. В хорошо укупоренной таре.

Срок годности. Порошок 8 лет, пленки 2 года.

ДИКСАФЕН (Dixafen). Комбинированный препарат, состоящий из диметпрамида, кофенна и эфедрина.

Фармакологическое действие. Оказывает противорвотное действие, ослабляет астенические явления в период первичной реакции на облучение, стимулирует сердечную деятельность и периферическую гемодинамику. При внутримышечном введении действие препарата наступает через 10—15 минут и сохраняется 4—5 ч.

Показания к применению. Для купирования симптомов первичной реакции на облучение (тошноты, рвоты, общей слабости, повышенной утомляемости).

Способ применения и дозы. Вводят внутримышечно сразу после облучения однократно в дозе 1 мл.

Противопоказаний к применению диксафена не установлено.

Форма выпуска. Ампулы по 1 мл, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

ДИМЕБОН (Dimebonum). Дигидрохлорид 9-[2-2-метилпиридин-5]-3,6-диметил-1,2,3,4-тетрагидро-гамма-карболина дигидрохлорид.

Фармакологическое действие. Антигистаминный препарат. Блокирует н-гистаминовые рецепторы.

Показания к применению. У взрослых острые аллергические заболевания, поллинозы, крапивница, сенная лихорадка, пищевая, косметическая и лекарственная аллергия, отек Квинке и другие аллергические реакции.

Способ применения и дозы. Внутрь независимо от приема пищи по 0,01—0,02 г 2—3 раза в день ежедневно в течение 5—12 дней.

Побочное действие. Ощущение «онемения» слизистых оболочек рта, седативный эффект.

Противопоказания. Не следует принимать во время работы водителям транспорта и лицам, профессия которых требует быстрой двигательной и психической реакции.

Форма выпуска. Таблетки по 0,01 г, в упаковке 30 штук.

Условия хранения. Список Б. В хорошо укупоренных банках темного стекла, в защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

ДИМЕДРОЛ (Dimedrolum). β-Диметиламиноэтилового эфира бензгидрола гидрохлорид. Синонимы: Allergan B, Benadryl.

Фармакологическое действие. Оказывает противогистаминное, холинолитическое и седативное действие.

Показания к применению. Аллергические заболевания (крапивница, сенная лихорадка, аллергический конъюнктивит, отек Квинке и др.), паркинсонизм, хорея, синдром Меньера, в качестве успокаивающего и снотворного средства.

Способ применения и дозы. Внутрь, внутримышечно, в вену, местно (накожно, в виде глазных капель, на слизистую оболочку носа), ректально. Под кожу не вводят из-за раздражающего действия. Внутрь

Отредактировал: ledi24

по 0,025—0,05 г 1—3 раза в день, внутримышечно и внутривенно по 1—5 мл 1% раствора; в виде глазных капель (0,2—0,5% раствор). Высшая разовая доза внутрь 0,1 г, суточная 0,25 г, внутримышечно —0,05 г и 0,15 г соответственно.

Побочное действие. Головокружение, головная боль, сухость во рту, тошнота, сонливость, общая слабость.

Противопоказания. Не рекомендуется назначать препарат во время работы водителям транспорта и лицам, профессия которых требует быстрой реакции.

Форма выпуска. Порошок, таблетки по 0,05 г в упаковке по 10 штук, по 0,02 г в упаковке по 6 штук для детей, ампулы по 1 мл 1% раствора в упаковке по 10 штук, суппозитории ректальные по 0,01 г, в упаковке 10 штук для детей, палочки по 0,05 г, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности. Порошок 5 лет, таблетки и ампулы 4 года, палочки и суппозитории 2 года.

ДИМЕКОЛИН (Dimecolinum). β-Диметиламиноэтилового эфира 1,6-диметилпипеколиновой кислоты дийодметилат.

Фармакологическое действие. Активный ганглиоблокатор.

Показания к применению. Гипертоническая болезнь (II—III стадия), гипертонические кризы, спазмы периферических сосудов и гладкой мускулатуры органов брюшной полости, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, для стимулирования родовой деятельности (особенно при нефропатии гипертонии); для достижения искусственной гипотонии.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,025—0,05 г 2—4 раза в день, подкожно и внутримышечно по 0,5—1 мл 1% раствора 2—3 раза в день.

Побочное действие. Общая слабость, головокружение, сердцебиение, при применении больших доз ортостатический коллапс; выраженный мидриаз, сухость во рту; атония мочевого пузыря, ведущая к нарушениям мочеиспускания.

Противопоказания. Гипотония, тяжелые паренхиматозные поражения печени, почек и центральной нервной системы; тромбофлебит.

Форма выпуска. Таблетки, покрытые оболочкой, по 0,025 г в упаковке по 50 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 5 лет.

ДИМЕКСИД (Dimexidum). Диметилсульфоксид. Синонимы: Demasorb, Hyadur.

Фармакологическое действие. Оказывает выраженное местноанестезирующее действие, а также противовоспалительное и антимикробное, изменяет чувствительность микрофлоры, резистентной к антибиотикам.

Показания к применению. При ушибах, растяжении связок, воспалительных отеках, ожогах, артритах, радикулитах и др.; в кожно-пластической хирургии (для консервирования кожных гомотрансплантатов), при роже, экземе, трофических язвах, гнойничковых заболеваниях кожи и др.

Способ применения и дозы. Наружно водные растворы (10—30—50—70%) в виде компрессов и тампонов, при кожных заболеваниях; в кожно-пластической хирургии повязки с 20—30% раствором в течение всего послеоперационного периода до стойкого приживления трансплантата; для хранения трансплантатов —5% раствор.

Отредактировал: ledi24

Побочное действие. Возможны легкое жжение, небольшие кожные высыпания, зуд.

Противопоказания. Беременность, тяжелые поражения паренхиматозных органов, стенокардия, коматозные состояния, инфаркт миокарда, выраженный атеросклероз, инсульт.

Форма выпуска. Во флаконах по 100 мл.

Условия хранения. В хорошо укупоренной таре.

Срок годности 3 года.

ДИМЕТПРАМИД (Dimethpramidum). 4-Диметиламино-5-нитро-(2-диэтил-аминоэтил)-орто-анисамид гидрохлорид.

Фармакологическое действие. Противорвотное средство, блокирующее рецепторы хеморецепторной триггерной зоны. Не обладает кумулятивным свойством.

Показания к применению. Для предупреждения и купирования тошноты и рвоты в послеоперационном периоде, при лучевом лечении и химиотерапии онкологических больных, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и других заболеваниях, сопровождающихся рвотой центрально-гуморального и нейрорефлекторного происхождения.

Способ применения и дозы. Внутрь до еды по 0,02 г 2—3 раза в сутки. Высшая суточная доза 0,1 г. Курс лечения 2—4 нед. в зависимости от характера заболевания, эффективности и переносимости препарата.

Побочное действие. Снижение АД и сонливость.

Противопоказания. Заболевания почек и печени с нарушением их функций, выраженная гипотония.

Форма выпуска. Таблетки по 0,02 г, в упаковке 50 штук.

Условия хранения. Список Б. В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 20° С.

Срок годности 2 года.

ДИМЕФОСФОН (Dimephosphonum). Диметиловый эфир-1,1 диметил-3-кетобутилфосфоновой кислоты.

Фармакологическое действие. Нормализует кислотно-основное состояние при ацидозах различной этиологии, усиливает реабсорбцию бикарбонатов, процессы ацидо- и аммониогенеза в почках, вентиляцию легких.

Показания к применению. Применяют как антиацидотическое средство у детей старше 8 лет при пневмонии, острых респираторных и других инфекционных заболеваниях, хронических неспецифических заболеваниях легких, сахарном диабете, рахитоподобных заболеваниях и др.

Способ применения и дозы. Внутрь из расчета 1 мл/5 кг массы тела 3—4 раза в день. Курс лечения зависит от характера заболевания, изменений кислотно-основного состояния и продолжается от 3 дней до 4 нед.

Побочное действие. Возможны диспептические явления.

Противопоказания. Склонность к аллергическим реакциям.

Форма выпуска. В виде 15% водного раствора во флаконах по 100 мл.

Условия хранения. При комнатной температуре в защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

ДИМЭСТРОЛ (Dimoestrolum). Диметиловый эфир диэтилстильбэстрола. Синоним: Dimethyl-Oestrogen.

Фармакологическое действие. Экстрогенный гормон продолжительного действия.

Показания к применению. Недостаточность функции яичников.

Отредактировал: ledi24

Способ применения и дозы. Внутримышечно в виде 0,6% масляного раствора по 2 мл 1 раз в неделю. На курс лечения 2—3 инъекции.

Побочное действие. При длительном применении возможны маточные кровотечения.

Противопоказания. Злокачественные и доброкачественные новообразования половых органов, молочных желез и других органов (у женщин в возрасте до 60 лет), мастопатия, эндометрит, склонность к маточным кровотечениям, гиперэстрогенная фаза климакса.

Форма выпуска. В ампулах 2 мл 0,6% масляного раствора в упаковке по 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 5 лет.

ДИНЕЗИН (Dinesinum). 10-(2-Диэтиламиноэтил)-фенотиазина гидрохлорид. **Синонимы:** Antipar, Deparkin.

Фармакологическое действие. Оказывает центральное антихолинергическое действие.

Показания к применению. Экстрапирамидные нарушения, в том числе паркинсонизм, гиперкинезы; в качестве корректора при нейролептической терапии.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,1 г/сут. Постепенно дозу увеличивают до 0,3—0,5 г, а в отдельных случаях до 0,6—0,7 г/сут.

Побочное действие. Сонливость, слабость, головокружение, иногда кожные высыпания.

Противопоказания. Нарушения функции печени, почек и мозгового кровообращения.

Форма выпуска. Таблетки, покрытые оболочкой, по 0,1 г в упаковке по 50 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 4 года.

ДИОКСИДИН (Dioxydinum). 1,4-Ди-N-окись-2,3-бис-(оксиметил) хиноксалина.

Фармакологическое действие. Антимикробный препарат широкого спектра действия.

Показания к применению. Тяжелые гнойно-воспалительные процессы: плевриты, эмпиема плевры, абсцесс легкого, перитониты, циститы, раны с наличием глубоких гнойных полостей.

Способ применения и дозы. Перед началом курса лечения рекомендуется провести пробу на переносимость. Препарат вводят в полости по 10—50 мл 1% раствора (100—500 мг) в сутки. Максимальная суточная доза 70 мл 1% раствора (700 мг). Вводят ежедневно в течение 3 нед. Повторные курсы проводят через 1—1½ мес. Мазь применяют при лечении гнойных и трофических ран, ожогов, гнойничковых заболеваний кожи.

Побочное действие. Головная боль, озноб, повышение температуры, диспептические реакции, судорожные подергивания мышц.

Противопоказания. Индивидуальная непереносимость.

Форма выпуска. 1% раствор в ампулах по 10 мл в упаковке 10 ампул; 0,5% раствор в ампулах по 10 мл в упаковке по 10 ампул; 5% мазь.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте при комнатной температуре. В случае выпадения кристаллов (при температуре ниже 15°С) их растворяют, нагревая ампулу в кипящей водяной бане. Если при охлаждении до 36—38°С кристаллы не выпадут вновь, препарат годен к употреблению.

Срок годности. Мазь и ампулы 2 года.

Отредактировал: ledi24

ДИОКСОНИЙ (Dioxonium). 1,2-Бис-(4′ пирролидинометил-1′, 3′-диоксоланил-2′)-этана дийодметилат.

Фармакологическое действие. Миорелаксант смешанного типа. После фазы деполяризации оказывает антидеполяризующее действие.

Показания к применению. Для расслабления мускулатуры и выключения спонтанного дыхания.

Способ применения и дозы. Самостоятельно или после введения дитилина. Вводят внутривенно по 0,04—0,05 мг/кг (после введения дитилина 0,03—0,04 мг/кг). Релаксация мышц продолжается 20—40 мин. Для удлинения эффекта вводят $^1/_2$—$^1/_3$ первоначальной дозы.

Введение препарата допустимо лишь при наличии условий для искусственной вентиляции легких.

Побочное действие. Умеренное снижение АД, тахикардия.

Противопоказания. Необходима осторожность при миастении.

Форма выпуска. Ампулы по 5 мл 0,1% раствора в упаковке по 10 штук.

Условия хранения. Список А. В защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

ДИПИДОЛОР (Dipidolor). 1′-(3-Циано-3,3-дифенилпропил)-[1,4′-бипиперидин]-4′-карбоксамид. Синоним: Piritramid.

Фармакологическое действие. Сильное анальгетическое средство.

Показания к применению. Болевые синдромы различной этиологии.

Способ применения и дозы. Внутримышечно по 10—15 мг через 2—3 ч.

Побочное действие. При передозировке угнетение дыхания.

Противопоказания. Индивидуальная повышенная чувствительность к препарату.

Форма выпуска. По 15 мг в ампулах емкостью 2 мл в упаковке по 5 ампул.

Условия хранения. Список А. В сухом прохладном месте (по правилам, установленным для морфина и других наркотических средств).

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Венгрии.

ДИПИН (Dipinum). 1,4-Ди [N, N′-ди(этилен)-фосфамид] пиперазин.

Фармакологическое действие. Подавляет пролиферативную активность тканей, в том числе опухолевых. Оказывает избирательное угнетающее действие на лимфопоэз.

Показания к применению. Хронический лимфолейкоз, протекающий с опухолевидными разрастаниями (при числе лейкоцитов более $7{,}5 \cdot 10^9$/л), метастазы гипернефромы.

Способ применения и дозы. Внутривенно или внутримышечно. При хроническом лимфолейкозе лечение начинают с введения 0,005 г дипина (1 мл 0,5% раствора) ежедневно или 0,01 г (2 мл 0,5% раствора) через день. Интервал между инъекциями затем удлиняют до 2—3 дней в зависимости от степени снижения числа лейкоцитов и тромбоцитов. Общая доза на курс до 0,2 г. При метастазах гипернефромы лечение начинают с 0.03 г (3 мл 1% раствора) через 3 дня или 0,04 г (4 мл 1% раствора) через 4 дня. Затем дозу постепенно уменьшают до 20—10—5 мг. На курс 0,2—0,24 г. При необходимости курс лечения повторяют.

Побочное действие. Лейкопения и тромбоцитопения, в отдельных случаях понижение аппетита и тошнота.

Противопоказания. Тяжелые заболевания печени и почек.

Форма выпуска. По 0,02 г лиофилизированная форма для приготов-

Отредактировал: ledi24

ления инъекционного раствора во флаконах в упаковке по 10 штук.

Условия хранения. Список А. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

ДИПИРОКСИМ (Dipiroximum). 1,1′-Триметилен-бис(4-оксиминометилпиридиний бромид) моногидрат. Синоним: Trimedoxinum.

Фармакологическое действие. Реактиватор холинэстеразы.

Показания к применению. Отравления фосфорорганическими соединениями.

Способ применения и дозы. Подкожно (при необходимости внутривенно) в комплексе с холинолитическими средствами (атропина сульфат и др.) в зависимости от тяжести состояния однократно или несколько раз по 1—3 мл 15% раствора, в особо тяжелых случаях до 7—10 мл.

Форма выпуска. Ампулы по 1 мл 15% раствора, в упаковке по 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

ДИПЛАЦИНА ДИХЛОРИД (Diplacinum dichloridum). 1,3-Бис-(β-платиниций-этокси)-бензола дихлорид.

Фармакологическое действие. Антидеполяризующий мышечный релаксант. В больших дозах вызывает расслабление скелетных мышц.

Показания к применению. В хирургии для расслабления мускулатуры и выключения произвольного дыхания.

Способ применения и дозы. Внутривенно в виде 2% раствора. При операции длительностью 2—2$^1/_2$ ч 20—35 мл 2% раствора.

Побочное действие. При введении больших доз незначительное повышение АД.

Противопоказания. Миастения. Необходима осторожность при выраженном нарушении функции печени и почек, а также в старческом возрасте.

Форма выпуска. Ампулы по 5 мл 2% раствора, в упаковке по 10 штук.

Условия хранения. Список А. В защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

ДИПРАЗИН (Diprazinum). 10-(2-Диметиламинопропил)-фенотиазина гидрохлорид. Синонимы: пипольфен, Allergan, Phenergan.

Фармакологическое действие. Обладает сильной противогистаминной активностью (более активен, чем аминазин и димедрол). Оказывает седативное действие.

Показания к применению. Аллергические заболевания, ревматизм с выраженным аллергическим компонентом, аллергические осложнения, вызванные лекарственными средствами, зудящие дерматозы, болезнь Меньера и др.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,025 г 2—3 раза в день, внутримышечно 1—2 мл 2,5% раствора, внутривенно (в составе литических смесей) до 2 мл 2,5% раствора. Детям назначают в меньших дозах в соответствии с возрастом. Высшие дозы для взрослых внутрь: разовая 0,075 г, суточная, 0,5 г; внутримышечно: разовая 0,05 г, суточная 0,25 г.

Побочное действие. Сухость во рту, тошнота. При внутримышечном введении болезненные инфильтраты, при внутривенном — резкое понижение АД.

Отредактировал: ledi24

Противопоказания. Состояния алкогольного опьянения; не следует назначать во время работы водителям транспорта.

Форма выпуска. Таблетки, покрытые оболочкой, в упаковке по 10 штук по 0,025 г и по 0,005 г для детей, ампулы по 2 мл 2,5% раствора, в упаковке по 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности. Ампулы 2 года, таблетки по 0,025 г 3 года, по 0,005 г 2 года.

ДИПРОМОНИЙ (Dipromonium). Дипромония дихлорацетат.

Фармакологическое действие. Оказывает липотропное действие, улучшает антитоксическую функцию печени, стимулирует окислительные процессы, обладает слабой гипотензивной и ганглиоблокирующей активностью.

Показания к применению. Хронический гепатит и жировая дистрофия печени, облитерирующий эндартериит, атеросклероз сосудов мозга, хронические заболевания легких, побочные реакции, связанные с применением противотуберкулезных препаратов.

Способ применения и дозы. Внутрь и внутримышечно. Внутрь в виде таблеток по 0,02 г 3—5 раз в день после еды. Суточная доза 0,06—0,1 г. Курс лечения 20—45 дней в зависимости от тяжести заболевания. Внутримышечно — содержимое ампулы 0,05 г лиофилизированного препарата растворяют в 2 мл воды для инъекций. Вводят ежедневно по 0,05 г 1 раз в день в течение 10—20 дней. Курс лечения можно повторить через месяц. При хронических гепатитах и жировой дистрофии печени вводят по 0,05—0,1 г в день в течение 15—20 дней; при побочных реакциях от туберкулезных препаратов — по 0,05 г в течение месяца.

Побочное действие. При применении внутрь возможны тошнота, рвота.

Форма выпуска. Таблетки по 0,02 г, в упаковке по 100 штук и в ампулах по 0,05 г лиофилизированный порошок в комплекте с растворителем.

Условия хранения. В сухом прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

ДИПРОФЕН (Diprophenum). β-Дипропиламиноэтилового эфира дифенилтиоуксусной кислоты гидрохлорид.

Фармакологическое действие. Оказывает сосудорасширяющее и слабое холинолитическое действие.

Показания к применению. Спазмы кровеносных (особенно периферических) сосудов (эндартериит, болезнь Рейно и др.), гладкой мускулатуры внутренних органов (бронхов, желудочно-кишечного тракта, мочевыводящих путей).

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,025 г 3 раза в день с постепенным увеличением дозы до 0,05—0,1 г 3 раза в день. Курс лечения 2—3 нед.

Побочное действие. Чувство онемения слизистой оболочки полости рта, изредка тошнота, головная боль, легкое головокружение.

Форма выпуска. Таблетки по 0,025 г, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В обычных условиях.

Срок годности 4 года.

ДИПРОФИЛЛИН (Diprophyllinum). 7-(2,3-Диоксипропил)-теофиллин. Синоним: Isophyllin.

Фармакологическое действие. Оказывает коронарорасширяющее и бронхорасширяющее действие, несколько увеличивает диурез.

Отредактировал: ledi24

Показания к применению. Коронароспазм, бронхоспазм, симптоматическая гипертония, гипертоническая болезнь.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,2 г 3—4 раза в день; в мышцу по 3—5 мл 10% раствора 1—2 раза в день.

Побочное действие. Возможны диспептические явления.

Форма выпуска. Таблетки по 0,2 г, в упаковке 10 штук, ампулы по 5 мл 10% раствора, в упаковке 10 штук, суппозитории ректальные по 0,5, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В хорошо укупоренной таре.

Срок годности. Ампулы и таблетки 4 года, суппозитории 3 года.

«ДИСОЛЬ» — СОЛЕВОЙ РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ (Solutio «Disolum» pro injectionibus). Состав: натрия ацетата 2 г, натрия хлорида 6 г, воды для инъекций до 1 л.

Показания к применению. Для коррекции гиперкалиемии и ее последствий при лечении больных холерой Эль-Тор (Инаба), острой дизентерией и пищевой токсикоинфекцией.

Способ применения и дозы. Препарат вводят внутривенно капельно (подогретый до 38—40°С) со скоростью 40—120 капель в минуту до нормализации показателей электролитного баланса.

Форма выпуска. Во флаконах по 400 мл.

Условия хранения. При комнатной температуре.

Срок годности 2 года.

ДИТЕТРАЦИКЛИНОВАЯ ГЛАЗНАЯ МАЗЬ (Unguentum Ditetracycini ophthalmicum). Действующим веществом мази является полусинтетическое производное тетрациклина-N,N′ (дибензилэтилендиамино)-диметилтетрациклин.

Фармакологическое действие. Препарат активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, риккетсий, возбудителей орнитоза, трахомы и некоторых простейших.

При местном применении (в течение 48—72 ч) оказывает пролонгированное действие, не раздражает кожу. Всасывается через неповрежденные кожные покровы и конъюнктиву глаза. Малотоксичен, не обладает кумулятивным свойством.

Показания к применению. Трахома, эпидемические конъюнктивиты и другие инфекционные заболевания глаз, вызванные чувствительными к тетрациклину возбудителями.

Способ применения и дозы. Закладывают за нижнее или верхнее веко больного 0,2—0,3 г мази через 2—3 дня. Курс лечения трахомы 2—5 мес.

Противопоказания. Индивидуальная повышенная чувствительность к препарату.

Форма выпуска. 1% глазная мазь (в 1 г 10 000 ЕД) в тубах по 7 г.

Условия хранения. Список Б. При комнатной температуре.

Срок годности 2 года.

ДИТИЛИН (Dithylinum). Дийодметилат β-диметиламиноэтилового эфира янтарной кислоты. Синоним: мио-релаксин.

Фармакологическое действие. Курареподобный препарат с деполяризующим действием.

Показания к применению. При интубации, эндоскопических процедурах (бронхо- и эзофагоскопия, цистоскопия и др.), кратковременных операциях.

Способ применения и дозы. Внутривенно из расчета 1—1,7 мг/кг.

Побочное действие. Возможно угнетение дыхания.

Отредактировал: ledi24

Противопоказания. Глаукома. Нельзя смешивать растворы дитилина с растворами барбитуратов и донорской кровью.

Форма выпуска. Ампулы по 5 мл 2% раствора в упаковке по 10 штук.

По импорту препарат поступает под названием «Миорелаксин» в ампулах по 5 штук, содержащих 0,25 г, и по 10 штук, содержащих 0,1 г сухого вещества, с приложением растворителя.

Условия хранения. Список А. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности дитилина $1^1/_2$ года, миорелаксина 5 лет.

ДИТРАЗИНА ЦИТРАТ (Ditrazini citras). 1-Метил-4-диэтилкарбамоилпиперазина цитрат. Синонимы: Loksuran (B), Banocid.

Показания к применению. Противоглистное средство при филяриатозах.

Способ применения и дозы. Назначают внутрь из расчета 2 мг/кг 3 раза в сутки в течение 10 дней. Суточная доза не должна превышать 0,4 г. Проводят 3—5 курсов с интервалами 10—12 дней.

Побочное действие. Кожный зуд, появление или усиление кожных высыпаний, сухой кашель, эозинофилия, эозинофильные инфильтраты, лимфаденопатии, увеличение размеров печени и селезенки.

Противопоказания. Онхоцеркоз, сопровождающийся поражением глаз.

Форма выпуска. Таблетки по 0,1 г, в упаковке 30 штук.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности 5 лет.

ДИТЭК (Ditek). Дозированный аэрозоль. 1 доза содержит: 1-(365-дигидокси-фенил)-2-(1-4-гидрокси-бензил)-этил-амино-этанола гидробромида (-фенотеролгидробромид) 0,05 мг и динатрия хромогликат 1 мг. Противоастматическое средство.

Фармакологическое действие. Фенотеролгидробромид эффективно предупреждает спазм мускулатуры бронхов и купирует уже развившиеся спастические состояния бронхиальной системы. Динатрия хромогликат не обладает собственным непосредственным бронхорасширяющим действием, но эффективно предупреждает бронхиальные спазмы.

Показания к применению. Лечение и профилактика удушья при бронхиальной астме и других заболеваниях, сопровождающихся обратимым сужением дыхательных путей (хронический обструктивный бронхит и др.).

Способ применения и дозы. Для профилактики и длительного лечения взрослым и детям старше 6 лет рекомендуют ингалировать по 2 дозы аэрозоля 4 раза в день через равные промежутки времени (утром, в полдень, во второй половине дня и вечером перед отходом ко сну). При необходимости (при начинающем бронхоспазме) можно дополнительно ингалировать 1—2 дозы аэрозоля. В тяжелых случаях, когда через 5 минут после ингаляции нет ощутимого эффекта, можно ингалировать еще 2 дозы. Последующая ингаляция может быть проведена не ранее чем через 2 часа. Для целенаправленной профилактики (предстоящая физическая нагрузка, предполагаемый контакт с аллергеном) следует ингалировать 2 дозы аэрозоля. Детям от 4 до 6 лет рекомендуют ингалировать 1 дозу аэрозоля 4 раза в день через равные промежутки времени. Препарат не предназначен для лечения детей младше 4 лет. Перед применением аэрозоля его следует встряхнуть.

Побочное действие. Препарат может вызвать мелкое дрожание пальцев, беспокойство, сердцебиение, головокружение и головную боль.

Отредактировал: ledi24

При передозировке наблюдается покраснение лица, тошнота, тахикардия, повышение систолического и снижение диастолического артериального давления, чувство тяжести, экстрасистолия. В таких случаях назначают седативные средства, транквилизаторы, в отдельных случаях прибегают к бета-адреноблокаторам с индивидуальным подбором дозы, учитывая возможность усиления обструкции бронхов.

Противопоказания. Тиреотоксикоз, тахиаритмии, подклапанный стеноз аорты. С осторожностью применяют у больных, страдающих сахарным диабетом, со свежим инфарктом миокарда, тяжелыми органическими поражениями сердца и сосудов, при беременности и в период лактации.

Форма выпуска. Дозированный аэрозоль в баллончике на 10 мл с мундштуком (200 доз).

Условия хранения. В месте, недоступном для детей.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Германии, Сербии и Австрии.

ДИФЕЗИЛ (Diphezylum). N-(β-феноксиэтил)-N, N-диметил-N-(2-окси-3-ацетил-5-хлорбензил) аммония-3-окси-2-нафтоат.

Фармакологическое действие. Обладает антигельминтной активностью в отношении трихоцефалеза.

Показания к применению. Трихоцефалез.

Способ применения и дозы. Внутрь натощак за 1 ч до завтрака в 30—50 мл сахарного сиропа или воды взрослым и детям старше 11 лет 5 г, детям младшего возраста 2,5 г. При необходимости лечение повторяют через 2—3 нед.

Побочное действие. Возможны тошнота, рвота, учащенная дефекация.

Противопоказания. Заболевания печени с выраженным нарушением ее функции.

Форма выпуска. Порошок.

Условия хранения. В хорошо укупоренной таре.

Срок годности 4 года.

ДИФЕНИН (Diphenlnum). 5,5-Дифенил-гидантоина и гидрокарбоната натрия. Синоним: Diphentoin.

Фармакологическое действие. Оказывает выраженное противосудорожное действие; снотворного эффекта почти не дает.

Показания к применению. Эпилепсия, в основном большие судорожные припадки.

Способ применения и дозы. Внутрь после еды 0,1—0,3 г 1—3 раза в день.

Побочное действие. Тремор, атаксия, дизартрия, нистагм, боль в глазах, повышенная раздражительность, кожные высыпания, иногда повышение температуры, желудочно-кишечные расстройства, лейкоцитоз, мегалобластическая анемия, агранулоцитоз, стоматиты.

Противопоказания. Болезни печени, почек, декомпенсация сердечно-сосудистой системы.

Форма выпуска. Таблетки по 0,117 г в упаковке по 10 штук; порошок.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 4 года.

ДИФОРМИН-РЕТАРД (Diformin-retard). Синонимы: Metformin-um, Glukofag.

Фармакологическое действие. Длительно действующее противодиабетическое средство, относящееся к бигуанидам. Действие основано

Отредактировал: ledi24

на угнетении гликонеогенеза в печени и повышении периферической утилизации глюкозы и не связано (в отличие от сульфанилмочевинных препаратов) с повышением секреции инсулина. Эти эффекты создают предпосылки для снижения липогенеза и повышения липолиза. В итоге у больных снижается аппетит, уменьшается масса тела, что благоприятно сказывается на больных диабетом, страдающих ожирением.

Поскольку больные диабетом подвержены повышенному риску развития атеросклероза, следует отметить положительное влияние диформина, проявляющееся в снижении уровня холестерина и триглицеридов в сыворотке крови и в повышении фибринолитической активности крови.

Показания к применению. Сахарный диабет, развивающийся в среднем возрасте или позднее.

Способ применения и дозы. В начале лечения назначают 1 таблетку 1 раз в день (утром) во время или сразу после еды. Эффект достигается постепенно путем осторожного повышения дозы через каждую неделю, после чего больному назначают поддерживающую дозу (обычно по 1—2 таблетки 2 раза в день). Для стабилизации углеводного обмена и снижения потребности в инсулине при лабильном диабете допустима комбинация диформина с инсулином.

Побочное действие. Возможны металлический привкус во рту, легкие желудочно-кишечные расстройства, значительно реже встречаются аллергические реакции. Длительное лечение может сопровождаться нарушением всасывания витамина B_{12}.

Противопоказания. Диабетическая кома, беременность, тяжелые операции и травмы. Необходима осторожность при почечной недостаточности, а также при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и печени. Диформин не назначают детям.

Форма выпуска. Таблетки по 0,5 г, в упаковке 100 штук.

Условия хранения. Обычные.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Финляндии.

ДИЦИНОН (Dicynone). 1,4-Диоксибензенсульфонат-3-диэтиламмония. Синоним: Cyclonamin.

Фармакологическое действие. Гемостатическое средство, способствующее уменьшению времени кровотечения и умеренному увеличению числа тромбоцитов.

Показания к применению. Для профилактики и лечения кровотечений при хирургических вмешательствах, в комплексе лечебных мероприятий при геморрагическом диатезе и функциональных маточных кровотечениях.

Способ применения и дозы. Внутривенно или внутримышечно по 1—2 мл 12,5% раствора за 1 ч до операции или внутрь по 0,5—0,75 г за 3 ч до операции; при необходимости дополнительно вводят во время операции еще 1—2 мл. При опасности кровотечения после операций вводят 2—4 мл или 0,5—2 г в течение первых суток.

Форма выпуска. Таблетки по 0,25 г, в упаковке 100 штук, ампулы по 2 мл 12,5% раствора.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Югославии.

ДИЭТИКСИМ (Diaethyximum). S-диэтиламиноэтилового эфира-пара-бромбензтиогидроксимовой кислоты гидрохлорид.

Фармакологическое действие. Реактиватор холинэстераз, активность которых подавлена фосфорорганическими соединениями (ФОС)

Отредактировал: ledi24

Способен проникать через гематоэнцефалический барьер. Устраняет блок нервно-мышечной передачи, улучшает биоэлектрическую активность мозга, уменьшает или полностью устраняет миофибрилляции, предотвращает брадикардию, слюнотечение, миоз и другие симптомы возбуждения м-холинорецепторов.

Показания к применению. Острые и хронические отравления фосфорорганическими пестицидами (хлорофос, карбофос, метафос, тиофос, дихлофос и др.). Показаниями к назначению являются мускаринникотиноподобные симптомы интоксикации ФОС: головная боль, головокружение, рвота, тошнота, затрудненное дыхание, боль в животе, миоз, мышечные подергивания, потливость, саливация, потеря сознания, судороги, отек легких, астенический синдром, психомоторное возбуждение, коматозное состояние.

Способ применения и дозы. Внутримышечно в виде 10 % водного раствора. Дозы и частота введения зависят от тяжести отравления и активности холинэстеразы крови. Диэтиксим применяют в комбинации с атропином и другими холинолитическими препаратами, а также сочетают с витаминами (B_1, B_6, С), транквилизаторами, снотворными средствами, глутаминовой кислотой и другими препаратами, нормализующими состояние центральной и вегетативной нервной системы, а также с препаратами, улучшающими функции паренхиматозных органов.

Форма выпуска. В виде 10% водного раствора в ампулах по 5 мл в упаковке по 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте при температуре не ниже 8°С.

Срок годности 2 года.

ДИЭТОН (Diaethonum). 2,6-Диметил-3,5-диэтоксикарбонил-1,4-дигидропиридин.

Фармакологическое действие. При нанесении на кожу перед облучением диэтон увеличивает ее радиорезистентность и предотвращает или уменьшает проявления лучевого дерматита. При развитии лучевых дерматитов препарат устраняет отек, гиперемию, зуд и жжение кожи, ускоряет ее заживление.

Показания к применению. Используют у взрослых для профилактики и лечения радиационных поражений кожи.

Способ применения и дозы. С профилактической целью диэтон наносят тонким слоем на кожу участка планируемого облучения за 30—40 мин до сеанса облучения и повторно через 1—2 ч после него. В дальнейшем мазь применяют 2—3 раза в день ежедневно в течение 5—10 дней. При многократном облучении кожу в день облучения смазывают за 30—40 мин до облучения и через 1—2 ч после него. С лечебной целью диэтон применяют ежедневно 3 раза в день в течение 10—20 дней в зависимости от тяжести поражения.

Побочное действие. У отдельных больных в первые 30 мин после нанесения препарата возможно преходящее ощущение жжения кожи.

Форма выпуска. Мазь 5% в тубах по 30 г.

Условия хранения. При температуре не выше +5°С.

Срок годности 2 года.

ДОБУТРЕКС (Dobutrex). Синоним: добутамин.

Фармакологическое действие. Усиление сердечных сокращений путем стимулирования бета-1-рецепторов сердца. Назначается взрослым, которым требуется инотропная поддержка при лечении сердечной недостаточности, ассоциирующейся с инфарктом миокарда, при

Отредактировал: ledi24

открытой операции на сердце, кардиомиопатии септического и кардиогенического шока.

Способ применения и дозы. Добутрекс (лиофилизированная форма) может разводиться водой для инъекций или в 5% растворе декстрозы для внутривенного введения. Физиологический раствор не рекомендуется. Если материал полностью не растворяется, добавьте еще дополнительно 10 мл разбавителя.

Добутрекс, приготовленный, как указано выше, необходимо асептически развести в контейнере 250 мл или 50 мл с одним из внутривенных растворов: хлоридом натрия; 5% декстрозой; 5% декстрозой+0,9% хлорида натрия. Растворы должны быть использованы в течение 24 часов.

В связи с коротким периодом полураспада добутрекс надо вводить как непрерывную внутривенную инфузию при помощи капельницы или любого другого подходящего аппарата. Важно контролировать скорость потока капель в минуту.

Большинство пациентов положительно реагируют на дозы в пределах от 2,5 до 10 мкг/мин. В то же время редко когда может понадобиться доза, равная 40 мкг/мин. Скорость введения и продолжительность терапии следует регулировать в соответствии с реакцией пациента. Чтобы прекратить терапию добутрексом, предпочтительнее постепенно снижать дозировку.

Безопасность и эффективность добутрекса для использования у детей не установлены.

Во время введения добутрекса необходимо тщательно контролировать скорость и ритм сердечных сокращений, артериальное кровяное давление. Желательно делать ЭКГ, пока не будет достигнуто стабильное реагирование. Если усилится сердцебиение, повысится давление крови, дозировку нужно уменьшить или временно прекратить введение препарата. При острой гипотензии, которая может вызвать кардиогенный шок (артериальное давление менее 70 мм/рт. ст.), добутрекс следует использовать с осторожностью. Его не применяют при беременности за исключением тех случаев, когда потенциальная выгода превышает потенциальный риск для плода.

Побочное действие. Изредка отмечаются тошнота, головная боль, ангинозная боль в груди, пальпитации, задержка дыхания, а также сыпь, лихорадка, эозинофилия и бронхоспазмы.

Форма выпуска. Допутрекс (добутамин гидрохлорид для инъекции) выпускается в виде ампул, содержащих 250 мг добутамина и 250 мг маннитола в стерильной лиофилизированной форме только для внутривенного введения, и ампул, содержащих 20 мл стерильного раствора. Каждый мл содержит 12,5 мг добутамина, 0,24 бисульфата натрия и воду для инъекций.

Условия хранения. Ампулы с добутрексом (раствор) хранить при температуре ниже 25°С. Подготовленный внутривенный раствор остается стабильным на протяжении 24 часов при комнатной температуре.

Производитель — фирма «Элли Лилли», США.

ДОКСИУМ (Doxium). Синонимы: добезилат кальция, Dobesifar.

Фармакологическое действие. Уменьшает повышенную проницаемость и ломкость капилляров, увеличивает пластичность эритроцитов in vitro.

Показания к применению. Диабетическая микроангиопатия и ретинопатия, венозная недостаточность, периферические застойные отеки, повышенная проницаемость капилляров и расстройства микроциркуляции. В терапии при атеросклерозе, циррозе печени, геморрое и др.

Способ применения и дозы. Назначают внутрь при диабетической

Отредактировал: ledi24

микроангиопатии и диабетической ретинопатии по 2—3 таблетки в день в течение 4—6 мес (в зависимости от стадии заболевания). В дальнейшем доза может быть уменьшена до 1—2 таблеток в день. При поражении венозных сосудов препарат назначают по 1 таблетке 3 раза в день в течение 1—3 нед. и далее по 1 таблетке 2 раза в день. Препарат принимают во время или после приема пищи, запивая большим количеством жидкости.

Побочное действие. Наблюдающиеся иногда расстройства желудочно-кишечного тракта или аллергические высыпания на коже проходят самостоятельно при уменьшении дозы или отмене препарата.

Противопоказания. Не выявлены.

Форма выпуска. Таблетки по 0,25 г, в упаковке 100 штук.

Условия хранения. В сухом прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Югославии.

ДОКСИЦИКЛИНА ГИДРОХЛОРИД (Doxycyclini hydrochloridum). 6-Дезокси-5-окситетрациклина гидрохлорид. Полусинтетическое производное окситетрациклина. Синонимы: Vibramycin, Doxacin, Biociclin, Doxylin.

Фармакологическое действие. Антибиотик широкого спектра антимикробного действия. Активен в отношении большинства грамположительных (стафилококки, пневмококки, стрептококки) и грамотрицательных микроорганизмов (менинго- и гонококки, эшерихии, сальмонеллы, шигеллы, энтеробактерии), а также риккетсий, микоплазм, возбудителей орнитоза, пситтакоза, трахомы и некоторых простейших.

Показания к применению. Применяют у взрослых и детей старше 8 лет при заболеваниях, вызванных чувствительными к нему микроорганизмами: бронхите остром и подостром, пневмонии, плеврите и инфекциях мочевыводящих путей, включая гонорею.

Способ применения и дозы. Внутрь после еды. В 1-й день суточную дозу для взрослых 0,2 г принимают сразу или по 0,1 г каждые 12 ч. В последующие дни суточная доза 0,1 г. При тяжелых инфекциях суточная доза в 1-й и последующие дни 0,2 г.

Детям от 8 до 12 лет назначают из расчета 4 мг/(кг·сут) в 1-й день, 2 мг/кг в последующие дни (4 мг/кг при тяжелом течении инфекции). Детям старше 12 лет назначают ту же дозу, что и взрослым.

Лечение больных гонореей проводят по схеме. Продолжительность лечения 7—10 дней.

Побочное действие. Возможны желудочно-кишечные расстройства (тошнота, рвота, учащение дефекации и др.), дисбактериоз и суперинфекция дрожжеподобными грибами, аллергические реакции.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к тетрациклинам, беременность. Препарат не назначают детям до 8 лет.

Форма выпуска. В капсулах по 0,05 г, в упаковке по 10 штук и по 0,1 г, в упаковке по 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В сухом, защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

ДОПАН (Dopanum). 6-Метил-5-[бис(2-хлорэтил)амино]-урацил. Синоним: Chlorethylaminouracil.

Фармакологическое действие. Обладает противоопухолевой активностью и угнетает кроветворение (особенно костномозговое).

Показания к применению. Лимфогранулематоз II—III стадии и (при удовлетворительном общем состоянии) IV стадии заболевания;

Отредактировал: ledi24

сублейкемические формы хронического миелолейкоза, протекающие со спленомегалией; хронический лимфолейкоз.

Способ применения и дозы. Внутрь (лучше на ночь) по 0,006—0,012 г один раз в 3—5—7 дней. На курс лечения 5—7 приемов допана. Детям из расчета 0,2 мг/кг.

Побочное действие. Угнетение костномозгового кроветворения (лейкопения, тромбоцитопения); иногда через 8—12 ч после приема тошнота и рвота.

Противопоказания. Лимфогранулематоз при числе лейкоцитов менее $4{,}5 \cdot 10^9$/л и тромбоцитов менее $150 \cdot 10^9$/л, быстротекущие и острые формы этого заболевания; острый лейкоз и хронический миелолейкоз с резким обострением.

Форма выпуска. Таблетки по 0,002 г, в упаковке 35 штук.

Условия хранения. Список А.

Срок годности 4 года.

ДОПЕГИТ (Dopegyt). L-α-метил-β-(3,4-дигидрооксифенил)-аланин. Синоним: Aldomet, Метилдопа.

Фармакологическое действие. Оказывает гипотензивное действие и уменьшает периферическое сопротивление сосудов.

Показания к применению. Гипертоническая болезнь II стадии.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,25 г 2—3 раза в день, при необходимости суточную дозу увеличивают до 1,5—2 г.

Побочное действие. Тошнота, рвота, головная боль, покраснение верхней половины туловища, в отдельных случаях лейкопения, субфебрилитет.

Противопоказания. Острые заболевания печени, беременность, феохромоцитома.

Форма выпуска. Таблетки по 0,25 г, в упаковке 50 штук.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Венгрии.

ДОФАМИН (Dofaminum). 2-(3,4-диоксифенил)-этил-аминогидрохлорид. Синонимы: Aprical, Dopmin, Dopamex, Dopamin.

Фармакологическое действие. Оказывает стимулирующее влияние на дофаминовые рецепторы, в больших дозах стимулирует α и β-адренорецепторы. Повышает сопротивление периферических сосудов и систолическое давление, усиливает сердечные сокращения, увеличивает сердечный выброс, уменьшает сопротивление почечных сосудов, увеличивает в них кровоток, а также клубочковую фильтрацию, экскрецию натрия и диурез, мезентериальные сосуды.

Показания к применению. Шок различной этиологии (кардиогенный, травматический, послеоперационный и др.); острая сердечная и сосудистая недостаточность, синдром «низкого сердечного выброса», связанные с хирургическим вмешательством, особенно с кардиохирургическими операциями.

Способ применения и дозы. Внутривенно капельно Содержимое ампулы (0,5% или 4% раствор дофамина) разводят соответственно в 125 или 400 мл 5% раствора глюкозы или изотонического раствор хлорида натрия из расчета, чтобы в 1 мл раствора содержалось соответственно 200 или 500 мкг дофамина. При противопоказаниях к введению больших объемов жидкости применяют более концентрированные растворы, где в 1 мл содержится 800 мкг. Инфузии проводят непрерывно в течение от 2—3 ч до 1—4 дней и более. Суточная доза в среднем 800 мкг на больного. Действие препарата наступает быстро и заканчивается через 5—10 мин после окончания введения.

Дофамин вводят под кардиомониторным контролем. Дозы и ско-

Отредактировал: ledi24

рость введения определяют с учетом уровня АД, частоты сердечных сокращений, ритма сердца, сердечного выброса и диуреза. Применяют только в условиях стационара.

Побочное действие. Большие дозы вызывают спазм периферических сосудов, тахикардию, желудочковую экстрасистолию, появление узлового ритма, стенокардические боли, нарушение дыхания, головную боль, психомоторное возбуждение и другие признаки адреномиметического действия.

Противопоказания. Феохромоцитома. Не следует назначать при аритмии в сочетании с ингибиторами моноаминоксидазы, с циклопропаном и галогенсодержащими средствами для наркоза.

Форма выпуска. В ампулах по 5 мл 0,5% и 4% раствора в упаковке по 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

ДРОПЕРИДОЛ (Droperidolum). 1-[3-(пара-Фторбензоил)-пропил]-4-(2-оксо-1-бензимидазолинил)-1,2,5,6-тетрагидропиридин. Синонимы: Inapsin, Droleptan.

Фармакологическое действие. Нейролептическое средство, оказывающее быстрое, сильное, но непродолжительное действие.

Показания к применению. В анестезиологии в сочетании с фентанилом (нейролептаналгезия) или другими анальгетиками и анестетиками при различных хирургических вмешательствах, а также в психиатрии при психомоторном возбуждении. Обладает противошоковым и противорвотным свойством. Понижает АД, обладает сильной каталептогенной активностью.

Способ применения и дозы. Подкожно, внутримышечно или внутривенно. Для премедикации и нейролептаналгезии за 30—40 мин до операции по специальной схеме. Дроперидол применяют при местной анестезии, эндотрахеальном наркозе, для уменьшения тошноты, рвоты, боли у больных с тяжелыми приступами стенокардии и при инфаркте миокарда.

Побочное действие. Экстрапирамидные нарушения, депрессия с преобладанием чувства страха, при применении в больших дозах — гипотония.

Противопоказания. Экстрапирамидные нарушения, длительное применение гипотензивных средств.

Форма выпуска. В ампулах по 5 мл 0,25% раствора, в упаковке по 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В сухом, защищенном от света месте при температуре 0—5°С.

Срок годности 2 года.

ДУБА КОРА (Cortex Quercus). Содержит дубильные вещества (10—20%) пирогалловой группы, галловую и эллаговую кислоты, флавоноид кверцетин, флобафен, пектины.

Применение. В качестве вяжущего и противовоспалительного средства при воспалительных заболеваниях слизистой оболочки полости рта, зева, глотки, гортани, гингивитах, стоматитах в виде отвара (20,0:200,0) для полосканий 6—8 раз в день и лечения ожогов (40,0: 200,0).

Форма выпуска. В упаковке по 100 г.

Условия хранения. В сухом прохладном месте.

Срок годности 5 лет.

Отредактировал: ledi24

«ДУПЛЕКС» («Duplex»). Водный раствор стрихнина нитрата (0,1%) и натрия арсената (1%).

Применение. Как общеукрепляющее и тонизирующее средство при упадке питания, невроза, легких формах анемии, псориазе. Вводят под кожу один раз в день ежедневно, начиная с 0,2 мл с постепенным повышением дозы до 1 мл. Курс лечения 20—40 дней; при псориазе до 2—3 мес. Высшая разовая доза 1 мл, суточная 2 мл. Детям до 2 лет не назначают, после 2— применяют в меньших дозах.

Побочное действие. Иногда тошнота, рвота, понос, пигментация кожи.

Противопоказания. Поражения почек, невриты, выраженная анемия, диспептические явления.

Форма выпуска. В ампулах по 1 мл по 10 штук.

Условия хранения. Список А.

Срок годности 4 года.

ДУШИЦЫ ТРАВА (Herba Origani vulgaris). Содержит эфирное масло (0,3—1%), в состав которого входят тимол и его изомер карвакрол, дубильные вещества, аскорбиновая кислота, флавоноиды.

Применение. В качестве отхаркивающего (хронический бронхит) и усиливающего перистальтику кишечника (атония кишечника) в виде настоя (10,0:200,0—15,0:200,0) внутрь по 1 столовой ложке 3 раза в день; наружно для ароматических ванн.

Форма выпуска. В упаковке по 100 г, в брикетах по 75 г.

Условия хранения. В сухом прохладном месте.

Срок годности не установлен.

ЖЕЛАТИНОЛЬ (Gelatinolum). Коллоидный 8% раствор частично расщепленной пищевой желатины.

Фармакологическое действие. Плазмозамещающее средство.

Показания к применению. Шок (операционный и травматический), геморрагии, подготовка к операциям, для дезинтоксикации организма.

Способ применения и дозы. Внутривенно или внутриартериально вначале струйно, затем капельно одновременно до 2000 мл.

Побочное действие. Возможно появление белка в моче в течение 1—2 дней.

Противопоказания. Острый и хронический нефрит.

Форма выпуска. Во флаконах 450 мл.

Условия хранения. При температуре от 4 до 22°С.

Срок годности 3 года.

ЖЕЛЕЗА ЛАКТАТ (Ferri lactas).

Применение. При гипохромной анемии в капсулах по 1 г 3—4 раза в день.

Форма выпуска. Порошок.

Условия хранения. В защищенном от света месте.

Срок годности 4 года.

ЖЕЛУДОЧНЫЕ ТАБЛЕТКИ С ЭКСТРАКТОМ КРАСАВКИ (Tabulettae stomachicae cum extracto Belladonnae). Состав: экстракта красавки 0,01 г, экстракта полыни 0,012 г, экстракта валерианы 0,015 г.

Применение. При заболеваниях желудка, сопровождающихся болью, по 1 таблетке 2—3 раза в день.

Форма выпуска. В упаковке по 10 штук.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности 4 года.

Отредактировал: ledi24

ЖЕЛУДОЧНЫЙ СОК НАТУРАЛЬНЫЙ (Succus gastricus naturalis). Секрет желудочных желез здоровых собак и других домашних животных, консервированный 0,03—0,04% салициловой кислотой.

Применение. При недостаточной функции желудочных желез, ахилии, гипо-, анацидных гастритах, диспепсии. Назначают внутрь во время или после еды 2—3 раза в день по 1—2 столовые ложки (детям в зависимости от возраста от $^1/_2$ чайной до 1 столовой ложки).

Форма выпуска. Сок натуральный от собак во флаконах по 100 мл. Сок натуральный от лошадей — эквин (Equinum) во флаконах по 100 мл.

Условия хранения. В защищенном от света месте при температуре от 2 до 10° С.

Срок годности 6 мес.

ЖЕЛЧЬ МЕДИЦИНСКАЯ КОНСЕРВИРОВАННАЯ (Chole conservata medicata). Препарат, содержащий натуральную желчь убойного скота.

Применение. Наружное обезболивающее и рассасывающее средство при острых и хронических артрозах, артритах, бурситах, тендовагинитах, спондилоартрозе, вторичном радикулите в виде компрессов. Курс лечения 6—30 дней.

Побочное действие. В отдельных случаях раздражение кожи.

Противопоказания. Нарушение целостности кожи, воспалительные и гнойничковые поражения кожи, лимфангиты, лимфадениты.

Форма выпуска. Флаконы по 250 мл.

Условия хранения. В прохладном темном месте.

Срок годности $2^1/_2$ года.

ЖЕНЬШЕНЯ НАСТОЙКА (Tinctura Ginsengi). Настойка (1:10) на 70% спирте из корней женьшеня настоящего (Panax ginseng) семейства аралиевых (Araliaceae). Содержит эфирное и жирное масла, пектины и другие углеводы, тритерпеновые гликозиды (панаксозиды А и В, панаквилон, панаксин), сапонины и другие вещества.

Фармакологическое действие. Тонизирующее средство.

Показания к применению. Гипотония, усталость, переутомление, неврастения.

Способ применения и дозы. Внутрь (до еды) по 15—25 капель 3 раза в день.

Форма выпуска. Во флаконах по 50 мл.

Условия хранения. В защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

ЖОСТЕРА (КРУШИНЫ СЛАБИТЕЛЬНОЙ) ПЛОД (Fructus Rhamni catharticae). Содержит антрагликозиды (рамнокатартин, рамноксантин, жостерин), флавоноиды (рамноцитрин, ксанторамнетин, кемпферол), пектиновые вещества, органические кислоты, сахар.

Применение. В качестве слабительного средства при хронических запорах в виде отвара (20,0:200,0) по $^1/_2$ стакана на ночь.

Форма выпуска. В упаковке по 100 г.

Условия хранения. В сухом прохладном месте.

Срок годности 4 года.

ЗАДИТЕН (Zaditen). Состав: в 1 таблетке 1 мг кетотифена.

Фармакологическое действие. Противоаллергическое средство. Тормозит высвобождение гистамина в организме, препятствуя тем самым

Отредактировал: ledi24

возникновению анафилаксии, отеку слизистых оболочек, бронхоспазму и другим проявлениям аллергической реакции.

Показания к применению. Профилактика и лечение бронхиальной астмы аллергического происхождения. Аллергический ринит.

Способ применения и дозы. Задитен назначают внутрь взрослым по 1 таблетке утром и вечером во время еды. Больным, чувствительным к седативному действию препарата, вначале назначают по $^1/_2$ таблетки в день, постепенно повышая дозу до 2 мг в день.

При необходимости суточная доза препарата может быть увеличена до 4 мг (по 2 таблетки 2 раза в день).

Детям старше 3 лет назначают по 0,025 мг/кг массы тела 2 раза в день.

Побочное действие. В начале лечения задитен может давать седативный эффект, иногда сухость во рту, легкое головокружение. Эти явления проходят без прекращения лечения.

Противопоказания. Неизвестны.

Форма выпуска. Капсулы по 1 мг, в упаковке по 30 штук.

Условия хранения. При комнатной температуре от 15 до 20°С.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Индии.

ЗАМАНИХИ НАСТОЙКА (Tinctura Echinopanacis). Настойка (1:5) на 70% спирте из корней и корневищ Echinopanax elatum (эхинопанакс высокий).

Применение. Как средство, стимулирующее центральную нервную систему, при гипотонии, астенических и депрессивных состояниях по 30—40 капель до еды 2—3 раза в день.

Форма выпуска. Во флаконах по 50 мл, анпро.

Условия хранения. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 4 года.

ЗВЕРОБОЯ ТРАВА (Herba Hyperici). Содержит дубильные вещества типа катехинов, флавоновый гликозид гиперозид, азулен, эфирное масло и другие вещества.

Применение. Как вяжущее и антисептическое средство при колитах в виде отвара (10,0—200,0) по $^1/_3$ стакана 3 раза в день за 30 мин до еды; местно для смазывания десен и полоскания рта в виде настойки (30—40 капель на стакан воды).

Форма выпуска. Резаная трава в упаковке по 100 г, брикеты по 75 г, настойка (Tinctura Hyperici) во флаконах по 25 мл, весовой.

Условия хранения. В сухом прохладном месте.

Срок годности. Настойка 4 года, трава и брикеты 3 года.

ЗЕЛЕНИНА КАПЛИ (Guttae Zelenini). Состав: настойки ландыша 10 мл, настойки валерианы 10 мл, настойки красавки 5 мл, ментола 0,2 г.

Применение. При неврозах сердца, сопровождающихся брадикардией, по 20—25 капель 2—3 раза в день.

Форма выпуска. Во флаконах по 25 мл.

Условия хранения. В защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

ЗИКСОРИН (Zixorin). 1 капсула содержит 100 мг флумецинола.

Фармакологическое действие. Способствует выведению из организма эндогенных метаболитов и ксенобиотиков, выделяющихся в форме глюкуронида. Усиливает выделение желчи.

Отредактировал: ledi24

Показания к применению. Предупреждение и лечение желтухи у новорожденных, поражение функции печени.

Способ применения и дозы. В случае желтухи новорожденных со 2-го дня жизни 10 мг/кг массы тела в течение 5 дней.

Побочное действие. Не отмечено.

Противопоказания. Неизвестны.

Форма выпуска. Капсулы по 100 мг, в упаковке 25 штук.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Венгрии.

ЗИМОЗАН (Zymosanum). Биополимер, выделенный из оболочки дрожжевой клетки, состоящий в основном из глюкана.

Фармакологическое действие. Неспецифический стимулятор кроветворения. Способен ослаблять угнетающее влияние противоопухолевых лекарственных средств и лучевого воздействия на гемопоэз.

Показания к применению. Комплексная терапия злокачественных новообразований различной локализации в тех случаях, когда необходимо защитить кроветворение от воздействия рентгеновских лучей и цитостатических веществ или восстановить его функции при угнетении.

Способ применения и дозы. Внутримышечно 5—10 инъекций через день по 0,002 г до или одновременно с облучением и химиотерапией при наличии лейкопении и тенденции к ней.

Противопоказания. Лейкоцитоз, большие опухоли, метастазы опухоли в печень.

Форма выпуска. Суспензия на изотоническом растворе натрия хлорида (1 мг/мл) в ампулах по 1 мл, в упаковке 10 штук и в ампулах по 2 мл, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. В прохладном месте.

Срок годности 2 года.

ЗИТАЗОНИУМ (Zitazonium). 2-[пара-(Дифенил-1-бутенил)-феноксй]-N,N-диметилэтиламин. Синоним: Tamoxifen, Nolvadex.

Фармакологическое действие. Основано на его антиэстрогенном свойстве.

Показания к применению. Рак молочных желез у женщин в климактерическом периоде.

Способ применения и дозы. Назначают по 0,01—0,02 г 2 раза в день при раке молочной железы в постменопаузном периоде; при овуляторной неоплодотворенности по 0,01 г 2 раза в день в течение 4 дней, начиная со 2-го дня менструации, далее дозу можно повысить до 0,02 г, а затем до 0,04 г, назначая препарат по той же схеме; в случае прекращения отделения молока после родов — по 0,01 г 4 раза в сутки в течение 5 дней; при олигоспермии по 0,01 г дважды в день.

Побочное действие. Отсутствие аппетита, тошнота, позывы к рвоте. При длительном применении иногда возникает тромбофлебит.

Противопоказания. Беременность.

Форма выпуска. Таблетки по 10 мг, в упаковке 60 таблеток.

Условия хранения. При комнатной температуре от 15 до 20°С.

Срок годности 3 года.

Поставляется из Венгрии.

ЗОЛОТОТЫСЯЧНИКА ТРАВА (Herba Centaurii). Содержит горькие гликозиды (генциопикрин, эритроцентаурин), алкалоиды (эритрицин, генцианин), флавоновый гликозид центауреин, аскорбиновую кислоту.

Применение. Для возбуждения аппетита и улучшения пищевари-

Отредактировал: ledi24

ния при пониженной функции желудочно-кишечного тракта в виде настоя (10,0:200,0) по 1 столовой ложке 3—4 раза в день за 30 мин до еды.

Форма выпуска. В упаковке по 100 г.

Условия хранения. В сухом прохладном месте.

Срок годности 2 года.

ЗУБНЫЕ КАПЛИ (Guttae odontalgicae). Состав: масла мятного 3,1 г, камфоры 6,4 г, настойки валерианы до 100 мл.

Применение. Для успокоения зубной боли по 2—3 капли на ватке на больной зуб.

Форма выпуска. Во флаконах по 10 мл.

Условия хранения. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

ИБУПРОФЕН (Ibuprofenum). d, l-2(4-Изобутилфенил) пропионовой кислоты. Синонимы: Brufen, Lamidon.

Фармакологическое действие. Нестероидный препарат, обладающий противовоспалительным, аналгезирующим и жаропонижающим свойством.

Показания к применению. Взрослым для лечения ревматоидного артрита, деформирующего остеоартроза, остеохондроза позвоночника, при артралгиях ревматического и неревматического происхождения.

Способ применения и дозы. Внутрь после еды 0,2 г 3—4 раза в день. Суточная доза 0,8—1,2 г.

Побочное действие. Изжога, тошнота, рвота, потливость, кожные аллергические реакции, в редких случаях — нарушение функции зрения.

Противопоказания. Обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, язвенный колит, амблиопия, нарушение цветового зрения, цирроз печени с портальной гипертензией, повышенная индивидуальная чувствительность к препарату.

Форма выпуска. Таблетки, покрытые оболочкой, по 0,2 г, в упаковке 100 штук.

Условия хранения. Список Б. В сухом, защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

ИЗАДРИН (Isadrinum). 1-(3,4-Диоксифенил)-2-изопропиламиноэтанола гидрохлорид. Синонимы: Aludrin, Isuprel, Novodrin, Euspiran.

Фармакологическое действие. Адренергическое вещество. Стимулятор β_1-, β_2-адренорецепторов.

Показания к применению. Для купирования и предупреждения приступов бронхиальной астмы; при астмоидных и эмфизематозных бронхитах, пневмосклерозе.

Способ применения и дозы. Внутрь по 1—2 таблетки 3—4 раза в день (держать под языком до полного рассасывания), в виде ингаляции по 0,5—1 мл 0,5% или 1% раствора 2—4 раза в день. Парентерально вводят по 0,5—1 мл 0,5% раствора.

Побочное действие. Тахикардия, аритмия, тошнота и др.

Противопоказания. Выраженный атеросклероз и аритмии сердца.

Форма выпуска. Таблетки по 0,005 г, в упаковке по 20 штук.

Из Германии препарат поставляется под названием «Новодрин» во флаконах по 100 мл 1% раствора, в ампулах по 1 мл 0,5% раствора в упаковке по 5 штук и аэрозоль по 25 г.

Из Чехо-Словакии препарат поступает под названием «Эуспиран» во флаконах по 25 мл 0,5% раствора.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Отредактировал: ledi24

Срок годности. Таблетки 4 года, раствор 5 лет, ампулы и аэрозоль 2 года.

«ИЗАМАН» («Isamanum»). Состав: изафенина 0,005 г, маннита 0,15 г.

Фармакологическое действие. Слабительное средство.

Показания к применению. Спастические и атонические запоры, неврогенные дискинезии толстого кишечника.

Способ применения и дозы. Первые 3 дня ежедневно по 1 таблетке 1—2 раза в день, затем через день и 1—2 раза в неделю, при привычных запорах по 2 таблетки однократно.

Форма выпуска. Таблетки в упаковке по 10 штук.

Условия хранения. В защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

ИЗАФЕНИН (Isapheninum). Бис-3,3,-(4-ацетоксифенил)-изатин. Синонимы: Bisatin, Purgophen.

Применение. При хронических атонических запорах в качестве слабительного средства по 0,01—0,015 г 1—2 раза в день, детям старшего возраста по 0,005—0,01 г 1—2 раза в день.

Высшая разовая доза для взрослых 0,025 г, суточная 0,05 г.

Форма выпуска. Таблетки по 0,01 г в упаковке по 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В сухом месте.

Срок годности 3 года.

ИЗОБАРИН (Isobarin). 1-(N-Азациклооктил)-этил-2-гуанидина сульфат. Соответствует отечественному препарату октадину. Синонимы: Ismelin, Octadinum.

Фармакологическое действие. Относится к симпатолитическим веществам. Понижает АД.

Показания к применению. Различные стадии гипертонической болезни, в том числе тяжелые формы со стойким повышением АД, а также со злокачественным течением.

Способ применения и дозы. Внутрь. Дозы устанавливают индивидуально от 0,025 г до 0,1 г/сут.

Побочное действие. Возможны головокружение, слабость, адинамия, диспептические явления, набухание слизистой оболочки носа, боль в околоушной железе, задержка жидкости в организме. В первые недели лечения возможен ортостатический коллапс.

Противопоказания. Выраженный атеросклероз и недостаточность функции почек, острые нарушения мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, гипотония, феохромоцитома.

Форма выпуска. Драже по 0,025 г, в упаковке по 100 штук.

Условия хранения. Список Б. В сухом, защищенном от света месте.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Югославии.

ИЗОДИБУТ (Isodibut).

Фармакологическое действие. Препарат является ингибитором альдозоредуктазы — фермента, ответственного за превращение внутриклеточной глюкозы в сорбитол. Угнетает сорбитоловый путь обмена глюкозы и стимулирует энергетические процессы в головном мозгу. Предотвращает накопление сорбитола в хрусталике, нервах, аэроте и предупреждает развитие катаракты, нейро- и ангиопатий, активизирует обменные процессы в головном мозгу.

Показания к применению. При сахарном диабете в качестве средства профилактики и лечения диабетических ангиопатий различной локализации, нейропатий, катаракты.

Отредактировал: ledi24

Способ применения и дозы. Внутрь до еды по 0,5 3—4 раза в день. Максимальная суточная доза 4 г. Курс лечения до 3 месяцев. Повторяемый курс через 6 месяцев. При наличии поражений желудочно-кишечного тракта препарат рекомендуется принимать после еды.

Побочное действие. Возможны аллергические кожные проявления. В этом случае препарат следует отменить.

Противопоказания. При тяжелых заболеваниях печени и почек с явлениями их недостаточности.

Форма выпуска. По 50 таблеток во флаконах.

Условия хранения. Список Б. В сухом, защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

ИЗОНИАЗИД (Isoniazidum). Гидразид изоникотиновой кислоты. Синонимы: Tubazid, Andrazide, INH, Iscotin.

Фармакологическое действие. Обладает высокой бактериостатической активностью в отношении микобактерий туберкулеза.

Показания к применению. Различные формы и локализации туберкулеза.

Способ применения и дозы. Внутрь, ректально, внутримышечно по 0,3 г 2—3 раза в день; детям по 0,006—0,015 г/(кг·сут) (но не более 0,5 г/сут) в 1—2 приема. Высшая разовая доза внутрь для взрослых 0,6 г, суточная 0,9 г. Полости и свищи промывают 1—2% водным раствором; разовая (и суточная) доза 0,05—0,2 г.

Побочное действие. Головокружение, головная боль, раздражительность, бессонница, парестезии, полиневриты, тошнота, рвота, аллергические реакции, желтуха, сердцебиение.

Противопоказания. Эпилепсия, склонность к судорогам, психические заболевания, ранее перенесенный полиомиелит, нарушение функции почек и печени, выраженный атеросклероз.

Форма выпуска. Порошок, таблетки в упаковке по 100 штук по 0,1 г и 0,3 г; в ампулах 10% раствор по 5 мл в упаковке по 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности. Таблетки 6 лет, ампулы 2 года.

ИЗОНИТРОЗИН (Isonitrosinum). 1-Диметиленамино-2-изонитрозобутанона-3-гидрохлорид.

Фармакологическое действие. Антидот при фосфорорганических отравлениях.

Показания к применению. Острая интоксикация или подозрение на отравление фосфорорганическими соединениями.

Способ применения и дозы. Внутримышечно 3 мл 40% раствора; при коматозных состояниях — внутривенно или внутриязычно; при необходимости препарат вводят повторно через каждые 30—40 мин. Суммарная доза 3—4 г.

Форма выпуска. В ампулах по 3 мл 40% раствора, в упаковке по 10 штук.

Условия хранения. Обычные.

Срок годности 2 года.

ИМАП (IMAP). 8-[4,4-Бис-(пара-фторфенил)-бутил]-1-фенил-1,3,8-триазаспиро-[4,5]-декан-4-ОН. Синонимы: Fluspirilen, Redeptin и др.

Фармакологическое действие. Нейролептическое средство с выраженным антипсихотическим эффектом. Оказывает пролонгированное действие. Продолжительность действия 1 инъекции —1 нед.

Показания к применению. Заболевания, сопровождающиеся

Отредактировал: ledi24

моторным или психическим беспокойством, параноидные галлюцинации, олигофрения, шизофрения, эпилептиформные психозы, делирий.

Способ применения и дозы. В стационаре препарат вводят внутримышечно 1 раз в неделю, начиная с 4—6 мг (2—3 мл), при необходимости повышая дозу до 8—10 мг (4—5 мл). После достижения оптимального эффекта количество препарата уменьшают до поддерживающей недельной дозы —2—6 мг (1—3 мл).

В амбулаторных условиях назначают 1 раз в неделю по 2—6 мг (1—3 мл).

При продолжительном лечении через каждые 3—4 нед рекомендуется делать недельный перерыв.

Побочное действие. Могут развиваться экстрапирамидные расстройства (для их предупреждения в день введения ИМАП и в следующие 2 дня назначают антипаркинсонические средства). При длительном применении ИМАП возможны похудание, общая слабость, ухудшение сна, депрессия. В 1-й день после инъекции возможны тошнота и ощущение усталости.

Противопоказания. Экстрапирамидные нарушения, депрессии, двигательные расстройства. Не следует назначать ИМАП в первые 3 мес. беременности.

Форма выпуска. Ампулы по 2 мл с 4 мг препарата (в 1 мл 2 мг ИМАП), в упаковке 3 штуки.

Условия хранения. Обычные.

Срок годности 3 года.

Поставляется из Венгрии.

ИМЕХИН (Imechinum). Йодметилат 2,2,6,6-тетраметилхинуклидина.

Фармакологическое действие. Оказывает блокирующее действие на н-холинореактивные системы и дает выраженный, но кратковременный гипотензивный эффект.

Показания к применению. Для получения управляемой артериальной гипотонии при хирургических вмешательствах, для предупреждения и купирования гипертонических кризов, лечения отеков легких и головного мозга, при гипертонии на почве острой почечной недостаточности.

Способ применения и дозы. Внутривенно. 1. Капельно со скоростью 90—120 капель в минуту в разведении 1:10 000 (1 мл 1% раствора разводят в 100 мл изотонического раствора натрия хлорида или 5% раствора глюкозы). Через некоторое время скорость введения раствора рекомендуется уменьшить до 30—50 капель в минуту. При недостаточном гипотензивном эффекте концентрацию раствора повышают до 1:5000. 2. Однократно или дробно в дозе 5—7—10 мг (0,5—0,7—1 мл 1% раствора) вводят медленно (по 2—3 мг с 3—4-минутными интервалами). 3. Комбинированно: вначале вводят 5—10 мг в виде раствора 1:10 000 или 1:5000 со скоростью 30—50 капель в минуту.

Побочное действие. Ортостатический коллапс, общая слабость, головокружение, нарушение аккомодации, сухость во рту.

Противопоказания. Тяжелые заболевания сердца, печени, тромбозы, болезни коронарных и мозговых сосудов, закрытоугольная глаукома. Не рекомендуется использовать препарат для получения управляемой гипотонии у лиц пожилого возраста, а также при поражении почек с нарушением функции.

Форма выпуска. Ампулы по 1 мл 1% раствора, в упаковке 10 штук; по 2 мл, в упаковке 10 штук.

Отредактировал: ledi24

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.
Срок годности $1^1/_2$ года.

ИМИФОС (Imiphosum). Диэтиленимид 2-метилтиазолидо-3-фосфорной кислоты. Синоним: Marcophan.

Фармакологическое действие. Цитостатический препарат. По фармакологической активности и противоопухолевому действию сходен с тиофосфамидом, но менее токсичен и обладает меньшими кумулятивными свойствами.

Показания к применению. Эритремия (истинная полицитемия) II стадии, резистентность к радиоактивному фосфору ^{32}P.

Способ применения и дозы. Внутривенно или внутримышечно по 0,05 г через день в виде 0,5% или 0,25% раствора на изотоническом растворе хлорида натрия. При необходимости интервал между введениями удлиняют до 2—4 дней. Доза на курс лечения 0,5—0,65 г. При рецидиве проводят повторные курсы лечения в тех же дозах, но не раньше, чем через 6 мес.

Побочное действие. Лейкопения и тромбоцитопения.

Противопоказания. Кахексия, значительная анемия, лейкопения и тромбоцитопения, сердечная недостаточность, тяжелые заболевания печени и почек.

Форма выпуска. Во флаконах по 0,05 г, в упаковке по 10 штук.

Условия хранения. Список А. В защищенном от света прохладном месте.

Срок годности 2 года.

ИМОДИУМ (Imodium). Состав: 1 капсула содержит 2 мг лоперамида.

Показания к применению. Острый и хронический гастроэнтерит.

Способ применения и дозы. Рекомендован взрослым и детям старше 5 лет. При острой диарее начальная доза для взрослых 2 капсулы, для детей — 1 капсула. При хроническом гастроэнтерите начальная доза 2 капсулы в день для взрослых, для детей по 1 капсуле. Поддерживающая доза 1—6 капсул в день.

Противопоказания. Опасность непроходимости кишечника, запор.

Форма выпуска. Капсулы 20 штук в упаковке.

Условия хранения. При комнатной температуре (15—20°С).

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Венгрии.

«ИНГАКАМФ» («Inhacamph»). Карманный ингалятор, содержащий ткань, пропитанную следующим составом: камфоры 0,3 г, ментола 0,17 г, метилового эфира салициловой кислоты 0,08 г, масла эвкалиптового 0,01 г.

Применение. В качестве противовоспалительного и антисептического средства для ингаляций при острых ринитах.

Форма выпуска. Ингалятор карманный.

Условия хранения. В сухом прохладном месте.

Срок годности $1^1/_2$ года.

«ИНГАЛИПТ» («Inhalyptum»). Состав: норсульфазола растворимого 0,75 г, стрептоцида растворимого 0,75 г, тимола 0,015 г, масла эвкалиптового 0,015 г, масла мятного 0,015 г, спирта этилового 95% 1,8 мл, глицерина 2,1 г, сахара 1,5 г, твина-80 0,9 г, воды дистиллированной до 30 мл. Жидкость, находящаяся в баллоне с клапаном под давлением сжатого газа азота.

Фармакологическое действие. Антисептическое и противовоспалительное средство.

Отредактировал: ledi24

Показания к применению. Тонзиллиты, фарингиты, ларингиты, афтозные и язвенные стоматиты.

Способ применения и дозы. Орошение по 1—2 $см^3$ 3—4 раза в сутки. Препарат удерживают в полости рта 5—7 мин.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к сульфаниламидам и эфирным маслам.

Форма выпуска. В аэрозольной упаковке по 30 мл.

Условия хранения. При температуре от 3 до 35°С.

Срок годности 1 год.

ИНДИГОКАРМИН (Indigocarminum). Индиго-5,5′-бис-сульфонат натрия.

Применение. Для исследования выделительной функции почек и динамической деятельности почечных лоханок и мочеточников (хромоцистоскопическая проба). Вводят внутривенно (медленно) в виде 0,4% водного раствора (подогретого до температуры тела) взрослым 4—5 мл, детям 2—3 мл. При необходимости препарат вводят внутримышечно в количестве 20 мл.

Форма выпуска. Ампулы по 5 мл 0,4% раствора, в упаковке по 10 штук.

Срок годности 3 года.

ИНДОВАЗИН (Indovasin). Состав 3% индометацина, 2% троксевазина в гельной основе.

Фармакологическое действие. Сильное противовоспалительное действие индометацина сочетается со способностью троксевазина уменьшать повышенную проницаемость капилляров и улучшать микроциркуляцию в пораженных тканях, ограничивать тромботические процессы.

Показания к применению. Бурситы, тендовагинит, синовит, варикозное расширение вен и геморрой, сопровождающийся болями и отеками, до- и послеварикозный синдром, гематомы травматического характера, состояние после иммобилизации.

Способ применения и дозы. Выжать из тюбика 1—2 см геля и наносить легкими втирающими движениями на пораженные участки 2—3 раза в день.

Побочное действие. Очень редко жалобы на желудочно-кишечные нарушения.

Противопоказания. С осторожностью при медикаментозной аллергии, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, лейкопении, геморрагическом диатезе.

Форма выпуска. Тюбики по 30 г.

Срок годности 2 года.

Поставляется из Болгарии.

ИНДОМЕТАЦИН (Indomethacin). 1-(пара-Хлорбензоил)-5-метокси-2-метилиндол-3-уксусная кислота. Синонимы: Indocid, Methindol.

Фармакологическое действие. Противовоспалительное, аналгезирующее и болеутоляющее средство.

Показания к применению. Ревматический и инфекционный неспецифический полиартрит, болезнь Бехтерева, подагрический артрит и др.

Способ применения и дозы. Назначают препарат внутрь во время или после еды, начиная с 0,025 г в день с последующим повышением дозы до 0,2 г/сут.

Мазь наносят 2 раза в сутки на больные суставы или участки тела.

Побочное действие. Головная боль, головокружение; диспептиче-

Отредактировал: ledi24

ские явления, в отдельных случаях изъязвление пищевода, желудка и кишечника, усиление боли при язвенном колите.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к препаратам салициловой кислоты, обострение язвенного процесса, бронхиальная астма.

Форма выпуска. Драже по 0,025 г в упаковке по 30 штук, мазь 10% в тубах по 40 г.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности. Драже 4 года, мазь 2 года.

Поставляется из Болгарии.

ИНКАЗАН (Incazanum). 3-Метил-8-метокси-3Н,1,2,5,6-тетрагидропиразино-[1,2,3-ab] β-карболина гидрохлорид. Синоним: Metralindol.

Фармакологическое действие. Антидепрессант четырехциклической структуры.

Показания к применению. Депрессия различного генеза (шизофрения, маниакально-депрессивный психоз, циклотимия, сосудистые заболевания головного мозга и др.). Вялоапатические, адинамические депрессии с заторможенностью, неглубокие депрессии с неврозоподобной и маловыраженной ипохондрической симптоматикой.

Способ применения и дозы. Внутрь, начиная с 0,025—0,05 г 1—2 раза в день, затем повышая дозу до 0,05—0,1 г/сут каждые 2—3 дня до достижения терапевтического эффекта. Средние суточные дозы 0,1—0,2 г.

Побочное действие. Сухость во рту, тошнота, колебания АД, брадикардия.

Противопоказания. Ажитированные депрессии и другие состояния, сопровождающиеся возбуждением. Нельзя назначать одновременно с ингибиторами моноаминоксидазы, а также в течение первых 14 дней после их отмены.

Форма выпуска. Таблетки по 0,025 г, в упаковке по 150 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

ИНМЕКАРБ (Inmecarbum). β-Диметиламиноэтилового эфира-1-бензил-2,3-диметилиндолкарбоновой-5-кислоты гидрохлорид.

Показания к применению. В качестве неспецифического вспомогательного средства в комплексном лечении больных алкоголизмом во время ремиссии. Использование одного инмекарба без комбинации с противоалкогольными средствами нецелесообразно.

Способ применения и дозы. Внутрь после еды от 0,5 до 1 г 3 раза в день. Оптимальную дозу определяют индивидуально в зависимости от состояния больного. Курс лечения не менее $1^1/_2$ мес. Курс можно повторять в течение года.

Побочное действие. Сонливость, диспептические явления, онемение слизистой оболочки ротовой полости, боль во внутренних органах и конечностях, обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, понижение АД, брадикардия.

Противопоказания. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, нарушение функции печени и почек, сердечно-сосудистая недостаточность, органические заболевания головного мозга. Не используют у подростков, беременных и женщин, кормящих грудью.

Форма выпуска. Таблетки, покрытые оболочкой, по 0,25 г, в упаковке 200 штук.

Условия хранения. Список Б. В сухом, защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

Отредактировал: ledi24

ИНСУЛИН (Insulin).

Фирма «НОВО» — Дания.

Фирма разработала новое поколение человеческого инсулина: Ново НМ.

Это наиболее совершенный человеческий инсулин в мире. Он возник в результате многолетнего совершенствования рекомбинационной ДНК-технологии. «НОВО» создала программу выработки «природного» инсулина из пекарских дрожжей.

Данный метод небактериального генного инженеринга позволяет полностью исключить наличие E. coli и других контаминантов животного происхождения. Дрожжевые полипептиды не обнаруживаются и для очистки препарата не требуется каких-либо токсических химических веществ. Важно также, что применение дрожжей обеспечит в будущем постоянный источник материала для выработки чистого человеческого инсулина (по схеме):

ДРОЖЖЕВЫЕ КЛЕТКИ
↓
ВЫДЕЛЕНИЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКА ИНСУЛИНА
↓
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКА ИНСУЛИНА
↓
ОЧИСТКА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ИНСУЛИНА
↓
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ИНСУЛИН, ПОЛУЧЕННЫЙ МЕТОДОМ ГЕННОГО ИНЖЕНЕРИНГА — НМge

Фирма «НОВО» выпускает следующие лекарственные формы:

актрапид^{R} НМ — быстродействующий растворимый инсулин

протафан^{R} НМ — изофановый инсулин промежуточного действия

актрафан^{R} НМ — готовая форма 30% быстродействующего и 70% изофанового инсулина промежуточного действия с выраженным первоначальным эффектом

монотард^{R} НМ — суспензия цинк-инсулина промежуточного действия

ультратард^{R} НМ — суспензия цинк-инсулина пролонгированного действия

Больные, ведущие активный образ действия, могут пользоваться базальным режимом инсулинотерапии, применяя, например, актрапид НМ и протафан НМ. Дозировка изменяется в зависимости от диеты и нагрузки. Больные с размеренным образом жизни предпочитают применять более удобные готовые формы инсулина, такие, как актрафан НМ.

Ново НМ-инсулины выпускаются как в гильзах Пенфилл^{R}, так и во флаконах. Гильзы Пенфилл с НовоПен^{R} и НовоПен^{R} II представляют собой идеальную инъекционную систему для больных с различной степенью активности жизни.

И только гильзы Ново Пенфилл содержат стеклянный шарик, позволяющий больным с помощью нескольких встряхиваний получать однородную суспензию кристаллов инсулина.

Инсулин Ново НМ полностью совместим с эквивалентными лекарственными формами: с Ново МС-препаратами, с Ново НМ полусинтетическим человеческим инсулином и с препаратами человеческого инсулина других фирм.

Такая высокая совместимость облегчает переход больных на инсулин Ново НМ. Они могут принимать ту же самую дозу и соблюдать тот

Отредактировал: ledi24

же терапевтический режим без изменения контрольных мер. Нет необходимости в изменении доз и дополнительном мониторинге.

Инсулин актрапид® НМ.

Нейтральный раствор человеческого монокомпонентного инсулина, который идентичен природному человеческому инсулину и обладает монокомпонентной степенью чистоты.

Актрапид НМ — прозрачный бесцветный раствор.

Выпускается в концентрациях по 40 МЕ/мл и 100 МЕ/мл.

Действие актрапида после подкожного введения проявляется примерно через $^1/_2$ часа, достигает максимума в период $2^1/_2$—5 часов и заканчивается приблизительно через 8 часов.

Актрапид® НМ Пенфилл используется в ручках-шприцах НовоПен®, НовоПен® II, а также в других системах, предназначенных специально для этих гильз.

Гильза Пенфилл содержит 1,5 мл актрапида НМ в концентрации 100 МЕ/мл.

Инсулин протафан® НМ.

Нейтральная суспензия изофанового человеческого инсулина, который идентичен природному человеческому инсулину и обладает монокомпонентной степенью чистоты.

При легком встряхивании раствор приобретает белую окраску и мутнеет.

Выпускается в концентрациях по 40 МЕ/мл и 100 МЕ/мл.

Действие препарата проявляется примерно через $1^1/_2$ часа после введения, достигает максимума в период между 4—12 часами и заканчивается приблизительно через 24 часа.

Протафан НМ Пенфилл используется в ручках-шприцах НовоПен®, НовоПен® II, а также в других системах для введения инсулина, предназначенных специально для этих гильз.

Гильза Пенфилл содержит 1,5 мл инсулина протафан НМ, активность которого 100 МЕ/мл.

Инсулин актрафан® НМ.

Для человеческого монокомпонентного инсулина НМ характерны идентичность природному человеческому инсулину и монокомпонентная степень чистоты.

При легком встряхивании раствор приобретает мутную белую окраску.

Выпускается в концентрации 40 МЕ/мл и 100 МЕ/мл.

Действие инсулина актрафан® НМ проявляется примерно через $^1/_2$ часа после введения, достигает максимума в период между 2—12 часами и заканчивается приблизительно через 24 часа.

Актрафан НМ Пенфилл используется в ручках-шприцах НовоПен, НовоПен II, а также других системах для введения инсулина, предназначенных специально для этих гильз.

Гильза Пенфилл содержит 1,5 мл инсулина актрафан НМ, активность которого 100 МЕ/мл.

Инсулин монотард® НМ.

Нейтральная суспензия человеческого монокомпонентного инсулина, для которого характерны идентичность природному человеческому инсулину и монокомпонентная степень чистоты. 30% инсулина находятся в аморфной форме и 70% — в кристаллической.

При легком встряхивании суспензия приобретает мутную белую окраску.

Выпускается в концентрации 40 МЕ/мл и 100 МЕ/мл.

Действие инсулина монотард НМ проявляется примерно через

Отредактировал: ledi24

$1^1/_2$ часа после введения, достигает максимума в период между 4—12 часами и заканчивается приблизительно через 24 часа.

Инсулин ультратард^R НМ.

Суспензия нейтрального кристаллического человеческого монокомпонентного инсулина, для которого характерны идентичность природному человеческому инсулину и монокомпонентная степень чистоты.

При легком встряхивании суспензия приобретает мутную белую окраску.

Выпускается в концентрациях 40 МЕ/мл и 100 МЕ/мл.

Действие инсулина ультратард НМ проявляется приблизительно через 4 часа, достигает максимума в период между 8—24 часами и заканчивается примерно через 28 часов.

Фирма «Эли Лилли» — США

Компания предлагает инсулины илетин II и хумулин.

Илетин II — очищенный свиной инсулин, выпускаемый в различных видах: регуляр, Н и ленте. Все эти препараты отличаются от обычного свиного инсулина, поскольку они прошли дополнительные этапы хроматографической очистки.

Инсулин ленте свиной.

Препарат объединен с цинком, чтобы сформировались кристаллы.

Начало действия: между 1 и 3 часами. Максимальный эффект наблюдается между 6 и 12 часами. Длительность действия от 18 до 26 часов.

Ленте свиной инсулин должен быть равномерно мутным или молочным. Если субстанция (мутная смесь) оседает на дне, ампулу следует покачать круговыми движениями или осторожно встряхнуть перед тем, как делать инъекцию, чтобы содержимое было смешано. Не пользуйтесь ампулой с инсулином, если вы видите хлопья, которые плавают или прилипают к ее стенкам. Также нельзя пользоваться инсулином, если он прозрачный и остается таким после того, как ампулу покрутили и встряхнули.

Инсулин регуляр свиной.

Препарат состоит из кристаллов цинк-инсулина и растворяется до прозрачного состояния. Регулярный свиной инсулин не модифицирован

Начало действия: через 30 минут. Максимальный эффект наблюдается между 2 и 4 часами. Длительность действия от 6 до 8 часов.

Регулярный инсулин должен быть прозрачным и бесцветным. Нельзя использовать инсулин, если он замутнен, необычно вязкий, имеет осадок или даже незначительно изменил цвет.

Инсулин Н свиной.

Препарат объединен с протамином и цинком.

Начало действия: между 1 и 2 часами. Максимальный эффект наблюдается между 6 и 12 часами. Длительность действия от 18 до 20 часов.

Н свиной инсулин должен быть равномерно мутным или молочным. Если субстанция (мутная взвесь) оседает на дне, ампулу следует покачать круговыми движениями или осторожно встряхнуть перед тем, как делать инъекцию, чтобы содержимое было смешано. Не пользуйтесь ампулой с инсулином, если вы видите хлопья, которые плавают или прилипают к ее стенкам. Также нельзя пользоваться инсулином, если он прозрачный и остается таким после того, как ампулу покрутили и встряхнули.

Инсулины хумулин (в ампулах и патрончиках) выпускаются в различных формах — хумулин Р, хумулин Н, хумулин Л, хумулин У, хумулин М1, хумулин М2, хумулин М3, хумулин М4 (человеческий инсулин)

Отредактировал: ledi24

Характеристика.

Хумулин Р (растворимый): стерильный, прозрачный, бесцветный жидкий раствор, pH=6.6-8.0.

Хумулин Н (изофан): стерильная суспензия, белый кристальный преципитат изофана человеческого инсулина в изотоническом фосфатном буфере, pH=6.9-7.5.

Хумулин Л (цинк суспензия): стерильная суспензия 30% аморфного и 70% кристаллического человеческого инсулина, цинковая суспензия, pH=6.9-7.5 (только ампулы).

Хумулин УП (цинковая суспензия): стерильная белая суспензия кристаллического человеческого инсулина, цинковая суспензия, pH=6.9-7.5 (только ампулы).

Хумулин М1: стерильная суспензия человеческого инсулина в пропорции 10% растворимого инсулина и 90% изофан инсулина.

Хумулин М2: стерильная суспензия человеческого инсулина в пропорции 20% растворимого инсулина и 80% изофан инсулина.

Хумулин М3: стерильная суспензия человеческого инсулина в пропорции 30% растворимого инсулина и 70% изофан инсулина.

Хумулин М4: стерильная суспензия человеческого инсулина в пропорции 40% растворимого инсулина и 60% изофан инсулина.

В каждом образце 100 ед/мл.

Хумулин Р содержит М-крезол как консервант. В хумулин Н и М смеси входят М-крезол и фенол, в хумулин У и Л — метилпарагидроксибензоат в качестве консервантов.

Хумулин Н и М смеси содержат также протамин; хумулин Л и У — окись цинка.

Использование.

Для лечения сахарного диабета, зависимого от инсулина. Хумулин представляет собой необходимый препарат во время проведения операции у пациента, в период гипергликемической комы, травмы или острой инфекции.

Дозировка и введение.

Они определяются и регулируются только под медицинским наблюдением в соответствии с состоянием пациента.

Все препараты хумулина могут вводиться подкожно или внутривенно; лишь хумулин Р в ампулах вводится внутривенно.

Подкожное введение, предпочтительное пациентам, следует делать в верхнюю часть руки, бедра, ягодицы или в брюшную область. Места укола нужно менять так, чтобы одна и та же часть тела использовалась не чаще одного раза в месяц. Позаботьтесь о том, чтобы не были затронуты капилляры. Место укола не надо массажировать.

Патрончики с хумулином используются только для инъекции в Пенах Бектон Дикинсона. При этом необходимо тщательно придерживаться указаний производителя, отмеченных на Пенах при их заправке и применении.

Пациенты должны всегда иметь под рукой запасной шприц и ампулу с хумулином на случай, если Пен-устройство для инъекции или патрончик будут утеряны.

Профили действия хумулина.

Хумулин Р: начало действия — приблизительно через 10 минут, максимум действия — между 1 и 3 часами, длительность действия — от 5 до 7 часов.

Хумулин Н: начало действия — через 30 минут, максимум действия — между 2 и 8 часами, длительность действия — от 18 до 20 часов.

Хумулин М1: начало действия — через 30 минут, максимум действия — между 2 и 9 часами, длительность действия — от 16 до 18 часов.

Отредактировал: ledi24

Хумулин М2: начало действия — через 30 минут, максимум действия — между 1 1/2 и 9 часами, длительность действия — от 14 до 16 часов.

Хумулин М3: начало действия — через 30 минут, максимум действия — между 1 и 8 1/2 часами, длительность действия — от 14 до 15 часов.

Хумулин М4: начало действия — через 30 минут, максимум действия — между 1 и 8 часами, длительность действия — от 14 до 15 часов.

Хумулин Л: начало действия — приблизительно через 2 часа, максимум действия — между 4 и 16 часами, длительность действия — около 24 часов.

Хумулин У: начало действия — через 3 часа, максимум действия — между 3 и 18 часами, длительность действия — от 24 до 28 часов.

Терапия одним препаратом.

Хумулин Р можно вводить без других видов инсулина, используя многоразовые ежедневные инъекции.

Хумулин Н, Л или У также можно вводить изолированно один или два раза в день.

Комбинированная терапия.

Для усиления первоначального эффекта некоторым пациентам дополнительно к хумулину Р назначают хумулины Н, Л и У.

Эффекты смешивания инсулинов животной группы для инсулиновых препаратов других производителей не исследовались и такая практика не рекомендуется.

Смеси.

Препараты хумулин М — готовые, предназначены для того, чтобы избежать комбинационной терапии. Их обычно следует вводить два раза в день (2/3 ежедневной потребности утром, остальное — вечером). Для любого введения доза не должна превышать 50 единиц.

Использование при беременности.

Пациенты должны обязательно информировать своих врачей о беременности. Важно в этот период сохранять хороший контроль над пациентами с диабетом, которых лечат инсулином (зависимых от инсулина). Потребности в препарате обычно падают в первом триместре и усиливаются во втором и третьем.

Использование при кормлении грудью.

Пациенткам с диабетом, которые кормят младенцев, может потребоваться коррекция дозы инсулина и/или диеты.

Противопоказания.

Гипогликемия. Ни при каких обстоятельствах не следует давать генный препарат, за исключением хумулина Р, внутривенно.

Передозировка.

Она вызывает гипогликемию, сопровождающуюся вялостью, волнениями, головной болью, сильным сердцебиением, потением и рвотой.

Мягкие гипогликемические реакции можно купировать жидкой глюкозой или сахаром.

Коррекция гипогликемии в острой форме проводится с помощью внутримышечного или подкожного введения глюкагона. Когда больной пришел в сознание, ему дают дополнительно сладкое питье.

Если же пациент находится в коматозном состоянии или не сумел среагировать на инъекцию глюкагона, следует ввести внутривенно декстрозу БПЦ.

Хранение.

Хумулин необходимо хранить в холодильнике при температуре между 2°С и 8°С, препараты не надо замораживать, держать у источников тепла или на солнечном свете.

Ампулы: если хранение в холодильнике невозможно, используемая

Отредактировал: ledi24

ампула может находиться при комнатной температуре (до 25°С) в течение одного месяца.

Патрончики: при пользовании патрончик нужно хранить при комнатной температуре (15—25°С), а не в холодильнике. Максимальное время хранения 21 день для всех хумулинов, за исключением хумулина Р, срок хранения которого 28 дней.

Перемешивание.

Ампулы с хумулином Л, У, М1, М2, М3, М4: ампулу покрутите в ладонях рук непосредственно перед использованием. Сильно не встряхивайте, поскольку это может вызвать вспенивание, что в свою очередь помешает правильно определить дозу.

Патрончики с хумулином Н, М1, М2, М3, М4: патрончик следует прокатить между ладонями 10 раз и повернуть на 180°. Перед тем как вставить его в Пен Бектон Дикинсон, проверьте патрончик на гомогенность составляющего вещества и повторите процедуру. Патрончик с хумулином Н и М нельзя использовать, если там имеются хлопья, плавающие в инсулине после составления, или твердые белые частицы прилипают ко дну и стенкам патрончика, что похоже на замерзание препарата.

Смешивание инсулина (только для ампул).

Инсулин короткого действия должен быть набран в шприц первым, чтобы предотвратить загрязнение ампулы препаратом длительного действия. Желательно ввести сразу после смешивания, особенно хумулин Л, У. Однако, если необходима отсрочка, следует соблюдать существующий порядок.

Патрончики с хумулином не приспособлены для смешивания в них другого инсулина, а также для нового наполнения.

ИНТАЛ (Intal). Динатрия хромогликат. Синоним: Chromoglycat.

Фармакологическое действие. Предупреждает спазмы бронхов.

Показания к применению. Бронхиальная астма.

Способ применения и дозы. Для ингаляций (1 капсула 3—4 раза в день) с помощью специального ингалятора.

Побочное действие. В отдельных случаях раздражение гортани и горла, особенно в период респираторных заболеваний; в редких случаях бронхоспазм.

Форма выпуска. Капсулы по 0,02 г в упаковке по 30 штук и ингалятор.

Условия хранения. В сухом прохладном месте (не ниже 0°С).

Срок годности 3 года.

Поставляется из Югославии.

ИНТЕРЛОК (Interlock). Активным веществом препарата является интерферон, получаемый посредством биосинтеза в культуре лейкоцитов донорской крови в ответ на воздействие парамиксовирусов.

Фармакологическое действие. Подавляет жизнедеятельность ряда вирусов.

Показания к применению. Предназначен для лечения вирусных заболеваний глаз (кератиты, кератоувеиты, конъюнктивиты), вызываемых герпес симплекс и герпес зостер. Особенно эффективен в начальной стадии заболеваний.

Способ применения и дозы. Содержимое ампулы растворяют в 1 мл стерильной дистиллированной воды. В острой стадии заболевания закапывают по 2—3 капли в каждый глаз 8—10 раз в день в сочетании с симптоматическим лечением. По мере стихания воспалительного процесса число закапываний уменьшают до 5—6 раз в день. Курс лечения — 12—14 дней, при необходимости — до 30 дней.

Побочное действие. Не отмечено.

Отредактировал: ledi24

Противопоказаний и ограничений к применению не имеется.

Форма выпуска. Лиофилизированный порошок (5000 МЕ) в ампуле, в упаковке 10 ампул.

Условия хранения. При температуре 2—10°С.

Срок годности 1,5 года.

ИНТЕРФЕРОН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ЛЕЙКОЦИТАРНЫЙ (Interferonum leucocyticum). Видоспецифический белок, синтезируемый лейкоцитами человека.

Показания к применению. Профилактика и лечение гриппа и других острых респираторных заболеваний вирусной этиологии.

Способ применения и дозы. Препарат вводят интраназально путем закапывания водного раствора или ингаляций. Содержимое ампулы растворяют в 2 мл кипяченой и охлажденной воды.

С целью профилактики введение препарата следует начинать при непосредственной угрозе заражения и продолжать до сохранения опасности заражения. Препарат вводят по 5 капель (0,25 мл) в каждый носовой ход 2 раза в сутки с интервалом не менее 6 ч (для введения препарата можно также использовать ингалятор любой системы).

С целью лечения препарат следует применять на ранней стадии заболевания при появлении первых симптомов. Вводят по 5 капель (0,25 мл) в каждый носовой ход через 1—2 ч не менее 5 раз в сутки в течение 2—3 сут.

Побочное действие. Не установлено.

Противопоказания. Не установлены.

Форма выпуска. Лиофилизированный порошок, ампулы по 2 мл.

Условия хранения. В сухом темном месте при температуре не выше 6°С.

Срок годности 1 год.

«ИРУКСОЛ» МАЗЬ (Unguentum «Iruxol»). В 1 г мази содержится: клостридиопептидазы А 0,6 ЕД, хлорамфеникола 10 мг.

Фармакологическое действие. Мазь для ферментного очищения ран.

Показания к применению. Варикозные раны, пролежни, ожоги II и III степени, гангрена, отморожения, послеоперационные раны.

Способ применения и дозы. Мазь ежедневно наносят на рану толстым равномерным слоем. Если необходимо усилить или ускорить действие препарата, проводят аппликации 2 раза в день.

Побочное действие. В начале лечения в области раны могут отмечаться жжение и боль, что лишь в редких случаях служит поводом к отмене препарата.

Форма выпуска. Мазь в тубах по 30 г.

Условия хранения. При температуре не выше 25°С.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Югославии.

ИСИПЕН (Isipen). Антибиотик широкого спектра действия группы пенициллина. Пиперациллин в виде натриевой соли.

Фармакологическое действие. Бактерицидный полусинтетический антибиотик пенициллинового ряда, активный в отношении как грамотрицательных патогенных микроорганизмов, так и грамположительных: стрептококков, пневмококков, стафилококков, не производящих пенициллиназу, и энтерококков, а также некоторых анаэробов, в особенности Bacteroides spp.

Показания к применению. Системные, местные и смешанные инфекции, вызванные чувствительными к препарату грамотрицательными и грамположительными аэробными и анаэробными микроорганиз-

Отредактировал: ledi24

мами. В клинической практике исипен можно назначать, не дожидаясь результатов бактериологического исследования.

Способ применения и дозы. Внутривенное введение: инъекция или капельное вливание. При этом суточная дозировка 100—200 мг/кг массы тела, разделенная на 2—4 эквивалентные дозы; в наиболее тяжелых случаях —200—300 мг/кг массы тела, разделенная на 3—4 эквивалентные дозы. Максимальное суточное количество 24 г, хотя и превышение такого показателя не приводило к неблагоприятным последствиям. При необходимости терапия может быть продолжена внутримышечными инъекциями.

Внутримышечно препарат вводится лишь с целью купирования неосложненных инфекций. Дозировка —2 г каждые 8—12 часов. Общая суточная доза до 4—6 г.

Новорожденным и детям от 2 месяцев до 14 лет исипен вводится только внутривенно. Суточная доза 100—200 мг/кг массы тела, разделенная на 2—4 эквивалентные дозы. В особо тяжелых случаях (септицемия, инфекции ЦНС) суточная дозировка может быть увеличена до 200—300 мг/кг массы тела, разделенная на 2—4 эквивалентные дозы.

При нарушении функции почек дозировка препарата должна рассчитываться в соответствии с уровнем этого нарушения: незначительное —16 г в сутки, среднее —12 г, тяжелое —8 г, больным на гемодиализе —8 г. Продолжительность лечения зависит от степени тяжести заболевания, обычно занимает еще 2—4 дня после исчезновения клинических симптомов.

Медленная внутривенная инъекция осуществляется за 3—5 минут, внутривенное вливание — за 20—40 минут; внутримышечно нельзя вводить более 2 г пиперациллина в один участок. Раствор допускается хранить в течение 24 часов при температуре до 23°С и в течение 48 часов — при 4°С, после чего неиспользованное количество уничтожается.

Если проводится комбинированная терапия, то необходимо подобрать оптимальную дозировку каждого препарата. Однако все они должны вводиться отдельно. Из-за химической нестабильности пиперациллина его не следует растворять в том же шприце, где находится раствор гидрокарбоната натрия.

Побочное действие. Отмечается редко. Как правило, это тошнота, появление жидкого стула, болевых ощущений в месте внутримышечного введения. При многократном внутривенном введении могут возникнуть флебит, изменения со стороны формулы крови (эозинофилия, тромбоцитопения, нейтропения), повышение уровня энзимов печени, подавление функции почек, легкие аллергические реакции.

Противопоказания. Гиперчувствительность к пенициллинам и инфекционный мононуклеоз. Относительные противопоказания: аллергические реакции на цефалоспориновые антибиотики, предрасположенность больного к аллергическим реакциям (бронхиальная астма, крапивница), беременность.

Форма выпуска. Флаконы по 1 и 2 г.

Срок годности 3 года.

Производится фирмой «КРКА», Словения.

ИХТИОЛ (Ichthyolum). Аммониевая соль сульфокислот сланцевого масла.

Применение. При заболеваниях кожи (ожоги, рожистое воспаление, экзема и др.), невралгиях, артритах в виде 10—20% мази, 10—30% водно-спиртового раствора для примочек; при воспалительных заболеваниях органов малого таза препарат применяют в виде свечей и 10% раствора ихтиола в глицерине для смачивания тампонов.

Отредактировал: ledi24

Форма выпуска. Мазь (Unguentum Ichthyoli) в упаковке по 25 г 10% и 20%; суппозитории ректальные по 0,2 г, в упаковке по 10 штук.

Условия хранения. В прохладном месте.

Срок годности. Ихтиол 10 лет; мазь, свечи 2 года.

ЙОД (Iodum).

Фармакологическое действие. Оказывает противомикробное действие; участвуя в синтезе тироксина, влияет на функцию щитовидной железы, усиливает процессы диссимиляции, благоприятно действует на липидный и белковый обмен.

Применение. Наружно в виде 5% спиртового раствора как антисептическое, раздражающее и отвлекающее средство, внутрь по 0,02 г на прием при атеросклерозе, хронических воспалительных процессах в дыхательных путях, при третичном сифилисе, гипертиреозе, эндемическом зобе, хронических отравлениях ртутью и свинцом.

Побочное действие. Возможны явления йодизма (насморк, крапивница и др.).

Противопоказания. При приеме внутрь: туберкулез легких, нефриты, фурункулез, угревые сыпи, хроническая пиодермия, геморрагические диатезы, крапивница, беременность, повышенная чувствительность к йоду.

Форма выпуска. Йод кристаллический ч., спиртовой 5% раствор во флаконах и ампулах по 1 мл, в упаковке по 10 штук; 5% спиртовой раствор весовой.

Условия хранения. В защищенном от света месте.

Срок годности кристаллического йода не ограничен; 5% спиртовой раствор и ампулы 3 года.

ЙОДАМИД (Iodamidum). 3-Ацетамидометил-5-ацетамидо-2,4,6-трийодбензойная кислота. Синоним: Acidum ametriodicum.

Фармакологическое действие. Диагностическое контрастное средство. Выпускается в виде йодамида-300 и йодамида-380. По химической структуре близок к триомбрасту.

Показания к применению. Как рентгеноконтрастный препарат для исследования сосудов и сердца, почек, мочевыводящих путей.

Способ применения и дозы. Для ангиокардиографии вводят в периферическую вену и непосредственно в полость сердца 30—50 мл йодамида-380; для аортографии при ретроградном введении применяют йодамид-380 из расчета 0,5—1 мл/кг; при внутривенном введении — 1 мл/кг со скоростью 18—20 мл/с.

При периферической артериографии и флебографии вводят в артерию или в вену верхней конечности 15—30 мл, а нижней конечности 20—40 мл йодамида-300 или йодамида-380 (8—12 мл/с).

Для церебральной ангиографии применяют только йодамид-300, вводят 6—10 мл (2—5 мл/с).

Для экскреторной урографии вводят в вену 20 мл йодамида-300 или йодамида-380 (0,3—0,5 мл/с).

Внутривенно капельно вводят взрослым смесь 80 мл йодамида-300 или йодамида-380 и 80 мл 5% раствора глюкозы (20—30 капель в минуту).

Для внутриполостного введения йодамид разводят 5% раствором глюкозы или изотоническим раствором натрия хлорида до получения 30% раствора йодамида. Для пиелографии ретроградно вводят в мочевые пути 6—8 мл (под рентгенологическим визуальным контролем). Для цистографии в мочевой путь вводят 100—200 мл.

Побочное действие. Возможны ощущение жара, головокружение, тошнота, учащение пульса, цианоз, крапивница, отек Квинке, астма-

Отредактировал: ledi24

тический приступ, анафилактоидные реакции. При передозировке — аритмия, фибрилляция желудочков, остановка сердца.

Противопоказания. Гипертиреоз, поражения паренхимы печени и почек, активный туберкулез, болезни миокарда, гипертоническая болезнь, шоковые состояния, коллапс, повышение индекса протромбина, нарушение свертывания крови, повышенная чувствительность к йоду.

Форма выпуска. В ампулах по 20 мл, в упаковке по 10 штук; йодамид-300, йодамид-380.

Условия хранения. В защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

ЙОДИНОЛ (Iodinolum). Состав: йода 0,1 г, калия йодида 0,3 г, спирта поливинилового 0,9 г, воды дистиллированной до 100 мл.

Фармакологическое действие. Антисептический препарат йода с удлиненным действием.

Применение. При хроническом тонзиллите промывание лакун, миндалин и супратонзиллярных пространств (4—5 промываний через 2—3 дня); при гнойных отитах закапывание по 5—8 капель и промывание в течение 2—4 нед; при атрофических ринитах пульверизация полости носа и глотки 2—3 раза в неделю в течение 2—3 мес; при трофических и варикозных язвах, гнойных ранах и ожогах повязки 1—2 раза в сутки.

Побочное действие. Возможны явления йодизма.

Форма выпуска. Во флаконах по 100 мл.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

ЙОДОЛИПОЛ (Iodolipolum). Йодированное масло. Синонимы: Iodipin, Lipiodol.

Применение. Как контрастное средство для рентгенологического исследования полостных органов; трахеи, матки и маточных труб. При бронхографии вводят до 20 мл; при метро- и сальпингографии 3—4 мл йодолипола вводят в полость матки.

Противопоказания. Общее тяжелое состояние больного, сердечная декомпенсация, аневризма грудной части аорты, выраженная эмфизема и острые, тяжело протекающие воспалительные процессы в легких.

Форма выпуска. 30% раствор в ампулах, в упаковках 10 штук по 5 мл и по 10 мл.

Условия хранения. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 4 года.

ЙОДОНАТ (Iodonatum). Водный раствор комплекса поверхностно-активного вещества с йодом; содержит около 3% йода.

Фармакологическое действие. Обладает высокой бактерицидной активностью в отношении эшерихий, золотистого стафилококка, протея, синегнойной палочки; оказывает фунгистатическое действие.

Показания к применению. Как антисептик только для обеззараживания кожи операционного поля (заменяет раствор йода).

Способ применения и дозы. В виде раствора, содержащего 1% свободного йода, для чего йодонат разбавляют в отношении 1:3 стерильной или кипяченой дистиллированной водой. В конце операции перед наложением на кожу швов повторно обрабатывают края раны 5—7 мл 1% раствора.

Форма выпуска. В бутылях оранжевого стекла с притертыми пробками.

Условия хранения. В защищенном от света месте при комнатной температуре.

Срок годности 1 год.

Отредактировал: ledi24

ЙОДОПИРОН (Iodopironum). Смесь комплекса поливинилпирролидон-йода с йодидом калия (содержит 6—8% активного йода).

Фармакологическое действие. Антисептическое средство. Обладает бактерицидной активностью в отношении эшерихий, золотистого стафилококка, протея.

Показания к применению. У взрослых в качестве кожного антисептика и в комплексном лечении гнойных ран.

Способ применения и дозы. Для обработки рук хирурга применяют 0,1% (по активному йоду) растворы; для комплексного лечения гнойных ран, обеззараживания операционного поля и обработки локтевых сгибов доноров —0,5 и 1% (по активному йоду) растворы йодопирона.

Препарат используется в стационарных условиях.

Противопоказания. Индивидуальная непереносимость йода.

Форма выпуска. Порошок, содержащий 6—8% активного йода, в упаковке по 150 г. 1% (по активному йоду) раствор йодопирона готовят в аптечных условиях.

Условия хранения. Список Б. Порошок — в сухом, защищенном от света месте; 1% раствор — во флаконах из темного стекла не более 2 мес; 0,5% и 0,1% (по активному йоду) растворы — во флаконах из темного стекла не более 4 дней со дня приготовления.

Срок годности 2 года.

ЙОДОФОРМ (Iodoformium). Трийодметан. Синоним: Formylum triiodatum.

Применение. В качестве антисептического средства при лечении инфицированных ран и язв в виде присыпок, мазей.

Форма выпуска. Порошок.

Условия хранения. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 10 лет.

ЙОПАГНОСТ (Iopagnost). α-Этил-β-(3-амино-2,4,6-трийодфенил)-масляная кислота. Синонимы: Bilipac, Cistobil, Cholevid.

Фармакологическое действие. Диагностическое рентгеноконтрастное средство.

Показания к применению. Как рентгеноконтрастный препарат для исследования желчных путей и желчного пузыря.

Способ применения и дозы. Внутрь по 1,5—3 г на ночь. Через 13—15 ч натощак делают рентгеновский снимок, при необходимости (отсутствие тени) — второй снимок через 3 ч. При наличии тени дают 2—3 яичных желтка в молоке и через $1^1/_2$ ч делают повторный снимок.

Побочное действие. Тошнота, понос, дизурические расстройства.

Противопоказания. Нефрит, уремия, острый гастроэнтерит, желтуха, сердечно-сосудистая недостаточность, гипертиреоз, повышенная чувствительность к йоду.

Форма выпуска. Таблетки по 0,5 г, в упаковке по 6 штук.

Йопагност поставляется из Чехо-Словакии. Из Словении поступает «Холевид» [3-этил-3(3-амино-2,4,6-трийодфенил)-пропионовая кислота] в таблетках по 0,5 г в упаковке по 6 штук.

Срок годности 5 лет.

КАВИНТОН (Cavinton). Одна таблетка содержит 5 мг этилового эфира аповинкаминовой кислоты; 1 ампула (2 мл) —10 мг этилового эфира аповинкаминовой кислоты.

Фармакологическое действие. Избирательно улучшает мозговой кровоток и снабжение мозга кислородом, не снижая АД и не оказывая непосредственного действия на сердце.

Показания к применению. Расстройства мозгового кровотока раз-

Отредактировал: ledi24

личной этиологии с психическими или неврологическими нарушениями (афазия, апраксия, двигательные расстройства, гипертоническая энцефалопатия, ангиоспастические и ишемические мозговые расстройства). Заболевания сосудистой и сетчатой оболочки глаз, обусловленные артериосклерозом или ангиоспазмом, частичные тромбозы, вторичная глаукома, вызванная закупоркой сосудов. Возрастные сосудистые или токсические поражения слухового нерва, головокружение лабиринтного происхождения.

Способ применения и дозы. При остро возникших нарушениях 3 раза в день по 10 мг внутривенно, затем внутрь по 1—2 таблетки 3 раза в день. Поддерживающая доза — по 1 таблетке 3 раза в день.

Противопоказания. Беременность.

Форма выпуска. Таблетки по 0,005 г, в упаковке 50 штук; ампулы по 2 мл (10 мг), в упаковке 10 штук.

Условия хранения. В защищенном от света месте.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Венгрии.

КАЗЕИНА ГИДРОЛИЗАТ (Hydrolysatum caseini). Продукт, получаемый при кислотном гидролизе белка казеина.

Фармакологическое действие. Белковый препарат для парентерального питания.

Показания к применению, способ применения, дозы и противопоказания те же, что и для гидролизина (Л-103).

Форма выпуска. Во флаконах по 400 мл.

Условия хранения. При температуре 10—23°С.

Срок годности 7 лет.

КАЛАНХОЭ СОК (Succus Kalanchoes). Сок получают из свежих листьев и травянистой части стебля растения каланхоэ (Kalanchoe pinnata (Lam.) Persoon).

Фармакологическое действие. Противовоспалительное средство, способствует быстрому очищению ран и язв от некротических тканей.

Показания к применению. Трофические язвы, незаживающие раны, ожоги, пролежни, трещины сосков у кормящих матерей, афтозные стоматиты, гингивиты и т. д.

Способ применения и дозы. На неповрежденную вокруг раны кожу (после туалета раны) наносят тонкий слой синтомициновой эмульсии, фурацилиновой мази, вазелина. При помощи шприца через иглу малого диаметра орошают рану или язву соком (1—3 мл), закрывают марлевой салфеткой (4—5 слоев), обильно смоченной соком, и накладывают повязки (ежедневно или через день). В стоматологической практике в виде аппликаций 3—4 раза в день.

Побочное действие. Изредка жжение в ране.

Форма выпуска. Во флаконах по 20 мл и во флаконах по 100 мл.

Условия хранения. При температуре не выше 10°С.

Срок годности 2 года.

КАЛЕНДУЛЫ ЦВЕТКИ (ЦВЕТКИ НОГОТКОВ) (Flores Calendulae). Содержат горькое вещество календен, каротиноиды (каротин, ликопин, виолаксинтин, рубиксантин), флавоноиды, сапонины, дубильные вещества, салициловую кислоту.

Применение. В качестве бактерицидного и противовоспалительного средства при ангине, воспалительных заболеваниях слизистой оболочки рта в виде настоя (10,0:200,0) и настойки (1 чайная ложка на стакан воды) для полоскания.

Форма выпуска. Цветки и настойка (Tinctura Calendulae) во флаконах по 50 мл.

Отредактировал: ledi24

Условия хранения. Цветки в сухом месте, настойка в прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 4 года.

КАЛЕФЛОН (Caleflonum). Очищенный экстракт из цветков ноготков лекарственных (Calendula officinalis).

Фармакологическое действие. Противовоспалительное средство.

Показания к применению. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, хронический гастрит в фазе обострения.

Способ применения. Внутрь после еды по 0,1—0,2 г 3 раза в день. Курс лечения 3—4 (до 6) нед. Можно назначать вместе с антацидными и спазмолитическими средствами.

Побочное действие. Горечь во рту, жжение в подложечной области.

Форма выпуска. Таблетки, покрытые оболочкой, по 0,1 г, в упаковке по 25 штук.

Условия хранения. Обычные.

Срок годности 4 года.

КАЛИМИН (Kalymin). Диметиловый эфир 1-метил-3-оксипиридина бромид. Синонимы: Mestinon, Pyridostigmin.

Фармакологическое действие. Препарат антихолинэстеразного действия.

Показания к применению. Миастения, двигательные нарушения после травм, параличей, энцефалит, восстановительный период после полиомиелита.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,06 г 1—3 раза в день, внутримышечно по 1—2 мл 0,5% раствора.

Побочное действие. При передозировке гиперсаливация, миоз, диспептические явления, учащенное мочеиспускание, подергивание мышц с последующей слабостью.

Противопоказания. Эпилепсия, гиперкинезы, бронхиальная астма, стенокардия, выраженный кардиосклероз.

Форма выпуска. Драже по 0,06 г, в упаковке по 100 штук, 0,5% раствор в ампулах по 1 мл, в упаковке по 10 штук.

Условия хранения. Список А.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Германии.

КАЛИПСОЛ (Calypsol). Синоним: Ketalar.

Фармакологическое действие. Быстродействующее снотворное и анестезирующее средство.

Показания к применению. Кратковременные хирургические операции и манипуляции, не требующие мышечной релаксации.

Способ применения и дозы. Вводят внутривенно и внутримышечно в индивидуальных дозах.

Средняя доза для внутривенного введения, вызывающая хирургический наркоз на 5—10 мин, равна 2 мг/кг. Препарат вводят медленно, в течение 60 с. Доза 10 мг/кг при внутримышечном введении обеспечивает 12—35-минутную анестезию. При передозировке возможна дыхательная недостаточность.

Вводить препарат необходимо в присутствии анестезиолога в стационарных условиях. Калипсол несовместим с другими наркотическими средствами и мышечными релаксантами.

Побочное действие. Повышение АД, учащение пульса. В период пробуждения галлюцинация, беспокойство.

Противопоказания. Нарушение мозгового кровообращения, гипертоническая болезнь.

Отредактировал: ledi24

Форма выпуска. 5% раствор по 10 мл во флаконе.

Условия хранения. При температуре 15—25°С в защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

Поставляется из Венгрии.

КАЛИЯ БРОМИД (Kalii bromidum).

Применение. Как успокаивающее средство при неврастении, неврозах, повышенной раздражительности. Назначают внутрь per se и в комплексе с калия йодидом по 0,1—1 г/сут.

Форма выпуска. Порошок.

Условия хранения. В защищенном от света месте.

Срок годности не ограничен.

КАЛИЯ ЙОДИД (Kalii iodidum).

Применение. При гипертиреозе, эндемическом зобе, воспалительных заболеваниях дыхательных путей, глазных заболеваниях (катаракта, глаукома и др.), бронхиальной астме в растворах и микстурах по 0,3—1 г на прием 3—4 раза в день после еды (желательно запивать молоком или киселем). При актиномикозе легких по 1 столовой ложке 10—20% раствора 4 раза в день.

Форма выпуска. Порошок.

Условия хранения. В банках оранжевого стекла.

Срок годности 3 года.

КАЛИЯ ОРОТАТ (KaNi orotas). Урацил-4-карбоновой (оротовой) кислоты калиевая соль. Синонимы: Dioron, Oropur.

Фармакологическое действие. Оказывает анаболическое действие при нарушении белкового обмена, сопровождающегося дефицитом оротовой кислоты.

Показания к применению. Заболевания печени и желчных путей, вызванные интоксикациями (кроме цирроза с асцитом); инфаркт миокарда, хроническая сердечная недостаточность, нарушения сердечного ритма; дерматозы, алиментарная и алиментарно-инфекционная гипотрофия у детей и др.

Способ применения и дозы. Внутрь (за 1 ч до еды или через 4 ч после еды) по 0,25—0,5 г 2—3 раза в день. Курс лечения (20—40 дней) при необходимости через месяц повторяют. Детям назначают из расчета 10—20 мг/(кг·сут) (в 2—3 приема).

Побочное действие. Аллергические дерматозы.

Форма выпуска. Таблетки по 0,5 г, в упаковке по 10 штук; 0,1 г, в упаковке по 10 штук для детей.

Срок годности 4 года.

КАЛИЯ ПЕРМАНГАНАТ (Kalii permanganas). Синоним: калий марганцовокислый.

Применение. В качестве антисептического средства для промывания ран, смазывания язвенных и ожоговых поверхностей, полоскания рта и горла, спринцеваний и промываний в гинекологической и урологической практике, наружно в виде водных растворов.

Форма выпуска. В мелкой расфасовке.

Срок годности не ограничен.

КАЛИЯ ХЛОРИД (Kalii chloridum).

Фармакологическое действие. Калий — основной внутриклеточный ион, играющий важную роль в регулировании функций организма.

Показания к применению. Нарушения сердечного ритма (мерцательная аритмия, пароксизмальная тахикардия), интоксикация после

Отредактировал: ledi24

введения сердечных гликозидов и диуретиков, недостаток калия в организме, в том числе при лечении кортикостероидами и др.

Способ применения и дозы. Внутрь в виде 10% раствора по 15—20 мл 3—4 раза в день (при необходимости разовую дозу увеличивают до 60—120 мл), внутривенно капельно до 2,5 г в 500 мл изотонического раствора натрия хлорида или в 5% растворе глюкозы.

Побочное действие. Парестезия, в редких случаях парадоксальная реакция (увеличение числа экстрасистол); при приеме внутрь тошнота, рвота, диарея.

Противопоказания. Нарушения выделительной функции почек, полная блокада сердца; необходима осторожность при нарушениях атриовентрикулярной проводимости.

Форма выпуска. Ампулы 4% раствор по 20 мл, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. В хорошо укупоренной таре.

Срок годности. Ампулы: 4% раствор 3 года, 10%—1 год.

КАЛЬМАГИН (Calmaginum). Комбинированный препарат состава: магния карбоната основного 4,5 г, кальция карбоната осажденного и натрия гидрокарбоната по 3 г.

Фармакологическое действие. Нейтрализует кислое содержимое желудка.

Показания к применению. Детям при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, остром и хроническом гастритах, гастродуоденитах и других заболеваниях, протекающих с гиперацидозом.

Способ применения и дозы. Внутрь в виде суспензии. В банку, содержащую 75 г препарата, наливают свежепрокипяченную теплую воду (35±5°С) до метки и периодически взбалтывают в течение 30 мин. Детям 3—6 лет назначают 5 мл суспензии на прием, 7—12 лет —7,5 мл, 13 лет и старше — по 15 мл и более. Принимают за 30 мин до еды или между приемами пищи 4—6 раз в день. Курс лечения 3—4 нед.

Побочное действие. У детей младшего возраста, находящихся на молочной диете, может развиться молочно-щелочной синдром Бернетта.

Форма выпуска. Гранулы по 75 г в банках с меткой, соответствующей 100 мл объема.

Условия хранения. В сухом, защищенном от света месте. Суспензию — в холодильнике не более 7 дней.

Срок годности 2 года.

«КАЛЬЦЕКС» («Calcex»). Комплексная соль гексаметилентетрамина и кальция хлорида.

Применение. При простудных заболеваниях по 0,5 г 3—4 раза в день.

Форма выпуска. Таблетки по 0,5 г в упаковке по 10 штук.

Срок годности 4 года.

КАЛЬЦИТРИН (Calcitrinum). Гормональный препарат, получаемый из щитовидных желез свиней, содержит гипокальциемический гормон кальцитонин (тирокальцитонин). Кальцитонин состоит из 32 аминокислотных остатков, молекулярная масса —3600.

За рубежом выпускают аналогичные препараты под названием «Кальцитар», «Кальцитонин» и др.

Фармакологическое действие. Участвует в регуляции обмена кальция и фосфатов в организме совместно с паратиреоидным гормоном и активированной формой витамина D_3. Тормозит естественный процесс костной резорбции и способствует переходу кальция и фосфатов из крови в костную ткань.

Отредактировал: ledi24

Показания к применению. Взрослым при системных заболеваниях, характеризующихся усиленной перестройкой скелета: болезни Педжета, несовершенном остеогенезе, спонтанном рассасывании костей, асептическом некрозе головок бедренных костей, климактерическом, стероидном, паратиреоидном и других видах остеопороза, фиброзной дисплазии, при осложненном течении травматического поражения костей (замедленном сращении переломов, травматическом и лучевом остеомиелите, патологической зональной перестройке костей у спортсменов и пародонтозе).

Способ применения и дозы. Внутримышечно или подкожно. Препарат растворяют в воде для инъекций. Перед началом лечения определяют содержание кальция в крови, а также проводят кожную пробу — внутрикожное введение 1 ЕД кальцитрина в 0,1 мл растворителя. Больным с содержанием кальция в крови ниже 2,5 ммоль/л (10 мг%) и больным с выраженной кожной реакцией на кальцитрин лечение не проводят.

Кальцитрин вводят 1 раз в день ежедневно в течение месяца, делая перерыв каждый 7-й день, или через день в течение 2—3 мес.

Спортсменам с патологической зональной перестройкой костей вводят по 1 ЕД в день; при системных поражениях скелета средней тяжести вводят по 2—3 ЕД в день, при тяжелых формах — по 5 ЕД в день. Повторный курс проводят не ранее 2 мес после окончания применения препарата.

Одновременно с кальцитрином рекомендуется прием препаратов кальция внутрь по 4—6 г/сут.

Побочное действие. Аллергические реакции в месте инъекции, приливы крови к лицу, повышение АД. Повышенные дозы (более 5 ЕД на инъекцию) вызывают тошноту, рвоту. Передозировка или повышенная чувствительность к препарату может привести к гипокальциемии (парестезии, подергивание мышц).

Противопоказания. Гипокальциемия, беременность и период лактации.

Форма выпуска. Флаконы, содержащие 10 ЕД для инъекций, в упаковке 5 штук.

Условия хранения. Список Б. В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 20°С.

Раствор препарата хранится при температуре 4°С не более 5 дней.

Срок годности 2 года.

КАЛЬЦИЯ ГЛИЦЕРОФОСФАТ (Calcii glycerophosphas). Глицерино-фосфорнокальциевая соль; смесь α- и β-изомеров.

Применение. Как общеукрепляющее и тонизирующее средство при общем упадке питания, переутомлении, истощении нервной системы, рахите per se и в смеси с фитином или кальция лактатом взрослым по 0,25—0,5 г, детям по 0,05—0,2 г 2—3 раза в день.

Форма выпуска. Порошок, таблетки по 0,5 г в упаковке 10 штук, таблетки, содержащие по 0,25 г кальция глицерофосфата и кальция лактата, в упаковке по 20 штук.

Условия хранения. В хорошо укупоренной таре.

Срок годности. Порошок — не ограничен, таблетки 10 лет, гранулы 5 лет.

КАЛЬЦИЯ ГЛЮКОНАТ (Calcii gluconas). Кальциевая соль глюконовой кислоты.

Фармакологическое действие. Близок к кальция хлориду, но оказывает меньшее раздражающее действие.

Применение. Применяют в тех же случаях, что и кальция хло-

Отредактировал: ledi24

рид, внутрь перед едой по 1—3 г 2—3 раза в день; детям от 0,5 г до 2—3 г 2—3 раза в день. Внутримышечно и внутривенно (медленно) вводят 5—10 мл 10% раствора ежедневно или через 1—2 дня; детям только внутривенно в зависимости от возраста от 1 до 5 мл 10% раствора каждые 2—3 дня.

Побочное действие. При парентеральном введении в редких случаях наблюдается тошнота, рвота, понос, замедление пульса.

Форма выпуска. Порошок, таблетки по 0,5 г, в упаковке 10 штук, ампулы по 10 мл 10% раствора, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. В хорошо укупоренной таре.

Срок годности. Порошок 10 лет, таблетки 8 лет, ампулы 2 года.

КАЛЬЦИЯ КАРБОНАТ ОСАЖДЕННЫЙ (Calcii carbonas praecipitatus).

Применение. В качестве антацидного средства, при повышенной кислотности желудочного сока. Назначают внутрь по 0,25—1 г 2—3 раза в день.

Форма выпуска. Порошок.

Срок годности 10 лет.

КАЛЬЦИЯ ЛАКТАТ (Calcii lactas).

Применение. При тех же заболеваниях, что и кальция глюконат внутрь 2—3 раза в день по 0,5 г или по 1 столовой ложке 5—10% раствора.

Форма выпуска. Порошок, таблетки по 0,5 г в упаковке 10 штук.

Условия хранения. В хорошо укупоренной таре.

Срок годности. Порошок 5 лет. Таблетки 4 года.

КАЛЬЦИЯ ПАНГАМАТ (Calcii pangamas). Смесь кальциевой соли эфира глюконовой кислоты и диметилглицина с глюконатом кальция и хлоридом кальция в соотношении не менее 70%, не более 25% и не более 6%. Синоним: витамин B_{15}.

Фармакологическое действие. Улучшает липидный обмен. Повышает усвоение кислорода тканями, а также содержание гликогена в мышцах и печени. Устраняет гипоксию.

Показания к применению. Атеросклероз. Эмфизема легких. Пневмония. Хронические гепатиты. Алкогольная интоксикация. Отравления наркотиками, хлорсодержащими органическими соединениями, антибиотиками тетрациклинового ряда, кортикостероидами, сульфаниламидными препаратами. Зудящие дерматозы.

Способ применения и дозы. Внутрь. Суточная доза для взрослых 100—300 мг, для детей до 3 лет 50 мг, от 3 до 7 лет 100 мг, от 7 до 14 лет 150 мг. Курс лечения (20—40 дней) через 2—3 мес может быть повторен.

Противопоказания. Глаукома, гипертоническая болезнь.

Форма выпуска. Таблетки, покрытые оболочкой, по 0,05 г, в упаковке 100 штук.

Условия хранения. В сухом месте при температуре не выше 18°С.

Срок годности 2 года.

КАЛЬЦИЯ ПАНТОТЕНАТ (Calcii pantothenas). Кальциевая соль D=(+)=пантотеновой кислоты. Синоним: витамин B_3.

Фармакологическое действие. Входит в состав кофермента А. Играет важную роль в процессах ацетилирования и окисления. Участвует в углеводном и жировом обмене и в синтезе ацетилхолина.

Показания к применению. Полиневриты, невралгии, парестезии, фотодерматозы, экзема. Аллергические реакции (дерматиты, сенная лихорадка). Трофические язвы, ожоги. Токсикозы беременных. Катары

Отредактировал: ledi24

верхних дыхательных путей, бронхит, бронхиальная астма. Послеоперационная атония кишечника. Интоксикация стрептомицином.

Способ применения и дозы. Внутрь взрослым по 0,1—0,2 г 2—4 раза в день. Детям в возрасте 1—3 лет по 0,05—0,1 г 2 раза в день, 3—14 лет по 0,1—0,2 г 2 раза в день. Суточная доза для взрослых 0,4—0,8 г, для детей 0,2—0,4 г. При атонии кишечника назначают по 0,25 г каждые 6 ч. Парентерально 1—2 мл 20% раствора 1—2 раза в день. Курс лечения 3—4 мес.

Побочное действие. Возможны тошнота, рвота, азотемия.

Форма выпуска. Порошок 100 г, таблетки по 0,1 г, в упаковке 50 штук, ампулы по 1 мл 20% раствора, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. В сухом, защищенном от света месте.

Срок годности. Порошок 2 года, ампулы 2 года, таблетки 1 год.

КАЛЬЦИЯ ХЛОРИД КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ (Calcii chloridum).

Фармакологическое действие. Необходим для осуществления процессов передачи нервных импульсов, сокращения скелетных мышц и мышцы сердца, для формирования костной ткани, свертывания крови и нормальной деятельности других органов и систем.

Показания к применению. Недостаточная функция паращитовидных желез, повышенное выделение кальция из организма; аллергические заболевания и осложнения; необходимость уменьшения проницаемости сосудов; паренхиматозный гепатит, токсические поражения печени, нефрит, эклампсия; как кровоостанавливающее средство и противоядие (при отравлении солями магния, щавелевой кислотой и др.).

Способ применения и дозы. Внутрь после еды по 1 столовой, десертной или чайной ложке 5—10% раствора 2—3 раза в день; внутривенно (медленно) по 5—15 мл 10% раствора.

Побочное действие. Чувство жара при внутривенном введении.

Противопоказания. Склонность к тромбозам, выраженный атеросклероз, повышенное содержание кальция в крови.

Форма выпуска. Порошок, 10% раствор в ампулах по 5 мл и по 10 мл в упаковках по 10 штук.

Условия хранения. Порошок в сухом месте.

Срок годности. Порошок — не ограничен, ампулы 10 лет

«КАМЕТОН» АЭРОЗОЛЬ («Cametonum» aërosolum). Содержит хлорбутанолгидрат 0,1 г, камфору 0,1 г, ментол 0,1 г, масло эвкалиптовое 0,1 г, масло вазелиновое 0,6 г, фреон 20,0 г.

Фармакологическое действие. Противовоспалительное и антисептическое средство.

Показания к применению. Острые и хронические (в стадии обострения) воспалительные заболевания носа, глотки и гортани.

Способ применения и дозы. Распыляется в области рта и носа 3—4 раза в день в течение 1—2 с. Длительность ингаляции 1—2 мин.

Противопоказания. Возраст до 5 лет.

Форма выпуска. В баллонах по 30 г с распылительной насадкой.

Условия хранения. При температуре не выше 40°С, оберегать от ударов.

Срок годности 1 год.

«КАМФОМЕН» АЭРОЗОЛЬ («Camphomenum» aërosolum). Содержит 0,1% спиртового раствора фурацилина 2 мл, ментола 0,06 г, масла эвкалиптового, масла камфорного и масла касторового по 0,61 г, масла оливкового до 10 г, фреона 20 г.

Отредактировал: ledi24

Фармакологическое действие. Противомикробное и противовоспалительное средство.

Показания к применению. Острый ринит, фарингит, фаринголарингит.

Способ применения и дозы. Распыляется в полости рта и носа 3—4 раза в день, по 1—3 распыления на процедуру.

Противопоказания. Препарат не назначают детям в возрасте до 5 лет, а также больным, работающим в условиях значительной запыленности воздуха.

Форма выпуска. Аэрозольные баллоны с дозиметром по 30 г.

Условия хранения. В защищенном от света месте при температуре не выше 35—40°С. Оберегать от ударов.

Срок годности 1 год.

КАМФОНИЙ (Camphonium). N (γ-диметиламинопропил)-камфидина дийодметилат.

Фармакологическое действие. Снижает АД, расширяет периферические кровеносные сосуды.

Показания к применению. Облитерирующий эндартериит, гипертоническая болезнь I—II стадии, язвенная болезнь желудка.

Способ применения и дозы. Принимают внутрь независимо от приема пищи. Дозы препарата должны быть строго индивидуальны, устанавливаются в зависимости от характера заболевания и составляют 0,01—0,1 г 1—2 раза в день. Парентерально вводят, начиная с 0,5—1 мл 1% раствора, при хорошей переносимости разовую дозу можно увеличить до 5 мл; инъекции производят 1—3 раза в день.

Побочное действие. Возможны общая слабость, учащение пульса, сухость во рту, расширение зрачков, запор. В этих случаях прием препарата следует прекратить и обратиться к врачу.

Противопоказания. Гипотония, выраженный артериосклероз, органические поражения миокарда, тромбозы, хроническая коронарная недостаточность, глаукома, инфаркт миокарда, кровоизлияние в мозг.

Форма выпуска. Таблетки по 0,01 г, в упаковке 50 штук, 1% раствор в ампулах по 1 мл, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности. Таблетки и ампулы 3 года.

КАМФОРА (Camphora).

Фармакологическое действие. Возбуждает центральную нервную систему, стимулирует кровообращение и дыхание, а также оказывает положительное влияние на обменные процессы в миокарде.

Показания к применению. Острая и хроническая сердечная недостаточность, гипотония, коллапс; для профилактики и лечения нарушений кровообращения при инфекционных заболеваниях, пневмонии, гнойном плеврите, отравлениях наркотиками, снотворными.

Способ применения и дозы. Подкожно по 1—5 мл 20% масляного раствора; внутрь по 0,1—0,2 г растертой камфоры на прием. Наружно для растираний при ревматизме, артритах и др. в виде 10% камфорного масла; для растираний и предупреждения пролежней — камфорный спирт (1 часть камфоры, 7 частей этилового спирта и 1 часть воды).

Побочное действие. Возможно попадание препарата в просвет сосудов и развитие масляных эмболий. Иногда крапивница, скарлатиноподобная сыпь, возбуждение, бред, судороги.

Противопоказания. Подкожное введение при эпилепсии, склонности к судорожным реакциям, недостаточной лактации. С осторожностью применяют при острых эндокардитах, аневризме крупных сосудов.

Отредактировал: ledi24

Форма выпуска. Растертая камфора в порошке, камфора рацемическая, 20% масляный раствор в ампулах, в упаковке 10 штук по 1 мл и 2 мл; масло камфорное 10% для наружного применения (Oleum camphoratum ad usum externum) во флаконах по 30 мл, спирт камфорный (Spiritus camphoratum) во флаконах по 80 г; 40 мл.

Условия хранения. В прохладном месте в хорошо укупоренной таре.

Срок годности. Порошок 6 лет, ампулы: раствор в масле не ограничен, в оливковом масле 5 лет, масло камфорное для наружного применения 2 года, спирт камфорный 1 год.

В настоящее время вместо камфоры для инъекций в ампулах широко используется сульфокамфокаин (см.).

КАНАМИЦИНА МОНОСУЛЬФАТ (Kanamycini monosulfas).

Фармакологическое действие. Препарат широкого спектра антимикробного действия. Устойчивость к нему развивается медленно. При приеме внутрь почти не всасывается из пищеварительного тракта. Не обладает кумулятивным свойством.

Показания к применению. Кишечные инфекции (дизентерия, дизентерийное бактерионосительство, бактериальный колит и энтероколит); для подготовки больных к операциям на желудочно-кишечном тракте.

Способ применения и дозы. Внутрь 4—6 раз в сутки по 0,5—0,75 г Высшая суточная доза 4 г. Детям из расчета 50 мг (кг·сут); недоношенным и детям первого месяца жизни назначать только по жизненным показаниям. Курс лечения 7—10 дней.

В предоперационном периоде взрослым назначают в 1-е сутки 6 г, а в последующие 2 сут по 1 г 4 раза.

Побочное действие. В единичных случаях тошнота, жидкий стул.

Противопоказания. Нарушение функции почек, поражения слухового нерва, непроходимость кишечника, а также прием препарата в сочетании со стрептомицином, мономицином, неомицином, гентамицином и флоримицином.

Форма выпуска. Таблетки по 0,125 г, в упаковке 10 штук, по 0,25 г, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В сухом темном месте при комнатной температуре.

Срок годности 2 года.

КАНАМИЦИНА СУЛЬФАТ (Kanamycini sulfas). Образуется при биосинтезе Streptomyces Kanamyceticus. Синонимы: Kanacin, Resistomycin.

Фармакологическое действие. Характеризуется широким спектром антибактериального действия. Высокоактивен в отношении кислотоустойчивых бактерий (включая Mycobacterium tuberculosis), большинства грамположительных и грамотрицательных бактерий (Aerobacter, aerogenes, Kl. pneumoniae. E. coli, Neisseria, Proteus, Salmonella, Shigella, Staphylococcus).

При внутримышечном введении быстро всасывается в кровь и сохраняется в терапевтической концентрации в течение 8 ч. Выводится в основном почками.

Наименее токсичен из препаратов неомицинового ряда, не обладает кумулятивным свойством.

Показания к применению. Туберкулез, вызванный микобактериями, устойчивыми к стрептомицину и фтивазиду; инфекционные болезни (пневмония, легочные нагноения, сепсис, пиелонефрит, пиелит, пиелоци-

Отредактировал: ledi24

стит), для предупреждения гнойных осложнений при хирургических вмешательствах.

Способ применения и дозы. Внутримышечно при туберкулезе в дозе 1 г в 2 приема, или однократно в течение 6 дней в неделю с перерывом каждый 7-й день.

При инфекциях нетуберкулезной этиологии по 0,5 г 2—3 раза в сутки в течение 5—7 дней. Детям из расчета 15—20 мг/(кг·сут).

Побочное действие. Длительное введение может вызвать поражение слухового нерва (неврит) и нарушение функции почек (микрогематурия, альбуминурия и др.).

Противопоказания. Нарушение функции почек и поражение слухового нерва, а также в сочетании со стрептомицином, мономицином; неомицином, гентамицином, флоримицином.

Форма выпуска. Во флаконах в комплекте с водой дистиллированной по 0,5 г и по 1 г, 5% раствор в ампулах по 10 мл, в упаковке по 10 штук, пленки глазные по 0,001 г, в упаковке по 30 штук.

Условия хранения. Список Б. В сухом темном месте при комнатной температуре.

Срок годности. Для инъекций во флаконах и ампулы 2 года, пленки 2 года.

КАНОКСИЦЕЛ (Canoxicelum). Сополимер D-глюкопиранозы и ангидроглюкуроновой кислоты, в котором часть карбоксильной группы связана с канамицином.

Фармакологическое действие. Оказывает местно гемостатическое и антибактериальное действие на грамположительные и грамотрицательные микроорганизмы.

Показания к применению. Капиллярное и паренхиматозное кровотечение (при различных оперативных вмешательствах на органах грудной и брюшной полости, костях, суставах, в гинекологической практике и др.), для профилактики нагноения в послеоперационном периоде.

Способ применения и дозы. Каноксицел извлекают из упаковки с соблюдением правил асептики и накладывают на кровоточащую поверхность, прижимая к ране. Применяют однократно, не следует использовать более одной салфетки. Будучи оставленным в ране, каноксицел рассасывается в тканях организма в течение 1 мес, оказывая пролонгированное (в крови 2—3 дня, в ближайших тканях 10—14 дней) антибактериальное действие.

Побочное действие. Аллергия в результате повышенной чувствительности к канамицину.

Противопоказания. Неврит слухового нерва, недостаточность функции почек и печени.

Форма выпуска. Стерильная салфетка размером 5·10 см в герметически укупоренном флаконе по 1 штуке.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте при температуре не выше 10°С.

Срок годности 2 года.

КАПОТЕН (Capoten). Синоним: каптоприл.

Фармакологическое действие. Эффективное средство для лечения больных с сердечной недостаточностью и гипертонической болезнью.

Показания к применению. При гипертонической болезни у взрослых и детей может использоваться per se или в сочетании с другими противогипертоническими препаратами.

Капотен рекомендуется для лечения больных с сердечной недостаточностью, которые слабо реагируют или вообще не поддаются

Отредактировал: ledi24

лечению с помощью обычной терапии. Препарат используют вместе с диуретиками.

Способ применения и дозы. Для взрослых начальная доза при гипертонии составляет 25 мг 2—3 раза в день. Если через 2 нед удовлетворительного снижения АД не отмечается, дозу препарата можно увеличить до 50 мг 2—3 раза в день. Начальную дозу следует вводить при тщательном медицинском контроле. При сердечной недостаточности назначают 25 мг 3 раза в день. Максимальная суточная доза 450 мг.

Для детей начальная доза 0,3 мг/кг, препарат вводят при тщательном медицинском наблюдении.

Побочное действие. Наблюдается зуд, покраснение лица, боль в животе.

Форма выпуска. Таблетки по 25 мг, в упаковке 40 таблеток.

Условия хранения. В сухом месте при температуре не выше 30°С.

Срок годности 3 года.

Поставляется из Югославии.

«КАПСИН» («Capsinum»). Состав: этилового (или метилового) эфира салициловой кислоты 1 часть, масла беленного и настойки перца стручкового по 2 части.

Применение. При радикулитах, невритах, миозитах, артритах наружно для растираний.

Форма выпуска. Во флаконах по 50 мл.

Условия хранения. В прохладном месте.

Срок годности 2 года.

«КАПСИТРИН» (Capsitrinum). Состав: настойки стручкового перца 27 мл, настойки зверобоя 1 мл, мыла зеленого 10 г, раствора аммиака 20% 6 мл, спирта этилового 60% 56 мл.

Применение. При радикулитах, невритах, миозитах, артритах наружно для растираний.

Форма выпуска. Во флаконах по 100 мл.

Условия хранения. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

КАПУСТА МОРСКАЯ (Laminaria). Содержит альгинат (30%), маннит (20—25%), витамины B_1, B_2, B_{12}, С, D, каротиноиды, органические соединения йода, микроэлементы (марганец, медь, серебро, кобальт, бор).

Применение. В качестве легкого слабительного средства при хронических атонических запорах (особенно больным с явлениями атеросклероза) по $^1/_2$—1 чайной ложке на ночь (запивать водой).

Противопоказания. Нефриты, геморрагические диатезы и заболевания, при которых противопоказаны препараты йода.

Форма выпуска. В упаковке по 150 г.

Срок годности 3 года.

КАРБЕНИЦИЛЛИНА ДИНАТРИЕВАЯ СОЛЬ (Carbenicillinum dinatricum). Динатриевая соль 6-α-карбоксифенил-ацетамидо-пенициллановой кислоты. Синоним: пиопен.

Фармакологическое действие. Антибиотик из группы пенициллинов, оказывающий антимикробное действие.

Показания к применению. Заболевания, вызванные чувствительными к этому препарату грамотрицательными микроорганизмами, септицемия, эндокардит, менингит, остеомиелит, раневая инфекция, инфицированные ожоги, перитонит, пневмония, инфекция мочевого тракта, гнойный отит и др.

Отредактировал: ledi24

Применение при инфекциях, вызванных грамположительными микроорганизмами, нецелесообразно.

Способ применения и дозы. Вводят внутримышечно, внутривенно (медленно струйно или капельно) только в условиях стационара в дозе, указанной в инструкции. При внутримышечном введении суточная доза для взрослых составляет 4—8 г в зависимости от выделенного возбудителя; суточная доза для детей —50—100 мг/кг. Суточную дозу делят на 4—6 введений. Продолжительность лечения определяется формой и тяжестью заболевания (в среднем 10—14 дней).

Для внутримышечного введения 1 г препарата растворяют в 2 мл дистиллированной воды для инъекций. Для внутривенного введения применяют раствор с концентрацией не более 1 г препарата в 20 мл 5% раствора глюкозы или изотонического раствора натрия хлорида.

Побочное действие. При развитии аллергических реакций антибиотик отменяют и проводят соответствующие лечебные мероприятия. При внутримышечном введении отмечается болезненность, при внутривенном — возможны флебиты.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к препаратам группы пенициллинов.

Форма выпуска. Флаконы по 1 г для инъекций.

Условия хранения. В защищенном от света месте при температуре не выше 5°С.

Срок годности 2 года.

КАРБИДИН (Carbidinum). 3,6-Диметил-1, 2, 3, 4, 4а, 9а-гексагидро-γ-карболина дигидрохлорид.

Фармакологическое действие. Оказывает нейролептическое, антипсихотическое и одновременно антидепрессивное действие.

Показания к применению. Периодическая и приступообразно-прогредиентная (шубообразная) шизофрения с депрессивно-параноидной структурой приступов, другие формы шизофрении с преобладанием депрессивно-бредовых расстройств, вялотекущая (простая) форма шизофрении с аффективными колебаниями алкогольные психозы и абстинентные состояния.

Способ применения и дозы. Лечение начинают с суточной дозы 12,5 мг (в 3 приема), постепенно доводят ее до 75—150 мг и более. При острых психозах лечение начинают сразу с высоких доз (100—150 мг/сут)

Побочное действие. Тремор рук, скованность, гиперкинезы и другие экстрапирамидные нарушения, которые устраняются корректорами (циклодол и др.). Изредка наблюдаются холестатические гепатиты.

Противопоказания. Нарушения функции печени, отравления наркотическими и аналгетическими средствами.

Форма выпуска. Таблетки, покрытые оболочкой, по 0,025 г, в упаковке 50 штук и 1,25% раствор в ампулах по 2 мл, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В сухом, защищенном от света месте.

Срок годности. Ампулы 2 года, таблетки 3 года.

КАРБОКРОМЕН (Carbocromenum). 3-(β-Диэтиламиноэтил)-4-метил-7-(карбэтоксиметокси)-2-оксо (1,2-хромена) гидрохлорид. Синонимы: Intensain, Intencordin.

Фармакологическое действие. Антиангинальное средство. Препарат аналогичен интенкордину.

Показания к применению. Ишемическая болезнь сердца с приступами стенокардии.

Способ применения и дозы. Внутрь после еды по 150 мг 3 раза в

Отредактировал: ledi24

день в течение 2 нед — 1½ мес. После достижения терапевтического эффекта больного переводят на поддерживающие дозы — по 75 мг 3 раза в день.

Побочное действие. Головная боль, общая слабость, сухость во рту, тошнота, рвота, кожный зуд.

Противопоказания. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, обострение хронического гастрита, заболевания печени и почек с нарушением их функции.

Форма выпуска. Таблетки по 0,075 г, в упаковке 100 штук.

Из Польши поставляется под названием «Интенкордин» в упаковке 100 таблеток.

Условия хранения. Список Б. В сухом, защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

КАРБОЛЕН (Carbolenum). Таблетки угля активированного (Tabulettae Carbonis activati) и таблетки угля активированного «КМ» (Tabulettae Carbonis activati «КМ»).

Фармакологическое действие. Способен адсорбировать газы, алкалоиды, соли тяжелых металлов, токсины и т. д.

Применение. Как адсорбирующее средство при диспепсии, метеоризме, внутрь по 1—3 таблетки 2—4 раза в день.

Форма выпуска. Таблетки по 0,25 г в упаковке по 10 штук карболен, уголь активированный «КМ».

Условия хранения. В укупоренной таре в сухом, защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

КАРДИОВАЛЕН (Cardiovalenum). Состав: консервированного и разведенного спиртом сока свежеубранной травы желтушника серого активностью 150 ЛЕД в 1 мл 17 г, адонизида активностью 85 ЛЕД в 1 мл 30 г, настойки свежесобранных корневищ и корня валерианы 46,9 г, жидкого экстракта плодов кроваво-красного боярышника 2 г, камфоры 0,4 г, спирта 96% 1,6 г, натрия бромида 2 г, хлорэтона (или метабисульфита натрия) 0,25%.

Применение. При ревматических пороках сердца, кардиосклерозе с нарушением кровообращения I—III стадии; при стенокардии, вегетативных неврозах по 15—20 капель 1—2 раза в день.

Противопоказания. Те же, что и для других препаратов, содержащих сердечные гликозиды.

Форма выпуска. Во флаконах по 25 мл.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности 1 год.

КАРЛОВАРСКАЯ СОЛЬ ИСКУССТВЕННАЯ (Sal carolinum fastitium).

Применение. В качестве слабительного утром натощак по 1 столовой ложке (детям 2—6 лет по 1 чайной ложке) на полстакана воды; как желчегонное по 1 чайной ложке на стакан теплой воды за 30—45 мин до еды 2—3 раза в день.

Форма выпуска. В упаковке по 125 г.

Из Чехо-Словакии поступает карловарская соль натуральная в упаковке по 100 г.

Условия хранения. В хорошо укупоренных банках в сухом прохладном месте.

Срок годности не ограничен.

КАРМИНОМИЦИН (Carminomycinum). Антибиотик, продуци-

Отредактировал: ledi24

руемый лучистым грибом Actinomadura carminata, относится к группе антрациклиновых антибиотиков.

Фармакологическое действие. Обладает высокой противоопухолевой и противолейкозной активностью. Угнетает кроветворение. Употребляется гидрохлорид карминомицина.

Показания к применению. Саркома мягких тканей и костей, диссеминированные формы рака молочной железы, легких, лимфогранулематоз, злокачественные опухоли у детей (симпатобластома, нефробластома, рабдомиосаркома), хорионэпителиома матки, острые миелобластные и лимфобластные лейкозы, бластный криз хронического миелолейкоза.

Способ применения и дозы. Карминомицина гидрохлорид вводят внутривенно, лечение проводят в «продленном» или «коротком» режиме. В «продленном» режиме взрослым назначают по 10—15 мг (5—7,5 мг/м^2=0,15—0,2 мг/кг) 2 раза в неделю. Курсовая доза 60—75 мг, интервал между курсами 4 нед.

Детям вводят из расчета 0,15 мг/кг.

При «коротком» режиме применяют по 5—10 мг (3—5 мг/м^2= =0,1—0,15 мг/кг) ежедневно в течение 5 дней с интервалами между курсами 3—4 нед.

При лейкопении (менее $2 \cdot 10^9$/л) и тромбоцитопении (менее $100 \cdot 10^9$/л) рекомендуется при следующем курсе уменьшить дозу на 25—50%.

Растворы препарата готовят непосредственно перед применением. Содержимое флакона (0,005 г=5 мг) растворяют в 10 мл изотонического раствора натрия хлорида.

Побочное действие. Тошнота, рвота, лейко- и тромбоцитопения, сердечно-сосудистые нарушения (боль в области сердца, тахикардия, изменение ЭКГ), при попадании карминомицина под кожу развивается некроз тканей в месте инъекции.

Противопоказания. Общее тяжелое состояние больного, тяжелые нарушения функции сердечно-сосудистой системы, печени, почек, беременность, индивидуальная непереносимость; пониженное содержание лейкоцитов (ниже $4 \cdot 10^9$/л) и тромбоцитов (ниже $100 \cdot 10^9$/л), острые лейкозы — лейкопения ниже $2 \cdot 10^9$/л.

Форма выпуска. Во флаконах по 0,005 г для инъекций.

Условия хранения. Список А. В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 20°С.

Срок годности 2 года.

КАРНИТИНА ХЛОРИД (Carnitini chloridum). D-L-N-(1-карбокси-2-оксипропил)-триметиламмония хлорид. Синонимы: долотин, новаин и др.

Фармакологическое действие. Биогенное вещество, участвующее в биохимической динамике мышечной ткани, улучшает аппетит, ускоряет рост и увеличивает массу тела.

Показания к применению. Заболевания и состояния, сопровождающиеся понижением аппетита, уменьшением массы тела, истощением, а также при задержке роста у детей.

Способ применения и дозы. Внутрь за 30 мин до еды, разбавляя препарат водой, чаем, киселем и т. д. Взрослым $^1/_2$—2 чайные ложки на прием 2—3 раза в день. Детям в зависимости от возраста дозы составляют от 4 до 42 капель на прием 2—3 раза в день, разводить в 5% растворе глюкозы или добавлять к сокам, компотам, киселю. Дозы, частота приема и длительность применения устанавливаются врачом.

Побочное действие. При приеме больших доз возможна боль в подложечной области.

Отредактировал: ledi24

Форма выпуска. 20% раствор во флаконах по 100 мл.

Условия хранения. В защищенном от света месте при комнатной температуре.

Срок годности 3 года.

КАРОТОЛИН (Carotolinum). Масляный экстракт каротиноидов из мякоти плодов шиповника, содержащий также токоферолы, ненасыщенные жирные кислоты и другие вещества.

Применение. Наружно при трофических язвах, экземах, атрофических изменениях слизистых оболочек, эритродермии.

Форма выпуска. Флаконы по 100 мл.

Условия хранения. В защищенном от света сухом месте при температуре не выше 20°С.

Срок годности 2 года.

КАРФЕЦИЛЛИН (Carphecillinum). Натриевая соль 6(α-феноксикарбонил)-фенилацетамидопенициллановой кислоты. Синоним: утициллин.

Фармакологическое действие. Антибактериальный препарат. Активен в отношении большинства грамотрицательных и грамположительных, а также всех видов индолположительных и индолотрицательных микроорганизмов.

Показания к применению. Взрослым при острых и хронических инфекциях мочевыводящих путей (цистит, пиелонефрит, уретрит), простатите и др.

Способ применения и дозы. Внутрь, независимо от приема пищи. Разовая доза 0,5 г, суточная 1,5 г. При тяжелых и хронических заболеваниях разовая — 1 г, суточная — 3 г, разделяя дозу на 3 приема. Длительность лечения 7—14 дней и более.

Побочное действие. Возможны боль в животе, тошнота, в редких случаях рвота, диарея; аллергия; при длительном применении — развитие дисбактериоза.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к препаратам группы пенициллина.

Форма выпуска. Капсулы по 0,25 г в упаковке по 20 штук.

Условия хранения. Список Б. В сухом, защищенном от света месте.

Срок годности 1 год.

КАСТОРОВОЕ МАСЛО (Oleum Ricini) (масло клещевинное)

Применение. Как слабительное средство взрослым по 15—20 г, детям 5—15 г на прием; для стимуляции родовой деятельности — 30—40 г (в сочетании с хинином и др.), при ожогах, язвах, трещинах наружно в составе мазей и бальзамов.

Противопоказания. Отравления жирорастворимыми веществами (фосфор, бензол и др.), экстрактом мужского папоротника.

Форма выпуска. Во флаконах по 30 мл и по 50 мл, капсулы по 1 г в упаковке по 15 штук.

Условия хранения. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности. Во флаконах 5 лет, капсулы 2 года.

КАТАХРОМ-ОФТАН (Catachrom-oftan). Синоним: Vitafacolum. Глазные капли, содержащие катахром, цитохром С, сукцинат натрия, аденозин, никотинамид и стабилизирующие вещества.

Фармакологическое действие. Основным действующим веществом препарата является цитохром С. По характеру действия соответствует витафаколу (Франция). Препарат улучшает кислородный обмен в роговой оболочке и ее питание, способствует ускорению репаративных процессов в переднем отделе глазного яблока.

Отредактировал: ledi24

Показания к применению. Начальные стадии катаракты и профилактика ее развития, кератиты различной этиологии (герпетические, экзогенные, травматические).

Способ применения и дозы. По 1—2 капли в пораженный глаз 3—4 раза в день. Курс лечения при кератитах 1—2 нед, при катаракте — не менее месяца.

Побочное действие. Препарат хорошо переносится больными.

Форма выпуска. Полиэтиленовые флаконы по 10 мл с капельницей.

Условия хранения. В защищенном от света месте.

Срок годности. В прохладном месте —$2^1/_2$ года, при комнатной температуре —2 года.

Поставляется из Финляндии.

КАФИОЛ (Cafiolum). Содержит измельченные листья (0,7 г) и плоды (0,3 г) сенны, плоды инжира (4,4 г), мякоть плодов сливы (2,2 г) и вазелиновое масло (0,84 г). Аналогичен регулаксу, закупаемому в Германии.

Фармакологическое действие. Слабительное средство.

Показания к применению. Запоры различного происхождения.

Способ применения и дозы. По $^1/_2$—2 брикета на прием, однократно или курсами по 10—14 дней. Высшая суточная доза 6 брикетов.

Форма выпуска. Брикеты по 8,44 г, в упаковке 6 штук.

Условия хранения. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

«КВАДЕВИТ» ТАБЛЕТКИ (Tabulettae «Quadevitum» obductae). Комбинированный препарат, содержащий комплекс витаминов, аминокислот, микроэлементов.

Фармакологическое действие. Способствует нормализации биохимических процессов, благоприятно влияет на обмен веществ (витаминный, углеводный, жиролипидный, водно-электролитный), ослабляет побочные эффекты лекарственных препаратов, стимулирует процессы репаративной регенерации, ускоряет заживление послеоперационных ран.

Показания к применению. Гиповитаминоз, авитаминоз. Недостаточность мозгового кровообращения, сердечно-сосудистая недостаточность, артериолосклеротическая хориоретинальная дистрофия макулярной области; для усиления функциональной активности печени и почек, стимуляция заживления ран, уменьшения токсичности и ослабления побочных эффектов нейротропных, химиотерапевтических и других лекарственных средств.

Способ применения и дозы. Внутрь после еды. С профилактической целью — по 1 таблетке 3 раза в день, с лечебной целью — по 2 таблетки 3—4 раза в день. Курс лечения 3—4 нед. Повторные курсы после 3-месячного перерыва.

Форма выпуска. Таблетки, покрытые оболочкой, в упаковке по 30 штук.

Условия хранения. В сухом, защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

КВАЛИДИЛ (Qualidylum). 1,6-Бис-(3,3-бензилхинуклидил-1,1)-гексана дихлорид.

Фармакологическое действие. Мышечный релаксант антидеполяризующего действия.

Показания к применению. Для мышечной релаксации при наркозе и облегчения интубации трахеи.

Способ применения и дозы. Внутривенно. Для расслабления мус-

Отредактировал: ledi24

кулатуры на 10 мин —1 мг/кг, до 15 мин —1,5 мг/кг; выраженная миорелаксация отмечается при введении 2 мг/кг (наибольший эффект при эфирном наркозе 35 мин). В последующем при необходимости вводят $^1/_3$, а затем $^1/_2$ первоначальной дозы.

Побочное действие. Повышенная саливация, потливость, умеренная тахикардия, незначительное расширение зрачков, уртикарная сыпь.

Противопоказания. Миастения.

Форма выпуска. 2% раствор в ампулах по 2 мл в упаковке по 10 штук.

Условия хранения. Список А.

Срок годности 4 года.

КВАСЦЫ ЖЖЕНЫЕ (Alumen ustum).

Применение. Как вяжущее и подсушивающее средство в виде присыпок при потливости ног и др.

Форма выпуска. В упаковке по 25 г.

Условия хранения. В хорошо укупоренных банках.

Срок годности 3 года.

КВАТЕРОН (Quateronum). α,β-Диметил-γ-диэтиламинопропилового эфира пара-бутоксибензойной кислоты йодэтилат.

Фармакологическое действие. Активный ганглиоблокатор.

Применение. При тех же заболеваниях, что и бензогексоний, а также для предупреждения приступов стенокардии. Назначают внутрь после еды по 0,02—0,04 г 3—5 раз в день. Высшая разовая доза для взрослых 0,05 г, суточная 0,2 г.

Побочное действие и противопоказания те же, что и для бензогексония.

Форма выпуска. Порошок, таблетки по 0,02 г в упаковке по 50 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности. Таблетки 3 года, порошок — не установлен.

КВЕРЦЕТИН (Quercetinum). 3,4,7,3′,4′-Пента-окси-флавон. Является агликоном рутина.

Фармакологическое действие. Понижает проницаемость капилляров и увеличивает резистентность сосудистой стенки, расширяет сосуды, понижает тонус гладкой мускулатуры, обладает спазмолитическим свойством.

Показания к применению. Повышенная проницаемость и хрупкость капилляров при гипертонической болезни, атеросклерозе, ревматизме, гематологических, инфекционных и других заболеваниях; повреждение капилляров при лечении антикоагулянтами, мышьяком, висмутом, тиоционатами; как вспомогательное и профилактическое средство при сосудистых осложнениях атеросклероза (инфаркт миокарда, инсульт, ретинопатия), при лучевой терапии и радиохирургическом методе лечения злокачественных новообразований.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,02 г 3—5 раз в день. Дозы и продолжительность лечения индивидуализируются в зависимости от клинической картины. Курс лечения до 5—6 нед. Одновременно рекомендуется назначать аскорбиновую кислоту.

Форма выпуска. Таблетки по 0,02 г в упаковке по 25 штук.

Условия хранения. В герметически укупоренных склянках оранжевого стекла в защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

КЕНАКОРТ (Kenacort). 9α-Фтор-16α-оксипреднизолон. Синонимы: Kenalog, Polcortolon.

Фармакологическое действие. Оказывает выраженное противовос-

Отредактировал: ledi24

палительное, антиаллергическое и десенсибилизирующее действие. По химической структуре и лечебным свойствам аналогичен дексаметазону и триамцинолону (полькортолону).

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,004—0,02 г в день в 3—4 приема. По получении лечебного эффекта дозу препарата постепенно уменьшают до 0,001 г в день.

Форма выпуска. Таблетки по 0,004 г в упаковке 25 штук.

Условия хранения. Список Б. В сухом прохладном месте.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Германии.

КЕНАЛОГ-40 (Kenalog-40). Синонимы: Polcortolon, Kenacort, Ledercort, Triamcinolonacetonid.

Фармакологическое действие. Синтетический кортикостероидный препарат с длительным противоаллергическим и противовоспалительным действием.

Показания к применению. Аллергические заболевания, дерматозы, ревматоидный артрит.

Способ применения и дозы. Вводят глубоко внутримышечно в дозах, определяемых тяжестью заболевания и реакцией больного. В среднем начальная доза составляет 60—80 мг 1 раз в 2—4 нед, иногда необходимый эффект дает введение 20 мг и менее. Начальная доза для детей в возрасте от 6 до 12 лет составляет 40 мг препарата. Повторные инъекции назначают при рецидивах заболевания.

Противопоказания. Острые психозы, рецидивирующее герпетическое поражение роговицы, выраженные грибковые и вирусные инфекции, активный или леченый туберкулез, артриты гонококковой или туберкулезной этиологии. Относительными противопоказаниями служат тяжелая миастения, метастазирующий рак, дивертикулит, свежие кишечные анастомозы, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, гипертоническая болезнь, синдром Иценко — Кушинга, почечная недостаточность, хронический нефрит, склонность к тромбоэмболии, тромбофлебиты, остеопороз, сахарный диабет, беременность (особенно в первые 3 мес). Детям от 6 до 12 лет назначают в исключительных случаях. Для оказания неотложной помощи при шоке детям до 6 лет не назначают.

Форма выпуска. Ампулы по 1 мл суспензии, содержащей 40 мг триамцинолона ацетонида, в упаковке 5 штук.

Условия хранения. В сухом прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Германии.

КЕТАЗОН (Ketason). 1,2-дифенил-4-(-кетобутил)-пиразолидин-3,5-дион-натрия. Синоним: кетофенилбутазон, кебузоне.

Фармакологическое действие. Кетазон предупреждает тяжелые осложнения подагры в тканях и сосудах, снижая концентрацию мочевой кислоты в крови и увеличивая ее выделение почками.

Показания к применению. Подагра во всех стадиях и формах.

Способ применения и дозы. Для лечения хронических форм подагры назначают 1—2 драже в день или через день в течение нескольких недель, при регулярном контроле гемограммы. Купирование острого приступа производят внутримышечной инъекцией содержимого 1—2 ампул препарата в день, при менее острых формах назначают 4—6 драже в день до исчезновения сильных болей и отеков. Инъекции делают в ягодичную мышцу, достаточно глубоко. Во время длительного приема кетазона ограничивают прием хлористого натрия и рекомендуют минеральные воды, содержащие литий (для предупреждения почечных колик в результате мощного уриказурического действия) Ацетилсалициловая кислота,

Отредактировал: ledi24

принимаемая одновременно, может значительно ослабить эффект препарата.

Противопоказания. Одновременная терапия антикоагулянтами кумаринового ряда, лейкопения, острая или в стадии обострения язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Относительным противопоказанием является сердечная недостаточность, гипертония, диабет, кахексия, преклонный возраст, заболевания печени и почек, беременность.

Форма выпуска. Драже по 0,25 г, упаковка 20 штук и ампулы 20% раствора по 5 и 50 ампул в упаковке.

Условия хранения. Обычные, в темном месте.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Чехо-Словакии.

КЕТАМИН (Ketaminum). 2-(орто-Хлорфенил)-2-(метиламино)-циклогексанона гидрохлорид. Синонимы: Ketanest, Ketalar, Ketaject, Kalipsol.

Фармакологическое действие. Средство для неингаляционного наркоза. Дает быстрый и непродолжительный наркотический эффект в сочетании с аналгезирующей активностью и сохранением адекватной самостоятельной вентиляции легких (доза кетамина, вызывающая апноэ, в 8 раз выше наркотической). Относительная кратковременность действия препарата обеспечивает возможность управления глубиной наркоза.

Кетамин действует на ассоциативную зону и подкорковые структуры таламуса, вызывая угнетение их функции и активируя лимбическую систему. В связи с этими особенностями анестезия кетамином называется «диссоциативной». Препарат оказывает общее анестезирующее и каталептическое действие, активизирует сердечно-сосудистую систему, соматическую аналгезию.

Минимальная доза кетамина, способная вызвать быстро наступающий гипнотический эффект при однократном внутривенном введении,— 0,5 мг/кг. При введении этой дозы сознание выключается на $1^1/_2$ мин (при дозе 1 мг/кг — на 6 мин, 1,5 мг/кг — на 9 мин, 2 мг/кг — на 10—15 мин). При внутримышечном введении действует медленнее, но продолжительнее.

Аналгетический эффект кетамина после введения в вену сохраняется до 2 ч; при внутримышечном введении действие его более продолжительно.

При введении кетамина нередко возникают галлюцинации, бред, яркие, образные сновидения. После пробуждения у больных может сохраняться длительная (до 6—8 ч) дезориентация. Частота и выраженность этих реакций уменьшаются при сочетании кетамина с нейролептиками, транквилизаторами (дроперидол, диазепам), а также с увеличением общей дозы кетамина.

Кетамин повышает АД, учащает и усиливает сокращение сердца и повышает его потребность в кислороде, расслабляет гладкую мускулатуру бронхов. Интенсивность кардиостимулирующего эффекта ослабляется при комбинации кетамина с нейролептиками, транквилизаторами.

В организме кетамин метаболизируется; основная часть его продуктов выделяется в течение 2 ч с мочой.

Показания к применению. Применяют у взрослых для мононаркоза и для комбинированного наркоза, особенно у больных с низким АД или при необходимости сохранения самостоятельной вентиляции легких или проведения искусственной вентиляции легких дыхательными смесями, не содержащими закись азота. Кетамин особенно показан в экстренной

Отредактировал: ledi24

хирургии и на этапах эвакуации, в частности, у больных с травматическим шоком и кровопотерей, при различных хирургических операциях, а также при эндоскопических процедурах, катетеризации сердца, небольших хирургических манипуляциях, перевязках, в том числе в стоматологической, офтальмологической и оториноларингологической практике.

Способ применения и дозы. Вводят внутривенно (струйно одномоментно или фракционно и капельно) или внутримышечно. Внутривенно препарат применяют из расчета 2—3 мг/кг, внутримышечно — 4—8 мг/кг. Для поддержания анестезии инъекции кетамина повторяют (по 0,5—1 мг/кг внутривенно или 3 мг/кг внутримышечно).

Поддержание наркоза непрерывной внутривенной инфузией кетамина достигается введением его со скоростью 2 мг/(кг·ч).

Кетаминовому наркозу предшествует премедикация транквилизаторами бензодиазепинового ряда (седуксен и др.).

Для усиления эффекта кетамина его обычно применяют в комбинации с нейролептиками (дроперидол) и анальгетиками (фентанил, дипидолор и др.); при этом кетамин вводят в уменьшенной дозе.

Препарат применяют в условиях стационара и скорой помощи.

Побочное действие. Возможны мышечная ригидность и непроизвольная мышечная активность, психомоторное возбуждение, для профилактики которых следует предварительно вводить (внутримышечно или внутривенно) диазепам. Чтобы уменьшить секрецию слизистых оболочек и слюнных желез, к средствам премедикации добавляют атропин (метацин). Необходимо следить за функцией дыхания, особенно за проходимостью верхних дыхательных путей, которые могут блокироваться в результате спазма жевательной мускулатуры и западения языка; в отдельных случаях возможно угнетение дыхания.

Противопоказания. Тяжелая артериальная гипертония, нарушение мозгового кровообращения, алкоголизм, эпилепсия и другие судорожные состояния, а также случаи, когда повышение АД нежелательно или опасно.

Форма выпуска. Выпускают в виде 5% раствора в ампулах по 2 мл 10 ампул в упаковке и по 10 мл в упаковке по 10 ампул.

Условия хранения. Список А. В защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

КЕФЗОЛ (Kefzol). 3-[(5-Метил-1,3,4-тиадиазол-2-ил) тиометил]-7-2-(1Н-тетразол-1-ил) ацетамидо] 3-цефем-4-карбоновой кислоты. Полусинтетический цефалоспориновый антибиотик. Синоним: Cephazolin.

Фармакологическое действие. Обладает широким спектром антибактериального действия, активен в отношении многих грамположительных, а также ряда грамотрицательных бактерий, некоторых видов протея.

Показания к применению. Заболевания, вызванные чувствительными к кефзолу микроорганизмами, тяжелые инфекции дыхательных и мочевых путей, септицемия, эндокардит, медиастинит, остеомиелит, раневая инфекция, инфицированные ожоги, перитонит и др.

Способ применения и дозы. При лечении инфекций умеренной тяжести поддержание в крови высоких концентраций достигается внутривенным или внутримышечным введением 0,5—1 г препарата каждые 6—8 ч. При лечении инфекций органов дыхания и мочевого тракта достаточна доза 0,5—1 г 2 раза в сутки. При тяжелых инфекциях назначают до 6 г/сут. Для детей доза составляет 25—30 мг/(кг·сут) в 2—3 приема, в тяжелых случаях — до 100 мг/кг.

Побочное действие. Аллергические реакции (зуд, сыпь), иногда

Отредактировал: ledi24

повышение температуры тела, лейкопения, эозинофилия, нейтропения, изменение биохимических показателей без клинических признаков повреждения печени или почек, тошнота, рвота, суперинфекция.

Противопоказания. Аллергические реакции на антибиотики цефалоспориновой группы, беременность. Препарат противопоказан недоношенным детям и детям в возрасте до 1 мес.

Форма выпуска. Флаконы по 0,25 г; 0,5 г и 1 г.

Условия хранения. В защищенном от света месте при температуре не выше 5°С.

Срок годности 2 года. В приготовленном растворе кефзол не теряет активности в течение 98 ч при хранении в холодильнике и 24 ч при комнатной температуре.

Поставляется из Югославии.

Этот препарат под названием «Цефамезин» (Cefamezin) — флаконы по 1 г — поставляется из других стран.

Срок годности 3 года.

КИНИЛЕНТИН (Kinilentin). Синоним: Chinidin bisulfat.

Фармакологическое действие. Оказывает антиаритмическое действие; уменьшает скорость прохождения ионов натрия и кальция через клеточную мембрану, уменьшает возбудимость миокарда, увеличивает рефрактерный период.

Показания к применению. Мерцательная аритмия, пароксизмальная суправентрикулярная тахикардия, а также частая экстрасистолия и желудочковая тахикардия.

Способ применения и дозы. В зависимости от состояния больного доза кинилентина подбирается индивидуально. Обычно назначают по 1—3 таблетки с интервалом 12 ч. При нарушении функции печени и почек доза должна быть меньше. Для определения переносимости препарата дают разовую дозу 0,1 г.

Побочное действие. Тошнота, рвота, понос. При передозировке препарата — головная боль, головокружение, шум в ушах, желудочковые экстрасистолы и мерцания, а также асистолия. При повышенной чувствительности к препарату — крапивница, тромбоцитопения, повышение температуры тела.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к препарату, тромбоцитопеническая пурпура, интоксикация дигиталисом и блокада предсердий, трепетание предсердий (если больной не принимал препараты дигиталиса).

Форма выпуска. Таблетки по 0,2 г, в упаковке 100 штук.

Условия хранения. Список Б. При комнатной температуре.

Срок годности 3 года.

Поставляется из Финляндии.

КИСЛОТА БОРНАЯ (Acidum boricum).

Фармакологическое действие. Антисептическое средство.

Способ применения. Применяют наружно водные и спиртовые растворы (2—4%), мазь (5—10%) и назначают также в присыпках при заболеваниях кожи.

Водный 2% раствор используют для полоскания полости рта и зева по 1 чайной ложке на стакан воды. Спиртовой раствор готовят на 70% этиловом спирте в концентрации 0,5%, 1%, 2%, 3%, 5%; применяют в виде ушных капель по 3—5 капель 2—3 раза в день. Мазь борную 5% применяют при сухости и трещинах кожи.

Меры предосторожности. При применении мази следует избегать попадания ее в глаза. В случае попадания мази в глаза их протирают ватным или марлевым тампоном, а затем промывают теплой водой.

Отредактировал: ledi24

Противопоказания. Применение борной кислоты противопоказано детям (в том числе новорожденным). Мазь не используют при острых воспалительных заболеваниях участков кожи, покрытых волосами. Растворы борной кислоты не применяют для обработки молочных желез у кормящих матерей.

Форма выпуска. Порошок 10 г; 25 г, мазь 5% по 25 г в банке.

Условия хранения. Порошок в обычных условиях. Мазь в прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности порошка не ограничен, мази 2 года.

КЛАФОРАН (Claforan). Синоним: цефотаксим.

Фармакологическое действие. Антибиотик цефалоспоринового ряда широкого спектра действия действует на все грамотрицательные бактерии.

Показания к применению. Инфекции дыхательных путей, почек и мочевыводящих путей, сепсис, менингиты и др.

Способ применения и дозы. Вводят внутривенно и внутримышечно. Дозы зависят от формы и тяжести болезни, общего состояния больного, а также от чувствительности бактерий к препарату. Общепринятая доза — 1 г 2 раза в день. При назначении больным с аллергией к пенициллину необходимо строгое наблюдение после первой инъекции.

Побочное действие. Возможны кожные высыпания, лихорадка аллергического происхождения.

Противопоказания. Аллергия к антибиотикам цефалоспоринового ряда.

Форма выпуска. Во флаконе по 1 г для инъекций.

Срок годности 2 года.

Поставляется из Югославии.

КЛИМАКТЕРИН (Climacterin). Состав одного драже: эстрадиола бензоата 25 ЕД, сухого порошка из яичника 0,03 г, нитроглицерина 0,0002 г, теобромина 0,025 г, кофеина 0,025 г, фенолфталеина 0,006 г, кальция фосфата 0,004 г.

Применение. При климактерических расстройствах внутрь по 1—2 драже 3 раза в день.

Форма выпуска. Драже в упаковке по 50 штук.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности 4 года.

Поставляется из Чехо-Словакии.

КЛИОН-Д (метронидазол) (Klion-D). состав: 1 вагинальная таблетка содержит 500 г метронидазола, 150 мг натрия миконазола.

Показания к применению. Местное лечение трихомоноза у женщин.

Способ применения и дозы. В течение 10 дней на ночь вводят глубоко во влагалище 1 таблетку, смоченную в воде.

Побочное действие. Головная боль, тошнота. В процессе лечения запрещается прием алкоголя и половая жизнь.

Противопоказания. Первые 3 мес беременности.

Форма выпуска. Таблетки по 10 штук в упаковке.

Срок годности 2 года.

Поставляется из Венгрии.

КЛИОН ИНЪЕКЦИИ (Klion) (метронидазол). Для внутривенного капельного введения. Состав: в 100 мл содержится 500 г метронидазола.

Показания к применению. Инфекции, вызванные анаэробными бактериями. Клион может применяться при абсцессах мозга, перитонитах, послеоперационных раневых инфекциях.

Отредактировал: ledi24

Способ применения и дозы. Взрослым и детям старше 12 лет вводят 100 мл внутривенно каждые 8 ч. Скорость введения 5 мл/мин. Лечение продолжают в течение 7 дней.

Для детей до 12 лет разовая внутривенная доза составляет 1,5 мл (7,5 мг) метронидазола на 1 кг массы тела.

Противопоказания неизвестны.

Побочное действие. Иногда отмечаются неприятный вкус во рту, тошнота, желудочно-кишечные расстройства.

Форма выпуска. Флаконы по 100 мл.

Срок годности 2 года.

Поставляется из Венгрии.

КЛОМИФЕНЦИТРАТ (Clomiphencitras). 1-Хлор-2-пара (2 диэтил-аминоэтокси)-фенил-1,2-дифенилэтилена цитрат. Синоним: Clostilbegyt.

Фармакологическое действие. Стимулирует выработку гонадотропина и овуляцию; оказывает выраженное антиэстрогенное действие.

Показания к применению. Стимуляция овуляции: ановуляторные расстройства гипофизарного и гипоталамического происхождения, вторичная аменорея различной этиологии, кроме гиперпролактиновой и яичниковой форм при андрогенной недостаточности и олигоспермии у мужчин, олигоменорея, постконтрацептивная аменорея и т. д.

Способ применения и дозы. Доза и продолжительность лечения зависят от чувствительности яичников. У женщин лечение начинают с 5-го дня менструального цикла и проводят на протяжении 5 дней. Назначают внутрь по 50 мг (0,05 г) 1 раз в день (перед сном). При отсутствии эффекта повторяют назначение препарата, проводя 3—5 курсов, увеличивая при этом дозу до 75—100 мг или увеличивая продолжительность курса до 10 дней. Курсовая доза, однако, не должна превышать 500 мг.

Мужчинам назначают по 50 мг 1—2 раза в день в течение 3—4 мес под систематическим контролем спермограммы.

Побочное действие. Гиперстимуляция яичников (боль внизу живота, метеоризм), менорragия, возможно кистозное увеличение яичников; во время лечения может наступить многоплодная беременность; возможны тошнота, понос, приливы, головокружение, дерматоз, нарушение зрения. При развитии этих явлений прием препарата следует прекратить. У мужчин возможна болезненность в области яичек.

Противопоказания. Доброкачественные или злокачественные новообразования, беременность. Заболевания нервной системы, печени; кровотечения, киста яичников, выпадение функции гипофиза; противопоказан лицам, деятельность которых требует повышенного внимания и быстрой реакции.

Форма выпуска. Таблетки по 0,05 г, в упаковке по 10 штук, по 30 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте, в плотно закрытых банках.

Срок годности 2 года.

КЛОТРИМАЗОЛ (Clotrimasol). Синоним: канестен.

Фармакологическое действие. Высокоактивный антимикробный препарат с широким спектром действия.

Показания к применению. Микозы кожи, вызываемые дерматофитами, почкующимися грибами, плесневыми и другими грибами, играющими роль в развитии кожных микозов, а также трихомонадный кольпит.

Способ применения и дозы. Втирать или смазывать кисточкой

Отредактировал: ledi24

пораженные участки кожи 2—3 раза в день. При дерматомикозах в течение 3—4 нед, при эритразме —3 нед, при вульвите и баланопостите 1—2 нед. При трихомонадном кольпите канестен вводят по 1 таблетке в течение 6 дней глубоко во влагалище на ночь. В первые 3 мес беременности препарат назначают с осторожностью.

Форма выпуска. Вагинальные таблетки по 0,1 г, в упаковке 6 штук; крем 1%, в тюбиках по 20 г; 1% раствор по 15 мл.

Условия хранения. При комнатной температуре в сухом, защищенном от света помещении.

Срок годности. Вагинальные таблетки 3 года, 1% раствор 3 года, 1% крем 2 года.

Поставляется из Польши.

КЛОФЕЛИН (Clophelinum). 2-(2,6-Дихлорфениламино) имидазолина гидрохлорид. Синонимы: гемитон, катапресан, хлофазолин и др.

Фармакологическое действие. Оказывает выраженное гипотензивное действие; понижает АД, урежает частоту сердечных сокращений, оказывает седативное действие и понижает внутриглазное давление.

Показания к применению. Все формы артериальной гипертонии и для купирования гипертонических кризов; в глазной практике — больным первичной открытоугольной глаукомой с умеренно повышенным или высоким внутриглазным давлением и стабилизированными зрительными функциями.

Способ применения и дозы. Внутрь, внутримышечно, подкожно, внутривенно и в виде инстилляций в глаз. При лечении артериальной гипертонии принимают внутрь (независимо от приема пищи) или вводят парентерально, а при глаукоме применяют в виде инстилляций в глаз.

Внутрь назначают по 0,000075 г (0,075 мг) 2—4 раза в день. Суточные дозы составляют обычно 0,3—0,45 мг, иногда 1,2—1,5 мг. Продолжительность лечения составляет от нескольких недель до 6—12 мес или больше, в зависимости от эффективности и переносимости препарата.

Внутримышечно и подкожно вводят по 0,5—1,5 мл 0,01% раствора; для внутривенного введения 0,5—1,5 мл 0,01% раствора разводят в 10—20 мл изотонического раствора натрия хлорида и вводят медленно в течение 3—5 мин.

Парентерально препарат применяют только в условиях стационара или системы скорой помощи.

При глаукоме клофелин применяют местно в виде инстилляций в глаз 0,125%, 0,25% или 0,5% растворов 2—4 раза в день без миотиков или (при недостаточном эффекте) в комбинации с ними. При стабильном состоянии поля зрения его применяют длительно (месяцы, годы), при отсутствии эффекта в течение первых 1—2 дней препарат отменяют.

Побочное действие. Сухость во рту, слабость, сонливость, при больших дозах — запор, ортостатический коллапс. В глазной практике 0,25% и 0,5% растворы могут вызвать нежелательное понижение АД и брадикардию.

Противопоказания. Работа, требующая повышенного внимания, быстрой психической и двигательной реакции. В глазной практике — резко выраженный атеросклероз сосудов головного мозга, артериальная гипотония.

Форма выпуска. Таблетки в упаковке по 50 штук по 0,000075 г (0,075 мг); по 0,00015 г (0,15 мг); в ампулах по 1 мл 0,01% раствора в упаковке по 10 штук; в тюбик-капельницах по 1,5 мл, в упаковке по 2 тюбика 0,125% раствор; 0,25% раствор и 0,5% раствор.

Из Германии поступают таблетки под названием «Гемитон».

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Отредактировал: ledi24

Срок годности. Порошок 5 лет, таблетки 4 года, ампулы 3 года, тюбик-капельницы глазные капли 2 года.

КОАМИД (Coamidum). Комплексный препарат кобальта и никотинамида.

Фармакологическое действие. Стимулятор кроветворения, способствует усвоению организмом железа и стимулирует процессы его преобразования.

Применение. При гипохромных и гипопластических анемиях под кожу ежедневно по 1 мл 1% раствора (при железодефицитных анемиях одновременно с препаратами железа). Курс лечения 3—4 нед.

Форма выпуска. Ампулы по 1 мл 1% раствора в упаковке по 10 штук.

Условия хранения. В защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

КОБАМАМИД (Cobamamid). Coα-[α-(5,6-диметилбензимидазолил)]-Coβ-аденозилкобамид.

Фармакологическое действие. Является природной коферментной формой витамина B_{12}, обладает анаболической активностью, участвует в ряде ферментных реакций, в синтезе нуклеиновых кислот, белка в обмене аминокислот, углеводов, липидов и др.

Показания к применению. Применяют в качестве анаболического средства у новорожденных и детей младшего возраста; при заболеваниях периферической нервной системы, при B_{12}-дефицитных анемиях, болезни печени, крови, при хроническом энтероколите.

Способ применения и дозы. Внутрь или парентерально (внутримышечно, подкожно или внутривенно). Дозы, частота введения, продолжительность лечения кобамамидом устанавливаются индивидуально для каждого больного.

Форма выпуска. Таблетки для детей в упаковке по 50 штук в дозе 0,0005 г и 0,001 г. Таблетки, покрытые оболочкой, в упаковке по 100 штук в дозе 0,0001 г; 0,0005 г; 0,001 г. Лиофилизированный порошок в ампулах для инъекций в комплекте с растворителем (1:1) в упаковке 5 штук по 0,0001 г; по 0,0005 г и по 0,001 г.

Условия хранения. В сухом, защищенном от света месте.

Срок годности. Ампулы и таблетки, покрытые оболочкой, 3 года; таблетки 2 года.

КОДЕИН (Codeinum). Метилморфин.

Фармакологическое действие. Аналогичен морфину, но действует слабее; активно тормозит кашлевой центр.

Показания к применению. Как противокашлевое средство, иногда в комбинации с седативными и снотворными препаратами в качестве успокаивающего средства.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,01—0,03 г на прием; детям в зависимости от возраста по 0,001—0,0075 г на прием.

Высшая разовая доза для взрослых 0,05 г, суточная 0,2 г.

Побочное действие. Запоры; длительное применение вызывает привыкание и пристрастие («кодеинизм»).

Противопоказания. Не назначают детям в возрасте до 2 лет.

Форма выпуска. Порошок.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 5 лет.

КОДЕИНА ФОСФАТ (Codeini phosphas). Синоним: Codeinum phosphoricum.

По **фармакологическому действию и показаниям к применению** аналогичен кодеину, назначают в тех же дозах.

Отредактировал: ledi24

Форма выпуска. Порошок.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 6 лет.

«КОДТЕРПИН» («Codterpinum»). Состав: кодеина 0,015 г, натрия гидрокарбоната 0,25 г, терпингидрата 0,25 г.

Применение. Как противокашлевое средство по 1 таблетке 2—3 раза в день.

Форма выпуска. В упаковке по 10 штук.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности 4 года.

Таблетки от кашля состава: кодеин 0,001 г, натрия гидрокарбонат 0,2 г, солодки корня порошок 0,2 г, термопсиса трава порошок 0,02 г.

Применение. Как противокашлевое средство по 1 таблетке 2—3 раза в день.

Форма выпуска. В упаковке по 10 штук.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности 4 года.

КОКАИНА ГИДРОХЛОРИД (Cocaini hydrochloridum). Метилового эфира бензоилэкгонина гидрохлорид.

Фармакологическое действие. Местноанестезирующее средство.

Применение. Для поверхностной анестезии слизистой оболочки и роговицы глаза (1—3% растворы), слизистых оболочек ротовой полости, носа, гортани (2—5% растворы). Для уменьшения всасывания кокаина и удлинения его анестезирующего действия к его растворам обычно прибавляют раствор адреналина (на 5 мл раствора кокаина 3—5 капель 0,1% раствора адреналина гидрохлорида).

Побочное действие. Возможны повышение внутриглазного давления, острый приступ глаукомы. Необходима осторожность при бронхоскопии.

Форма выпуска. Порошок.

Условия хранения. Список А. В защищенном от света месте в хорошо укупоренных банках оранжевого стекла.

Срок годности 8 лет.

КОКАРБОКСИЛАЗА (Cocarboxylasum). Тиофосфорный эфир тиамина. Синонимы: тиаминпирофосфат, Diphosphothiamin. В медицинской практике применяется кокарбоксилаза гидрохлорид.

Фармакологическое действие. Кофермент тиамина. Входит в состав фермента карбоксилазы, катализирующего карбоксилирование и декарбоксилирование α-кетокислот.

Показания к применению. Ацидоз и прекоматозное состояние при сахарном диабете. Нарушения сердечно-сосудистой деятельности (изменение сердечного ритма, экстрасистолия, бигеминия пароксизмальная тахикардия) и нарушение коронарного кровообращения. Инфаркт миокарда.

Способ применения и дозы. Внутримышечно и внутривенно. При сердечно-сосудистых заболеваниях разовая доза для взрослых 0,05—0,1 г, суточная 0,05—0,2 г. Курс лечения 15—30 дней. При сахарном диабете суточная доза для взрослых 0,075—1 г. Курс лечения 5—10 дней.

Побочное действие и противопоказания. Те же, что и при введении препаратов тиамина бромида.

Форма выпуска. В ампулах по 0,05 г, в упаковке по 10 штук в комплекте с растворителем 1:1.

Условия хранения. В прохладном месте при температуре не выше 5°С.

Срок годности 2 года.

Отредактировал: ledi24

Из Польши препарат поставляется в ампулах по 0,05 г в упаковке по 3 штуки с приложением растворителя.

Срок годности 3 года.

КОЛИБАКТЕРИН СУХОЙ (Colibacterinum siccum). Высушенная взвесь живых бактерий антагонистически активного штамма кишечной палочки М-17.

Показания к применению. Острая дизентерия при развитии выраженного дисбактериоза кишечника, при сопутствующих заболеваниях желудочно-кишечного тракта; непереносимость химиотерапевтических препаратов; долечивание реконвалесцентов дизентерии, сальмонеллеза и смешанных кишечных инфекций, постдизентерийный колит, затяжные и хронические формы дизентерии, колиты и энтероколиты, неспецифический язвенный колит на фоне дисбактериоза, в том числе возникшего в результате длительной антибиотикотерапии: применяют также при нарушении аэробной микрофлоры.

Способ применения и дозы. Внутрь за 30—40 мин до еды детям:

	От 6 мес до 1 года	*От 1 года до 3 лет*	*Старше 3 лет и взрослым*
При хроническом колите	1—2 дозы 2 раза в день	2—4 дозы 2 раза в день	3—5 доз 2 раза в день
При неспецифическом язвенном колите	2 дозы 2 раза в день	3—5 доз 2 раза в день	4—6 доз 2 раза в день
При дисбактериозах	2 дозы 2 раза в день	3—4 дозы 2 раза в день	3—4 дозы 2 раза в день

Курс лечения больных острыми формами — не менее 2 нед, в отдельных случаях в зависимости от клинических и лабораторных показателей —3—4 нед; при постдизентерийном колите и при длительной кишечной дисфункции — не менее 4—6 нед.

При неспецифическом язвенном колите, хронических колитах и энтероколитах курс лечения до $1^1/_2$—2 мес и более. Целесообразно назначать повторные курсы лечения или поддерживающие дозы (половина суточной дозы) в течение 1—$1^1/_2$ мес.

Препарат разводят кипяченой водой перед приемом из расчета 1 чайная ложка воды на 1 дозу. Таблетки принимают цельными или размельченными, запивая кипяченой водой. Лицам с повышенной кислотностью желудочного сока рекомендуется за 5—10 мин до приема препарата выпить $^1/_2$ стакана минеральной воды (боржом, ессентуки № 4 или № 17) или раствор гидрокарбоната натрия ($^1/_2$ чайной ложки на стакан воды).

Колибактерин в ампулах принимают с 6-месячного, а в таблетках — с 3-летнего возраста.

Побочное действие. Не установлено.

Противопоказания. При лечении колибактерином не рекомендуется принимать антибиотики.

Форма выпуска. Ампулы по 2—3 дозы, в упаковке по 10 ампул, таблетки (1 таблетка — 1 доза) по 20 штук во флаконе.

Срок годности 6—12 мес.

КОЛЛАЛИЗИН (Collalysinum). Синонимы: коллагеназа, клостридиопептидаза А.

Отредактировал: ledi24

Фармакологическое действие. Обладает протеолитической активностью; влияя преимущественно на коллагеновые волокна, способствует расплавлению струпов и некротических тканей.

Показания к применению. Для профилактики и лечения симблефарона, рубцовых изменений кожи век, конъюнктивы глазного яблока после ожога, при стриктурах слезоотводящих путей, помутнениях роговицы, пластическом иридоциклите, вторичной катаракте, помутнении стекловидного тела, рубцах сетчатки, при травматическом кровоизлиянии в стекловидное тело, а также как средство для лечения рубцовых изменений кожи.

Способ применения и дозы. Непосредственно перед применением коллализина содержимое флакона (500 КЕ) растворяют в 0,5% растворе новокаина, изотоническом растворе натрия хлорида или в воде для инъекций.

Препарат вводят подконъюнктивально, непосредственно в очаг поражения (спайка, рубец, стекловидное тело и т. д.) с помощью электрофореза, фонофореза, а также применяют накожно.

Перед применением коллализина проверяют чувствительность больного к препарату, для чего под конъюнктиву больного глаза вводят 1 КЕ и наблюдают 48 ч, при накожном применении проводят кожные пробы с нанесением раствора коллализина в лечебных дозах на 24 и 48 ч.

Побочное действие. Возможно развитие язв роговицы, аллергической реакции.

Противопоказания. Незаконченный процесс эпителизации роговицы после ожога, сочетание симблефарона с язвой роговицы, наличие дефектов в склере, кровоизлияние в стекловидное тело менее $^1/_2$ его объема, наличие признаков свертывания крови в стекловидном теле, резко выраженная реакция после введения 1 КЕ.

Форма выпуска. В лиофилизированном виде в ампулах по 500 КЕ.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте при температуре от 4 до 6° С.

Срок годности 2 года.

КОЛЛАРГОЛ (Collargolum). Синоним: серебро коллоидное.

Применение. В качестве антисептического средства при гнойных ранах, хронических циститах, уретритах, гнойных конъюнктивитах, бленнорее, рожистом воспалении, лимфангите, мягком шанкре в виде 0,2—5% раствора и 15% мази.

Форма выпуска. Порошок.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 5 лет.

КОЛХАМИН (Colchaminum). N-Метилдезацетилколхицин. Синонимы: Omain, Colcemid.

Алкалоид, выделенный из луковиц безвременника великолепного (Colchicum speciosum Stev.) и безвременника осеннего (Colchicum autumnale L.).

Фармакологическое действие. Обладает антимитотической активностью (блокирует митоз на стадии метафазы) и при парентеральном введении оказывает ингибирующее влияние на рост опухолевой ткани и угнетает кровотворение; при непосредственном контакте с опухолевыми клетками (например, при раке кожи) препарат приводит к их гибели.

Показания к применению. Эндофитная и экзофитная формы рака кожи I и II стадии, рак пищевода, рак желудка (переходящий на пищевод) в случаях, не подлежащих хирургическому лечению в комбинации с сарколизином.

Способ применения и дозы. При раке кожи ежедневно наружно в

Отредактировал: ledi24

виде 0,5% мази. Курс лечения 18—25 дней (при эндофитной форме 30—35 дней). При раке пищевода внутрь по 0,006—0,01 г в 2—3 приема через день в зависимости от переносимости препарата больными. На курс лечения обычно применяют 0,05—0,11 г. При комбинированном лечении 0,005—0,006 г колхамина и 0,015 г сарколизина применяют одновременно 3 раза в неделю; ослабленным больным дозы уменьшают. Курс лечения 12—15 приемов в течение 4—5 нед, после чего делают перерыв на 1—2 мес или применяют препараты в тех же дозах 1—2 раза в неделю.

Побочное действие. Гиперемия, болезненность и отечность окружающих тканей; при приеме внутрь одновременно с сарколизином — тошнота и рвота; при передозировке колхамина или повышенной чувствительности к нему могут наблюдаться лейкопения, тромбоцитопения, понос, алопеция.

Противопоказания. Лейкопения, тромбоцитопения и анемия.

Форма выпуска. 0,5% мазь в упаковке по 25 г, таблетки по 0,002 г в упаковке по 100 штук.

Условия хранения. Список А. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности. Таблетки 5 лет, мазь 3 года.

КОМПЛИВИТ (Complivitum) — комплекс витаминов с минеральными веществами. Состав одной таблетки: ретинола ацетат (витамин А) 3300 МЕ, тиамина бромид (витамин B_1) 0,00129 г или тиамина хлорид 0,001 г, пиридоксина гидрохлорид (витамин B_6) 0,005 г, рибофлавин-мононуклеотид 0,00127 г, цианокобаламин (витамин B_{12}) 12,5 мкг, аскорбиновая кислота (витамин С) 0,05 г, α-токоферола ацетат (витамин Е) 0,01 г, никотинамид (витамин РР) 0,0075 г, рутин (витамин Р) 0,025 г, пантотенат кальция (витамин B_3) 0,005 г, фолиевая кислота (витамин B_C) 0,0001 г, липоевая кислота 0,002 г, железо сульфат 0,02489 г, меди сульфат 0,002946 г, кальция фосфат 0,217 г, кобальта сульфат 0,000477 г, марганца сульфат 0,01096 г, цинка сульфат 0,008795 г, магния фосфат двузамещенный 0,1176 г, магния карбонат основной 0,0722 г, кальция стеарат 0,0057 г.

Фармакологическое действие. Компливит компенсирует витаминно-минеральную недостаточность, положительно влияет на содержание гемоглобина в крови и другие ее показатели, повышает переносимость физических нагрузок (профессиональных и спортивных), в том числе длительных.

Показания к применению. Нарушения липидного обмена (гиперлипидемия с повышенным содержанием холестерина, β-липопротеидов, триглицеридов) и снижение толерантности к углеводам.

Способ применения и дозы. Компливит принимают внутрь после еды по 1 таблетке 2 раза в день в течение 3—4 нед. Повторный курс такой же продолжительности проводят через 3—5 мес. При этом доза препарата может быть снижена до 1 таблетки в сутки, а длительность перерыва увеличена до 8—10 мес.

Противопоказания. Индивидуальная непереносимость препарата.

Форма выпуска. В таблетках, покрытых оболочкой, в упаковке 60 штук.

Условия хранения. В сухом, защищенном от света месте, при комнатной температуре.

Срок годности 2 года.

КОНВАФЛАВИН (Convaflavinum). Суммарный флавоноидный препарат из травы ландыша дальневосточного (Convallaria Keiskei

Отредактировал: ledi24

Mig.). В состав его входят в основном кейозид, гиперозид и незначительное количество кверцетина.

Фармакологическое действие. Оказывает желчегонное действие и обладает спазмолитическими свойствами. Препарат малотоксичен.

Показания к применению. В качестве желчегонного средства при острых и хронических заболеваниях печени и желчных путей (холециститы, холангиты и др.).

Способ применения и дозы. Назначают внутрь по 0,02 г 3 раза в день до еды ежедневно в течение 3—4 нед. При необходимости курс лечения повторяют.

Побочное действие. При передозировке иногда могут наблюдаться головокружение, расстройство стула, аллергическая сыпь. В этом случае прием конвафлавина следует прекратить.

Форма выпуска. Таблетки, покрытые оболочкой, по 0,01 г по 50 штук во флаконах оранжевого стекла.

Условия хранения. В плотно закрытых флаконах в сухом, защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

КОНВУЛЕКС (Convulex). Синонимы: апилепсин, ацидипрол, депакин.

Фармакологическое действие. Антиэпилептическое средство нового типа, действующее при всех типах эпилепсии при проведении моно- и комбинированной терапии. Действующим веществом конвулекса являются вальпроиновая кислота, вальпроат натрия, вызывающие положительные биохимические сдвиги в мозговой ткани.

Показания к применению. Любые виды припадков при различных типах эпилепсии.

Способ применения и дозы. Среднюю суточную дозу 0,9—1,2 г принимают в 3 приема равными частями. В более тяжелых случаях суточная доза препарата может быть увеличена до 2,4 г. Начальную дозу конвулекса, составляющую 0,01 г/кг, еженедельно увеличивают на 0,01 г/кг и постепенно доводят до 0,03 г/кг. Уже в начальный период лечения конвулексом следует постепенно сокращать дозы других противосудорожных средств, назначаемых одновременно.

Побочное действие. Возможны тошнота и рвота.

Иногда наблюдается кратковременная тромбоцитопения. В редких случаях возможно выпадение волос.

Во время лечения следует систематически (каждые 2 мес) контролировать функцию печени и поджелудочной железы, а также свертываемость крови.

При необходимости следует уменьшить дозу или прекратить лечение.

Беременным конвулекс назначают с осторожностью (особенно в течение первых 40 дней).

Противопоказания. Повышенная чувствительность к препарату, геморрагический диатез, нарушение функции печени и поджелудочной железы.

Форма выпуска. Капсулы по 0,15 г, в упаковке 100 штук. Сироп по 100 мл, содержащий в 1 мл 50 мг вальпроата натрия.

Условия хранения. Обычные.

Срок годности. Капсулы и сироп 5 лет.

Поставляется из Финляндии (из Болгарии — депакин, отечественный — ацидипрол).

КОНТРАЦЕПТИН Т (Contraceptinum T). Состав: хинозола 0,03 г, борной кислоты 0,3 г, танина 0,06 г, жировой основы 1,46 г.

Отредактировал: ledi24

Фармакологическое действие. Оказывает антисептическое и сперматоцидное действие.

Показания к применению. Противозачаточное средство.

Способ применения и дозы. Вводят во влагалище до полового акта.

Форма выпуска. Суппозитории вагинальные в упаковке по 10 штук.

Условия хранения. В прохладном месте.

Срок годности 2 года.

КОНТРИКАЛ (Contrycal). Трасилол «Гордокс». Полипептид, получаемый из легких крупного рогатого скота.

Фармакологическое действие. Ингибирует активность ряда ферментов (калликреин, трипсин, химопсин, плазмин), образуя с ними неактивные комплексы.

Показания к применению. Острый панкреатит и обострение хронического панкреатита, острый панкреонекроз; для предупреждения панкреатита при операциях на поджелудочной железе и близко расположенных к ней органах.

Способ применения и дозы. Внутривенно (медленно одномоментно или капельно) 10 000—20 000 ЕД, при необходимости по 50 000 ЕД/сут, внутрибрюшинно 10 000—20 000 ЕД.

Побочное действие. Возможны аллергические реакции.

Форма выпуска. Ампулы по 30 000 ЕД по 10 штук с приложением растворителя.

Условия хранения. В прохладном месте при температуре до 15°С.

Контрикал поставляется из Германии. Из Венгрии препарат поступает под названием «Гордокс» в ампулах по 100 000 ЕД, из других стран — под названием «Трасилол» в ампулах по 5 мл, содержащих 25 000 ЕД.

Срок годности. Контрикал 3 года, «Гордокс» 5 лет.

КОНФЕРОН (Conferon). Состав: капсулы содержат 250 мг сульфата окиси железа и 35 мг диоктилсульфосукцината натрия.

Показания к применению. Применяют, как и другие препараты железа, при железодефицитных анемиях различной этиологии.

Состав применения и дозы. Средняя доза для взрослых и подростков по 1—2 капсулы 3 раза в день; детям в возрасте 3—6 лет — по 1 капсуле 2 раза в день; 7—12 лет — по 1 капсуле 3 раза в день.

Капсулы проглатывают (не разжевывая) после еды.

Форма выпуска. Капсулы по 0,25 г в упаковке 50 штук.

Срок годности 2 года.

Поступает из Венгрии.

КОНЬКОВА МАЗЬ (Unguentum Koncovi). Утверждены две прописи мази Конькова следующего состава: 1) этакридина 0,3 г, дистиллированной воды 1,5 г, рыбьего жира витаминизированного 35 г, меда пчелиного 65 г; 2) этакридина 0,3 г, рыбьего жира 33,5 г, меда пчелиного 62 г, дегтя березового 3 г, воды дистиллированной 1,2 г.

Применение. Наружно. Как антисептическое и ранозаживляющее средство при пиодермии, вяло заживающих ранах, ожогах.

Форма выпуска. В упаковке по 100 г.

Условия хранения. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности $3^1/_2$ года.

КОРВАЛОЛ (Corvalolum). Состав: этилового эфира-α-бромизовалериановой кислоты 20 г, фенобарбитала натрия 18,26 г, масла мятного 1,4 г, едкого натра (1 н. раствор) 78,62 мл, спирто-водной смеси (спирта 96% 574 мл, воды 442 мл) до 1 л.

Применение. При неврозах с повышенной раздражительностью,

Отредактировал: ledi24

нерезко выраженных спазмах коронарных сосудов, тахикардии, бессонице, ранних стадиях гипертонической болезни и спазмах кишечника по 15—20 капель 2—3 раза в день, при тахикардии и спазмах сосудов по 30—40 капель на прием.

Форма выпуска. Во флаконах по 15 мл.

Из Германии поступает валокордин.

Условия хранения. Список Б. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности $1^1/_2$ года.

КОРГАРД (Corgard). Селективное кардиобетаадреноблокирующее средство. Синоним: надолол.

Фармакологическое действие. Оказывает продолжительное отрицательное хронотропное и инотропное действие, снижает интенсивность метаболизма в миокарде, повышает переносимость сердцем физической нагрузки, уменьшает потребность миокарда в кислороде, улучшает почечный кровоток.

Показания к применению. Ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, аритмии, мигрень, тиреотоксикоз.

Способ применения и дозы. При ишемической болезни сердца начальная дозировка 40 мг, при гипертонической болезни —80 мг в сутки. Препарат принимается 1 раз в день по утрам. Если желаемого эффекта не наступает, доза повышается через неделю после назначения, и у большинства больных она составляет 160 мг. При гипертонии может доходить до 240 мг (с включением в терапию салуретика и вазодилататора). Когда проводят монотерапию, суточная доза может достигать 640 мг.

Побочное действие. Желудочно-кишечные расстройства, брадикардия, утомление, холодные конечности, бессонница, парастезии, сухость во рту, головокружение, в отдельных случаях сердечная недостаточность и атриовентрикулярный блок.

Противопоказания. Бронхиальная астма, синусная брадикардия, атриовентрикулярная блокада II и III степени, кардиогенный шок, вторичная недостаточность правого желудочка при легочной гипертензии, застойный порок сердца.

Форма выпуска. Таблетки по 40 и 80 мг, в упаковке по 20 штук.

Условия хранения. При комнатной температуре.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Германии.

КОРГЛИКОН (Corgliconum). Очищенный препарат из листьев ландыша майского и его разновидностей.

Фармакологическое действие. Аналогичен конваллятоксину и строфантину; дает более продолжительный эффект.

Показания к применению. Острая и хроническая сердечная недостаточность II и III стадии, пароксизмальная тахикардия.

Способ применения и дозы. Внутривенно медленно по 0,5—1 мл 0,06% раствора в 20 мл 40% раствора глюкозы. Высшая разовая доза для взрослых в вену 1 мл, суточная 2 мл.

Побочное действие и противопоказания те же, что и для строфантина.

Форма выпуска. Ампулы по 1 мл 0,06% раствора в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

КОРДАНУМ (Cordanum). (±)-1-[пара-[3-(трет-Бутиламино)-2-

Отредактировал: ledi24

гидроксипропокси]-фенил]-циклогексилмочевина. Синоним: Talinolol.

Фармакологическое действие. Корданум является β-адреноблокатором, уменьшает сократительную способность миокарда и величину сердечного выброса.

Показания к применению. Хроническая ишемическая болезнь сердца, нарушение сердечного ритма, гиперкинетический синдром сердца, артериальная гипертония, гипертрофический субаортальный стеноз.

Способ применения и дозы. Внутрь по 1 драже (50 мг) 3 раза в сутки, при необходимости дозу увеличивают до 2 драже 3 раза в сутки. Дальнейшее повышение дозы возможно только при соотвстствующем контроле.

Побочное действие. Головная боль, чувство жара, тошнота, усталость и головокружение.

Противопоказания. Абсолютные: выраженная сердечная недостаточность и кардиогенный шок, постгеморрагический шок, атриовентрикулярная блокада II и III степени, шоковое состояние. Относительные: склонность к гипогликемии, метаболический ацидоз, нарушения периферического артериального кровообращения, заболевания бронхов и легких.

Форма выпуска. Драже по 50 мг, в упаковке 50 штук; ампулы 10 мг —5 мл, в упаковке 10 ампул.

Условия хранения. Обычные.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Германии.

КОРДАРОН (Cordarone) [2-Бутил-3-бензофуранил] [-4-2-(диэтиламиноэтокси)-3,5-дийодфенил]-кетона гидрохлорид. Синонимы: Amiodaronum, Trangorex.

Фармакологическое действие. Кордарон увеличивает коронарный кровоток и уменьшает сопротивление коронарных сосудов, улучшает снабжение кислородом сердечной мышцы. Благодаря адреноблокирующей активности препарат урежает ритм сердечных сокращений при тахикардии и понижает потребность миокарда в кислороде. Под влиянием кордарона приступы стенокардии у больных исчезают или становятся значительно реже, что позволяет уменьшить количество применяемого нитроглицерина.

Показания к применению. Хроническая коронарная недостаточность, аритмии (желудочковая экстрасистолия, фибрилляция предсердий).

Способ применения и дозы. Лечение начинают с 0,2 г 3 раза в день во время или после еды. Через неделю дозу уменьшают до 0,1 г 3 раза в день или по 0,2 г 2 раза в день. Курс лечения составляет 2—3 нед, его повторяют после 1—2-недельного перерыва. Общая продолжительность лечения устанавливается индивидуально в зависимости от состояния больного. При нарушении сердечного ритма препарат вводят внутривенно.

Побочное действие. Возможны аллергические кожные высыпания, диспептические явления (тошнота, понос), повышенная раздражительность, эйфория. Длительное применение больших доз препарата, особенно у лиц пожилого и старческого возраста, может вызвать брадикардию.

Противопоказания. Брадикардия, первые 3 мес после перенесенного инфаркта миокарда, беременность (препарат обладает тератогенным свойством). Необходима осторожность при назначении кордарона больным с нарушением атриовентрикулярной проводимости, при бронхиальной астме.

Отредактировал: ledi24

Форма выпуска. Таблетки по 0,2 г, в упаковке 60 штук, ампулы по 3 мл 5% раствора, по 5 штук в упаковке.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности. Таблетки 5 лет, ампулы 3 года.

Поставляется из Югославии.

КОРДИАМИН (Cordiaminum). 25% раствор диэтиламида никотиновой кислоты. Синонимы: Nicaethamidum, Nikethamide.

Фармакологическое действие. Стимулятор центральной нервной системы, возбуждает дыхательный и сосудодвигательный центры.

Показания к применению. Нарушение сердечной деятельности; сердечная слабость и ослабление дыхания при инфекционных заболеваниях и в период выздоровления, при шоке, асфиксии, отравлениях и др.

Способ применения и дозы. Внутрь по 20—30 капель; подкожно, внутримышечно и внутривенно (медленно) по 0,5—2 мл 2—3 раза в день; при отравлениях внутривенно (медленно) до 3—5 мл.

Высшие дозы: внутрь разовая 60 капель, суточная 180 капель, парентерально разовая 2 мл, суточная 6 мл.

Форма выпуска. Во флаконах по 15 мл, ампулы в упаковке 10 штук по 1 мл и 2 мл.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 5 лет.

КОРДИГИТ (Cordigitum). Экстракт из сухих листьев наперстянки пурпуровой, содержащий сумму гликозидов (дигитоксин, гитоксин и др.).

Фармакологическое действие. Кардиотоническое средство.

Показания к применению. Сердечная недостаточность.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,4—0,8 мг 2—4 раза в день.

Побочное действие. При передозировке брадикардия, тошнота, экстрасистолия.

Противопоказания. Острые эндокардиты; необходима осторожность при свежем инфаркте миокарда, нарушениях ритма.

Форма выпуска. Таблетки по 0,8 мг, в упаковке 10 штук, суппозитории по 0,0012 г, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности. Таблетки контролируются ежегодно, суппозитории 2 года.

КОРЕБЕРОН (Coreberon). Состав: в одном драже 20 мг фторида натрия.

Фармакологическое действие. Действующее вещество фторид натрия оказывает многостороннее влияние на дисбаланс между нарастанием и рассасыванием костной ткани, что приводит к увеличению основного костного вещества. Кореберон способствует укреплению хрупких суставов, стабилизации скелета и уменьшению ломкости костей.

Показания к применению. Первичный остеопороз (постклимактерический, пресенильный, сенильный и идиопатический); профилактика и лечение стероидного остеопороза; особые формы локализованных остеопатий; плазмоцитома и остеолитические костные метастазы.

Способ применения и дозы. Индивидуальны, предпочтение отдается непрерывному лечению. Обычно кореберон назначают при непрерывном лечении по 2 драже 2 раза в день (утром и вечером) после еды в течение 1 года (не менее); при интермиттирующем лечении по 2 драже 2 раза в день в течение 3 мес, затем перерыв 2—3 мес, после чего лечение продолжают. С профилактической целью кореберон назначают по 2 драже в сутки после еды.

Побочное действие. После 2—3-месячного лечения могут появиться

Отредактировал: ledi24

боли в нижних конечностях (преимущественно в суставах), в этом случае предлагается перейти на интермиттирующую схему лечения или отменить препарат.

Противопоказания. Не рекомендуется назначать в период роста, беременности и лактации, а также при тяжелых нарушениях функции печени и почек.

Форма выпуска. Драже, в упаковке 100 штук.

Условия хранения. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Германии.

КОРТИЗОНА АЦЕТАТ (Cortisoni acetas). Прегнен-4-диол-17α, 21-триона-3,11,20-21-ацетат. Синонимы: Adreson, Cortelan.

Фармакологическое действие. Глюкокортикостероид. Оказывает противовоспалительное, десенсибилизирующее и антиаллергическое действие, обладает противошоковыми и антитоксическими свойствами; тормозит развитие лимфоидной ткани; обладая иммунодепрессивной активностью, подавляет развитие соединительной ткани, уменьшает проницаемость капилляров; задерживает синтез и ускоряет распад белка.

Показания к применению. Коллагенозы, ревматизм, инфекционный неспецифический полиартрит, бронхиальная астма, острый лимфобластный и миелобластный лейкоз, инфекционный мононуклеоз, нейродермиты, экзема и другие кожные заболевания, различные аллергические заболевания, болезнь Аддисона, острая недостаточность коры надпочечников, гемолитическая анемия, гломерулонефрит, острый панкреатит; шок и коллапс при хирургических вмешательствах; для подавления реакции отторжения при гомотрансплантации органов и тканей.

Способ применения и дозы. Внутрь в первые дни по 0,1—0,2 г/сут (в 3—4 приема), затем дозу постепенно уменьшают до 0,025 г/сут. При ревматизме на курс лечения 3—4 г. Внутримышечно в виде суспензии 0,025—0,05 г 1—2 раза в сутки. Высшая разовая доза для взрослых 0,15 г, суточная 0,3 г. Детям дозы устанавливают в зависимости от возраста от 0,0125 до 0,025 г на прием.

Побочное действие. При продолжительном применении возможны вирильное ожирение, гирсутизм, появление угрей, нарушение менструального цикла, остеопороз, симптомокомплекс Иценко — Кушинга, изъязвление пищеварительного тракта, прободение нераспознанной язвы, геморрагический панкреатит, гипергликемия, понижение сопротивляемости к инфекциям, повышение свертываемости крови, психические нарушения. Внезапная отмена препарата может вызвать обострение болезни.

Противопоказания. Тяжелые формы гипертонической болезни, сахарного диабета и болезни Иценко — Кушинга; беременность, недостаточность кровообращения III стадии, острый эндокардит, психозы, нефрит, остеопороз, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, недавно перенесенные операции, сифилис, активная форма туберкулеза, старческий возраст.

Форма выпуска. Таблетки по 0,025 г, в упаковке 80 штук. По импорту препарат поставляется в виде суспензии (1 мл соответствует 0,025 г) во флаконах по 10 мл.

Срок годности 3 года.

КОРТИКОТРОПИН (Corticotropinum). Полипептидный гормон, состоящий из 39 аминокислот. Синонимы: АКТГ, Acton.

Фармакологическое действие. Физиологический стимулятор коры надпочечников; усиливает биосинтез и выделение в кровь кортикостероидных гормонов (в основном глюкокортикоидов, а также

Отредактировал: ledi24

андрогенов). По действию на организм сходен с глюкокортикоидами.

Показания к применению. Межуточно-гипофизарная недостаточность, ревматизм, инфекционный неспецифический полиартрит, подагра, бронхиальная астма, экзема, аллергические заболевания и др.

Способ применения и дозы. Внутримышечно 10—30 ЕД 3—4 раза в сутки. Детям при ревматизме дозы устанавливают в зависимости от возраста: до 1 года по 15—20 ЕД, от 1 года до 6 лет по 20—40 ЕД, от 6 до 14 лет по 40—60 ЕД/сут. Курс лечения (2—5 нед) при необходимости может быть повторен.

Побочное действие. Задержка воды в организме, ионов натрия и хлора с развитием отеков и повышением АД; тахикардия, отрицательный азотистый баланс, бессонница, повышенная возбудимость нервной системы, умеренный гирсутизм, нарушение менструального цикла, задержка рубцевания ран и изъязвление слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, обострения скрытых очагов инфекции, торможение роста у детей. Может развиться сахарный диабет, а у больных, страдающих диабетом,— усиление гипергликемии и кетоз; возможны аллергические реакции.

Противопоказания. Тяжелые формы гипертонической болезни и диабета, болезнь Иценко — Кушинга, беременность, недостаточность кровообращения III стадии, острый эндокардит, психозы, нефрит, остеопороз, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, недавно перенесенные операции, сифилис, активная форма туберкулеза, старческий возраст.

Форма выпуска. Во флаконах по 40 ЕД.

Условия хранения. В защищенном от света месте при температуре не выше 20°С.

Срок годности 3 года.

КОРТИНЕФФ (Cortineff). Фторгидрокортизон ацетат.

Синоним: Флоринеф, Флюорокортизон ацетат.

Фармакологическое действие. Обладает сильным противовоспалительным (в 7 раз сильнее гидрокортизона) и минералотропным действием.

Показания к применению. Первичная недостаточность надпочечников (болезнь Адисона), вторичная недостаточность надпочечников при поражении гипофиза, мочеполовой синдром с потерей ионов натрия, местно при аллергическом кератите и аллергическом поражении глаза.

Способ применения и дозы. Препарат назначают внутрь при первичной недостаточности коры надпочечников по $^1/_2$ таблетки вместе с кортизоном (25 мг) в сутки в течение 6 дней или по 1 таблетке препарата вместе с кортизоном в течение 3—5 дней в неделю. Дозу в целом принимают либо только утром, или 50% утром, 20% в полдень и 30% — вечером.

Побочное действие. Нарушения водно-электролитного обмена, задержка натрия, отеки, гипокалиемия, ослабление памяти, обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, затруднение в заживлении ран, зуд, гиперпигментация, гипертензия, повышение внутриглазного давления, головные боли, головокружение, нарушение менструации, синдром Кушинга, торможение роста у детей, обострение диабета, психические расстройства, миопатии.

Противопоказания. Системные микозы, инфекционные болезни, гнойные поражения кожи, беременность и кормление грудью. Осторожно при остром нефрите и вирусных глазных заболеваниях, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. В ходе применения препарата нельзя делать противооспенную прививку.

Форма выпуска. Таблетки по 0,1 мг, 20 штук в упаковке.

Отредактировал: ledi24

Условия хранения. При комнатной температуре.

Срок годности 3 года.

Поставляется из Польши.

«КОРТОМИЦЕТИН» («Cortomycetinum»). Мазь, содержащая гидрокортизона ацетата 0,5 г, левомицетина 0,2 г, вазелина 22,5 г, вазелинового масла 22,5 г, ланолина 10 г, стеариновую кислоту 3 г, сорбитанолеат 5 г, воду дистиллированную до 100 г.

Фармакологическое действие. Противовоспалительное, антиаллергическое, противозудное и антимикробное средство.

Показания к применению. Воспалительные и аллергические заболевания кожи: инфицированные и микробные экземы; нейродермиты, аллергические дерматиты, псориаз, пиодермия.

Способ применения и дозы. Мазь наносят тонким слоем на пораженные участки кожи 2—3 раза в день. Суточное количество мази 2—3 г. Курс лечения может продолжаться 7—30 дней, составляя обычно 7—10 дней.

Побочное действие. Зуд, гиперемия, болезненность. Может вызвать обострение кожных заболеваний с островоспалительной реакцией.

Противопоказания. Туберкулез, грибковые и вирусные заболевания кожи при наличии язвенных поражений и ран, беременность.

Форма выпуска. Список Б. Мазь в тубах по 15 г.

Условия хранения. В прохладном месте.

Срок годности 2 года.

КОТАРНИНА ХЛОРИД (Cotarnini chloridum). 2-Метил-6,7-метилен-диокси-8-метокси-3,4-дигидроизохинолиний хлорид. Синонимы: Strypticin, Oxystyptin, Styptogen.

Фармакологическое действие. Оказывает тонизирующее действие на мускулатуру внутренних органов (особенно матки).

Показания к применению. Маточные кровотечения после родов, абортов и др.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,05 г 3 раза в день. Высшая разовая доза для взрослых 0,1 г, суточная 0,3 г.

Форма выпуска. Таблетки, покрытые оболочкой, по 0,05 г, в упаковке по 20 штук.

Условия хранения. Список Б. В хорошо укупоренных банках оранжевого стекла в защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

КОФЕИН (Coffeinum). 1,3,7-Триметилксантин.

Фармакологическое действие. Стимулятор центральной нервной системы.

Показания к применению. Угнетение центральной нервной системы, отравления наркотическими средствами, недостаточность сердечно-сосудистой системы.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,05—0,1 г 2—3 раза в день.

Противопоказания. Повышенная возбудимость, бессонница, выраженная гипертония, атеросклероз, органические заболевания сердечно-сосудистой системы, старческий возраст, глаукома.

Форма выпуска. Порошок.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности 5 лет.

КОФЕИН-БЕНЗОАТ НАТРИЯ (Coffeinum natrii benzoas). По фармакологическим свойствам аналогичен кофеину и применяется в тех же случаях.

Отредактировал: ledi24

Назначают внутрь по 0,1—0,2 г 2—3 раза в день, подкожно по 1—2 мл 10% и 20% раствора.

Форма выпуска. Порошок, таблетки по 0,075 г (для детей) в упаковке 10 штук, таблетки в упаковках 6 штук по 0,1 г, по 0,2 г, ампулы в упаковках 10 штук 10% раствора по 1 мл и 2 мл, 20% раствора по 1 мл и 2 мл.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности. Порошок 10 лет, ампулы 6 лет, таблетки по 0,1 и 0,2 г 8 лет, по 0,075 г 4 года.

«КОФЕТАМИН» («Coffetaminum»). Состав: кофеина 0,1 г, эрготамина тартрата 0,001 г.

Фармакологическое действие. Определяется входящими в состав препарата кофеином и эрготамином тартратом.

Показания к применению. Вазопаралитическая форма мигрени, артериальная гипотония, а также в качестве средства, понижающего внутричерепное давление при сосудистых, травматических и инфекционных поражениях ЦНС.

Способ применения и дозы. Внутрь по 1—2 таблетки во время приступа головной боли 2 раза в день, затем по 1 таблетке 2—3 раза в день в течение нескольких дней (до 1 мес).

Форма выпуска. Таблетки, покрытые оболочкой, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

КОФИЦИЛ (Cophicylum). Таблетки состава: ацетилсалициловой кислоты 0,3 г, фенацетина 0,1 г, кофеина 0,05 г.

Фармакологическое действие. Оказывает болеутоляющее, жаропонижающее и противовоспалительное действие.

Показания к применению. Головная и зубная боль, невралгия, артралгия, миалгия, подагра, неревматический артрит, простудные заболевания.

Способ применения и дозы. Внутрь во время или после еды по 1—2 таблетки, запивая водой. Суточная доза 3—6 таблеток. Детям от 2 до 10 лет разовая доза $^1/_4$ таблетки, старше 10 лет — $^1/_2$ таблетки.

Побочное действие. Препарат обычно переносится хорошо. При передозировке или длительном применении возможны тошнота, рвота, боль в животе, анорексия, шум в ушах, ослабление слуха и зрения, диплопия, изъязвление слизистой оболочки желудка и кровотечение из нее, аллергические реакции. При появлении подобных явлений и осложнений препарат следует отменить.

Противопоказания. Пониженное свертывание крови, кровотечение из легких, желудка, матки и других органов, гастрит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, идиосинкразия, бронхиальная астма и другие аллергические заболевания, беременность, детям до 2 лет. Препарат не рекомендуется применять при бессоннице, гипертонии, атеросклерозе, органических болезнях сердечно-сосудистой системы, в старческом возрасте, при глаукоме.

Форма выпуска. Таблетки в упаковке по 6 штук.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности 3 года.

КРАПИВЫ ЛИСТ (Folium Urticae). Содержит витамин К, витамин B_2, пантотеновую кислоту, каротиноиды (β-каротин, ксантофилл, ксантофилл эпоксид, виолаксантин), витамин С, дубильные вещества, органические кислоты.

Применение. Как кровоостанавливающее средство (маточные, кишечные, почечные и легочные кровотечения) и источник витаминов

Отредактировал: ledi24

в виде настоя (10,0:200,0—15,0:200,0) по 1 столовой ложке или по 25—30 капель жидкого экстракта 3—4 раза в день за 30 мин до еды.

Форма выпуска. Лист резаный в упаковке по 100 г, брикеты 75 г, жидкий экстракт (Extractum Urticae fluidum) во флаконах по 100 мл.

Условия хранения. В прохладном месте.

Срок годности. Лист резаный 2 года, брикеты 3 года, экстракт 1 год.

КРАСАВКИ ПРЕПАРАТЫ (Praeparata Belladonnae).

Фармакологическое действие. Препараты красавки по свойствам аналогичны атропину и оказывают спазмолитическое и болеутоляющее действие.

Показания к применению. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, желчнокаменная болезнь и другие заболевания, сопровождающиеся спазмами гладкой мускулатуры, брадикардия, вызванная перевозбуждением n. vagus, и др.

Способ применения и дозы. Внутрь в виде настойки по 5—10 капель (детям 1—5 капель) на прием; в виде экстракта (в суппозиториях, пилюлях, микстурах, порошках) по 0,015—0,02 г на прием, а также в виде комплексных таблеток с натрия гидрокарбонатом и фенилсалицилатом.

Побочное действие. Сухость во рту, головокружение, парез аккомодации, тахикардия.

Противопоказания. Глаукома.

Форма выпуска. Настойка красавки (Tinctura Belladonnae); сухой экстракт красавки 1:2 (Extractum Belladonnae siccum) по 25 г; экстракт красавки густой (Extractum Belladonnae spissum) по 25 г; суппозитории ректальные по 0,015 г, в упаковке 10 штук; сложные таблетки следующего состава: экстракт красавки 0,015 г, папаверина гидрохлорид 0,02 г в упаковке по 10 штук. Капли желудочные состава: настойка красавки (Tinctura Belladonnae) 5 мл, настойка валерианы (Tinctura Valerianae) 20 мл, настойка мяты перечной (Tinctura Menthae piperitae) 15 мл и настойка полыни (Tinctura Absinthi) 25 мл.

Условия хранения. Список Б. В сухом месте.

Срок годности. Настойка 5 лет, экстракты: густой 3 года, сухой 2 года, капли желудочные 3 года, таблетки 4 года.

КРИЗАНОЛ (Chrysanolum). Смесь кальциевой и натриевой солей 1-ауротио-пропанол-2-сульфоновой кислоты с глюконатом кальция, суспензированная в персиковом масле. Содержит от 33,5 до 35% золота.

Показания к применению. Ревматоидный артрит.

Способ применения и дозы. Внутримышечно 1 раз в неделю. Разовая доза 1 мл 5% взвеси, что соответствует 17 мг металлического золота. На курс лечения 58—60 инъекций.

Побочное действие. Дерматиты, диарея, снижение уровня гемоглобина и уменьшение числа лейкоцитов в крови, альбуминурия и гематурия.

Противопоказания. Суставно-висцеральные и «септические» формы ревматоидного артрита, лихорадка, значительное похудание, анемия, системная красная волчанка и другие коллагенозы, заболевания почек и печени, обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, склонность к аллергическим заболеваниям.

Форма выпуска. Ампулы по 2 мл 5% взвеси, в упаковке 25 штук.

Условия хранения. В сухом, защищенном от света месте.

Срок годности 1 год.

КРИСТЕПИН (Cristepin). Состав одного драже: метансульфонат дигидроэргокристина 0,58 мг, клопамид 5 мг, резерпин 0,1 мг. Синоним: бринердин.

Фармакологическое действие. Благодаря комбинации трех ингре-

Отредактировал: ledi24

диентов различного механизма действия, кристепин оказывает синергическое влияние на АД.

Показания к применению. При всех формах гипертензии: эссенциальной, почечной, кардиоваскулярной, эндокринной, нейрогенной.

Способ применения и дозы. По 1 драже в день. В тяжелых случаях назначают 2—3 драже в день, чем достигается быстрое снижение АД. При длительном лечении больных гипертонической болезнью по 1 драже в день, иногда достаточно 1 драже в 2 дня.

Побочное действие. Чувство усталости, головокружение, сухость во рту, головная боль.

Форма выпуска. Драже, в упаковке 30 штук.

Срок годности 3 года.

Поставляется из Чехо-Словакии.

КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЕ КАРАНДАШИ (Stili haemostatici). Состав: квасцов 7,5 г, алюминия сульфата 2,5 г.

Применение. Как кровоостанавливающее средство при царапинах, ссадинах и мелких порезах.

Форма выпуска. В пеналах.

Срок годности 2 года.

КРОВОХЛЕБКИ КОРНЕВИЩЕ И КОРНИ (Rhizoma et radix Sanguisorbae). Содержат дубильные вещества (12—20%) с преобладанием пирогалловой группы; крахмал.

Применение. В качестве вяжущего и кровоостанавливающего средства при кишечных заболеваниях, поносах и внутренних кровотечениях в виде отвара (1 столовая ложка на стакан кипяченой воды) по 1 столовой ложке 5—6 раз в день.

Форма выпуска. В упаковке по 100 г.

Условия хранения. В сухом прохладном месте.

Срок годности 5 лет.

КРУШИНЫ КОРА (Cortex Frangulae). Содержит свободные и связанные антраценпроизводные, глюкофрангулорозид, реоэмодинантранол, франгулоэмодин, хризофанол, франгулин.

Применение. Как слабительное средство при хронических запорах в виде отвара (20,0:200,0) по $^1/_2$ стакана, жидкого экстракта по 20—40 капель или сухого экстракта по 0,2—0,4 г на прием.

Форма выпуска. Кора резаная в упаковке по 100 г; экстракт крушины жидкий (Extractum Frangulae fluidum) во флаконах по 25 мл; экстракт крушины сухой (Extractum Frangulae siccum); в таблетках, покрытых оболочкой, по 0,2 г в упаковке по 50 штук, сироп 100 мл.

Условия хранения. Кора в сухом прохладном месте, экстракт (жидкий и сухой) в защищенном от света месте.

Срок годности. Кора 5 лет, экстракты: жидкий 1 год, сухой и таблетки 3 года, сироп 2 года.

КСАНТИНОЛА НИКОТИНАТ (Xantinoli nicotinas). 7-[2-Окси-3-(N-метил-β-оксиэтиламино)-пропил]-теофиллина никотинат. Синонимы: теоникол, компламин, ксавин и др.

Фармакологическое действие. Расширяет периферические сосуды, улучшает коллатеральное кровообращение, усиливает окислительное фосфорилирование и синтез АТФ.

Показания к применению. Облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей, болезнь Рейно, острые артериальные тромбозы, диабетическая ангиопатия, ретинопатия, острый тромбофлебит поверхностных и глубоких вен и посттромбофлебитический синдром, трофи-

Отредактировал: ledi24

ческие язвы нижних конечностей, синдром Меньера, дерматиты, для усиления мозгового кровообращения.

Способ применения и дозы. Внутрь, внутримышечно или внутривенно. В таблетках по 0,15 г 3 раза в день, при необходимости дозу увеличивают до 0,3—0,6 г 3 раза в день. Принимают после еды, не разжевывая. Курс лечения не менее 2 мес.

Внутримышечно по 0,3 г (2 мл 15% раствора) 1—3 раза в сутки с постепенным увеличением дозы до 0,6—0,9 г (4—6 мл 15% раствора) 2—3 раза в сутки. Длительность лечения 2—3 нед.

При острой закупорке кровеносных сосудов или кровоизлиянии в мозг вводят внутривенно струйно (очень медленно) по 0,3 г 1—2 раза в день в течение 5—10 дней. Можно вводить внутривенно капельно со скоростью 40—50 капель в минуту. Для этого 1,5 г (10 мл 15% раствора) разводят в 200—500 мл 5% раствора глюкозы или в 200 мл изотонического раствора хлорида натрия, капельно вводят в течение $1^1/_2$—4 ч до 4 раз в сутки, длительность курса 5—10 дней.

Побочное действие. Головокружение, жар, покалывание и покраснение кожи верхней части тела, особенно головы и шеи.

Противопоказания. Сердечная недостаточность II—III стадии, острый инфаркт миокарда, острые геморрагии.

Форма выпуска. Таблетки по 0,15 г, в упаковке 60 штук и ампулы по 2 мл 15% раствора, в упаковке 10 штук.

Из Югославии поступает «Компламин» в ампулах по 2 мл.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности ксантинола никотината 2 года, компламина 3 года.

КСЕРОФОРМ (Xeroformium). Трибромфенолят висмута основной с окисью висмута.

Применение. В качестве вяжущего, противовоспалительного, антисептического средства в составе порошков, присыпок при заболеваниях кожи и слизистых оболочек.

Форма выпуска. Порошок.

Условия хранения. В сухом, защищенном от света месте.

Срок годности 6 лет.

КУКУРУЗНЫЕ РЫЛЬЦА (Stigmata Maydis). Столбики с рыльцами, собранные в период созревания початков кукурузы. Содержат ситостерол, стигмастерол, жирные масла, эфирное масло, сапонины, витамины К и С, горькое гликозидное вещество, камедеподобное и другие вещества.

Фармакологическое действие. Желчегонное, мочегонное и кровоостанавливающее средство.

Показания к применению. Холециститы, холангиты, гепатиты; кровотечения (особенно при гипопротромбинемии).

Способ применения и дозы. Внутрь перед едой в виде отвара (10,0:200,0) по 1—3 столовые ложки через 3—4 ч; экстракт по 30—40 капель 2—3 раза в день.

Форма выпуска. Высушенные кукурузные столбики с рыльцами в коробках по 50 г, резано-прессованные 100 г, жидкий экстракт (Extractum Stigmatum maydis fluidum) во флаконах по 25 мл.

Условия хранения. В сухом, прохладном и защищенном от света месте.

Срок годности. Столбики с рыльцами $4^1/_2$ года, экстракт 3 года.

КУПРЕНИЛ (Cuprenil). D-3-3-Диметилцистеин (продукт гидролиза бензилпенициллина). Синоним: D-Penicillaminum.

Отредактировал: ledi24

Фармакологическое действие. Комплексообразователь.

Показания к применению. Гепатолентикулярная дегенерация, цистинурия, макроглобулинемия, ревматоидные артриты, отравления солями тяжелых металлов (свинец, ртуть и др.), в том числе профессиональные.

Способ применения и дозы. Внутрь 1—1,5 г (в 3—4 приема) ежедневно, при гепатолентикулярной дегенерации до 4 г в день. Одновременно назначают препараты калия, рекомендуется диета, обедненная микроэлементами меди.

Побочное действие. Аллергические реакции (дерматозы, отек Квинке), диспептические явления; при длительном применении — тромбоцитопения, лейкопения, в редких случаях — альбуминурия.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к пенициллину, заболевание почек с нарушением выделительной функции.

Форма выпуска. Капсулы по 0,15 г, в упаковке 100 штук.

Условия хранения. В сухом прохладном месте.

Срок годности 2 года.

Поставляется из Польши.

КУРАНТИЛ (Curantil). 2,6-Бис-[бис-(β-оксиэтил)-амино]-4,8-ди-N-пиперидино-пиримидино (5,4-d) пиримидин. Синоним: **Persantin.**

Фармакологическое действие. Коронарорасширяющее средство.

Показания к применению. Хроническая коронарная недостаточность.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,0125—0,025 г 3—6 раз в день; внутримышечно или внутривенно 1—2 мл 0,5% раствора.

Форма выпуска. Таблетки по 0,025 г, в упаковке 100 штук, ампулы по 2 мл 0,5% раствора, в упаковке 5 штук.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Германии.

ЛАГОХИЛУС ОПЬЯНЯЮЩИЙ (Lagochilus inebrians). Надземные части содержат лагохиллин, эфирное масло, дубильные вещества и каротин.

Фармакологическое действие. Ускоряет свертывание крови и оказывает седативное действие.

Показания к применению. Кровотечения при геморрагических диатезах, маточные, геморроидальные, носовые и другие для предупреждения повышенной кровоточивости при хирургических операциях внутрь взрослым по 1 чайной ложке настойки в $^1/_2$ стакана воды или по 1 таблетке 3—4 раза в день.

Способ применения и дозы. Настойка (Tinctura Lagochili) по 25—30 капель 2—3 раза в день (до еды), таблетки (Tabulettae extracti Lagochili obductae) по 1 таблетке 2—3 раза в день.

Побочное действие. Послабляющее действие, тошнота, учащение пульса, сонливость.

Противопоказания. Те же, что и при применении других кровоостанавливающих средств.

Форма выпуска. Настойка по 50 мл во флаконе, таблетки, покрытые оболочкой, по 0,2 г, в упаковке 50 штук.

Условия хранения. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности. Настойка и таблетки 3 года.

«ЛАКТАСОЛ» РАСТВОР (Solutio «Lactasolum»). Состав: натрия хлорида 6,20 г, калия хлорида 0,30 г, кальция хлорида 0,16 г, магния хлорида 0,10 г, натрия лактата 3,36 г, натрия гидрокарбоната — коли-

Отредактировал: ledi24

чество, достаточное для доведения pH до 6,0—8,2, воды для инъекций — до 1 л. Синонимы: рингер-лактат, лактатно-солевой раствор, раствор Гартмана.

Фармакологическое действие. Препарат компенсирует нарушение водно-электролитного баланса с одновременной коррекцией метаболического ацидоза. При введении в достаточных количествах оказывает дезинтоксикационное и регулирующее гемодинамику действие.

Показания к применению. Острые циркуляторные нарушения, сопровождающиеся дефицитом экстрацеллюлярной жидкости или дегидратацией, при травме, термических поражениях, шоке различного происхождения, перитоните, кишечной непроходимости, диарее.

Способ применения и дозы. Вводят внутривенно струйно и капельно. Дозы устанавливают индивидуально в зависимости от показания к применению — от 1 до 3 л.

Побочное действие. Озноб и повышение температуры тела.

Противопоказания. Алкалоз, все случаи, когда противопоказано введение в организм больших количеств жидкости (закрытая травма черепа с внутричерепной гипертензией, сердечная недостаточность и др.).

Форма выпуска. Раствор во флаконах по 400 мл.

Условия хранения. Обычные.

Срок годности 2 года.

ЛАКТИН (Lactinum).

Фармакологическое действие. Лактогенный гормон передней доли гипофиза крупного и мелкого рогатого скота. Усиливает лактацию.

Показания к применению. Гиполактация в послеродовом периоде.

Способ применения и дозы. Внутримышечно по 70—100 ЕД 1—2 раза в сутки. Курс лечения 5—6 дней. Препарат растворяют непосредственно перед употреблением в 2—4 мл стерильной дистиллированной воды.

Противопоказания. Склонность к аллергическим реакциям.

Форма выпуска. Лиофилизированный порошок во флаконах по 100 ЕД и 200 ЕД.

Условия хранения. В защищенном от света месте при комнатной температуре.

Срок годности 2 года.

ЛАКТОБАКТЕРИН СУХОЙ (Lactobacterinum siccum). Высушенная микробная масса живых лактобактерий.

Фармакологическое действие. Обладает антагонистической активностью в отношении шигелл, энтеропатогенных эшерихий, гемолитического стафилококка и протея.

Показания к применению. Острые кишечные инфекции (острая дизентерия, сальмонеллез, эшерихиоз, вирусная диарея), дисбактериоз кишечника, хронические энтероколиты, неспецифический язвенный колит; кишечные дисфункции на фоне дисбактериоза разной этиологии. Санация половых путей при воспалительных заболеваниях их и предродовой подготовке беременных «группы риска» с нарушением чистоты вагинального секрета до III—IV степени.

Способ применения и дозы. При кишечных заболеваниях внутрь за 30—40 мин до еды детям первого полугодия — 1 доза 2 раза в день, от 6 мес до 1 года — 1 доза 2—3 раза в день, от 1 года до 3 лет — 2 дозы 2 раза в день, старше 3 лет и взрослым 2—5 доз 2 раза в день.

При неспецифическом язвенном колите от 5 до 10 доз 2—3 раза в день.

Курс лечения больных острыми формами не менее 2 нед, в отдель-

Отредактировал: ledi24

ных случаях в зависимости от клинических и лабораторных показателей —3—4 нед; при постдизентерийном колите и при длительной кишечной дисфункции — не менее 4—6 нед.

Курс лечения при неспецифических язвенных колитах, хронических колитах и энтероколитах до $1^1/_2$ мес и более.

При необходимости можно назначать повторные курсы лечения или поддерживающие дозы (половина суточной дозы) в течение $1—1^1/_2$ мес и более.

В акушерско-гинекологической практике — интравагинально по 5—6 доз 1 раз в день в течение 5—8 дней.

Лечение можно сочетать с назначением антибиотиков.

Препарат разводят кипяченой водой перед применением из расчета 1 чайная ложка воды на 1 дозу. Таблетки применяют цельными или размельченными, запивая кипяченой водой.

Побочное действие. Не установлено.

Противопоказания. Не установлены.

Форма выпуска. Ампулы по 3 дозы в упаковке по 10 штук, таблетки (1 таблетка —1 доза) по 20 штук во флаконе.

Условия хранения. В сухом темном месте при температуре не выше 6°С. Хранение разведенного препарата не допускается.

Срок годности 6—12 мес.

ЛАМИНАРИД (Laminaridum). Смесь полисахаридов с белковым компонентом и соли альгиновых кислот, получают из морской капусты.

Фармакологическое действие. Оказывает слабительное действие.

Показания к применению. Хронические запоры с выраженными спазмами кишечника.

Способ применения и дозы. Внутрь после еды по 5—10 г (1—2 чайные ложки) 1—3 раза в сутки, запивая $^1/_4—^1/_2$ стакана воды.

Форма выпуска. Гранулы (в 1 г гранул содержится 0,2 г препарата) по 50 г во флаконе.

Условия хранения. В сухом месте.

Срок годности 2 года.

ЛАНДЫША НАСТОЙКА (Tinctura Convallariae). Спиртовое извлечение 1:10 на 70% спирте из травы ландыша.

Применение. При неврозах сердца, нарушениях сердечной деятельности (без нарушения компенсации), в том числе в сочетании с настойкой валерианы, натрия бромидом. Взрослым по 15—20 капель 2—3 раза в день.

Форма выпуска. Настойка ландыша по 25 мл; капли ландышево-валериановые (Tinctura Convallariae et valerianae) по 30 мл; капли ландышево-валериановые с адонизидом и бромидом натрия по 26 мл.

Условия хранения. В защищенном от света месте.

Срок годности. Капли с настойкой ландыша 2 года.

ЛАНТОЗИД (Lantosidum). Новогаленовый препарат, получаемый из листьев наперстянки шерстистой (Digitalis lanata).

Фармакологическое действие. Аналогичен спиртовым растворам суммы гликозидов из наперстянки, но быстрее всасывается и обладает меньшим кумулятивным свойством.

Показания к применению. Хроническая недостаточность кровообращения I—III стадии, сопровождающаяся тахикардией, тахиаритмией и мерцанием предсердий.

Способ применения и дозы. Внутрь по 15—20 капель 2—3 раза в день;

Отредактировал: ledi24

при диспептических явлениях микроклизмы: 20—30 капель в 20 мл изотонического раствора натрия хлорида.

Высшая разовая доза для взрослых внутрь 25 капель, суточная 75 капель

Форма выпуска. Во флаконах-капельницах по 15 мл.

Условия хранения. Список Б. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности. Контролируется ежегодно.

ЛАПЧАТКИ КОРНЕВИЩЕ (Rhizoma Tormentillae). (Корневище калгана, корневище дубровки, корневище узика.) Содержит дубильные вещества (15—30%) с преобладанием конденсированных танидов, флавоноиды.

Применение. В качестве вяжущего и противовоспалительного средства при заболеваниях желудочно-кишечного тракта (поносы), воспалительных процессах в полости рта (стоматиты, гингивиты) в виде отвара (10,0:200,0) внутрь по 1 столовой ложке 3 раза в день; наружно полоскание и смазывание ротовой полости.

Форма выпуска. В упаковке по 50 г, в круглых брикетах по 5 г, в упаковке 6 штук.

Условия хранения. В сухом прохладном месте.

Срок годности. Корневище дробленое 6 лет, брикеты 3 года.

ЛЕВАМИН-70 (Levamin-70). Левамин-70 изготовляется из чистых кристаллических аминокислот в природной левоформе. Протеиновый эквивалент левамина-70 составляет 70 г/л.

Фармакологическое действие. Инфузионный раствор для парентерального питания.

Показания к применению. При анаболических состояниях для синтеза тканевого белка, при катаболических состояниях (после травмы или при больших операциях, при осложненных инфекциях).

Способ применения и дозы. Вводят внутривенно, капельно из расчета: для взрослого минимальная доза аминокислот 0,5 г/кг массы тела в день. Максимальная доза составляет примерно 2 г/кг.

Доза левамина-70 колеблется от 500 до 2000 мл в день. Детям можно давать до 4 г аминокислот на 1 кг массы тела в день.

Одновременно с питательным раствором следует ежедневно вводить электролиты и витамины. Скорость введения не должна превышать 0,2 г/(кг·ч).

Побочное действие. Возможен инфузионный тромбофлебит периферических вен.

Противопоказания. Почечная недостаточность с анурией или олигурией, хроническая уремия с высоким содержанием азота, нарушение функции печени.

Форма выпуска. Во флаконах по 100 мл и 500 мл.

Условия хранения. В защищенном от света месте при температуре 10—20°С.

Срок годности 2 года.

Поставляется из Финляндии.

ЛЕВЗЕИ ЖИДКИЙ ЭКСТРАКТ (Extractum Leuzeae carthamoidis fluidum).

Показания к применению. Как средство, возбуждающее центральную нервную систему, повышающее работоспособность при физическом и умственном утомлении по 20—30 капель 2—3 раза в день.

Форма выпуска. Во флаконах по 40 мл.

Условия хранения. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

Отредактировал: ledi24

«ЛЕВОВИНИЗОЛЬ» АЭРОЗОЛЬ («Laevovinisolum» aërosolum). Состав: левомицетина 0,136 г, винилина 13,5 г, линетола 13,4 г, спирта этилового 95% 2,9 г, цитраля 0,1 г, пропеллента до 60 г.

Фармакологическое действие. Антимикробное и противовоспалительное средство.

Показания к применению. Поверхностные и ограниченные глубокие ожоги, пролежни, трофические язвы, инфицированные раны (площадью не более 20 $см^2$).

Способ применения и дозы. Препарат распыляют по пораженной поверхности с расстояния 20—30 см в течение 1—3 суток 2—3 раза в неделю (при тяжелых поражениях 1—2 раза в день) Остерегаться попадания в глаза.

Противопоказания. Обширные гранулирующие раны, непереносимость левомицетина.

Побочное действие. Возможно скоропроходящее ощущение жжения.

Форма выпуска. Аэрозольные баллоны по 60 г

Условия хранения. При температуре от 5 до 20°С.

Срок годности 2 года.

ЛЕВОМЕКОЛЬ (Laevomecolum). Комбинированный препарат состава: левомицетин 0,75 г, метилурацил 4 г, полиэтиленоксид-400 76,2 г, полиэтиленоксид-1500 19,05 г.

Фармакологическое действие. Оказывает противовоспалительное (дегидратирующее) и антимикробное действие, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микробов: стафилококков, синегнойных палочек, эшерихий. Без повреждения биологических мембран проникает в глубь тканей.

Показания к применению. Гнойные раны, инфицированные смешанной флорой (стафилококки, синегнойные палочки, эшерихии), первая (гнойно-некротическая) фаза раневого процесса.

Способ применения и дозы. Местно. Препаратом пропитывают стерильные марлевые салфетки и рыхло заполняют рану. Перевязки проводят ежедневно до полного очищения раны от гнойно-некротических масс.

Для введения препарата в гнойные полости через катетер (дренажную трубку) с помощью шприца левомеколь предварительно подогревают до 35—36°С.

Побочное действие. Аллергические реакции (кожные высыпания)

Противопоказания. Индивидуальная повышенная чувствительность к левомицетину.

Форма выпуска. Мазь по 100 г в банках.

Условия хранения. В плотно закрытых стеклянных банках, в сухом, защищенном от света месте при комнатной температуре (17–20°С)

Срок годности 2 года.

ЛЕВОМИЦЕТИН (Laevomycetinum). D-(—)трео-1-пара-нитрофенил-2-дихлорацетил-амино-1,3-пропандиол. Синонимы: Biophenicol, Chloramphenicolum.

Фармакологическое действие. Обладает широким спектром антимикробного действия. Активен в отношении многих грамположительных и грамотрицательных микробов, риккетсий, спирохет и некоторых крупных вирусов; действует на штаммы бактерий, устойчивые к пенициллину, стрептомицину, сульфаниламидам.

Отредактировал: ledi24

Легко всасываются из желудочно-кишечного тракта. Максимальная концентрация в крови отмечается через 2—4 ч и держится в течение 4—5 ч. Быстро выводится и не накапливается в организме даже при длительном применении.

Показания к применению. Брюшной тиф и паратиф, дизентерия, бруцеллез, туляремия, коклюш, пневмония, гонорея, трахома, пситтакоз и другие инфекционные болезни.

Способ применения и дозы. Внутрь за 20—30 мин до еды по 0,25—0,75 г 3—4 раза в сутки; разовая доза для детей до 3 лет 10—15 мг/кг. Курс лечения 7—10 дней. При упорной рвоте препарат назначают в суппозиториях, дозу при этом увеличивают в $1^1/_2$ раза.

Побочное действие. Диспептические явления, раздражение слизистой оболочки полости рта и зева, кожные сыпи, дерматиты, изменения крови (лейкопения или агранулоцитоз, апластическая или гипопластическая анемия); при длительном применении грибковые поражения кожи и слизистых оболочек.

Противопоказания. Псориаз, экзема, грибковые заболевания, повышенная чувствительность к препарату.

Форма выпуска. Порошок, таблетки, в упаковке 10 штук по 0,5 г, по 0,65 г пролонгированного действия, покрытые оболочкой по 0,25 г, капсулы по 0,25 г, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности. Порошок и таблетки, покрытые оболочкой, 8 лет; таблетки по 0,25 и 0,5 г и капсулы 5 лет; таблетки по 0,65 г пролонгированного действия 2 года.

ЛЕВОМИЦЕТИНА СТЕАРАТ (Laevomycetini stearas). D-(—) трео-1-пара-Нитрофенил-2-дихлорацетиламино-пропандиол-1,3 3-стеарат. Синоним: Eulaevomycetin.

Фармакологическое действие. In vitro не оказывает антимикробного действия, активность его проявляется только in vivo после расщепления и освобождения левомицетина. В желудочно-кишечном тракте омыляется с образованием левомицетина, который является действующим веществом препарата. Концентрация его в крови при приеме нарастает медленнее, чем при введении левомицетина.

Показания к применению. В тех же случаях, что и левомицетин в детской практике, когда введение левомицетина затруднено из-за горького вкуса.

Способ применения и дозы. Внутрь 3—4 раза в день; взрослым обычно по 1 г на прием; детям до 3 лет из расчета 0,02 г/кг, от 3 до 8 лет по 0,3—0,4 г на прием, от 8 лет и старше по 0,4—0,6 г на прием.

Противопоказания и побочное действие те же, что и для левомицетина.

Форма выпуска. Порошок, таблетки 0,25 г, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности. Порошок 3 года, таблетки 2 года.

ЛЕВОМИЦЕТИНА СУКЦИНАТ НАТРИЯ (Laevomycetinum natrii succinas). D-(—)-трео-1-пара-Нитрофенил-2-дихлорацетиламино-пропандиол-1,3 3-сукцинат натрия. Синоним: Chlorocid C.

Фармакологическое действие, показания к применению и условия хранения те же, что и для левомицетина.

Способ применения и дозы. Парентерально (внутривенно, внутримышечно и подкожно) 2—3 раза в сутки по 0,5—1 г. Детям вводят внутримышечно в суточной дозе: в возрасте до 1 года из расчета 25 мг/кг, старше 1 года 50 мг/кг 2 раза в сутки с интервалом 12 ч.

Отредактировал: ledi24

Форма выпуска. Флаконы по 1 г активного вещества в комплекте с 0,5% раствором новокаина по 5 мл для инъекций.

Срок годности 3 года.

ЛЕВОПА (Levopa). (—)-3-(3,4-Диоксифенил-L-аланин). Синонимы: L-Dopa, Dopaflex, Levodopa.

Фармакологическое действие. Проникает через сосудистомозговой барьер, в базальных ганглиях превращается в допамин и устраняет или значительно уменьшает акинезию, в меньшей степени влияя на ригидность.

Показания к применению. Болезнь Паркинсона, паркинсонизм.

Способ применения и дозы. Внутрь после еды, начиная с 0,25 г с постепенным повышением дозы в течение 6—8 нед до 4—6 г (в 3—4 приема). Высшая суточная доза 8 г.

Побочное действие. Возможны тошнота, рвота, потеря аппетита, ортостатическая гипотония, аритмия, покраснение лица, повышенная возбудимость нервной системы или депрессия, тремор.

Противопоказания. Идиосинкразия к препарату, выраженные нарушения функции печени и почек, функции желез внутренней секреции, декомпенсация сердечно-сосудистой системы; нельзя применять детям до 12 лет и женщинам в период лактации.

Форма выпуска. Капсулы по 0,5 г, в упаковке 500 штук, капсулы по 0,25 г, в упаковке 100 штук.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Югославии

Этот препарат под названием Л-ДОПА (L-Dopa) поступает из других стран.

ЛЕВОРИН (Levorinum). Антибиотик, продуцируемый Streptomyces levoris Krass.

Фармакологическое действие. Активен в отношении дрожжеподобных грибов (в частности, рода Candida) и некоторых простейших (Trichomonas vaginalis). Не обладает кумулятивным свойством. Малотоксичен.

Показания к применению. Трихомониаз половых органов; заболевания, вызываемые дрожжеподобным грибом Candida (кандидоз желудочно-кишечного тракта, поражения кожных покровов, слизистых оболочек, женских половых органов); с профилактической целью при кандиданосительстве.

Способ применения и дозы. Внутрь по 400 000—500 000 ЕД 2—3 раза в сутки в течение 10—12 дней. Детям до 2 лет назначают из расчета 25 000 ЕД/(кг·сут), от 2 до 6 лет по 20 000 ЕД/(кг·сут), после 6 лет в разовой дозе 200 000—250 000 ЕД 3—4 раза в день.

Местно препарат назначают в виде 5% мази на ланолиново-вазелиновой основе и водных взвесей 1:500.

Побочное действие. Кашель, повышение температуры.

Противопоказания. Внутрь не применяют при заболеваниях печени, острых желудочно-кишечных заболеваниях, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки; водные суспензии при маточных кровотечениях.

Форма выпуска. Порошок для наружного применения; таблетки по 500 000 ЕД, в упаковке 25 штук; таблетки защечные по 500 000 ЕД, в упаковке 25 штук; порошок 2 000 000 ЕД для приготовления водной суспензии 60 г; мазь в тубах по 30 г (1 г содержит 500 000 ЕД).

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте при температуре не выше 4°С.

Отредактировал: ledi24

Срок годности. Порошок 1 год, порошок для суспензии 1 год, таблетки простые и защечные и мазь 2 года.

ЛЕВОРИНА НАТРИЕВАЯ СОЛЬ (Levorinum-natrium).

Фармакологическое действие, показания к применению те же, что и для леворина.

Способ применения и дозы. В виде растворов из расчета 20 000 ЕД в 1 мл для полосканий, спринцеваний, смачивания тампонов, клизм 2—3 раза в день. Для ингаляций применяют раствор, приготовленный перед употреблением из расчета 100 000—200 000 ЕД на 5 мл дистиллированной воды. Ингаляции проводят в течение 15—20 мин 1—3 раза в день.

Побочное действие. При ингаляциях кашель, бронхоспазм, повышение температуры.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к леворину, бронхиальная астма.

Форма выпуска. Флаконы по 200 000 ЕД.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте при температуре не выше 4°С.

Срок годности 1 год.

«ЛЕВОСИН» («Laevosinum»). Комбинированный препарат состава: левомицетин 1 г, сульфадиметоксин 4 г, метилурацил 4 г, тримекаин 3 г, полиэтиленоксид-1500 17,6 г, полиэтиленоксид-400 до 100 г.

Фармакологическое действие. Оказывает антимикробное, противовоспалительное (дегидратирующее), некролитическое и обезболивающее действие. Активен в отношении стафилококков и грамотрицательной флоры (эшерихии, протеи и палочки сине-зеленого гноя).

Показания к применению. Гнойные раны в первой (гнойно-некротической) фазе раневого процесса.

Способ применения и дозы. Местно. Препаратом пропитывают стерильные марлевые салфетки и рыхло заполняют рану, перевязки проводят ежедневно до полного очищения раны. Для введения препарата в гнойные полости через катетер (дренажную трубку) с помощью шприца «Левосин» предварительно подогревают до 35—36° С.

Побочное действие. Аллергические реакции в виде кожных высыпаний.

Противопоказания. Индивидуальная непереносимость препарата или его компонентов.

Форма выпуска. Мазь в стеклянных банках по 100 г

Условия хранения. В сухом, защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

ЛЕГАЛОН (Legalon). Синонимы: Hepadestal, Silymarin.

Фармакологическое действие. Гепатотропный препарат. Действующим веществом легалона является силимарин — соединение, способное стабилизировать мембраны клеток печени и тем самым защищать печень от разнообразных вредных воздействий, а также ускорять репаративные процессы в печени на клеточном уровне.

При применении легалона улучшается общее состояние больного в результате активации детоксицирующей функции печени, уменьшаются неприятные ощущения, возникающие в процессе пищеварения, повышается аппетит, увеличивается масса тела.

Показания к применению. Острые и хронические заболевания печени, а также защита клеток печени при поступлении токсических веществ (цирроз, ожирение, нарушение функции печени при отравлении и т д.).

Отредактировал: ledi24

Способ применения и дозы. По 1 драже (0,035 г) 3 раза в день после еды.

Форма выпуска. Драже, содержащие 0,035 г силимарина, в упаковке 80 штук.

Условия хранения. Обычные.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Югославии.

ЛЕДИН (Ledinum). Сесквитерпеновый спирт, выделенный из эфирного масла побегов багульника болотного (Ledum palustre L.)

Фармакологическое действие. Противокашлевый препарат.

Показания к применению. Острые и хронические заболевания легких и верхних дыхательных путей.

Способ применения и дозы. Внутрь (независимо от приема пищи) по 0,05—0,1 г 3—5 раз в сутки, ежедневно в течение 3—10 дней.

Побочное действие. Аллергические реакции.

Форма выпуска. Таблетки, покрытые оболочкой, по 0,05 г, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. В защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

ЛЕЙКОГЕН (Leucogenum). 2-(α-Фенил-α-карбэтоксиметил) тиазолидин-4-карбоновая кислота.

Фармакологическое действие. Увеличивает число лейкоцитов в крови при лейкопении. Малотоксичен, не обладает кумулятивными свойствами.

Показания к применению. Лейкопения при лучевой и лекарственной терапии.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,02 г 3—4 раза в день до нормализации лейкоцитарной формулы (5—7 дней; при стойкой лейкопении 2—3 нед и более).

Противопоказания. Лимфогранулематоз, злокачественные новообразования костного мозга.

Форма выпуска. В таблетках по 0,02 г, в упаковке 20 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 4 года.

ЛЕКОЗИМ (Lekozim). Синонимы: Lekopain, Caricaza.

Фармакологическое действие. Лекозим представляет собой смесь трех протеолитических ферментов (папаин, химопапаин, протеиназа) сходной структуры и муколитического фермента (лизоцим), стабилизированных и активированных соответствующими добавками. Имеет выраженную хондролитическую, фибринолитическую и тромболитическую активность, лизирует и гидролизует молодую соединительную ткань. Наибольшая активность проявляется в интервале pH от 5 до 7 и при температуре около 37°С.

Показания к применению. Применяют в травматологической, нейрохирургической, ортопедической и офтальмологической практике (остеохондроз позвоночника, грыжи межпозвоночного диска, особенно в поясничном отделе, базальные арахноидиты, непроходимость слезных путей, кератиты, помутнения роговицы и стекловидного тела).

Способ применения и дозы. Применяют в инъекциях под кожу, методами электрофореза (эндоназально и транскутанно, в офтальмологии — фокусированный и локальный электрофорез), фонофореза, а также в виде парабульбарных и интравитреальных инъекций, путем инстилляций. Непосредственно перед введением содержимое флакона растворяют в 2 мл воды для инъекций и перемешивают, встряхивая.

Отредактировал: ledi24

При контакте с металлами ферментативная активность препарата снижается, поэтому допустимо только кратковременное соприкосновение раствора с иглой шприца. Применяют препарат также в виде глазных капель.

При грыже межпозвоночного диска полученный раствор вводят непосредственно в диск в дозе 35—75 FIP U[1], при дегенеративном диске достаточна доза 20—35 FIP U.

Применение препарата требует особой осторожности в дозировании, особенно в офтальмологической практике, и строгого соблюдения инструкции по его применению.

Побочное действие. При введении лекозима в ткани глаза или межпозвоночные диски может появиться боль, поэтому перед введением препарата назначают анальгетики и кортикостероидные препараты (с целью премедикации) При повышенной чувствительности, проявляющейся зудом, повышением температуры тела, проводят антигистаминную терапию.

Противопоказания. Быстро прогрессирующие неврологические расстройства, беременность, незавершенный рост, недержание кала и мочи. Препарат относительно противопоказан при аллергическом диатезе, в травматологической и нейрохирургической практике у детей в возрасте до 9 лет

Препарат не применяют внутривенно и внутримышечно

Форма выпуска. Лиофилизированная субстанция во флаконе с протеолитической активностью 70 FIP U.

Условия хранения. При температуре 4°С в темном сухом месте.

Срок годности 1 год. Водные растворы сохраняют активность в течение 1—3 ч.

Поставляется из Югославии

ЛЕСПЕНЕФРИЛ (Lespenephril). Получаемый из стеблей и листьев бобового растения леспедеза головчатая (Lespedeza capitata). Выпускается в виде спиртовой настойки (70%) или лиофилизированного экстракта для инъекций.

Фармакологическое действие. Повышает диурез и увеличивает выведение из организма солей натрия, в меньшей степени калия, уменьшает азотемию при недостаточности почек, содержание холестерина в крови у больных атеросклерозом.

Показания к применению. Острые и хронические гиперазотемические нефриты, азотемии другой этиологии, лечение и профилактика атеросклероза.

Способ применения и дозы. Внутрь по 1—2 чайные ложки в день, в более тяжелых случаях — начиная с 2—3 (до 6) чайных ложек в день. Для поддерживающей терапии назначают длительно по $^1/_2$—1 чайной ложке через день.

Внутривенно или внутримышечно вводят растворенный в прилагаемом растворителе лиофилизированный препарат (в среднем по 4 ампулы в день). В вену вводят в виде капельных вливаний в изотоническом растворе натрия хлорида.

При умеренных степенях хронической недостаточности почек назначают препарат внутрь (в дополнение к другим методам лечения)

Побочное действие. Не вызывает

Противопоказания. Не установлены.

Форма выпуска. Во флаконах по 120 мл и в виде лиофилизирован-

---

[1] Единица Международной федерации фармацевтики.

Отредактировал: ledi24

ного порошка в ампулах для инъекций по 0,006 г, в упаковке 50 штук.

Условия хранения. В защищенном от света месте.

Срок годности. Во флаконах, лиофилизированная форма 2 года. Поставляется из-за рубежа.

ЛИБЕКСИН (Libexin). Синонимы: Prenoxdiazin, Tibexin. Одна таблетка содержит 100 мг преноксдиазина.

Фармакологическое действие. Противокашлевый аппарат, по активности примерно равен кодеину. Не угнетает дыхания и не вызывает пристрастия.

Показания к применению. Острый и хронический бронхит, опухоль бронхов, бронхиальная астма, грипп, эмфизема легких, сухой и экссудативный плеврит, плевропневмония, инфаркт легкого, спонтанный пневмоторакс, хирургические вмешательства на плевре.

Способ применения и дозы. Внутрь взрослым по 0,1 г (1 таблетка) 3—4 раза в день, в тяжелых случаях по 0,2 г 3—4 раза в день, детям в зависимости от возраста — по 0,025—0,05 г ($^1/_4$—$^1/_2$ таблетки) 3—4 раза в день. Таблетку проглатывают, не разжевывая.

Противопоказания. Обильное образование секрета в дыхательных путях, особенно в послеоперационный период после ингаляционного наркоза.

Побочное действие. Не установлено.

Форма выпуска. Таблетки по 0,1 г, в упаковке 20 штук.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Венгрии.

ЛИВ-52 (Liv-52). Комплексный препарат, изготовленный из соков и отваров ряда растений.

Фармакологическое действие. Предотвращает и устраняет нарушения функции печени, стимулирует рост организма, улучшает аппетит

Показания к применению. Нарушение функции печени при вирусном и токсических гепатитах, циррозе печени, хроническом гепатите, расстройстве функции печени у детей и других заболеваниях печени. Препарат улучшает также аппетит, пищеварение, способствует отхождению газов из кишечника.

Способ применения и дозы. Внутрь. Взрослым по 2—3 таблетки, детям по 1—2 таблетки 3—4 раза в день.

Побочное действие. Не вызывает.

Противопоказания. Не установлены.

Форма выпуска. Таблетки в упаковке по 100 штук.

Условия хранения. В прохладном, сухом, защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

Поставляется из Индии.

«ЛИВИАН» АЭРОЗОЛЬ («Livianum» aërosolum). Состав: линетола 69,45 г, рыбьего жира 20 г, α-токоферола ацетата 0,01 г, анестезина 2 г, циминаля 0,05 г, масла подсолнечного 2,99 г, масла лаванды 0,5 г, спирта 95% 5 мл.

Фармакологическое действие. Обладает ранозаживляющим свойством.

Показания к применению. Химические и термические ожоги кожи.

Способ применения и дозы. Препарат распыляют по пораженной поверхности ежедневно или через день в течение 2—10 сут. При гранулирующих ранах с гнойным отделяемым после нанесения препарата

Отредактировал: ledi24

накладывают асептическую повязку, орошенную аэрозолем. Повязку меняют 1 раз в день.

Форма выпуска. Аэрозольный баллон емкостью 30 г.

Условия хранения. При комнатной температуре.

Срок годности 1 год.

ЛИДАЗА (Lidasa). Препарат из семенников крупного рогатого скота. Содержит фермент гиалуронидазу. Аналогичные препараты выпускают за рубежом (Hyaluronidasum, Hyason, Hylase, Widase).

Фармакологическое действие. Увеличивает проницаемость тканей и облегчает движение жидкостей в межтканевых пространствах.

Показания к применению. Контрактуры суставов, рубцы после ожогов и операций, анкилозирующий спондилоартрит, гематомы; для ускорения всасывания лекарственных веществ, вводимых под кожу и внутримышечно (местные анестетики, мышечные релаксанты и др.), в офтальмологии при кератитах, рубцах роговицы, ретинопатии.

Способ применения и дозы. Подкожно в рубцово-измененные ткани или вблизи места поражения по 1 мл ежедневно или через день. На курс лечения 6—15 инъекций. В офтальмологии применяют инстилляции 0,1% раствора одновременно с лечением антибактериальными препаратами; при ретинопатии под кожу виска, под конъюнктиву и ретробульбарно.

Побочное действие. Возможны аллергические кожные реакции.

Противопоказания. Злокачественные новообразования, туберкулез и другие инфекционные болезни и воспалительные процессы.

Форма выпуска. Во флаконах по 0,1 г.

Условия хранения. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 1 год.

ЛИДОКАИН 10% ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ (Lidocain). α-Диэтиламино-2,6-диметилацетанилида гидрохлорид. 1 мл ампульного раствора для инъекций содержит 100 мг лидокаина гидрохлорида.

Показания к применению. Желудочковые экстрасистолия и тахикардия, особенно в острой стадии инфаркта миокарда, а также вызванные интоксикацией препаратами наперстянки.

Способ применения и дозы. Препарат применяют только внутримышечно. Общая доза не должна превышать 300 мг.

Противопоказания. Тяжелые функциональные расстройства печени.

Побочное действие. Могут наблюдаться головная боль, головокружение, сонливость.

Форма выпуска. Раствор 10% в ампулах по 2 мл, в упаковке по 10 ампул.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Венгрии.

ЛИЗОЦИМ (Lysocimum) (мукополисахаридаза). Фермент белковой природы. Получают из белка куриного яйца.

Фармакологическое действие. Антибактериальный препарат, обладает способностью стимулировать неспецифическую реактивность организма, оказывает противовоспалительное и муколитическое действие.

Показания к применению. Хронические септические состояния и гнойные процессы, ожоги, отморожения, конъюнктивиты, эрозии роговицы, афтозные стоматиты и другие инфекционные болезни.

Способ применения и дозы. Местно и внутримышечно.

Содержимое флакона (0,1 г) растворяют в 2—3 мл изотонического раствора хлорида натрия или 0,25% раствора новокаина. Внутримышечно вводят по 150 мг 2 раза в сутки. Курс лечения не менее 7 дней, при

Отредактировал: ledi24

необходимости курс продолжают до 1 мес. Местно в офтальмологической практике в виде инстилляций 0,25% раствора 3—4 раза в день в течение 3—7 дней.

Для лечений ожогов, отморожений и гнойных ран накладывают салфетки, смоченные 0,05% раствором.

Форма выпуска. Стерильный порошок во флаконе по 0,1 г.

Условия хранения. В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 20°С.

Срок годности 3 года.

ЛИКВИРИТОН (Liquiritonum). Содержит сумму флавоноидов из корня солодки.

Фармакологическое действие. Обладает спазмолитическими, противовоспалительными и умеренными антацидными свойствами.

Показания к применению. При обострении и для профилактики язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при хроническом гастрите с сохраненной секреторной функцией желудка, эрозивных гастритах.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,1—0,2 г 3—4 раза в день за 20—30 мин до еды в течение 4—5 нед; после 10—12 дней перерыва курс лечения повторяют.

Форма выпуска. Таблетки по 0,1 г, в упаковке 25 штук.

Условия хранения. В сухом темном месте.

Срок годности 3 года.

ЛИКОРИНА ГИДРОХЛОРИД (Lycorini hydrochloridum). 1,2-Диокси-9,10-метилендиокси-7Н,1,2,4,5,12,12а-гексагидропирроло [3, 2,1-d, e] фенатридина гидрохлорид.

Фармакологическое действие. Оказывает бронхолитическое действие, повышает секрецию бронхиальных желез и разжижает мокроту.

Показания к применению. Заболевания легких и бронхов.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,1—0,2 мг 3—4 раза в день.

Побочное действие. При применении больших доз рвота.

Противопоказания те же, что и для апоморфина гидрохлорида.

Форма выпуска. Таблетки по 0,0002 г, в упаковке 50 штук.

Условия хранения. Список А. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

ЛИМОННИКА КИТАЙСКОГО НАСТОЙКА (Tinctura Schizandrae). Настойка (1:5) на 95% спирте из семян лимонника китайского (Schizandra chinensis (Furcz) Baill].

Применение. Как стимулятор центральной нервной системы при физической и умственной усталости, повышенной сонливости, гипотонии по 20—25 капель 2—3 раза в день.

Противопоказания. Нервное перевозбуждение, гипертония, нарушение сердечной деятельности.

Форма выпуска. Во флаконах по 50 мл.

Условия хранения. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 4 года.

ЛИНЕТОЛ (Linaetholum). Смесь этиловых эфиров жирных кислот льняного масла.

Фармакологическое действие. Ранозаживляющее средство.

Показания к применению. Лучевые поражения кожи, химические и термические ожоги.

Способ применения и дозы. Наружно открытым способом.

Форма выпуска. Во флаконах по 180 мл.

Отредактировал: ledi24

Условия хранения. В прохладном, защищенном от света месте.
Срок годности 2 года.

ЛИНИМЕНТ БАЛЬЗАМИЧЕСКИЙ (ПО ВИШНЕВСКОМУ) (Linimentum balsamicum Wischnevsky). Синоним: мазь Вишневского. Состав: дегтя 3 г, ксероформа 3 г, масла касторового 94 г.

Применение. В качестве антисептического средства при лечении ран, пролежней, язв.

Форма выпуска. В упаковке по 100 г.

Условия хранения. В прохладном месте.

Срок годности 5 лет.

ЛИНИМЕНТ «САНИТАС» (Linimentum «Sanitas»). Состав: метилсалицилата 24 г, масла эвкалиптового 1,2 г, скипидара 3,2 г, камфоры 5 г, сала свиного 33,3 г, вазелина 33,3 г.

Применение. Наружно для растираний как обезболивающее и противовоспалительное средство при ревматизме, артритах и др.

Форма выпуска. В упаковке по 50 г.

Условия хранения. В хорошо укупоренной таре в прохладном месте.

Срок годности 2 года.

ЛИНКОМИЦИНА ГИДРОХЛОРИД (Lincomycini hydrochloridum). Антибиотик, продуцируемый Streptomyces lincolniensis. Синонимы: Lincocin, Mycivin.

Фармакологическое действие. Активен в отношении грамположительных микроорганизмов; на грамотрицательные бактерии и грибы не действует. В терапевтических концентрациях оказывает бактериостатическое действие. Хорошо всасывается. Максимальная концентрация в крови достигается через 2—4 ч после введения. Проникает в костную ткань.

Показания к применению. Стафилококковые инфекции; септические процессы; остеомиелиты, вызванные устойчивыми к пенициллину возбудителями.

Способ применения и дозы. Внутрь 3—4 раза в сутки по 500 мг, детям 30—60 мг/(кг·сут); внутримышечно взрослым 2—3 раза в сутки по 300—600 мг (2 мл), детям 10—20 мг/(кг·сут); внутривенно 3 раза по 600 мг растворенного в 250 мл 5% раствора глюкозы в течение 2 ч, детям 10—20 мг/(кг·сут).

Побочное действие. При пероральном применении осложнения со стороны желудочно-кишечного тракта (понос); в единичных случаях лейкопения и повышение содержания билирубина в крови.

Противопоказания. Нарушения функции печени и почек.

Форма выпуска. Капсулы 0,25 г (250 000 ЕД), в упаковке 10 штук, ампулы 30% раствор по 1 мл, в упаковке 10 штук, 2% мазь в упаковке по 15 г.

Условия хранения. Список Б. При комнатной температуре.

Срок годности. Ампулы и капсулы 3 года, мазь 2 года.

ЛИОБИЛ (Liobilum). Таблетки содержат 0,2 г лиофилизированной бычьей желчи.

Фармакологическое действие. Способствует образованию и оттоку желчи, усилению секреции поджелудочной железы, расщеплению и всасыванию жиров в кишечнике, усилению перистальтики кишечника.

Показания к применению. Как желчегонное средство при гепатитах, холециститах, а также для усиления секреторной функции поджелудочной железы и усиления перистальтики кишечника при привычных запорах.

Отредактировал: ledi24

Способ применения и дозы. Взрослым назначают внутрь по 1—3 таблетки 3 раза в день в конце еды. Курс лечения 1—2 мес.

Противопоказания. Обтурационная желтуха, острый панкреатит.

Форма выпуска. Таблетки по 0,2 г, растворимые в кишечнике, в упаковке 50 штук, по 10 штук.

Условия хранения. В сухом месте при температуре не выше 25°С.

Срок годности 2 года.

ЛИПАМИД (Lipamidum). Амид липоевой кислоты.

Фармакологическое действие. По фармакологическим свойствам близок к липоевой кислоте. Принимает участие в обменных процессах, протекающих в организме, обладает гипохолестеринемическим свойством.

Применение. В тех же случаях и дозах, что и липоевая кислота. Препарат лучше переносится, чем липоевая кислота.

Форма выпуска. Таблетки, покрытые оболочкой, по 0,015 г, в упаковке 50 штук.

Условия хранения. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

ЛИПАНТИЛ (Lipanthyl).

Показания к применению. Тяжелые первичные гиперлипидемии (гипертриглицеридемия, гиперхолестеринемия и их комбинированные формы), не поддающиеся влиянию диеты и изменения режима жизни (например, увеличение физической активности, понижение массы тела, прекращение курения).

Тяжелые вторичные гипертриглицеридемии, сохраняющиеся несмотря на соответствующее лечение основной болезни (сахарный диабет, подагра).

Ксантоматоз, предупреждение атеросклеротических осложнений со стороны головного мозга, сердца и периферической сосудистой системы.

Липантил усиливает противосвертывающий эффект производных кумарина, действие противодиабетических и противоподагрических препаратов.

Способ применения и дозы. Обычно принимают 3 капсулы в день: 2— утром и 1— вечером. При наследственной гиперлипидемии у детей препарат назначается лишь при отсутствии результата от трехмесячной диеты.

Побочное действие. Преходящие жалобы на неполадки в желудочно-кишечном тракте, устраняемые после снижения дозы липантила, головокружение, тошнота, рвота, крапивница, зуд, головная боль. Изредка — временное повышение уровня трансаминаз в сыворотке крови, которое нормализуется в течение 8 дней без прекращения курса лечения. Могут отмечаться выпадение волос, половая слабость, боль и слабость в мышцах.

Противопоказания. Тяжелые функциональные расстройства печени. Холелитиаз или указание на холелитиаз в анамнезе. Тяжелые функциональные расстройства почек, нефролитиаз. Беременность, период лактации. Первичный билиарный цирроз. Особой осторожности требует назначение препарата женщинам, принимающим гормональные противозачаточные средства.

Форма выпуска. 50 капсул по 100 мг фенофибрата.

Условия хранения. Хранить в защищенном от влаги месте.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Венгрии.

Отредактировал: ledi24

ЛИПОЕВАЯ КИСЛОТА (Acidum lipoicum). 6,8-Дитиооктановая кислота. Синонимы: Acidum thiocticum, Biletan.

Фармакологическое действие. По биохимическим свойствам приближается к витаминам группы В. Принимает участие в регулировании углеводного и липидного обмена, оказывает липотропное влияние, способствует понижению уровня холестерина, улучшает функцию печени, оказывает детоксицирующее действие.

Показания к применению. Атеросклероз, заболевания печени (гепатит, цирроз, вирусный гепатит А), диабетический полиневрит, интоксикации.

Способ применения и дозы. Внутрь после еды до 0,025 г 2—4 раза в день. Суточная доза от 0,05 до 1,5 г. Курс лечения (20—30 дней) после месячного перерыва может быть повторен. Парентерально вводят 1—2 мл 0,5% раствора.

Побочное действие. Диспептические явления, аллергические дерматозы.

Форма выпуска. Таблетки, покрытые оболочкой, по 0,025 г, в упаковке 100 штук; ампулы по 2 мл 0,5% раствора, в упаковке 10 штук; таблетки, покрытые оболочкой, по 0,012 г, в упаковке 50 штук для детей.

Условия хранения. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности. Таблетки и ампулы 3 года.

ЛИПОСТАБИЛ (Lipostabil). Состав: одна капсула содержит «эссенциальные» фосфолипиды — субстанция EPL 300 мг, теофиллин 50 мг; одна ампула (10 мл) содержит «эссенциальные» фосфолипиды — субстанция EPL 500 мг, пиридоксин гидрохлорид (витамин B_6) 4 мг, никотиновую кислоту 2 мг, аденозин-5-монофосфат 2 мг.

Фармакологическое действие. Липостабил влияет на патологический процесс в различных частях организма посредством содержащегося в нем полиненасыщенного фосфатидилхолина (PPC).

Улучшает показатели содержания липопротеинов в крови. Благодаря тому, что способность липопротеинов высокой плотности (HDL), обогащенных PPC, забирать холестерин возрастает, большая часть атерогенного холестерина переходит в состояние, при котором он может легче транспортироваться с помощью HDL, метаболизироваться в печени и выводиться из организма с желчью в виде желчных кислот.

Снижает повышенный уровень содержания липидов в крови. Обеспечивает мобилизацию холестерина и его вывод из стенок артерий.

Улучшает циркуляторные свойства крови.

Показания к применению. Гиперлипопротеинемия, гиперхолестеринемия и гипертриглицеридемия, атеросклероз, нарушения коронарного, церебрального и периферического кровообращения, стенокардия, состояние после инфаркта миокарда и инсульта, заболевания сосудов, особенно при сахарном диабете, профилактика тромбоэмболии перед операцией.

Способ применения и дозы. К применению пригодны только прозрачные растворы. Содержимое ампулы обычно вводят медленно внутривенно, без дополнительного растворения. В случаях, когда рекомендуется дополнительное растворение, используют только растворы сахаров (глюкоза, левулеза, раствор инвертазы) или собственную кровь больного в соотношении 1:1. Никакие другие растворители не должны применяться.

При введении липостабила внутривенно не допускать смеси с растворами электролитов (физиологический раствор, раствор Рингера).

2 капсулы липостабила форте (не разжевывать!) применяются 3 раза в день перед едой с небольшим количеством воды. Во многих

Отредактировал: ledi24

случаях гиперлипопротеинемии, в зависимости от тяжести состояния, рекомендуется продолжительное лечение.

Больные атеросклерозом должны начинать прием препарата с высоких доз — 1—2 ампулы по 10 мл ежедневно в течение 2—4 недель. Содержимое двух ампул может вводиться одновременно. Внутривенное введение производится медленно.

Дополнительно перед едой 3 раза в день принимают 2 капсулы липостабила форте (не разжевывать!) с небольшим количеством воды.

Когда состояние больного улучшится, внутривенная терапия может быть прекращена и заменена поддерживающей терапией, которая заключается в приеме 1—2 капсул липостабила форте 3 раза в день. Курс — не менее 12 недель. Общая продолжительность лечения зависит от состояния больного. Благодаря отличной переносимости препарат особенно пригоден для длительного лечения.

В случае жировой эмболии рекомендуется вводить не менее 8—10 мл липостабила в день посредством медленных внутривенных инъекций дробными дозами в 20—40 мл. Лечение указанными дозами продолжают до улучшения состояния больного. Назначение липостабила не исключает применения обычных мер для лечения жировой эмболии и шокового состояния: восполнения объема крови, применения седативных средств, кислорода, антибиотиков, искусственного питания и т. д.

Форма выпуска. Ампулы 5 мл и 10 мл по 5 штук в коробке; капсулы форте по 50 капсул в упаковке.

Условия хранения. В сухом прохладном месте.

Производится фирмой «Наттерманн», Германия и фирмой «Босналиек», Югославия.

ЛИПОФУНДИН (Lipofundin).

Фармакологическое действие. Жировая эмульсия для парентерального питания.

Показания к применению. Заболевания пищеварительного тракта, бессознательное состояние, голодание в дооперационном и послеоперационном периоде, продолжающееся более 3 дней, и др.

Способ применения и дозы. Вводят подогретым до температуры тела больного или не ниже комнатной температуры. Для этого препарат за 12 ч до введения выдерживают в условиях комнатной температуры.

В 1-е сутки вводят по 5—10 мл 20% липофундина на 1 кг массы тела больного. В течение первых 10—15 мин эмульсию вводят по 15—20 капель в минуту, затем постепенно, в течение 30 мин, скорость инфузии удваивают. Введение 500 мл липофундина длится около 5—8 ч. После введения 1—$1^1/_2$ л препарата следует сделать перерыв, достаточный для полного просветления плазмы крови.

К эмульсии нельзя добавлять другие лекарственные средства.

Форма выпуска. 20% жировая эмульсия во флаконах по 500 мл.

Условия хранения. При температуре 2—8°С. Не допускать замораживания.

Срок годности 2 года.

Применяется только в условиях стационара.

Поставляется из Финляндии.

ЛИПОЦЕРЕБРИН (Lipocerebrinum). Препарат из липоидов мозга убойного скота.

Применение. Как укрепляющее средство при нервном истощении, неврозах, гипотонии, переутомлении по 1—2 таблетки 3 раза в день.

Форма выпуска. Таблетки, покрытые оболочкой, по 0,15 г, в упаковке 50 штук.

Отредактировал: ledi24

Условия хранения. В сухом прохладном месте.

Срок годности 3 года.

ЛИПЫ ЦВЕТКИ (Flores Tiliae). Содержат эфирное масло (0,05%), флавоновый гликозид гесперидин, гликозид тилиацин, дубильные вещества, слизь, сапонины.

Применение. В качестве потогонного и бактерицидного средства при простудных заболеваниях в виде горячего настоя (10,0:200,0) внутрь по 1—2 стакана; наружно для полоскания полости рта и зева.

Форма выпуска. В упаковке по 100 г.

Условия хранения. В сухом прохладном месте.

Срок годности 2 года.

ЛИТИЯ КАРБОНАТ (Lithii carbonas).

Фармакологическое действие. Понижает возбудимость центральной нервной системы, оказывает седативное и антиманиакальное действие.

Показания к применению. Маниакальное состояние различного генеза и для профилактики фазнопротекающих психозов.

Способ применения и дозы. При маниакальных состояниях внутрь, начиная с 0,6 г в день с постепенным повышением дозы в течение 4—5 дней до 1,5—2,1 г в 2—3 приема; с профилактической целью — 0,6—1,2 г/сут под контролем концентрации препарата в крови.

Побочное действие. Диспептические явления, дискомфорт, мышечная слабость, тремор рук, адинамия, сонливость, повышенная жажда.

Противопоказания. Нарушение выделительной функции почек, тяжелые сердечно-сосудистые заболевания с декомпенсацией и нарушением проводящей системы сердца. Относительные противопоказания — нарушения функции щитовидной железы.

Форма выпуска. Таблетки, покрытые оболочкой, по 0,3 г, в упаковке 50 штук.

Условия хранения. В хорошо укупоренной таре.

Срок годности 4 года.

ЛИТИЯ ОКСИБУТИРАТ (Lithii oxybutyras). Литиевая соль гамма-оксимасляной кислоты.

Фармакологическое действие. Психотропное средство, оказывает седативное действие.

Показания к применению. Гипоманиакальные и маниакальные состояния различного генеза, психопатия, неврозы, органические и другие заболевания с рецидивирующими аффективными расстройствами.

Способ применения и дозы. Назначают внутримышечно (или внутрь). Доза литня оксибутирата подбирается индивидуально. Разовая доза с 0,5 до 1 г, суточная 3 г (в 2—3 приема). При выраженной возбудимости вводят внутримышечно 20% раствор с таким расчетом, чтобы концентрация препарата в крови была не ниже 0,4 ммоль/л (0,4 мэкв/л) и не выше 1,4 ммоль/л (1,4 мэкв/л). Такая концентрация обеспечивает профилактический эффект препарата и позволяет предупредить побочное действие. Лечение препаратом можно проводить в сочетании с транквилизаторами, нейролептиками и антидепрессантами.

Побочное действие. Диспептические и дизурические явления, общее недомогание, головокружение, сонливость, мышечная слабость, нестойкий тремор рук, на более поздних этапах лечения — нарушение ритма сердечной деятельности (синусовая тахикардия, экстрасистолия), гиперкинетические расстройства (тремор, тики). В редких случаях развитие диффузного нетоксического зоба.

Противопоказания. Нарушение выделительной функции почек. Длительное лечение противопоказано при болезнях сердечно-сосудистой

Отредактировал: ledi24

системы, стойком нарушении кровообращения и ритма сердечной деятельности, аллергии, обменных и эндокринных нарушениях, обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта, катаракте.

Форма выпуска. Ампулы по 2 мл 20% раствора, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В сухом месте.

Срок годности 2 года.

«ЛИФУЗОЛЬ» АЭРОЗОЛЬ («Lifusolum» aërosolum). Состав: фурацилина 0,008 г, смолы БМК-5 4 г, линетола 0,3 г, ацетона 38,7 г, фреона 11 и 12 (50:50) 127 г.

Фармакологическое действие. Пленкообразующий антисептический препарат в аэрозольном баллоне.

Показания к применению. Препарат для защиты операционных ран и послеоперационных швов от инфицирования (вместо наклейки и повязки) для защиты кожи от мацерации при свищах и трахеостоме, для герметизации каналов в местах выхода дренажей, катетеров и т. д.

Способ применения и дозы. Наружно. Нажимают на распылительную головку баллона, с расстояния 10—15 см от обрабатываемой поверхности распыляют препарат в течение 1—2 с троекратно с небольшими паузами (15—30 с) для подсыхания пленки. Курс лечения зависит от течения раневого процесса.

Противопоказания. Обширные повреждения кожного покрова, кровоточащие, мокнущие и загрязненные раны, выраженные воспалительные явления.

Побочное действие. При обработке обширных, глубоких раневых поверхностей может возникнуть острая быстропроходящая боль; аллергическая реакция в виде дерматита.

Форма выпуска. Аэрозольный баллон емкостью 165 г.

Условия хранения. Вдали от огня, отопительных приборов и прямых солнечных лучей, при температуре 12—15°С. Не допускается разборка как наполненного, так и пустого баллона.

Срок годности 2 года.

ЛОБЕЛИНА ГИДРОХЛОРИД (Lobelini hydrochloridum). L-1-Метил-2-бензоилметил-6-(2-окси-2-фенилэтил)-пиперидина гидрохлорид.

Фармакологическое действие. Дыхательный аналептик.

Показания к применению. Ослабление или рефлекторная остановка дыхания (при отсутствии нарушений со стороны сердечно-сосудистой системы), асфиксия новорожденных.

Способ применения и дозы. Внутримышечно и внутривенно (медленно) по 0,3—1 мл 1% раствора. Детям в зависимости от возраста 0,1—0,3 мл 1% раствора.

Высшие дозы: внутримышечно разовая 0,012 г, суточная 0,02 г; внутривенно разовая 0,005 г, суточная 0,01 г.

Побочное действие. При передозировке возбуждение рвотного центра, паралич сердца, угнетение дыхания и тонико-клонические судороги.

Противопоказания. Тяжелые органические поражения сердечно-сосудистой системы, остановка дыхания в результате прогрессирующего истощения дыхательного центра.

Форма выпуска. Ампулы по 1 мл 1% раствора, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 5 лет.

«ЛОБЕСИЛ» («Lobesilum»). Состав: лобелина гидрохлорида 0,002 г, магния трисиликата 0,075 г, кальция карбоната 0,025 г.

Отредактировал: ledi24

Показания к применению. Как средство, облегчающее отвыкание от курения.

Способ применения и дозы. Внутрь по 1 таблетке 4—5 раз в день до еды в течение 7—10 дней. В дальнейшем при необходимости прием препарата продолжают в течение 2—4 нед с постепенным уменьшением частоты приема.

Побочное действие. Слабость, раздражительность, головокружение, тошнота.

Противопоказания. Органические изменения сердечно-сосудистой системы.

Форма выпуска. Таблетки, покрытые оболочкой, в упаковке 50 штук.

Условия хранения. Список А. В защищенном от света месте при температуре не выше 15°С.

Срок годности 1 год.

ЛОПРЕСОР (Lopresor). Состав. Активное вещество: ди-[(±)-1-(изопропиламино)-3-[п-(2-метоксиэтил)фенокси]-2-пропанол] L(+)-тартрат (-метопролол-тартрат). Драже (с разделительной бороздкой) по 50 и 100 мг.

Фармакологическое действие. β-адреноблокирующее средство, обладающее кардиоселективным действием.

Показания к применению. Гипертензия, стенокардия, нарушения сердечного ритма, особенно суправентрикулярная тахикардия.

Способ применения и дозы. *Гипертензия:* по 100—200 мг в день в один (утром) или два приема (утром и вечером). При необходимости можно назначить дополнительное гипотензивное средство (преимущественно диуретические препараты). Распределение высоких суточных доз на два приема способствует лучшей переносимости лопресора. *Стенокардия:* по 100—200 мг в день в два приема. При необходимости доза может быть увеличена до 400 мг в сутки. Применяется для длительной профилактики заболевания (для купирования отдельных приступов по-прежнему принимают нитроглицерин). *Нарушения сердечного ритма:* по 100—150 мг в день в два-три приема. При необходимости доза может быть увеличена до 300 мг в сутки.

Лопресор следует с особой осторожностью назначать больным, страдающим метаболическим ацидозом.

Передозировка может привести к сильной брадикардии и гипотензии. При передозировке больному назначают 1—2 мг атропина сульфата внутривенно, а также, если необходимо, гипертензивные средства (норадреналин). Можно назначить и 1—5 (-10) мг глюкагона.

Побочное действие. Как и при применении других β-адреноблокирующих средств, в отдельных случаях, особенно в начале лечения, могут наблюдаться желудочно-кишечные расстройства, расстройства сна и быстрая утомляемость при физических нагрузках.

Противопоказания. Предсердно-желудочковая блокада сердца II—III степени, тяжелая брадикардия, сердечная недостаточность, устойчивая к действию препаратов наперстянки, кардиогенный шок.

Форма выпуска. Драже по 50 и 100 мг, в упаковке по 40 и 200 штук; таблетки по 200 мг «Ретард»; ампулы по 5 мг, в упаковке по 5 штук.

Условия хранения. Обычные, в темном месте.

Срок годности 5 лет.

Производится фирмой «Сиба-Гейги», Швейцария.

ЛОРИНДЕН А (Lorinden A). Мазь, содержащая 0,02% флуметазона пивалата и 3% салициловой кислоты.

Фармакологическое действие. Обладает локальным противовоспалительным, противоаллергическим и противозудным свойством.

Отредактировал: ledi24

Показания к применению. Хроническая экзема. Нейродермит, псориаз, плоский и эритематозный лишай. Себорейный дерматит.

Способ применения и дозы. Мазь наносят тонким слоем на болезненные участки кожи 2—3 раза в сутки. Лечение продолжают 3—4 дня до полного исчезновения болезненных проявлений. Мазь можно применять в окклюзионной повязке, сменяемой каждые 24—48 ч.

Противопоказания. Гнойные осложнения кожных болезней, вирусные кожные болезни, туберкулез кожи, сифилитические поражения кожи, кожные реакции после вакцинации. Аллергия к кортикостероидам.

Побочное действие. У особенно чувствительных детей могут появиться раздражение и зуд кожи.

Форма выпуска. Мазь по 15 г в упаковке.

Условия хранения. Список Б. В сухом месте.

Срок годности 3 года.

Поставляется из Польши.

ЛОРИНДЕН С (Lorinden C). Мазь, содержащая 0,02% флуметазона пивалата (локакортена) и 3% йодхлороксихинолина.

Фармакологическое действие. Оказывает сильное противовоспалительное, бактерицидное, противогрибковое действие, уменьшает зуд.

Показания к применению. Гнойные кожные болезни: импетиго, бактериальная опрелость, воспаление кожи и эпидермиса. Аллергические кожные заболевания и их гнойные осложнения, уртикарные высыпания, детская крапивница, экзема, аллергический дерматит.

Способ применения и дозы. Мазь наносят тонким слоем на пораженные участки кожи 2—3 раза в сутки. Лечение продолжают 3—4 дня до полного исчезновения болезненных проявлений. Мазь можно применять в окклюзионной повязке, сменяемой через 24—48 ч. Не рекомендуется применять мазь на широко распространившиеся кожные изменения более 3 нед.

Противопоказания. Туберкулез кожи, ветряная оспа, сифилитические поражения кожи; после вакцинации. Аллергия к кортикостероидам.

Побочное действие. При особой чувствительности больных может появиться раздражение кожи, зуд, сыпь.

Форма выпуска. Мазь в упаковке по 15 г.

Условия хранения. Список Б. В сухом месте.

Срок годности 3 года.

Поставляется из Польши.

ЛОФЕНАЛ (Lophenalum). Пара-[бис-(β-Хлорэтил)-амино]-фенацетил-DL-фенилаланин.

Фармакологическое действие. Обладает противоопухолевой активностью в дозах, оказывающих слабое угнетающее действие на гемопоэз, особенно на тромбоцитопоэз.

Показания к применению. Рак яичников (неоперабельные случаи); после нерадикальных операций, диссеминация по брюшине с асцитом; метастазы в легкие, сопровождающиеся гидротораксом; как дополнительное средство при хроническом лимфолейкозе, лимфогранулематозе, лимфо- и ретикулосаркоматозе.

Способ применения и дозы. Внутрь после еды 1—2 раза в день от 0,3 до 1,2 г/сут. На курс лечения 9—50 г. Для поддерживающей терапии назначают 0,3—0,6 г в неделю. Лечение проводят под гематологическим контролем не реже 1 раза в неделю в начале лечения и каждые 3—4 дня во второй половине курса.

Побочное действие. Иногда потеря аппетита, тошнота, рвота; лейкопения и тромбоцитопения.

Отредактировал: ledi24

Противопоказания. Значительная анемия, лейкопения и тромбоцитопения; терминальная стадия болезни, а также тяжелые сопутствующие заболевания.

Форма выпуска. Таблетки по 0,3 г, в упаковке 100 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте при температуре не выше 10°С.

Срок годности 3 года.

ЛЬНА СЕМЯ (Semen Lini). Содержит слизь (5—12%), жирное масло (30—48%), белковые вещества (18—33%), гликозид линамарин.

Применение. В качестве обволакивающего и смягчающего средства при заболеваниях кишечника в виде слизи, которую готовят ex tempore из 1 части цельного льняного семени и 30 частей горячей воды.

Форма выпуска. В упаковке по 200 г.

Условия хранения. В сухом прохладном месте.

Срок годности 3 года.

ЛЮДИОМИЛ (Ludiomil). Состав. Активное вещество: 1-(3-метиламинопропил)-дибензо[б, е] бицикло [2,2,2]-октадиена гидрохлорид (= мапротилина гидрохлорид). Драже по 10, 25, 50 и 75 мг. Капли: 2% раствор мапротилин-резината. 1 мл капельной суспензии (= примерно 20 капель) соответствует 20 мг мапротилина гидрохлорида. Ампулы 2 мл по 25 мг мапротилина в виде метансульфоната. Людиомил — тетрациклический антидепрессант. Его активное вещество относится к классу психотропных соединений под общим названием дибензобициклооктадиены.

Фармакологическое действие. Значительно повышает настроение, равным образом воздействует на чувство страха и возбуждение, на психомоторное торможение и на физическое недомогание — основной симптом скрытой депрессии. Эффект препарата ощущается очень быстро. Он обладает хорошей переносимостью, что делает его особенно пригодным для применения в амбулаторной практике.

Показания к применению. Депрессии эндогенные — периодические, циклические, поздние — инволюционные, психогенные — реактивные, невротические, депрессии истощения, соматогенные, климактерические. Другие депрессивные состояния, сопровождающиеся чувством страха, дисфорией и раздражительностью, апатия, психосоматические и соматические расстройства на фоне чувства тоски, страха.

Способ применения и дозы. Дозу необходимо подбирать индивидуально, учитывая состояние больного. После исчезновения симптомов возможна попытка уменьшения дозы; ее необходимо перевести на прежний уровень при усилении симптоматики. Для амбулаторных больных: 3 раза в день по 25 мг или 1 раз в день (предпочтительно вечером) по 75 мг внутрь в течение нескольких недель. Для больных с выраженной депрессией: 3 раза в день по 50 мг или 1 раз по 150 мг. Если нужно повысить суточную дозу, ее увеличивают постепенно и дают в 2—3 приема.

При внутривенном капельном вливании суточная доза составляет 25—150 мг, разбавляемых в 250 мл физиологического раствора или глюкозы. Вводится капельно на протяжении 1,5—2 часов. В случае необходимости — более высокая доза: 75—150 мг в 500 мл указанных растворов на протяжении 2—3 часов. После инфузионной терапии и появления выраженного терапевтического эффекта больного следует перевести на прием препарата внутрь.

При внутривенных инъекциях разовая доза составляет 25—50 мг, разбавляемых до объема соответственно 10 или 20 мл стерильным физиологическим раствором либо дистиллированной водой, и вводится минимум в течение 3 минут. Суточная доза не должна превышать 150 мг.

Отредактировал: ledi24

Депрессивные состояния у стариков и детей лечат драже или каплями. Сначала людиомил назначают по 10 мг 3 раза в день, затем при необходимости разовые дозы постепенно увеличивают до 25 мг. Подросткам доза может быть доведена до уровня взрослых. Капли специально предназначены для детей и стариков: 1 капля — примерно 1 мг мабротилина гидрохлорида. Капельную суспензию перед употреблением надо встряхивать.

Людиомил с осторожностью рекомендуют больным, страдающим тяжелыми заболеваниями печени и почек, глаукомой, расстройствами мочеиспускания. Больным с сердечными заболеваниями требуется регулярный контроль за функцией сердца, ЭКГ и кровяного давления. При повышенной склонности к судорогам лечение должно проводиться с одновременным применением противосудорожных средств.

Препарат уменьшает гипотензивное действие адреноблокаторов; может усиливать действие норадреналина или адреналина на сердечно-сосудистую систему, а также активность седативных и антихолинергических средств. Его не рекомендуется назначать одновременно с ингибиторами МАО. Больным, получавшим ингибитор МАО, людиомил показан лишь после перерыва в лечении (14 дней).

Типичные симптомы передозировки — сонливость, беспокойство, атаксия, судороги, ступор, кома, тахикардия, гипотония, дыхательная депрессия.

Побочное действие. Усталость, сухость во рту, запор, расстройство зрения или головокружение, в редких случаях — временное понижение кровяного давления и тахикардия, аллергические кожные реакции, требующие иногда замены терапии.

Людиомил может снижать толерантность к алкоголю, неблагоприятно влиять на реакции больного в условиях уличного движения.

Противопоказания. Препарат противопоказан в первые три месяца беременности. Активное вещество проникает в материнское молоко.

Форма выпуска. Драже по 10 мг, в упаковке по 50 и 500 штук; драже по 25 мг, в упаковке по 30, 100 и 1000 штук; драже по 50 мг, в упаковке по 30, 100 и 1000 штук; драже по 75 мг, в упаковке по 20, 100 и 500 штук; капли (2%) в упаковке по 50 мл; ампулы (2 мл) в упаковке по 10 и 100 штук.

Срок годности драже 5 лет, капель и ампул 3 года.

Производитель — фирма «Сиба-Гейги», Швейцария.

ЛЮТЕНУРИН (Lutenurinum). Сумма алкалоидов, содержащихся в корневищах и корнях кубышки желтой (Nuphar lutea (L.) Subth. et Smith.].

Фармакологическое действие. Эффективен в отношении трихомонад, патогенных грибов рода Candida, оказывает бактериостатическое действие в отношении грамположительных микробов; обладает сперматоцидной активностью.

Показания к применению. Трихомонадные урогенитальные заболевания, трихомонозы, осложненные грибковой и бактериальной флорой. В качестве противозачаточного средства.

Способ применения и дозы. Местно. При трихомонадных инфекциях 0,5% линимент или вагинальные суппозитории. При лечении женщин влагалище обрабатывают линиментом ежедневно или через день. Суппозитории применяют как дополнительное средство в промежутках между процедурами. Первый курс лечения 10—20 дней. Проводят не менее 3 курсов.

В качестве противозачаточного средства применяют вагинальные суппозитории или пенообразующие таблетки, которые вводят во влага-

Отредактировал: ledi24

лище за 5—10 мин до полового сношения. Таблетки перед употреблением смачивают водой.

Побочное действие. Возможно местное раздражающее действие.

Противопоказания. Индивидуальная непереносимость.

Форма выпуска. Суппозитории вагинальные, содержащие 0,003 г препарата, в упаковке 10 штук; 0,5% линимент, в упаковке 50 г.

Условия хранения. Список Б. В сухом, защищенном от света месте.

Срок годности. Линимент и суппозитории 2 года.

МАГНИЯ КАРБОНАТ ОСНОВНОЙ (Magnesii subcarbonas). Синоним: магнезия белая.

Применение. В качестве антацидного и послабляющего средства, при повышенной кислотности желудочного сока внутрь по 1—3 г (детям 0,5—2 г) 2—3 раза в день; наружно в виде присыпок.

Форма выпуска. Порошок.

Условия хранения. В хорошо укупоренной таре.

Срок годности не ограничен.

МАГНИЯ ОКИСЬ (Magnesii oxydum). Синоним: магнезия жженая.

Применение. Как антацидное средство при повышенной кислотности желудочного сока по 0,025—1 г на прием, при отравлении кислотами, как легкое слабительное по 3—5 г на прием.

Форма выпуска. Порошок.

Условия хранения. В хорошо укупоренной таре.

Срок годности 10 лет.

МАГНИЯ СУЛЬФАТ (Magnesii sulfas). Синонимы: горькая соль, Magnesium sulfuricum.

Применение. Как успокаивающее, спазмолитическое и противосудорожное средство внутримышечно (иногда при гипертонических кризах внутривенно медленно) по 5—20 мл 25% раствора; как слабительное внутрь (на ночь или натощак за 30 мин до еды 10—30 г), как желчегонное по 1 столовой ложке 20—25% раствора; при отравлениях препарат используют в виде 1% раствора для промывания желудка.

Препарат включают в комплекс противоэпилептического лечения (для купирования эпилептического статуса).

Побочное действие. При парентеральном введении возможно угнетение дыхания.

Форма выпуска. Порошок; ампулы 25% раствора по 5 мл, 10 мл и 20 мл, в упаковке по 10 штук.

Условия хранения. В хорошо укупоренной таре.

Срок годности. Порошок 10 лет, ампулы 5 лет.

МАГУРЛИТ (Magurlit). Состав: пиридоксина гидрохлорид 0,008 г, магния цитрат 0,18 г, кислота лимонная 0,27 г, натрия цитрат 0,723 г, калия цитрат 0,794 г.

Фармакологическое действие. Способствует нейтрализации мочи. Длительное применение препарата приводит к растворению камней, состоящих из мочевой кислоты и оксалата кальция, и предупреждает их образование.

Показания к применению. Лечение и профилактика мочекаменной болезни с образованием уратов.

Способ применения и дозы. Назначают внутрь. Дозы определяют индивидуально под контролем pH мочи перед каждым приемом препарата с помощью индикаторной бумаги по шкале цветности (величина pH не должна превышать 6,2—6,8).

Средняя начальная доза составляет 6—8 г в день в 3 приема (утром 2 г, после обеда 2 г и вечером 2—4 г).

Отредактировал: ledi24

Побочное действие. В отдельных случаях возможны нарушения функции желудочно-кишечного тракта.

Противопоказания. Инфицированная щелочная моча. Ввиду высокого содержания натрия и калия в препарате его нельзя назначать больным с нарушением кровообращения.

Форма выпуска. В упаковке 100 пакетов, содержащих по 2 г гранул, с приложением индикаторной бумаги с пределом измерений 5,4—7,0 и шкалы цветности для контроля pH мочи.

Условия хранения. В сухом месте.

Срок годности 3 года.

Поставляется из Венгрии.

МАДОПАР (Madopar). Содержит в одной капсуле 100 («Мадопар-125») или 200 («Мадопар-250») мг левопы и 25 или 50 мг (соответственно) бенсеразида.

Фармакологическое действие. Антипаркинсоническое средство. Бенсеразид тормозит экстрацеребральное декарбоксилирование левопы, которая проникает через гематоэнцефалический барьер, в базальных ганглиях превращается в допамин и устраняет или значительно уменьшает ригидность, брадикинезию и тремор. Комбинация с бенсеразидом позволяет уменьшить дозу левопы для достижения терапевтического эффекта, что снижает побочное действие.

Показания к применению. Болезнь Паркинсона, паркинсонизм (кроме лекарственного).

Способ применения и дозы. Первые 2—3 дня «Мадопар-125» назначают по 1 капсуле 1—2 раза в сутки, при необходимости повышая суточную дозу на 1 капсулу через каждые 2—3 дня. Таким образом добиваются оптимального эффекта, который обычно наблюдается при дозе 4—8 капсул «Мадопара-125» (или 3—4 капсулы «Мадопара-250»). Больным, ранее лечившимся левопой, мадопар назначают в дозе, составляющей 20% от прежней дозы левопы (после 12-часового перерыва).

Побочное действие. Хореиформные и дистонические насильственные движения, мышечные судороги, блефароспазм, тризм, психические нарушения (бредовые расстройства, депрессия, эйфория, деменция), реже — ортостатическая гипотензия, нарушения ритма сердца, иногда головная боль, атаксия, потливость, задержка мочеиспускания, нарушения функции желудочно-кишечного тракта.

Противопоказания. Идиосинкразия к препарату, выраженные нарушения функции печени, почек и желез внутренней секреции, декомпенсация сердечно-сосудистой системы, закрытоугольная глаукома, психические заболевания, возраст до 12 лет, беременность и лактация.

Препарат не назначают одновременно с ингибиторами моноаминоксидазы.

Форма выпуска. Капсулы «Мадопар-125» в упаковке 100 штук; капсулы «Мадопар-250» в упаковке 100 штук.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности 3 года.

Поставляется из Югославии.

МАЖЕПТИЛ (Majeptil). 2-Диметилсульфамидо-10-[3-(1-метилперазинил-4)-пропил]-фенотиазина. Синонимы: Cephalin, Thyorgopirazin.

Фармакологическое действие. Нейролептическое средство с относительно слабым седативным, но мощным антипсихотическим действием.

Показания к применению. Шизофрения, кататонические, кататоногебефренические состояния, острые и хронические психозы.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,005—0,01 г в день с постепен-

Отредактировал: ledi24

ным повышением дозы до 0,1 г/сут, внутримышечно вводят по 1 мл 1% раствора.

Побочное действие. Экстрапирамидные расстройства.

Противопоказания. Органические заболевания центральной нервной системы.

Форма выпуска. Таблетки по 0,001 г (1 мг), в упаковке по 5000 штук и по 0,01 г (10 мг), в упаковке по 1000 штук, ампулы по 1 мл 1% раствора, в упаковке 50 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 4 года.

Поставляется из-за рубежа.

МАЗЬ ОТ ОБМОРОЖЕНИЯ (Unguentum contra congelationem). Состав: настойки стручкового перца (1:5) 7,4 г, кислоты муравьиной 0,3 г, раствора аммиака 25% 1,45 г, масла камфорного 10% 6,2 г, мыла жидкого калийного 1,9 г, масла касторового 1 г, ланолина безводного (или церезина) 1,3 г, сала свиного 9,45 г, вазелина 71 г.

Применение. Наружно для профилактики и лечения обморожений.

Форма выпуска. В упаковке по 10 г.

Условия хранения. В сухом прохладном месте.

Срок годности 3 года.

МАЛИНЫ ПЛОД (Fructus Rubi idaei). Содержит органические кислоты (салициловая, яблочная, лимонная, винная), антоцианы, кумарины, пектиновые вещества, сахар.

Применение. В качестве потогонного средства при простудных заболеваниях в виде настоя (20,0:200,0) или чая (2 столовые ложки на стакан кипящей воды) внутрь по 2—3 стакана в течение 1—2 ч.

Форма выпуска. В упаковке по 50 г.

Условия хранения. В сухом проветриваемом помещении.

Срок годности 2 года.

МАНИНИЛ (Maninil). 1-[4-[2(5-Хлор-2-метоксибензамидоэтил]-фенилсульфонил]-3-циклогексилмочевина. Синоним: Glibenclamid, Maninil, Daonil.

Фармакологическое действие. Гипогликемическое средство.

Показания к применению. Сахарный диабет у лиц старше 40 лет.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,0025 г 1 раз в день после завтрака, при необходимости дозу увеличивают до 0,005—0,01 г/сут.

Побочное действие. В отдельных случаях гипогликемические и аллергические реакции, лейкопения, тромбоцитопения, проходящие парезы.

Противопоказания. Ацидоз, коматозное и прекоматозное состояние, выраженное нарушение функции печени и почек, юношеский возраст.

Форма выпуска. Таблетки по 0,005 г, в упаковке 60 штук.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Германии.

МАННИТ (Mannitum). Шестиатомный спирт. Синоним: маннитол.

Фармакологическое действие. Сильное диуретическое средство. Диуретический эффект определяется количеством препарата, профильтровавшегося через почки. При нарушении фильтрационной функции почек диуретический эффект может отсутствовать.

Показания к применению. Задержка жидкости в организме, местная внеклеточная гипергидратация (например, отек мозга); для профилактики и лечения нарушений водно-солевого равновесия; при операциях с экстракорпоральным кровообращением; при острой почечной и почечно-

Отредактировал: ledi24

печеночной недостаточности с уменьшенной фильтрационной способностью почек, при посттрансфузионных осложнениях, вызванных введением несовместимой крови.

При азотемии у больных циррозом печени с асцитом маннит неэффективен.

Способ применения и дозы. Внутривенно (струйно медленно или капельно). Применяют готовый 15% раствор или 10—15—20% растворы, приготовленные ex tempore. Растворяют маннит в воде для инъекций или в 5% растворе глюкозы. С профилактической целью маннит применяют в разовой дозе 0,5 г/кг массы тела, с лечебной целью — из расчета 1—1,5 г/кг. Суточная доза не должна превышать 140—180 г. Повторное введение проводят под контролем показаний водно-солевого баланса. Препарат применяют только в стационаре.

Противопоказания. Органические поражения почек с нарушением процесса фильтрации, сердечная недостаточность.

Побочное действие. Избыточное введение маннита может вызвать обезвоживание организма (диспептические явления, галлюцинации). Введение маннита при анурии может привести к развитию отека легких.

Форма выпуска. В лиофилизированном виде во флаконах емкостью 500 мл по 30 г, в виде 15% раствора во флаконе по 400 мл и по 200 мл.

Условия хранения. Лиофилизированный маннит — в обычных условиях, 15% раствор — при температуре не выше 25°С.

Срок годности 1 год.

МАРАСЛАВИН (Maraslavin). Отвар из лекарственных трав.

Фармакологическое действие. Оказывает противовоспалительное, бактериостатическое и дезодорирующее действие.

Показания к применению. Воспалительные формы амфодонтоза.

Способ применения и дозы. Рыхлые ватные тампоны, смоченные препаратом, закладывают на 5—6 мин на десны и в гингивальные карманы. Процедуру повторяют 5—6 раз (для каждого кармана) за сеанс, последний тампон оставляют до появления жжения. Курс лечения до 3 мес (7—20 сеансов).

Побочное действие. При плотном наложении тампонов возможно небольшое повышение температуры тела.

Форма выпуска. Флаконы по 100 г.

Условия хранения. В прохладном месте.

Срок годности 3 года.

Поставляется из Болгарии.

«МАРЕЛИН» («Marelinum»). Комбинированный препарат состава: экстракта марены красильной 0,0325 г, экстракта золотарника канадского 0,025 г, экстракта хвоща полевого 0,015 г, келлина 0,0025 г, коргликона 0,000125 г, салициламида 0,035 г, фосфата магния 0,01 г.

Фармакологическое действие. Оказывает спазмолитическое, диуретическое и противовоспалительное действие. Способствует перемещению или самостоятельному отхождению конкрементов, уменьшает боль при почечной колике, повышает диурез и подкисляет мочу. При нефролитиазе приводит к обильному отхождению кристаллов мочевых солей, слизи и гноя; нормализует солевой обмен.

Показания к применению. Фосфатный и оксалатный нефроуролитиаз, в том числе нефролитиаз, осложненный калькулезным пиелонефритом. Наличие конкрементов чашечки и почечной лоханки, камни мочеточника различной величины и локализации. Состояние после оперативного удаления почечных камней или их самостоятельного отхождения; солевой диатез — фосфатурия и оксалурия.

Способ применения и дозы. Внутрь перед едой по 2—4 таблетки

Отредактировал: ledi24

3 раза в день в течение 20—30 дней. Повторные курсы через 1—1 1/2 мес. Больным с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки препарат принимать после еды.

С целью профилактики рецидивов после оперативного удаления камня или его самопроизвольного отхождения принимать по 2 таблетки 3 раза в день в течение 2—3 мес. Курс лечения повторяют через 4—6 мес.

Побочное действие. У больных с воспалительными заболеваниями желудочно-кишечного тракта возможны диспептические явления и обострение язвенной болезни.

Противопоказания. Острый и хронический гломерулонефрит.

Форма выпуска. Таблетки, покрытые оболочкой, в упаковке 120 штук.

Условия хранения. В сухом, прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

МАРЕНЫ КРАСИЛЬНОЙ ЭКСТРАКТ СУХОЙ (Extractum Rubiae tinctorum siccum).

Фармакологическое действие. Оказывает спазмолитическое и мочегонное действие; способствует разрыхлению мочевых камней, содержащих фосфаты кальция и магния.

Показания к применению. Мочекаменная болезнь.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,25—0,75 г 2—3 раза в день в 1/2 стакана теплой воды.

Побочное действие. Окрашивает мочу в красноватый цвет.

Форма выпуска. Таблетки по 0,25 г, в упаковке 100 штук.

Условия хранения. В хорошо укупоренной таре.

Срок годности 2 года.

МАРЛЯ КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩАЯ (Tela haemostatica). Марлевые салфетки, пропитанные полиангидроглюкуровой кислотой.

Фармакологическое действие. Оказывает кровоостанавливающее действие при местном применении, прекращая кровотечение из различных органов и тканей в течение 1—2 мин. Оставленная в организме марля может полностью рассосаться в течение 30—40 дней в зависимости от количества взятого материала и места его нахождения.

Показания к применению. Для интраоперационной остановки кровотечения при вмешательствах на паренхиматозных органах, сердце, легких, мозговой оболочке и мозге; для заполнения матки при послеродовых кровотечениях; для остановки носоглоточных, десневых кровотечений и кровотечений из донорских участков кожи при пересадке кожи; для остановки кровотечений у больных с нарушением свертывающей системы крови и повышенной проницаемостью и ломкостью сосудов (болезнь Верльгофа, лейкозы, гемофилия).

Способ применения и дозы. Местно. Препарат извлекают из флакона, не нарушая стерильность, затем в виде тампона или салфетки накладывают на кровоточащую поверхность в несколько слоев. Сверху кровоостанавливающую марлю прижимают тампоном из обычной марли. После остановки кровотечения кровоостанавливающую марлю извлекают из раны. В случае угрозы продолжения кровотечения минимальное количество препарата можно оставить в ране, которое постепенно полностью рассасывается. Нельзя оставлять препарат в гнойных ранах и местах костных переломов.

Препарат применяется в стационаре и хирургических отделениях поликлиник.

Форма выпуска. В виде стерильных салфеток размером 13×13 см в упаковке по 1 штуке.

Условия хранения. В защищенном от света месте, при температуре не выше 5°С.

Срок годности 4 года.

Отредактировал: ledi24

МАТЬ-И-МАЧЕХИ ЛИСТ (Folium Farfarae). Содержит слизь, гликозид туссилягин, дубильные вещества, сапонины, органические кислоты, ситостерин.

Применение. В качестве отхаркивающего, смягчающего средства при заболеваниях верхних дыхательных путей в виде настоя (5,0: 200,0—10,0:200,0) по 1 столовой ложке 3—4 раза в день.

Форма выпуска. В упаковке по 100 г резаные листья, прессованные.

Условия хранения. В сухом проветриваемом помещении.

Срок годности 2 года.

МАФЕНИДА АЦЕТАТ (Maphenidi acetas). 4-Аминометил-бензолсульфамида ацетат.

Фармакологическое действие. Антимикробный препарат широкого спектра действия, активен in vitro в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий и патогенных анаэробов, возбудителей газовой гангрены.

Показания к применению. Инфицированные ожоги, гнойные раны, пролежни и трофические язвы.

Способ применения и дозы. Местно в виде 10% мази. Наносят мазь непосредственно на раневую поверхность, вводят в полости тампоны, пропитанные мазью или накладывают на раны салфетки, смазанные слоем мази толщиной 2—3 см. Смену повязок проводят ежедневно или 2—3 раза в неделю. Длительность лечения 1—5 нед.

Побочное действие. Возможны местное раздражение, жжение, боль в ране. При сильной боли назначают анальгетики.

Противопоказания. Токсико-аллергические реакции на мафенид и сульфамидные препараты.

Форма выпуска. 10% мазь в упаковке по 50 г в банках и ангро.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

МЕБИКАР (Mebicarum). 2,4,6,8-Тетраметил-2,4,6,8-тетраазабицикло-(3,3,0)-октандион-3,7.

Фармакологическое действие. Оказывает отчетливое транквилизирующее действие, не давая миорелаксирующего и заметного гипнотического эффекта.

Показания к применению. Разнообразные невротические и неврозоподобные состояния, сопровождающиеся тревогой, страхом, повышенной раздражительностью и эмоциональной неустойчивостью, фобиями и т. д.; легкие гипоманиакальные и тревожно-бредовые состояния без грубых нарушений поведения и психомоторного возбуждения; резидуальные состояния после острых психозов с явлениями аффективной неустойчивости и остаточной продуктивной симптоматикой; хронический вербальный галлюциноз органического генеза; неврозоподобные состояния у больных алкоголизмом в период ремиссии.

Способ применения и дозы. Внутрь независимо от приема пищи по 0,3—1 г 2—3 раза в день. Курс лечения от 2—3 нед до 6 мес и более.

Побочное действие. Иногда слабость, головокружение, редко аллергические реакции в виде кожного зуда.

Противопоказания. Индивидуальная непереносимость.

Форма выпуска. Таблетки по 0,3 г, в упаковке 20 штук.

Условия хранения. Список Б. В сухом, защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

«МЕГОСИН» («Megosinum»). Мегосин-1′, 6,6′-тетраокси-5,5′ диизопропил-3,3′ диметил-7,7′-диоксо-8,8′-диметинимиоэтансульфокислоты динатриевая соль-2,2′-динафталин.

Отредактировал: ledi24

Фармакологическое действие. Обладает вирулицидной активностью в отношении вируса герпеса.

Показания к применению. Взрослым в качестве антигерпетического средства при вирусных заболеваниях кожи.

Способ применения и дозы. Наносится тонким слоем на пораженный участок кожи 3 раза в день. Лечение продолжается 4—6 дней.

Форма выпуска. 3% мазь в упаковке по 10 г.

Условия хранения. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

МЕДРОТЕСТРОНА ПРОПИОНАТ (Medrotestroni propionas). 2-α-Метил-5α-андростанол-17β-она-3 пропионат. Синонимы: метилдигидротестостерона пропионат, местерон.

Фармакологическое действие. По строению и действию сходен с тестостерона пропионатом; оказывает противоопухолевое действие, но обладает более высокой анаболической и меньшей андрогенной активностью.

Показания к применению. Рак молочной железы (даже при далеко зашедшем процессе с метастазами). Препарат назначают больным с сохраненным к началу лечения менструальным циклом или при менопаузе до 5 лет, а также больным, у которых ранее овариальная функция подавлена облучением яичников, андрогенными препаратами или перенесшим овариэктомию.

Способ применения и дозы. Внутримышечно ежедневно в период активного метастазирования по 0,1 г, при ремиссии по 0,05 г. Лечение длительное: для профилактики рецидивов и метастазов после мастэктомии 2—3 года, при далеко зашедшем процессе (IV стадия) на протяжении всей жизни.

Побочное действие. Гиперкальциемия и гиперкальциурия, острый паренхиматозный гепатит, сопровождающийся желтухой, нарушение сердечной деятельности, явления вирилизации.

Противопоказания. Острые заболевания печени и почек, острые заболевания сердечно-сосудистой системы (инфаркт миокарда, тяжелая форма гипертонической болезни, криз), терминальная стадия заболевания.

Форма выпуска. 5% масляный раствор в ампулах по 1 мл, в упаковке 6 штук.

Условия хранения. Список Б. В сухом месте при комнатной температуре.

Срок годности 5 лет.

МЕЗАПАМ (Mezapamum). 7-Хлор-2,3 дигидро-1 метил-5 фенил-1Н-1,4 бензодиазепин. Синонимы: Rudotel, Nobrium и др.

Фармакологическое действие. Дневной транквилизатор, оказывает успокаивающее, анксиолитическое, миорелаксантное, противосудорожное действие. Способен потенцировать эффект нейротропных и снотворных препаратов.

Показания к применению. Неврозы, психопатия и другие нервно-психические расстройства с неврозоподобными и психопатоподобными нарушениями, сопровождающиеся повышенной возбудимостью, раздражительностью, при абстинентном синдроме. Отсутствие выраженных миорелаксантных и гипноседативных свойств позволяет назначать мезапам ослабленным больным и лицам пожилого возраста.

Способ применения и дозы. Внутрь независимо от приема пищи. Лечение для взрослых начинают с дозы 0,005 г (5 мг). Средняя разовая

Отредактировал: ledi24

доза для взрослых 0,01—0,02 г, средняя суточная доза 0,03—0,04 г. Высшая суточная доза 0,06—0,07 г. Суточную дозу распределяют на 2—3 приема. Терапевтический эффект проявляется на 8—15-е сутки, после чего переходят на поддерживающее лечение в индивидуально подобранных дозах. Продолжительность курса не должна превышать 2 мес. Повторный курс можно назначать не менее чем через 3 нед.

При алкоголизме мезапам назначают в средних суточных дозах короткими курсами в течение 1—2 нед.

Побочное действие. В первые дни приема возможны дневная сонливость, мышечная вялость, легкие нарушения координации движений, в связи с чем лицам, работа которых требует быстрой психической и физической реакции, препарат назначают с осторожностью; в отдельных случаях наблюдаются аллергические высыпания на коже.

Противопоказания. Тяжелые формы печеночной и почечной патологии, миастения, беременность, индивидуальная непереносимость. Не следует назначать лицам, деятельность которых связана с быстротой и высокой точностью автоматических движений.

Форма выпуска. Таблетки по 0,01 г, в упаковке 50 штук.

Этот препарат под названием «Рудотель» (Rudotel) таблетки по 0,01 г в упаковке по 50 штук поступает из Германии.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности мезапама 2 года, рудотеля 5 лет.

МЕЗАТОН (Mesatonum). 1-(мета-Оксифенил)-2-метиламиноэтанола гидрохлорид. Синонимы: Adrianol, Isophrin.

Фармакологическое действие. Адреномиметическое средство. Активно стимулирует α-адренорецепторы, на β-рецепторы сердца оказывает слабое влияние. Расширяет зрачок и понижает внутриглазное давление.

Показания к применению. Гипотония; суправентрикулярная пароксизмальная тахикардия; в качестве сосудосуживающего и противовоспалительного средства в офтальмологической и оториноларингологической практике.

Способ применения и дозы. При коллапсе вводят внутривенно медленно под контролем АД 0,3—1 мл 1% раствора в 40 мл 40% раствора глюкозы. При необходимости длительного назначения внутривенно капельно вводят 1—2 мл 1% раствора в 250—500 мл 5% раствора глюкозы. Под кожу или внутримышечно вводят по 0,5—1 мл 1% раствора; внутрь 0,01—0,025 г 2—3 раза в день. В офтальмологии и оториноларингологии применяют 0,25—1% растворы, при глаукоме — 10% раствор в каплях.

Побочное действие. Головная боль, тошнота (при повышении АД).

Противопоказания. Выраженный атеросклероз, гипертоническая болезнь (за исключением коллапса). Необходима особая осторожность при гипертиреозе, склонности к ангиоспазмам, а также у лиц пожилого возраста.

Форма выпуска. Порошок, ампулы по 1 мл 1% раствора, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте; порошок в хорошо укупоренных банках оранжевого стекла.

Срок годности. Порошок 4 года, ампулы 3 года.

МЕЗИМ-ФОРТЕ (Mezym-forte). Состав: 140 мг панкреатина, 4200 ЕД амилазы, 3500 ЕД липазы и 250 ЕД протеаз.

Фармакологическое действие. Обеспечивает хорошую перевариваемость жиров, белков и углеводов.

Показания к применению. При недостаточной секреторной и

Отредактировал: ledi24

переваривающей способности желудка и кишечника (при хронических гастритах, энтероколитах и др.), при хронических панкреатитах, гепатитах, холециститах.

Способ применения и дозы. Назначают взрослым по 1—3 драже в день (перед приемом пищи).

Форма выпуска. Драже, покрытые оболочкой, в упаковке 20 штук.

Условия хранения. Обычные.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Германии.

МЕКСАМИН (Mexaminum). 5-Метокситриптамина-гидрохлорид.

Фармакологическое действие. Близок к серотонину. Вызывает сокращение гладкой мускулатуры, сужение кровеносных сосудов, оказывает седативное действие, усиливает эффект снотворных и анальгетиков. Обладает радиозащитной активностью.

Показания к применению. Профилактика общей лучевой реакции при лучевой терапии.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,05 г (1 таблетка) за 30—40 мин перед каждым сеансом лучевой терапии. При хорошей переносимости дозу можно увеличить до 0,1 г.

Побочное действие. В отдельных случаях легкая тошнота, головокружение, боль в подложечной области, реже рвота.

Противопоказания. Выраженный склероз сосудов сердца и мозга, сердечно-сосудистая недостаточность, бронхиальная астма, беременность, заболевания почек с нарушением их функции.

Форма выпуска. Таблетки, покрытые оболочкой, по 0,05 г, в упаковке 50 штук.

Условия хранения. Список Б. В склянках темного стекла, в защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

МЕЛИПРАМИН (Melipramin). N-(3-Диметиламинопропил) иминодибензила гидрохлорид. Синонимы: Imizinum, Tofranil.

Фармакологическое действие. Антидепрессант, оказывающий одновременно стимулирующее влияние на центральную нервную систему; не тормозит активность моноаминоксидазы.

Показания к применению. Депрессивные состояния различной этиологии, особенно протекающие с заторможенностью.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,025—0,05 г в день с последующим увеличением дозы до 0,3 г/сут, внутримышечно 2 мл 1,25% раствора 1—3 раза в сутки.

Побочное действие. Головокружение, потливость, сердцебиение, сухость во рту, нарушение аккомодации, эозинофилия, лейкоцитоз; при передозировке возбуждение и бессонница.

Противопоказания. Заболевания печени, почек, кроветворных органов, сахарный диабет, выраженный атеросклероз, глаукома, аденома предстательной железы, атония мочевого пузыря, беременность (первые 3 мес).

Форма выпуска. Таблетки по 0,025 г, в упаковке 50 штук, ампулы по 2 мл 1,25% раствора, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

Поставляется из Венгрии.

МЕЛЛИКТИН (Mellictinum). Гидройодид алкалоида метиллика-

Отредактировал: ledi24

конитина, содержащегося в живокости полубородатой, живокости сетчатоплодной и др. семейства лютиковых.

Фармакологическое действие. Курареподобный препарат, по механизму действия на нервно-мышечную проводимость близок к d-тубокурарину. Оказывает умеренное ганглиоблокирующее действие.

Показания к применению. Заболевания, сопровождающиеся повышением мышечного тонуса, пирамидная недостаточность сосудистого и воспалительного характера, болезнь Паркинсона, постэнцефалитический паркинсонизм, болезнь Литтля и др.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,02 г 1—5 раз в день. Курс лечения (3—8 нед) через 3—4 мес может быть повторен.

Побочное действие и противопоказания те же, что и для d-тубокурарина.

Форма выпуска. Таблетки по 0,02 г, в упаковке 50 штук.

Условия хранения. Список А. В защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

МЕНОВАЗИН (Menovasinum). Состав: ментола 2,5 г, новокаина 1 г, анестезина 1 г, спирта этилового 70% до 100 мл.

Фармакологическое действие. Местное обезболивающее и противозудное средство.

Показания к применению. Миалгии, невралгии, артралгии, зудящие дерматозы.

Способ применения и дозы. В виде растирания 2—3 раза в день.

Побочное действие. Головокружение, общая слабость, понижение АД.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к новокаину.

Форма выпуска. Во флаконах по 40 мл.

Условия хранения. Список Б. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

МЕНТОЛ (Mentholum). 2-Изопропил-5-метилциклогексанол-1.

Фармакологическое действие. Успокаивающее и болеутоляющее средство.

Применение. Наружно при невралгиях, артралгиях, миалгиях в виде 4% раствора или 10% масляной взвеси; при зудящих дерматозах —0,5% раствор или 1% мазь (ланолиново-вазелиновая основа); капли в нос (в смеси с фенилсалицилатом на вазелиновом масле); при мигренях — ментоловые карандаши. Внутрь как успокаивающее средство в сочетании с препаратом красавки, валерианы и др.

Противопоказано смазывание носоглотки детям раннего возраста, так как возможно угнетение и остановка дыхания.

Форма выпуска. Порошок, капли (ментол 0,1, фенилсалицилат 0,3, масло вазелиновое 9,6) во флаконах по 10 мл, ментоловые (мигреневые) карандаши (Stili Mentholi) в упаковке по 5 г.

Условия хранения. В хорошо укупоренной таре в прохладном месте.

Срок годности. Порошок 5 лет, масло ментоловое 1—2% 4 года, спиртовой раствор 2 года.

МЕПРОБАМАТ (Meprobamat). Димекарбаминовый эфир 2-метил-2-пропил-пропандиола-1,3. Синонимы: Andaxin, Sedanyl.

Фармакологическое действие. Транквилизатор, оказывает успокаивающее действие на центральную нервную систему, снимает эмоциональную напряженность, тревогу.

Показания к применению. Нервно-психические заболевания, осо-

Отредактировал: ledi24

бенно сопровождающиеся чувством страха, тревоги, напряженности, невротические состояния, декомпенсация психопатий.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,2—0,4 г 2—3 раза в день, при необходимости дозу увеличивают до 2—3 г/сут. Высшая разовая доза для взрослых 0,8 г, суточная 3 г.

Побочное действие. В отдельных случаях кожные высыпания, диспептические явления, сонливость. Возможно привыкание.

Противопоказания. Работа, требующая быстрой психической и двигательной реакции, эпилепсия (grand mal).

Форма выпуска. Таблетки по 0,2 г, в упаковке 20 штук.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Германии.

МЕРКАЗОЛИЛ (Mercazolilum). 1-Метил-2-меркаптоимидазол. Синонимы: Methimazole, Thymidazol.

Фармакологическое действие. Антитиреоидное (тиреостатическое) вещество.

Показания к применению. Диффузный токсический зоб.

Способ применения и дозы. Внутрь после еды 0,005—0,01 г 3—4 раза в день. По достижении ремиссии (через 3—6 нед) дозу уменьшают каждые 5—10 дней на 0,005—0,01 г и постепенно подбирают минимальные поддерживающие дозы (0,005 г 1 раз в день, через день или 1 раз в 3 дня). Высшая разовая доза взрослых внутрь 0,01 г, суточная 0,04 г.

Побочное действие. Возможны лейкопения, тошнота, рвота, нарушение функции печени, зобогенный эффект, медикаментозный гипотиреоз, кожная сыпь, боль в суставах.

Противопоказания. Беременность, период лактации, выраженная лейкопения и гранулоцитопения, узловая форма зоба. Не следует сочетать мерказолил с препаратами, вызывающими лейкопению (амидопирин, сульфаниламиды и др.).

Форма выпуска. Таблетки по 0,005 г, в упаковке 20 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 5 лет.

МЕРКАПТОПУРИН (Mercaptopurinum). 6-Меркаптопурин моногидрат. Синонимы: Leukerin, Mercaleukin, Purinethol.

Фармакологическое действие. Замедляет течение лейкозов, уменьшает количество незрелых форм (гемоцитобласты и лимфобласты). Токсическое действие препарата на организм проявляется в угнетении кроветворения (лейкопения, тромбоцитопения, ретикулоцитопения) и нарушениях функции желудочно-кишечного тракта.

Показания к применению. В комплексе с другими лекарственными средствами при остром лейкозе, обострении хронического миелолейкоза, протекающего по типу острого лейкоза.

Способ применения и дозы. Внутрь ежедневно по 0,002—0,0025 г/кг в 1 или 3 приема. При хорошей переносимости дозу повышают до 0,005 г/кг. Лечение проводят при тщательном клиническом и гематологическом контроле.

Побочное действие. При повышенной чувствительности к препарату наблюдаются лейкопения, тромбоцитопения, тенденция к геморрагиям и диспептические явления.

Противопоказания. Заболевания, сопровождающиеся нарушением функции печени и почек.

Форма выпуска. Таблетки по 0,05 г, в упаковке 50 штук.

Отредактировал: ledi24

Условия хранения. Список А. В сухом прохладном месте.
Срок годности 5 лет.

МЕТАЗИД (Methazidum). 1,1′-Метилен-бис-(изоникотиноилгидразон).

Фармакологическое действие. Высокоактивен в отношении микобактерий туберкулеза.

Показания к применению. Различные формы и локализации туберкулеза.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,5 г 2 раза в день. Детям из расчета 0,02—0,03 г/(кг·сут) (но не более 1 г/сут) в 2—3 приема. Высшая разовая доза для взрослых внутрь 1 г, суточная 2 г.

Побочное действие. В отдельных случаях возможны те же осложнения, что и при применении изониазида.

Противопоказания. Органические заболевания нервной системы, стенокардия, декомпенсированный порок сердца, нарушение функции почек нетуберкулезного характера.

Форма выпуска. Таблетки в упаковке по 100 штук по 0,1 г, 0,3 г и 0,5 г, порошок.

Условия хранения. Список Б. В сухом месте.
Срок годности 8 лет.

МЕТАНДРОСТЕНОЛОН (Methandrostenolonum). 17α-Метиландростандиен-1,4-ол-17β-он-3. Синонимы: Dianabol, Nerobol.

Фармакологическое действие. Обладает значительной анаболической активностью при относительно мало выраженном андрогенном действии.

Показания к применению. Нарушение белкового обмена при астении, кахексии различного происхождения, после тяжелых травм, операций, ожогов; инфекционные и другие заболевания, сопровождающиеся потерей белка (инфекция, ожоги, лучевая терапия, длительное применение кортикостероидов и др.); при остеопорозе, в педиатрической практике при задержке роста, анорексии, упадке питания и т. д.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,005—0,01 г в день перед едой, детям до 2 лет из расчета 0,05—0,1 мг/кг, от 2 до 5 лет 1—2 мг/сут, от 6 до 14 лет 3—5 мг/сут (в 1—2 приема). Курс лечения обычно 4—8 нед. Высшая разовая доза для взрослых 0,01 г, суточная 0,05 г.

Побочное действие. Диспептические явления, увеличение печени, преходящая желтуха, отеки, у женщин маскулинизация.

Противопоказания. Рак предстательной железы, острая печеночная недостаточность, беременность и лактация.

Форма выпуска. Таблетки по 0,005 г, в упаковке 100 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.
Срок годности 4 года.

МЕТАЦИКЛИНА ГИДРОХЛОРИД (Methacyclinum hydrochloridum). Синоним: Rondomycin.

Фармакологическое действие. Антибиотик тетрациклинового ряда, обладающий широким спектром антимикробного действия. Активен в отношении большинства грамположительных (стафилококки, пневмококки, стрептококки) и грамотрицательных микроорганизмов (эшерихии, сальмонеллы, шигеллы и др.), а также возбудителей орнитоза, пситтакоза, трахомы и некоторых простейших. Препарат не действует на большинство штаммов протея и синегнойной палочки, на грибы, мелкие и средние вирусы. К действию метациклина гидрохлорида устойчивы тетрациклинрезистентные штаммы микроорганизмов. В сравнении с другими антибиотиками тетрациклинового ряда препарат лучше всасывается при введении внутрь и дольше сохраняется

Отредактировал: ledi24

в крови в терапевтических концентрациях. Хорошо проникает в органы и ткани, обнаруживается в значительных концентрациях в печени, почках, легких, селезенке, а также в плевральной и асцитической жидкостях, синовиальном экссудате, проникает через плаценту и в терапевтических концентрациях обнаруживается в крови плода.

Показания к применению. Сепсис, подострый септический эндокардит, ангины, отиты, инфекции желче- и мочевыводящих путей и желудочно-кишечного тракта, гнойные инфекции кожи и мягких тканей, инфицированные ожоги и раны, остеомиелит; гинекологические инфекционные заболевания, плевриты, острые и хронические бронхиты, острые пневмонии и обострение хронических пневмоний, осложненных бронхоэктазами.

Способ применения и дозы. Внутрь (во время или после еды) взрослым и детям старше 5 лет. Разовая доза для взрослых составляет 0,3 г, суточная 0,6 г. Детям в возрасте от 5 до 12 лет препарат назначают из расчета 7,5—10 мг/кг в 2—4 приема. При тяжелых инфекциях доза может быть увеличена до 15 мг/(кг·сут). Детям старше 12 лет метациклина гидрохлорид назначают в тех же дозах, что и взрослым. Длительность курса лечения 5—7 дней.

Побочное действие. Аллергические реакции, желудочно-кишечные расстройства, раздражение слизистых оболочек полости рта. Возможны дисбактериоз и кандидозные осложнения, которые предупреждают параллельным назначением нистатина и леворина. Длительное лечение у детей может сопровождаться отложением препарата в зубной эмали и дентине, а также пигментацией зубов.

Противопоказания. При нарушении функции печени, почек и лейкопении препарат назначают с осторожностью. Препарат не назначают детям до 5 лет и беременным.

Форма выпуска. Капсулы по 0,15 г, в упаковке 16 штук и по 0,3 г, в упаковке 8 штук.

Условия хранения. В сухом, защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

МЕТАЦИН (Methacinum). β-Диметиламиноэтилового эфира бензиловой кислоты йодметилат.

Фармакологическое действие. Активное м-холинолитическое средство, избирательно действующий периферический холинолитик.

Показания к применению. Заболевания, сопровождающиеся спазмами гладкой мускулатуры (язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, хронический гастрит, почечная и печеночная колика и др.), в анестезиологии для уменьшения секреции слюнных и бронхиальных желез и др.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,002—0,004 г 2—3 раза в день, парентерально по 0,5—2 мл 0,1% раствора.

Высшая разовая доза для взрослых при приеме внутрь 0,005 г, суточная 0,015 г, парентерально разовая 0,002 г, суточная 0,006 г.

Побочное действие. При передозировке сухость во рту, запор, затруднение мочеиспускания.

Противопоказания. Глаукома.

Форма выпуска. Таблетки по 0,002 г, в упаковке 10 штук, ампулы по 1 мл 0,1% раствора, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список А. В защищенном от света месте.

Срок годности. Таблетки 4 года, ампулы 3 года.

МЕТЕРАЗИН (Metherazinum). 2-Хлор-10-[3-(1-метилпиперазинил-4)-пропил]-фенотиазина дималеат. Синонимы: Chlorperazin, Stemetil.

Отредактировал: ledi24

Фармакологическое действие. Активный нейтролептический препарат, аналогичный аминазину, но оказывает более выраженное антипсихотическое действие.

Показания к применению. Различные формы шизофрении, психические заболевания с бредовыми и галлюцинаторными расстройствами, некоторые паранойяльные состояния.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,025 г/сут с последующим увеличением дозы на 0,025 г до получения максимального эффекта. В некоторых случаях доза может быть увеличена до 0,3—0,4 г/сут.

Побочное действие. Сонливость, вялость, экстрапирамидные расстройства, иногда лейкопения.

Противопоказания. Заболевания печени и почек с нарушением их функций.

Форма выпуска. Таблетки, покрытые оболочкой, по 0,025 г, в упаковке 50 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 4 года.

МЕТИЛАНДРОСТЕНДИОЛ (Methylandrostendiolum). 17-α-Метиландростен-5-диол-3β,17β. Синонимы: Methandiol, Protandren.

Фармакологическое действие. Близок к метилтестостерону, но отличается меньшей андрогенной активностью при относительно высокой анаболической активности.

Показания к применению. Для усиления белкового обмена после тяжелых травм, операций, инфекционных и других заболеваний, при остеопорозе, отставании в росте, истощении и т. д.

Способ применения и дозы. Сублингвально по 0,025—0,05 г/сут, детям из расчета 1—1,5 мг/кг (не более 0,05 г/сут). Курс лечения 4 нед, перерывы между курсами 2—4 нед. Высшая разовая доза внутрь и под язык для взрослых 0,025 г, суточная 0,1 г. При раке молочной железы доза может быть увеличена до 0,2—0,3 г/сут (с постепенным уменьшением до 0,1—0,075 г).

Побочное действие. Нарушение функции печени, желтуха, аллергические реакции, у женщин вирилизация.

Противопоказания. Рак предстательной железы, острые заболевания печени, беременность, период лактации, декомпенсация углеводного обмена, ацидоз при сахарном диабете.

Форма выпуска. Таблетки для сублингвального применения по 0,01 г и 0,025 г, в упаковке 30 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 5 лет

МЕТИЛЕНОВЫЙ СИНИЙ (Methylenum coeruleum). N, N, N′, N′-Тетраметилтионина хлорид. Синонимы: Methylenblau, Methylthionii chloridum.

Фармакологическое действие. Оказывает антисептическое действие, обладает окислительно-восстановительными свойствами.

Применение. В качестве антисептического средства при ожогах, пиодермии, фолликулитах и т. д., воспалительных заболеваниях мочевыводящих путей, в качестве антидота при отравлениях цианидами, окисью углерода, сероводородом, нитритами, анилином и его производными.

Способ применения и дозы. Наружно в виде 1—3% спиртового раствора; при циститах, уретритах (промывания 0,02% водным раствором), а также внутрь по 0,1 г 3—4 раза в день; при отравлениях окисью углерода, синильной кислотой, сероводородом назначают внутривенно 50—100 мл 1% водного раствора или 1% раствора в 25%

Отредактировал: ledi24

растворе глюкозы; при отравлениях нитритами, анилином — внутривенно 0,1—0,15 мл 1% раствора на 1 кг массы тела.

Форма выпуска. Порошок.

Срок годности порошка не ограничен.

МЕТИЛМЕТИОНИНСУЛЬФОНИЯ ХЛОРИД (Methylmethioninsulfonii chloridum) Витамин U (Vitaminum U)

Фармакологическое действие. Активизированная форма метионина. Оказывает стимулирующее действие при заживлении поврежденной слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта.

Показания к применению. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, хронический гастрит с нормальной, пониженной и повышенной секреторной функцией желудка, гастралгия.

Способ применения и дозы. Внутрь после еды по 0,05—0,1 г; суточная доза 0,25 г. Курс лечения 30—40 дней.

Побочное действие. При индивидуальной непереносимости возможны тошнота, рвота, усиление боли, которые исчезают при уменьшении дозы или отмене препарата.

Форма выпуска. Таблетки по 0,05 г, в упаковке 100 штук.

Условия хранения. В сухом, защищенном от света месте в плотно закрытой упаковке.

Срок годности $2^1/_2$ года.

МЕТИЛСАЛИЦИЛАТ (Methylii salicylas). Метиловый эфир салициловой кислоты.

Фармакологическое действие. Обезболивающее и противовоспалительное средство.

Применение. При артритах, ревматизме, радикулите и др. для растирания per se и в смеси с хлороформом.

Форма выпуска. Во флаконах и в смеси с хлороформом 1:1.

Условия хранения. В защищенном от света месте.

Срок годности не ограничен.

МЕТИЛТЕСТОСТЕРОН (Methyltestosteronum). 17α-Метиландростен-4-ол-β17-он-3. Синонимы: Metandren, Stenendiol.

Фармакологическое действие. Сильный андроген, но по активности несколько уступает тестостерона пропионату.

Показания к применению. Половое недоразвитие, функциональные нарушения в половой сфере; климакс у мужчин и связанные с ним сосудистые и нервные расстройства; дисфункциональные маточные кровотечения в преклимактерическом и климактерическом периодах у женщин; рак молочной железы и яичников.

Способ применения и дозы. Сублингвально по 0,005—0,1 г/сут. Высшая разовая доза 0,05 г, суточная 0,1 г.

Побочное действие. Большие дозы у мужчин могут вызвать повышенное половое возбуждение, задержку воды и солей в организме, у женщин явления маскулинизации, головокружение, тошноту.

Противопоказания. Рак предстательной железы.

Форма выпуска. Таблетки по 0,005 г, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 8 лет.

МЕТИЛУРАЦИЛ (Methyluracilum). 2,4-Диокси-6-метил-1,2,2,4-тетрагидропиримидин, или 4-метилурацил. Синоним: Methazil.

Фармакологическое действие. Ускоряет процессы клеточного размножения и рост в различных тканях и органах при резорбтивном и местном действии. Резорбтивное действие проявляется преимущественно в стимуляции лейкопоэза (в основном за счет гранулоцитов) при угнетении кроветворения.

Отредактировал: ledi24

Показания к применению. Алиментарно-токсическая алейкия, агранулоцитоз и лейкопения различной этиологии; лучевые поражения кожи (эпителииты), вяло заживающие ожоги, раны, переломы костей, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.

Способ применения и дозы. Внутрь во время или после еды 1 г 3—4 раза в день; в отдельных случаях суточную дозу увеличивают до 5—6 г. Детям дозы устанавливают в соответствии с возрастом. Наружно препарат применяют в виде 5% или 10% мази с антибиотиками (фурацилин, окситетрациклин, синтомицин и др.) и в виде суппозиториев.

Противопоказания. Лейкемические формы лейкоза (особенно миелоидные).

Форма выпуска. Порошок, таблетки по 0,5 г, в упаковке 50 штук; суппозитории ректальные с метилурацилом по 0,5 г, в упаковке 10 штук, мазь 10%, в упаковке по 25 г.

Условия хранения. Список Б. В сухом месте.

Срок годности. Порошок 5 лет, таблетки 4 года, мазь 3 года.

МЕТИЛЭРГОМЕТРИН (Methylergometrinum). В медицинской практике применяют метилэргометрина тартрат.

Фармакологическое действие. Усиливает сокращение матки.

Показания к применению. Гипотония и атония матки после родов, кровотечения в послеродовом периоде, при кесаревом сечении и аборте.

Способ применения и дозы. Внутримышечно и внутривенно (в 20 мл 40% раствора глюкозы) по 0,25—1 мл 0,02% раствора.

Противопоказания. Беременность и роды.

Форма выпуска. Ампулы по 1 мл 0,02% раствора, в упаковке 5 штук.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности 3 года.

Поставляется из Чехо-Словакии.

МЕТИНДИОН (Methindionum). 2-Метиламино-2-этилдиона-1,3 гидрохлорид.

Фармакологическое действие. Противосудорожное средство, не угнетающее центральную нервную систему; уменьшает психомоторное возбуждение, улучшает настроение.

Показания к применению. Эпилепсия (grand mal), особенно при височной форме и эпилепсии травматического генеза.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,25 г через $1^1/_2$—2 ч 6—7 раз в сутки. При припадках в ночное время и утром дополнительно назначают фенобарбитал (0,05—0,1 г) или бензонал (0,1—0,2 г.)

Побочное действие. Головокружение, тошнота, тремор пальцев.

Форма выпуска. Таблетки по 0,25 г, в упаковке 50 штук.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности 4 года.

МЕТИОНИН (Methioninum). d,l,α-Амино-γ-метилтиомасляная кислота. Синонимы: Acimetion, Thiomedon.

Фармакологическое действие. Незаменимая аминокислота, необходимая для поддержания роста и азотистого равновесия организма.

Показания к применению. Для лечения и профилактики токсических поражений печени (цирроз, хронические отравления и др.); в педиатрии при дистрофии, вызванной белковой недостаточностью.

Способ применения и дозы. Внутрь за $^1/_2$—1 ч до еды по 0,5—1,5 г 3—4 раза в день; детям в зависимости от возраста от 0,1 до 0,5 г на прием. Курс лечения 10—30 дней

Отредактировал: ledi24

Побочное действие. Возможна рвота.

Форма выпуска. Порошок, таблетки по 0,25 г, покрытые оболочкой, в упаковке 50 штук.

Условия хранения. В защищенном от света месте.

Срок годности. Порошок 5 лет, таблетки 4 года.

МЕТИПРЕД (Methypred). Синонимы: Medeson, Urbason.

Фармакологическое действие. Активный глюкокортикостероид, практически не влияющий на обмен веществ, не оказывает психотропного действия.

Показания к применению. Аллергические заболевания (бронхиальная астма, крапивница и др.), экзема, дерматиты, агранулоцитоз, тромбопения, гемолитическая анемия и др.

Способ применения и дозы. Внутрь при бронхиальной астме до 16—40 мг/сут, при хронических полиартритах 6—12 мг/сут, детям из расчета 0,8—1,5 мг/кг в день. В отдельных (тяжелых) случаях взрослым дозу увеличивают до 100 мг/сут; при необходимости вводят суспензию в полость суставов (10—40 мг) в брюшную и плевральную полости (до 100 мг) и подконъюнктивально (до 20 мг).

Побочное действие. При длительном применении больших доз развивается гиперкортицизм, гирсутизм. Необходима особая осторожность при сахарном диабете.

Противопоказания. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, туберкулезный менингит.

Форма выпуска. Таблетки по 4 мг, в упаковке 30 штук; или комплект, содержащий 1 ампулу препарата (80 мг) (250 мг) и 1 ампулу воды дистиллированной (1 мл).

Условия хранения. Список Б.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Финляндии.

МЕТИСАЗОН (Methisazonum). Тиосемикарбазон N-метилизатина. Синонимы: Kemoviran, Viruzona.

Фармакологическое действие. Подавляет репродукцию вирусов оспенной группы, обладает профилактической активностью в отношении вируса натуральной оспы и оказывает благоприятное влияние при лечении поствакциональных осложнений, а также эффективен при лечении рецидивирующего генитального герпеса.

Способ применения и дозы. Внутрь ежедневно через 1—$1^1/_2$ ч после еды 2 раза в день в течение 4—6 дней. Разовая доза для взрослых 0,6 г (1,2 г/сут). Детям до 14 лет из расчета 0,01 г/кг на прием 2 раза в сутки в течение 4—6 дней.

Побочное действие. В отдельных случаях тошнота, рвота, головокружение. В этих случаях уменьшают дозу.

Противопоказания. Выраженные поражения печени и почек, хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, злокачественные новообразования.

Форма выпуска. Таблетки по 0,25 г, в упаковке 25 штук.

Условия хранения. В защищенном от света месте.

Срок годности 4 года.

МЕТОТРЕКСАТ (Methotrexatum). 4-Амино-N^{10}-метилптероилглутаминовая кислота. Синонимы: Methopterine, Amethopterin.

Фармакологическое действие. Структурный аналог и антагонист фолиевой кислоты, оказывает противоопухолевое действие.

Показания к применению. В комплексной терапии острых и подострых лейкозов (в основном у детей), хорионэпителиомы матки, рака молочной железы.

Отредактировал: ledi24

Способ применения и дозы. Внутрь, внутримышечно или внутривенно. При лейкозе детям ежедневно 2,5—7,5 мг/сут в зависимости от возраста; при показаниях по 20 мг в день ежедневно курсами по 5—6 дней с перерывами 8—10 дней или по 10—15 мг ежедневно или через день, или по 30—40 мг в день 1 раз в 4 дня.

Побочное действие. Понос, стоматит, язвенные поражения полости рта и кишечника, угнетение кроветворения с кровоточивостью, анемией, вторичной инфекцией.

Противопоказания. Беременность, заболевания печени и почек с выраженным нарушением функции, угнетение кроветворения.

Форма выпуска. Таблетки, покрытые оболочкой, по 2,5 мг, в упаковке 50 штук, ампулы, содержащие 5 мг порошка и 2 мл 0,9% раствора натрия хлорида для инъекций, в упаковке 5 штук.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности 3 года.

МЕФЕНАМИНОВАЯ КИСЛОТА (Acidum mephenamicum). N-(2,3-диметилфенил)-антраниловая кислота. Синоним: Coslan.

Фармакологическое действие. Аналгезирующее, противовоспалительное и жаропонижающее средство.

Показания к применению. Ревматизм, ревматоидный артрит, артралгии, невралгии и мышечная боль.

Способ применения и дозы. Внутрь (после еды) взрослым по 0,5 г 3—4 раза в день. При необходимости и хорошей переносимости дозу доводят до 3 г/сут, а после достижения терапевтического эффекта снижают ее до 1 г/сут. Детям в возрасте от 5 до 10 лет назначают по 0,25 г 3—4 раза в день, старше 10 лет — по 0,3 г 3—4 раза в день.

Побочное действие. Возможны тошнота, понос, боль в животе, аллергические реакции.

Противопоказания. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта. Следует соблюдать осторожность при назначении препарата больным с заболеваниями кроветворных органов и почек.

Форма выпуска. Таблетки по 0,5 г, в упаковке 50 штук.

Условия хранения. Список Б. В сухом, защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

МЕФЕНАМИНА НАТРИЕВАЯ СОЛЬ (Mephenaminum natrium) N-(2,3-Диметилфенил)-антранилат натрия.

Фармакологическое действие. Нестероидное противовоспалительное средство, оказывает местное противовоспалительное и анестезирующее действие, стимулирует эпителизацию поврежденной слизистой оболочки. Обладает антитрихомонадной активностью.

Показания к применению. Дистрофически-воспалительные формы пародонтоза и язвенные поражения слизистой оболочки полости рта.

Способ применения и дозы. Применяют в виде 0,1—0,2% водного раствора или 1% пасты, которые готовят непосредственно перед употреблением. В качестве основы для приготовления пасты используют белую глину, замешанную на воде или изотоническом растворе натрия хлорида. Пасту вводят через 1—2 дня в зубодесневые карманы. Курс лечения 6—8 сеансов. При язвенных поражениях слизистой оболочки полости рта применяют аппликации водного раствора 1—2 раза в сутки.

Побочное действие. Большие концентрации (растворы выше

Отредактировал: ledi24

0,3%, пасты выше 1%) могут вызывать раздражение слизистой оболочки полости рта.

Форма выпуска. Порошок по 3 кг в полиэтиленовых пакетах.

Условия хранения. Список Б. В сухом, защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

МИДАНТАН (Midantanum). Аминоадамантана гидрохлорид. Синонимы: Amantadine, Symmetrel.

Фармакологическое действие. Обладает н-холинолитической активностью, а также оказывает влияние на катехоламиновый обмен.

Показания к применению. Паркинсонизм различной этиологии, особенно с ригидно-брадикинетическим синдромом.

Способ применения и дозы. Внутрь (per se и в комплексе с циклодолом и др.) по 0,1 г 2—4 раза в день в течение 2—4 мес.

Побочное действие. Возможны раздражительность, бессонница, головокружение.

Противопоказания. Заболевания печени и почек. Необходима осторожность при повышенной возбудимости, в частности при тиреотоксикозе.

Форма выпуска. Таблетки, покрытые оболочкой, по 0,1 г, в упаковке 100 штук.

Условия хранения. Список Б. В сухом месте.

Срок годности 5 лет

МИДОКАЛМ (Mydocalm). 1-Пиперидино-2-метил-3-пара-толилпропанона-3-гидрохлорид. Синоним: Mydeton.

Фармакологическое действие. Подавляет полисинаптические спинномозговые рефлексы и понижает повышенный тонус скелетных мышц.

Показания к применению. Заболевания, сопровождающиеся повышенным мышечным тонусом, в том числе параличи, парезы, параплегии, травматические контрактуры, экстрапирамидные расстройства.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,05 г 3 раза в день с постепенным повышением дозы до 0,45 г/сут, внутримышечно по 1 мл 10% раствора 2 раза в день; внутривенно (медленно) 1 мл 1 раз в день.

Побочное действие. Иногда чувство легкого опьянения, головная боль, повышенная раздражительность, нарушение сна.

Форма выпуска. Таблетки по 0,05 г, в упаковке 30 штук, ампулы по 1 мл 10% раствора, в упаковке 5 штук.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности. Таблетки и ампулы 3 года.

Поступает из Венгрии.

МИЕЛОБРОМОЛ (Myelobromol). 1,6-Дибром-1,6-дидезокси-D-маннит. Синоним: Dibrommanit.

Фармакологическое действие. Противоопухолевое средство.

Показания к применению. Хронический миелолейкоз (особенно при устойчивости к милосану), эритремия.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,25 г/сут в течение 3—6 нед с последующим уменьшением дозы до 0,125 г (ежедневно или через день). Затем препарат дают в поддерживающих дозах 8—12 нед по 0,125—0,25 г 1—3 раза в 7—10 дней. На курс лечения 6—7 г препарата, для поддерживающей терапии 3 г.

Побочное действие. Возможны расстройства желудочно-кишечного тракта, тромбоцитопения.

Противопоказания. Геморрагический диатез.

Форма выпуска. Таблетки по 0,25 г, в упаковке 100 штук.

Условия хранения. Список А. В сухом прохладном месте.

Отредактировал: ledi24

Срок годности 5 лет
Поставляется из Венгрии.

МИЕЛОСАН (Myelosanum). Бис-метилсульфоновый эфир бутандиола-1,4. Синонимы: Busulfan, Myleran.

Фармакологическое действие. Цитостатическое средство, избирательно угнетающее гранулоцитопоэз и оказывающее сильное антилейкемическое действие.

Показания к применению. Обострение хронического мислолейкоза (лейкемическая форма).

Способ применения и дозы. Внутрь. В зависимости от формы заболевания (степень спленомегалии, число лейкоцитов) по 2—10 мг/сут в 1—3 приема. Курс лечения 3—5 нед. При рецидиве курс лечения повторяют.

Побочное действие. При передозировке возможны гранулоцитопения и тромбоцитопения (последняя иногда сопровождается геморрагиями). У больных пожилого возраста иногда отмечаются головокружение и головная боль, боль в области сердца. При длительном применении — аменорея у женщин и снижение потенции у мужчин.

Противопоказания. Острый лейкоз, обострение хронического миелолейкоза, протекающее по типу острого лейкоза, алейкемические и сублейкемические формы хронического лейкоза.

Форма выпуска. В таблетках по 0,002 г (2 мг), в упаковке 50 штук
Условия хранения. Список А.
Срок годности 5 лет.

«МИКОЗОЛОН» МАЗЬ (Unguentum «Mycosoloni»). 15 г мази содержит 37,5 мг (0,25%) деперзолона и 300 мг (2%) миконазола.

Фармакологическое действие. «Микозолон» объединяет в себе противовоспалительное и антиаллергическое действие кортикостероида деперзолона и противогрибковые свойства миконазола, который действует на различные виды дерматофитов, на дрожжевые и лучистые грибы и обладает антибактериальным свойством в отношении грамположительной микрофлоры.

Показания к применению. Инфекционные заболевания кожи и ногтей, вызванные дерматофитами или грибами; микозы, сопровождающиеся суперинфекцией грамположительными бактериями.

Способ применения и дозы. Мазь наносят на пораженную поверхность кожи 1—2 раза в день или применяют в виде окклюзионной повязки до полного излечения (обычно в течение 2—5 нед). При поражении ногтей необходимо коротко срезать ногти и тщательно втирать мазь в ногтевое ложе 1 раз в день и накладывать окклюзионную повязку. Лечение продолжают и после отслойки ногтя до полной регенерации ногтевой пластинки (2—3 мес от начала лечения).

Противопоказания. Туберкулез кожи, герпес, ветряная оспа
Форма выпуска. Тубы по 15 г.
Условия хранения. При температуре 15—20°С.
Срок годности 2 года.
Поставляется из Венгрии.

МИКОСЕПТИН (Mycoseptin). Состав: кислоты ундециленовой 5 г, цинковой соли ундециленовой кислоты 20 г, мазевой основы до 100 г.

Фармакологическое действие. Обладает фунгистатической и фунгицидной активностью, оказывает антисептическое и легкое подсушивающее действие.

Отредактировал: ledi24

Показания к применению. Грибковые заболевания кожи (различные формы эпидермофитии, дрожжевые дерматозы).

Способ применения и дозы. Наружно. Смазывают пораженные участки кожи 1—2 раза в день. Курс лечения 15—20 дней, затем назначают препарат 1—2 раза в неделю в течение 4—6 нед.

Форма выпуска. Мазь в тубах по 30 г.

Срок годности 2 года.

Поставляется из Чехо-Словакии.

«МИКРОЙОД» («Microiodum»). Состав: йода 0,0005 г, калия йодида 0,005 г, корня валерианы в порошке 0,05 г, наполнителя до 0,25 г.

Применение. При тиреотоксикозах внутрь по 1 драже после еды 2—3 раза в день. Курс лечения (20 дней) повторяют с 10—20-дневными интервалами.

Форма выпуска. Таблетки, покрытые оболочкой, в упаковке 40 штук.

Условия хранения. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

МИКРОФОЛЛИН-ФОРТЕ (Microfollin-forte). 17α-Этинилэстратриен-1,3,5 (10)-диол-3,17β. Синонимы: Aethinyloestradiol, Follikoral.

Фармакологическое действие. Эстрогенный гормон.

Показания к применению. Заболевания, вызванные недостаточной функцией яичников (дисменорея, гипер- и гипоменорея, бесплодие, климактерические расстройства и др.).

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,05—0,1 мг 1—2 раза в день.

Побочное действие. При назначении больших доз тошнота, рвота, головокружение.

Противопоказания. Опухоли у женщин в возрасте до 60 лет, мастопатия, эндометрит, маточные кровотечения, гиперэстрогенная фаза климакса.

Форма выпуска. Таблетки по 0,05 мг, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Венгрии.

МИКРОЦИД (Microcidum). Антибактериальный препарат, получаемый из культуральной жидкости одного из видов плесневого гриба Penicillium.

Фармакологическое действие. Эффективен в отношении грамположительных и грамотрицательных микробов.

Показания к применению. Инфицированные и длительно не заживающие раны, язвы, ожоги, пролежни, экземы; абсцессы, флегмоны и другие гнойно-воспалительные заболевания.

Способ применения и дозы. Наружно в виде орошений, промываний, для смачивания повязок и тампонов, а также в виде эмульсии с рыбьим жиром.

Форма выпуска. Флаконы по 100 мл.

Условия хранения. При температуре не выше 20°С.

Срок годности 2 года.

МИОФЕДРИН (Myofedrin). Синоним: Oxyphedrin hydrochlorid.

Фармакологическое действие. Повышает снабжение миокарда кровью, увеличивает силу сокращения сердечной мышцы; без повышения потребности в кислороде активизирует обмен веществ в сердечной мышце.

Показания к применению. Коронарная недостаточность, стенокардия, инфаркт миокарда, функциональная слабость сердца.

Отредактировал: ledi24

Способ применения и дозы. По $^1/_2$—2 таблетке после еды (начная терапию с $^1/_2$ таблетки) 3 раза в день.

Противопоказания. Недостаточность аорты с гемодинамическими изменениями, подклапанный стеноз аорты.

Форма выпуска. Таблетки по 0,16 мг, в упаковке 50 штук.

Условия хранения. В защищенном от света месте.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Германии.

МИСКЛЕРОН (Miscleron). Этиловый эфир α(пара-хлорфенокси)-изомасляной кислоты. Синонимы: Atromidin, Clofibrat.

Фармакологическое действие. Гипохолестеринемическое средство.

Показания к применению. Атеросклероз и другие заболевания, сопровождающиеся гиперхолестеринемией.

Способ применения и дозы. Внутрь до еды по 2—3 капсулы 3 раза в день.

Побочное действие. Диспептические явления, кожные высыпания и зуд.

Противопоказания. Нарушения функции печени и почек, беременность.

Форма выпуска. Капсулы по 0,25 г, в упаковке 50 штук.

Условия хранения. В прохладном месте.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Венгрии.

МИТРОШИНА ЖИДКОСТЬ (Liquor Mitroschini). Продукт, получаемый термической обработкой зерна.

Применение. Наружно как антисептическое средство при кожных заболеваниях.

Форма выпуска. Во флаконах по 30 мл.

Срок годности 3 года.

МОДИТЕН-ДЕПО (Moditen-Depo). 2-Трифторметил-10-[3-[1-(β-каприноил-оксиэтил)-пиперазинил-4]-пропил]-фенотиазина. Синонимы: Fluphenazine-depo, Lyogen-depo.

Фармакологическое действие. Нейролептик пролонгированного действия, в организме депонируется и медленно всасывается в кровь, что обеспечивает стабильность эффекта в течение 2—4 нед.

Показания к применению. Различные формы шизофрении, особенно с длительным неблагоприятным течением («ядерная» шизофрения, параноидная форма), тенденцией к отказу от терапии. В небольших дозах — при вялотекущей шизофрении, особенно с явлениями навязчивости, дисморфофобии, психопатоподобными расстройствами.

Способ применения и дозы. Внутримышечно 12,5—75 мг 1 раз в 2—4 нед.

Побочное действие. Явление паркинсонизма, тремор, апатия, углубление депрессии.

Форма выпуска. В ампулах по 1 мл масляного раствора, содержащих 25 мг препарата, в упаковке 5 штук.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности 2 года.

Поставляется из Югославии.

МОЖЖЕВЕЛЬНИКА ПЛОДЫ (Fructus Juniperi). (Можжевеловые ягоды). Содержат эфирное масло (0,5—2%), смолу, пектиновые вещества, органические кислоты, сахар.

Применение. В качестве диуретического средства при отеках сер-

Отредактировал: ledi24

дечного происхождения в виде настоя (10,0:200,0) по 1 столовой ложке 3—4 раза в день.

Противопоказания. Нефриты, нефрозонефриты.

Форма выпуска. В упаковке по 50 г.

Условия хранения. В сухом прохладном месте.

Срок годности 3 года.

МОЗОЛЬНАЯ ЖИДКОСТЬ (Liquor ad clavos). Состав: кислоты салициловой 1 г, спирта этилового 95% 1 г, коллодия 8 г, бриллиантового зеленого 0,01 г.

Применение. Как кератолитическое и антисептическое средство при мозолях.

Форма выпуска. В упаковке по 10 мл.

Условия хранения. В защищенном от света месте.

Срок годности 1 год.

МОНОМИЦИН (Monomycinum). Выделен из культуральной жидкости Streptomyces circulatus var. monomycini. Синоним: Catenulin.

Фармакологическое действие. Обладает широким спектром антимикробного действия: активен в отношении большинства грамположительных, грамотрицательных микроорганизмов и кислотоустойчивых бактерий. При приеме внутрь плохо всасывается. При парентеральном введении быстро всасывается в кровь, хорошо проникает в органы и ткани, не кумулирует; выводится из организма почками.

Показания к применению. Гнойно-воспалительные процессы различной локализации; перитониты, абсцессы легкого и эмпиема плевры, заболевания желчного пузыря и желчных ходов, остеомиелиты, инфекции мочевыводящих путей, заболевания желудочно-кишечного тракта (дизентерия, эшерихиозы); в предоперационном периоде при подготовке больных к операции на желудочно-кишечном тракте и др.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,25 г (250 000 ЕД) 4—6 раз в сутки; детям по 10—25 мг/(кг·сут) в 2—3 приема. Внутримышечно по 0,25 г (250 000 ЕД) 3 раза в сутки. Детям назначают из расчета 4—5 мг/(кг·сут) в 3 введения.

Побочное действие. Неврит слухового нерва, нарушение функции почек, диспептические явления (при приеме внутрь).

Противопоказания. Тяжелые дегенеративные изменения печени, почек, неврит слухового нерва различной этиологии.

Форма выпуска. Во флаконах в комплекте с растворителем по 0,25 г активного вещества, таблетки по 0,25 г, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б. При температуре не выше 20°С.

Срок годности. Для флаконов в комплекте с растворителем и таблеток 2 года.

МОРФИНА ГИДРОХЛОРИД (Morphini hydrochloridum).

Фармакологическое действие. Активный анальгетик, подавляющий все виды болевой чувствительности без выключения сознания и изменения других видов чувствительности.

Показания к применению. Боль различной этиологии (травматическая, при новообразованиях, ишемической болезни сердца и др.).

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,01—0,02 г, подкожно по 1 мл 1% раствора; детям (старше 2 лет) дозы устанавливают соответственно возрасту. Высшая разовая доза для взрослых 0,02 г, суточная 0,05 г.

Побочное действие. Тошнота, рвота, запор, угнетение дыхания;

Отредактировал: ledi24

для уменьшения побочного действия одновременно назначают холинолитические средства (атропин и др.).

Противопоказания. Дыхательная недостаточность, старческий возраст, общее истощение; при длительном применении возможно развитие наркомании.

Форма выпуска. Ампулы по 1 мл 1% раствора, в упаковке 10 штук, 1% раствор по 1 мл в шприц-тюбике, в упаковке 100 штук.

Условия хранения. Список А. В защищенном от света месте.

Срок годности. Ампулы 3 года, шприц-тюбики 2 года.

МОЧЕВИНА (Urea pro injectionibus).

Фармакологическое действие. Оказывает мочегонное действие, способствует предупреждению и уменьшению отека мозга, понижает внутриглазное давление.

Показания к применению. Повышенное внутриглазное давление; для предупреждения и уменьшения отека мозга; при глаукоме и других заболеваниях, сопровождающихся повышением внутриглазного давления.

Способ применения и дозы. Внутривенно капельно в виде 30% раствора при 10% растворе глюкозы из расчета 0,5—1,5 г/кг 1.—3 раза в сутки; внутрь 30—50% раствор на сахарном сиропе (0,75—1,5 г/кг)

Побочное действие. При приеме per se возможны диспептические явления; при внутривенном введении в отдельных случаях флебиты и тромбоз вен.

Противопоказания. Выраженное нарушение функции печени, почек и сердечно-сосудистой системы.

Форма выпуска. В комплекте с растворителем (10% раствор глюкозы) по 30 г, 45 г, 60 г и 90 г.

Условия хранения. В хорошо укупоренной таре в сухом месте.

Срок годности 3 года.

МУКАЛТИН (Mucalthinum). Смесь полисахаридов, получаемая из травы алтея лекарственного (Althaea officinalis L.).

Фармакологическое действие. Отхаркивающее средство.

Показания к применению. Заболевания дыхательных путей и легких (трахеиты, бронхиты, пневмонии и др.)

Способ применения и дозы. Внутрь до еды по 0,05—0,1 г на прием 2—3 раза в день.

Форма выпуска. Таблетки по 0,05 г, в упаковке 30 штук.

Условия хранения. В сухом прохладном месте.

Срок годности 3 года.

МУКАРТРИН (Mucartrin). В 1 мл содержится 0,125 г мукартрина.

Фармакологическое действие. Влияет на начальные артрозные изменения. Подавляет ферментные системы, расщепляющие мукополисахариды. Восстанавливает обменные трофические процессы в суставах и эластичность суставного хряща.

Показания к применению. Препарат применяют для лечения дегенеративно-дистрофических заболеваний при сравнительно сохранившемся суставном хряще и отсутствии воспалительной реакции, а также для лечения плечелопаточного периартрита.

Способ применения и дозы. Внутримышечно 125—250 мг (1—2 ампулы). Вводят глубоко в мышцу ежедневно в течение первых 3 дней, затем через день в течение последующих 10 дней. Лечение продолжают в той же дозировке по 2 раза в неделю в течение 3 нед, затем 1 раз в неделю до прохождения полного курса (25—30 инъекций).

Отредактировал: ledi24

Побочное действие. Не установлено.

Противопоказания. Нельзя применять препарат при сопутствующем воспалительном процессе в суставах и полной деструкции покровного хряща сустава.

Форма выпуска. Ампулы по 1 мл 12,5% раствора, в упаковке 10 ампул.

Условия хранения. Обычные.

Срок годности 3 года.

Поставляется из Болгарии.

МУРАВЬИНЫЙ СПИРТ (Spiritus formicicus, Spiritus Acidi formici). Состав: кислоты муравьиной 14 г, спирта этилового 70% 986 мл.

Применение. Как раздражающее кожу средство при миозитах, невралгиях и других заболеваниях для растираний.

Форма выпуска. Во флаконах по 50 мл.

Условия хранения. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

МЫЛО ЗЕЛЕНОЕ (Sapo viridis). Мыло калийное (Sapo kalinus viridis).

Применение. Для очистки кожи и приготовления мыльного спирта и мыльно-карболового раствора, употребляемых как дезинфицирующие средства.

Форма выпуска. В упаковке по 50 г.

Условия хранения. Обычные.

Срок годности 2 года.

МЫШЬЯКОВИСТЫЙ АНГИДРИД (Acidum arsenicosum anhydricum). Синонимы: белый мышьяк, кислота мышьяковистая.

Применение. Наружно как некротизирующее средство при кожных болезнях, в стоматологии для некротизации пульпы. Внутрь при малокровии, общем истощении, неврастении по 0,001 г на прием. Высшая разовая доза для взрослых внутрь 0,005 г, суточная 0,015 г. Детям до 2 лет не назначают, старше 2 лет дают по 0,0001—0,001 г.

Форма выпуска. В мелкой расфасовке.

Условия хранения. Список А.

Срок годности не ограничен.

МЯТЫ ПЕРЕЧНОЙ ЛИСТЬЯ (Folium Menthae piperitae). Содержат эфирное масло 1—3%, в состав которого входит ментол (40—70%); эфиры ментола, кетон ментон, флавоноиды; урсоловую и олеаноловую кислоты.

Фармакологическое действие. Успокаивающее, спазмолитическое и желчегонное средство.

Показания к применению. Тошнота, рвота, спазм гладкой мускулатуры.

Способ применения и дозы. Внутрь: настой (5,0:200,0) по 1 столовой ложке 3—4 раза в день, настойка по 10—15 капель на прием; мятные таблетки по 1—2 сублингвально; масло мяты перечной как освежающее и антисептическое средство в виде полосканий, зубных порошков и паст, а также для исправления вкуса микстур.

Форма выпуска. Листья в упаковке по 100 г; настойка (Tinctura Menthae) во флаконах-капельницах по 25 мл; мятные таблетки (Tabulettae olei Menthae), в упаковке 10 штук; масло мяты перечной (Oleum Menthae piperitae).

Условия хранения. В сухом прохладном месте.

Отредактировал: ledi24

Срок годности. Настойка 3 года, таблетки 2 года. Содержание эфирных масел в листьях проверяется ежегодно.

НАКОМ (Nacom). Состав: карбидопы 0,025 г, левопы 0,25 г. Синоним: Sinemet.

Фармакологическое действие. Антипаркинсоническое средство. Карбидопа тормозит экстрацеребральное декарбоксилирование левопы, которая проникает через гематоэнцефалический барьер, в базальных ганглиях превращается в допамин и устраняет или значительно уменьшает ригидность, брадикинезию и тремор. Благодаря комбинации с карбидопой терапевтический эффект достигается при помощи меньших доз левопы, реже наблюдаются побочные явления.

Показания к применению. Болезнь Паркинсона, паркинсонизм (кроме лекарственного).

Способ применения и дозы. Начинают лечение с $^1/_2$ таблетки 1—2 раза в сутки, при необходимости повышая ежедневную дозу на $^1/_2$ таблетки через 2—3 дня до достижения оптимального эффекта (но не более 8 таблеток в сутки). У больных, которые лечились левопой, делают в лечении 12-часовой перерыв и далее назначают наком в дозе, составляющей 20% от прежней дозы левопы.

Побочное действие. Хореиформные, дистонические или иные насильственные движения, мышечные судороги, блефароспазм, тризм. Реже наблюдаются психические нарушения (бредовые, депрессивные расстройства, признаки деменции), нарушения ритма сердца, ортостатическая гипотензия, тошнота, рвота, головокружение, еще реже — желудочно-кишечные кровотечения, артериальная гипертензия, флебиты, лейкопения, агранулоцитоз.

Противопоказания. Идиосинкразия к препарату, выраженные нарушения функции печени, почек и желез внутренней секреции, декомпенсация сердечно-сосудистой системы, закрытоугольная глаукома, психические заболевания, возраст до 12 лет, беременность и лактация.

Препарат не назначают одновременно с ингибиторами моноаминоксидазы.

Форма выпуска. Таблетки, в упаковке 100 штук.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Югославии.

НАНИПРУС (Naniprus). Лиофилизированная форма нитропруссида натрия в ампулах со стабилизатором цитратом натрия. Синонимы: Nitroprusside natrium, Nipride.

Фармакологическое действие. Препарат оказывает выраженное сосудорасширяющее действие, обусловленное непосредственным влиянием на гладкомышечные клетки стенок сосудов. В результате воздействия на стенки артерий АД понижается и таким образом редуцируется постсердечная нагрузка.

Показания к применению. Кризы гипертонические любого происхождения, злокачественная гипертония; острая левосторонняя недостаточность сердца при инфаркте миокарда.

Способ применения и дозы. Применяется исключительно в виде капельной инфузии в вену, перед этим лиофилизат в ампуле растворяют 5—10 мл 5% раствора глюкозы или 5 мл дистиллированной воды. Приготовленный раствор наливают в сосуд с 150—500 мл 5% раствора глюкозы. Скорость введения определяется необходимым или уже достигнутым результатом. Начальная оптимальная доза 0,5—5 мг/кг массы тела [обычно 2—8 мг/(кг·мин)]. Используется только

Отредактировал: ledi24

свежеприготовленный раствор, запрещается смешивание с растворами других лекарств.

Противопоказания. Кровоизлияние в мозг, нарушенный метаболизм цианидов. Необходима осторожность при наличии артериовенозного анастомоза и повышенного внутричерепного давления.

Форма выпуска. Ампулы по 10 мл темного стекла, содержащие 30 мг нитропруссида натрия. В упаковку к ампуле прилагают ампулу, содержащую 5 мл растворителя.

Условия хранения. Список Б. В темном, сухом, прохладном месте.

Срок годности 2 года.

Поставляется из Болгарии.

НАПРОСИН (Naprosyn). 2[6^1-Метокси-2^1-нафтил]-пропионовая кислота. Синоним: Naproxen.

Фармакологическое действие. Напросин является нестероидным противоревматическим препаратом с противовоспалительным, аналгетическим и жаропонижающим действием.

Показания к применению. Ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилит, остеоартрит, подагра, а также повреждение мягких тканей.

Способ применения и дозы. Напросин оказывает пролонгированное действие, назначают его 2 раза в день. Суточная доза препарата составляет 0,5 г (по 0,25 г утром и вечером). При необходимости суточная доза может быть увеличена до 0,75 г.

Побочное действие. В указанных дозах напросин хорошо переносится как при кратковременном, так и при продолжительном применении. Иногда могут возникать неприятные ощущения в области верхнего отдела желудочно-кишечного тракта (давление, боль, изжога), а также головная боль, головокружение, усиленное потоотделение. Значительно реже появляются высыпания на коже.

Противопоказания. Абсолютных противопоказаний не выявлено. Не рекомендуется назначать препарат детям в возрасте до 16 лет, а также больным, у которых в прошлом имели место желудочно-кишечные кровотечения; беременным, женщинам в период лактации и больным с нарушением функции печени, с сердечной недостаточностью и аллергией на противовоспалительные препараты (особенно на ацетилсалициловую кислоту).

Форма выпуска. Таблетки по 0,25 г, в упаковке 30 штук и ампулы 5 мл по 500 мг напросина и 25 мг лидокаина.

Условия хранения. В защищенном от света месте.

Срок годности таблеток 5 лет, ампул 3 года.

Поставляется из Словении фирмой «КРКА».

НАТРИЯ АДЕНОЗИНТРИФОСФАТ (Natrii adenosintriphosphas). Динатриевая соль аденозинтрифосфорной кислоты.

Фармакологическое действие. Участвует во многих процессах обмена веществ; особенно большое значение имеет для мышечной деятельности.

Показания к применению. Мышечная дистрофия и атрофия; хроническая коронарная недостаточность; дистрофия миокарда; постинфарктный кардиосклероз; спазмы периферических сосудов.

Способ применения и дозы. Внутримышечно в первые 2—3 дня 1 раз в день по 1 мл 1% раствора, затем 1 раз в день по 2 мл или 2 раза в день по 1 мл 1% раствора. Курс лечения (30—40 инъекций) через 1—2 мес может быть повторен.

Побочное действие. Головная боль, усиление диуреза, тахикардия.

Противопоказания. Острый инфаркт миокарда.

Форма выпуска. Ампулы по 1 мл 1% раствора, в упаковке 6 штук.

Отредактировал: ledi24

Условия хранения. В защищенном от света месте при температуре от 4 до 5°С.

Срок годности 1 год.

Этот препарат под названием «Фосфобион» поставляется из Румынии (по 5 ампул в упаковке).

НАТРИЯ АРСЕНАТ (Natrii arsenas).

Применение. Как общеукрепляющее и тонизирующее средство при упадке питания, неврозах, легких формах анемии, псориазе. Вводят подкожно ежедневно, начиная с 0,2 мл 1% раствора с постепенным повышением дозы до 1 мл. Курс лечения 20—40 дней, при псориазе до 2—3 мес. Высшая разовая доза для взрослых 1 мл 1% раствора, суточная 2 мл 1% раствора. Детям до 2 лет препарат не назначают, старше 2 лет вводят под кожу по 0,0003—0,0015 г.

Побочное действие. Тошнота, рвота, понос, пигментация кожи.

Противопоказания. Поражения почек, невриты, выраженная анемия, диспептические явления.

Форма выпуска. Ампулы по 1 мл 1% раствора, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список А.

Срок годности 5 лет.

НАТРИЯ БЕНЗОАТ (Natrii benzoas).

Применение. Как отхаркивающее средство при заболеваниях дыхательных путей (бронхиты и др.) в порошках, растворах и микстурах по 0,2—0,5 г 3—4 раза в день.

Форма выпуска. Порошок.

Условия хранения. В сухом месте.

Срок годности 10 лет.

НАТРИЯ БРОМИД (Natrii bromidum).

Фармакологическое действие. Способствует восстановлению равновесия между процессами возбуждения и торможения при нарушении их соотношения.

Показания к применению. Повышенная раздражительность, бессонница, гипертоническая болезнь.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,1—1 г 3—4 раза в день, детям (в зависимости от возраста) по 0,05—0,4 г 3 раза в день.

Побочное действие. При передозировке или плохой переносимости насморк, кашель, слабость, кожные высыпания.

Форма выпуска. Порошок.

Условия хранения. В сухом, защищенном от света месте.

Срок годности 10 лет.

НАТРИЯ ГИДРОКАРБОНАТ (Natrii hydrocarbonas). Синонимы: Natrium bicarbonicum, Sodium bicarbonate.

Применение. В качестве антацидного средства при повышенной кислотности желудочного сока, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при заболеваниях, сопровождающихся ацидозом (диабет и др.), внутрь по 0,5—1,5 г на прием; как отхаркивающее в составе микстур, для полосканий, промываний и ингаляций при насморке, конъюнктивитах, стоматитах, ларингитах и др. в виде 0,5—2% раствора. В виде суппозиториев используют против укачивания при морской и воздушной болезни.

Противопоказания. Состояния, сопровождающиеся развитием метаболического алкалоза.

Форма выпуска. Порошок, ампулы 20 мл 4% раствора, в упаковке 10 штук, суппозитории ректальные, в упаковке 10 штук по 0,3 г, по 0,5 г, 0,7 г.

Отредактировал: ledi24

Условия хранения. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности. Порошок неограничен, ампулы и суппозитории 2 года, таблетки 10 лет.

НАТРИЯ ЙОДИД (Natrii iodidum).

Применение. В тех же случаях, что и калия йодид, внутрь по 0,3—1 г 3—4 раза в день; при поздних сифилитических изменениях зрительного нерва и при актиномикозе легких внутривенно по 5—10 мл 10% раствора через 1—2 дня (всего 8—12 вливаний).

Побочное действие и противопоказания те же, что и для других препаратов йода.

Форма выпуска. Порошок.

Условия хранения. В защищенном от света месте.

Срок годности 1 год.

НАТРИЯ НУКЛЕИНАТ (Natrii nucleinas).

Фармакологическое действие. Способствует увеличению числа лейкоцитов в крови.

Показания к применению. Как средство, стимулирующее лейкопоэз, при лимфопении и агранулоцитозе, а также при нарушениях фосфорного обмена (фосфатурия, рахит и др.).

Способ применения и дозы. Внутрь (натощак) по 0,1—0,2 г; внутримышечно 5—10 мл 2 % или 5 % раствора; детям дозы устанавливают в соответствии с возрастом. Длительность лечения 10 дней и более в зависимости от течения заболевания.

Форма выпуска. Порошок.

Условия хранения. В плотно укупоренных стеклянных банках.

Срок годности 2 года.

НАТРИЯ ОКСИБУТИРАТ (Natrii oxybutyras). Натриевая соль γ-оксимасляной кислоты.

Фармакологическое действие. Оказывает угнетающее действие на центральную нервную систему. В малых дозах дает транквилизирующий эффект, предотвращает невротические расстройства и вегетативные реакции на стрессорные воздействия; оказывает снотворное действие. В больших дозах препарат вызывает наркотическое состояние и мышечную релаксацию.

Не угнетает сердечно-сосудистую систему, повышает сократительную способность миокарда и улучшает микроциркуляцию. Повышает клубочковую фильтрацию, стабилизирует функцию почек в условиях кровопотери. Усиливает эффект анальгетиков и средств для наркоза, обладает противосудорожной активностью. Повышает устойчивость организма к кислородной недостаточности, включая локальные формы гипоксии, в частности гипоксию сетчатки, вызванную высоким внутриглазным давлением.

Показания к применению. В хирургической практике применяют для вводного и базисного наркоза в общей и детской хирургии, особенно у больных, находящихся в состоянии гипоксии, при дыхательной недостаточности, пороках сердца, в детской хирургии при операциях на сердце в условиях гипотермии и искусственного кровообращения, при проведении наркоза у людей пожилого возраста с исходной гипотонией и гиповолемией, в шоковом состоянии, у истощенных больных, при печеночно-почечной недостаточности, при выполнении различных диагностических процедур; при реанимации и интенсивной терапии больных с тяжелыми гипоксическими сдвигами, с гипоксическим и посттравматическим отеком мозга; эмболиях мозга, послеоперационных психозах, психомоторном возбуждении; для стимуляции диуреза

Отредактировал: ledi24

у больных с гипергидратацией, после операций с применением гиперволемической гемодилюции, у больных с отеком мозга, в состоянии шока и кровопотери; при состояниях, сопровождающихся повышением содержания калия в плазме крови (синдром раздавливания, ожоги).

В акушерско-гинекологической практике используют для наркоза при оперативном родоразрешении и в качестве средства лечебного акушерского наркоза для отдыха рожениц и повышения устойчивости матери и плода к гипоксии.

В офтальмологической практике назначают при первичной глаукоме с целью активизации окислительных процессов в сетчатке, у больных с открытоугольной глаукомой при нормальном или умеренно повышенном внутриглазном давлении в развитой и далекозашедшей стадиях заболевания с нарушением зрительных функций.

В психиатрической и неврологической практике применяют при невротических и неврозоподобных расстройствах, обусловленных психогенными воздействиями, интоксикационными и травматическими поражениями центральной нервной системы, протекающих с нарушениями сна, неврастеническими расстройствами.

Способ применения и дозы. При проведении наркоза с помощью натрия оксибутирата премедикация осуществляется принятой комбинацией анальгетиков, холинолитиков и антигистаминных средств.

Натрия оксибутират, используемый самостоятельно или в сочетании с другими средствами для наркоза, вводят внутривенно или внутрь.

Ослабленным больным натрия оксибутират вводят в дозе 50—70 мг/кг, физически крепким —70—120 мг/кг. Препарат вводят капельно со скоростью 1—2 мл/мин (лучше в сочетании с 50—100 мл 5—40% раствора глюкозы) в течение 10—20 мин. Через 5—7 мин от начала введения препарата больной засыпает.

Одномоментно препарат вводят в течение 1—2 мин из расчета 35—40 мг/кг в смеси с 4—6 мг/кг тиопентала-натрия. Наркотический эффект отмечается через 4—6 мин от начала инъекций; для поддержания наркоза дополнительно вводят натрия оксибутират из расчета 40 мг/кг. Наркоз достаточной глубины для проведения оперативного вмешательства наступает спустя 30—40 мин от начала введения. Эта методика позволяет быстро (после введения миорелаксантов) провести интубацию трахеи и начать оперативное вмешательство при добавлении обезболивающих средств.

При назначении внутрь порошок натрия оксибутирата разводят в кипяченой воде и принимают за 40—60 мин до операции из расчета 100—200 мг/кг. Сон наступает через 40—60 мин. Основной наркоз может поддерживаться эфиром, закисью азота, фторотаном и другими ингаляционными анестетиками.

Для вводного наркоза у детей натрия оксибутират применяют внутрь в дозе 150 мг/кг в 20—40 мл 5% раствора глюкозы. Препарат можно вводить внутривенно в дозе 100 мг/кг (в 30—50 мл 5% раствора глюкозы) в течение 5—10 мин частыми каплями. Сон наступает через 10—20 мин, длительность его $1^1/_2$—3 ч.

При операциях на сердце натрия оксибутират как антигипоксант и препарат, предупреждающий нежелательные реакции на охлаждение, применяют в дозе 100 мг/кг внутривенно.

При лечении гипоксических состояний, в том числе отека мозга, дыхательных и сердечно-сосудистой недостаточности, шоке, при необходимости синхронизации с искусственной вентиляцией легких, психомоторном возбуждении в послеоперационном периоде натрия окси-

Отредактировал: ledi24

бутират применяют в дозе 50—100 мг/кг в комплексе с другими мероприятиями.

При длительном введении препарата в больших дозах для предотвращения возможной гипокалиемии необходим хлорид калия (в дозе, составляющей $^1/_5$ от дозы натрия оксибутирата).

Для стимуляции диуреза препарат вводят в дозе 30—50 мг/кг внутривенно, медленно (скорость 2—3 мл/мин). Выделение мочи начинается через 10—15 мин и длится $1^1/_2$—2 ч. Возможно сочетание с салуретиками, угнетающими канальцевую реабсорбцию.

Для лечебного акушерского наркоза препарат вводят внутривенно, медленно в дозе 50—60 мг/кг в 20 мл 40% раствора глюкозы в течение 10—15 мин или принимают внутрь в дозе 40—80 мг/кг. Сон или поверхностный наркоз длится $1^1/_2$—3 ч. В случае перехода к оперативному родоразрешению натрия оксибутират вводят внутривенно в дозе 60—70 мг/кг и на этом фоне осуществляется интубационный наркоз при дробном введении миорелаксантов.

Для уменьшения невротических реакций и нормализации сна натрия оксибутират назначают внутрь в виде готового 5% сиропа или 5% раствора, который готовят из 66,7% раствора. Доза натрия оксибутирата составляет для дневных приемов по 0,75 г (1 столовая ложка 5% раствора) 2—3 раза в день, на ночь 1,5—2,25 г (2—3 столовые ложки 5% раствора).

Для приготовления 5% раствора из 66,7% раствора следует 37,5 мл 66,7% раствора натрия оксибутирата влить в бутылку вместимостью 0,5 л и долить кипяченой воды до 0,5 л.

При глаукоме натрия оксибутират применяют внутрь по 0,75—1,5 г (1—2 столовые ложки 5% раствора) 3—4 раза в день ежедневно в течение 30 дней. Повторные курсы проводят 2—3 раза в год. Лечение препаратом сочетают с применением гипотензивных средств местного действия.

Побочное действие. При быстром введении препарата (более 2 мл 20% раствора в минуту) возможны двигательное возбуждение, подергивание мимической мускулатуры и конечностей.

При выходе из наркоза после операции может возникнуть двигательное и речевое возбуждение. В зависимости от состояния больного следует либо дополнительно ввести оксибутират натрия для продолжения послеоперационного сна, либо дождаться полного пробуждения больного.

Длительное применение натрия оксибутирата в больших дозах без введения хлорида калия может привести к гипокалиемии. Значительная передозировка или слишком быстрое внутривенное введение препарата могут сопровождаться нарушением ритма дыхания. Лечебные мероприятия состоят в искусственной вентиляции легких, применении хлорида калия.

У отдельных больных отмечается тошнота, рвота, сонливость в дневное время.

Противопоказания. Гипокалиемия; тяжелые токсикозы беременных, сопровождающиеся гипокалиемией и гипертензивным синдромом; миастения.

Форма выпуска. В ампулах по 10 мл 20% раствора, в упаковке 10 штук; во флаконах по 37,5 мл 66,7% раствора, 5% сироп во флаконах по 400 мл, в порошке.

Условия хранения. В сухом, защищенном от света месте; приготовленный 5% раствор натрия оксибутирата для приема внутрь следует хранить в холодильнике.

Срок годности 2 года.

Отредактировал: ledi24

НАТРИЯ ПАРА-АМИНОСАЛИЦИЛАТ (Natrii para-aminosalicylas). Натриевая соль пара-аминосалициловой кислоты. Синонимы: ПАСК-натрий, Aminacyl, Propasa и др.

Фармакологическое действие. Обладает бактериостатической активностью в отношении микобактерий туберкулеза.

Показания к применению. Различные формы туберкулеза.

Способ применения и дозы. Внутрь по 3—4 г 3 раза в день, детям по 0,2 г/(кг·сут) (не более 10 г в сут) в 3—4 приема. Внутривенно (капельно) по 250—450 мл 3% раствора 5—6 раз в неделю.

Побочное действие. Расстройства желудочно-кишечного тракта, аллергические реакции, лихорадочная реакция, астматические явления, эозинофилия. При нарушении техники внутривенного введения возможен шок.

Противопоказания. Нефрит, гепатиты, цирроз, амилоидоз, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, микседема, декомпенсированный порок сердца. Внутривенное введение противопоказано при тромбофлебитах, нарушении свертываемости крови.

Форма выпуска. Порошок, таблетки по 0,5 г, в упаковке 150 штук, таблетки, растворимые в кишечнике, по 0,5 г, в упаковке 150 штук, таблетки по 0,5 г, покрытые оболочкой, в упаковке 100 штук, гранулы в упаковке по 100 г.

Условия хранения. В защищенном от света месте.

Срок годности. Порошок и гранулы 1 год, таблетки 3 года, таблетки, покрытые оболочкой, 2 года.

НАТРИЯ САЛИЦИЛАТ (Natrii salicylas). Синоним: Nadisal.

Фармакологическое действие. Оказывает аналгетическое, жаропонижающее и противовоспалительное действие.

Применение. При ревматизме, экссудативном плеврите, неревматических артритах, подагре, невралгиях, миалгиях по 0,5—1 г 3—6 раз в сутки после еды до 10—12 г/сут; иногда вводят внутривенно (медленно) 3—10 мл 10—15% раствора.

Побочное действие. Тошнота, рвота, понос, боль в животе, анорексия, шум в ушах, снижение слуха и зрения, диплопия, аллергические реакции.

Противопоказания. Заболевания, сопровождающиеся пониженной свертываемостью крови, повышенная чувствительность к препарату, обострение язвенной болезни.

Форма выпуска. Порошок.

Условия хранения. В сухом, защищенном от света месте.

Срок годности 5 лет.

НАТРИЯ ТИОСУЛЬФАТ (Natrii thiosulfas). Синоним: Natrium hyposulfurosum.

Фармакологическое действие. Оказывает противотоксическое, противовоспалительное и десенсибилизирующее действие.

Применение. При аллергических заболеваниях, артритах, невралгиях, отравлениях соединениями мышьяка, ртути, свинца, синильной кислоты и ее солями, солями йода, брома внутривенно по 5—50 мл 30% раствора; внутрь по 2—3 г в виде 10% раствора; при чесотке наружно в виде 60% раствора.

Форма выпуска. Порошок; 30% раствора в ампулах по 5 мл, по 10 мл, в упаковках 10 штук.

Условия хранения. В хорошо укупоренной таре.

Срок годности. Порошок не ограничен; ампулы 5 лет.

НАТРИЯ УСНИНАТ (Natrii usninas). Натриевая соль усниновой кислоты.

Отредактировал: ledi24

Фармакологическое действие. Оказывает антимикробное действие в отношении грамположительных бактерий.

Показания к применению. Для лечения ран, ожогов, трещин и т. д.

Способ применения и дозы. Наружно в виде 1% водно-спиртового или 0,5% масляного раствора, а также в виде раствора в глицерине или пихтовом бальзаме с добавлением 2% раствора анестезина. Внутрь в виде порошка или в смеси с сульфаниламидами (1 часть натрия уснината с 3—5 частями стрептоцида, норсульфазола). При припудривании ран порошком расходуют 0,1—0,2 г препарата на рану размером 16 $см^2$.

Форма выпуска. Флаконы по 50 мл 1% раствора в этиловом спирте; 0,5% раствор в касторовом масле по 50 г с добавлением 2% раствора анестезина; 0,3% раствор в пихтовом бальзаме по 25 г

Условия хранения. Список Б.

Срок годности. Все формы 3 года.

НАТРИЯ ФЛУОРАТ (Natrium fluoratum). Таблетки для сосания.

Фармакологическое действие. Препарат восполняет дефицит фтора в организме, вызывает созревание и затвердевание зубной эмали, предотвращает зубной кариес, особенно у детей.

Показания к применению. Профилактика зубного кариеса.

Способ применения и дозы. Детям от 3 до 6 лет —$1^1/_2$ таблетки в сутки; 6—16 лет —2 таблетки в сутки. Таблетки применяют в течение 200—250 дней.

Побочное действие. При передозировке возможны гипофункция щитовидной железы, иногда аллергические реакции, герпес, насморк, эозинофилия.

Форма выпуска. Таблетки по 1 мг, в упаковке 20 штук.

Условия хранения. В защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

Поставляется из Польши.

НАТРИЯ ХЛОРИД (Natrii chloridum).

Применение. При обезвоживании организма и как дезинтоксикационное средство в виде изотонического раствора подкожно, внутривенно и в клизмах до 2 л/сут, а также для растворения различных лекарственных средств. Гипертонические растворы (3%, 5%, 10%) наружно для лечения гнойных ран; внутривенно 10—20 мл 10% раствора при кровотечениях (легочные, желудочно-кишечные).

Форма выпуска. Порошок, таблетки по 0,9 г; 0,9% изотонический раствор для инъекций в ампулах, в упаковках 10 штук по 5 мл, 10 мл и 20 мл, во флаконах по 400 мл, 10% раствор по 10 мл в ампулах, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. В хорошо укупоренной таре.

Срок годности. Порошок и таблетки по 0,9 г не ограничен, растворы для инъекций: 0,9% в ампулах 10 лет, 0,9% в бутылях 1 год, 10% во флаконах 2 года.

НАТУЛАН (Nathulan). Пара-N′-(Метилгидразинометил)-N-изопропилбензамида гидрохлорид.

Фармакологическое действие. Противоопухолевое средство.

Показания к применению. Генерализованные формы лимфогранулематоза (III—IV стадии).

Способ применения и дозы. Per se и в комплексе с другими препаратами внутрь, начиная с 0,05 г с постепенным повышением дозы до 0,25—0,3 г ежедневно до получения ремиссии. В дальнейшем под-

Отредактировал: ledi24

держивающие дозы 0,05—0,15 г в день. На курс лечения 4—7 г

Побочное действие. Понижение или отсутствие аппетита, тошнота, рвота, лейкопения, гепато- и кардиотоксическое действие, в отдельных случаях невриты, полиневриты, аллергические дерматиты.

Противопоказания. Лейкопения, тромбоцитопения, значительные нарушения функции печени и почек, беременность.

Форма выпуска. Капсулы по 0,05 г, в упаковке 50 штук

Условия хранения. В прохладном месте.

Срок годности 3 года.

Поставляется из-за рубежа.

НАФТАЛАННАЯ МАЗЬ (Unguentum Naphthalani). Состав: нефти нафталанской рафинированной 70 г, парафина 18 г, петролатума 12 г

Фармакологическое действие. Оказывает смягчающее, рассасывающее, дезинфицирующее и некоторое болеутоляющее действие.

Применение. Наружно при заболеваниях кожи (экзема, нейродермит, фурункулез и др.), при ожогах, язвах и др.

Форма выпуска. В упаковке по 30 г, ангро.

Условия хранения. В прохладном месте.

Срок годности 8 лет.

«НАФТАЛЬГИН» ЛИНИМЕНТ (Linimentum «Naphtalgini»). Состав: анальгина 2,5 г, метилсалицилата 2,5 г, нефти нафталанской 2,5 г, эмульгатора Т-2 13 г, смеси жирных спиртов кашалотового жира 3 г, воды дистиллированной до 100 г.

Применение. Как аналгезирующее средство для растираний.

Форма выпуска. В упаковке по 100 г

Условия хранения. В прохладном месте.

Срок годности 2 года.

НАФТАМОН (Naphtammonum). 2-Феноксиэтилдиметилбензиламмония 2-оксинафтоат. Синонимы: Alcopar, Debefenium.

Фармакологическое действие. Антигельминтное средство.

Показания к применению. Анкилостомидоз, энтеробиоз, трихостронгилоидоз, трихоцефалез.

Способ применения и дозы. Внутрь натощак 1 раз в сутки 5 г взрослым и детям старше 5 лет (детям до 5 лет 2—2,5 г). Курс лечения 1—5 дней. Высшая разовая и суточная доза для взрослых внутрь 5 г.

Побочное действие. Тошнота, рвота, частый стул.

Противопоказания. Нарушения функции печени.

Форма выпуска. Порошок, в упаковке по 5 г, таблетки, растворимые в кишечнике, по 0,5 г, в упаковке 10 штук, Нафтамон «К», таблетки, покрытые оболочкой, по 0,5 г, в упаковке 600 штук.

Условия хранения. В сухом месте.

Срок годности. Порошок 5 лет, таблетки 2 года.

НАФТИЗИН (Naphthyzinum). 2-(α-Нафтилметил)-имидазолина нитрат. Синонимы: Naphazolinum, Sanorine.

Фармакологическое действие. Вызывает сужение периферических кровеносных сосудов, повышает АД, расширяет зрачки. Оказывает местное сосудосуживающее и противовоспалительное действие (по сравнению с адреналином более длительное).

Показания к применению. Риниты, гаймориты, аллергические конъюнктивиты; необходимость остановки носовых кровотечений.

Способ применения и дозы. Местно в виде 0,05% и 0,1% раствора по 1—2 капли в носовой ход 2—4 раза в день. При кровотечениях тампоны, смоченные 0,05% раствором. При конъюнктивитах 1—2 капли 0,05% раствора.

Отредактировал: ledi24

Побочное действие. Тахикардия, головная боль.

Противопоказания. Артериальная гипертония, выраженный атеросклероз.

Форма выпуска. Во флаконах по 10 мл 0,05% раствора и 0,1% раствора.

Из Чехо-Словакии препарат поставляется под названием «Санорин» во флаконах по 10 мл и 0,1% эмульсии.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

НАШАТЫРНО-АНИСОВЫЕ КАПЛИ (Liquor ammonii anisatus). Состав: масла анисового 2,81 г, раствора аммиака 15 мл, спирта этилового 90% до 100 мл.

Применение. В качестве отхаркивающего средства при бронхитах взрослым 10—15 капель на прием, детям столько капель, сколько лет ребенку, 3—4 раза в день.

Форма выпуска. Во флаконах по 25 мл, 100 мл, 100 г.

Условия хранения. В прохладном месте.

Срок годности 2 года.

НАЯКСИН (Najaxinum). Препарат, изготовленный из сухого яда среднеазиатской кобры (Naianaia oxiana E.). В 1 мл водного раствора содержится 1 мг сухого нативного яда и 4 мг новокаина гидрохлорида.

Фармакологическое действие. Обезболивающее средство, особенно при повторном применении. Усиливает эффект центральных анальгетиков (морфин, промедол) и местноанестезирующих средств (кокаин, тримекаин).

Показания к применению. Болевой синдром при различных заболеваниях периферической нервной системы (пояснично-крестцовый радикулит, невралгия тройничного нерва и невриты различной этиологии)

Способ применения и дозы. Подкожно и внутримышечно с интервалами в 1—3 дня. Лечение начинают с введения дозы 0,2 мл, затем повышая ее на 0,1—0,2 мл, и доводят до 1—2 мл. Максимальная разовая доза 2 мл. Курс лечения 12—20 инъекций. Курс лечения можно повторить после 4-недельного интервала.

Противопоказания. Повышенная чувствительность организма к яду кобры (аллергия), туберкулез легких, порок сердца, лихорадочное состояние, беременность и период лактации, органические поражения печени и почек.

Форма выпуска. Ампулы по 1 мл для инъекций, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список А. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 5 лет.

НЕВИГРАМОН (Nevigramon). 1-Этил-7-метил-1,8 нафтиридин-3-он-3-карбоновая кислота. Синоним: Negram.

Фармакологическое действие. Антибактериальный препарат.

Показания к применению. Инфекции мочевыводящих путей.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,5—1 г 3—4 раза в день.

Побочное действие. Диспептические расстройства, головная боль, головокружение, аллергические реакции.

Противопоказания. Угнетение дыхательного центра, нарушение функции печени.

Форма выпуска. Капсулы по 0,5 г, в упаковке 56 штук.

Условия хранения. Список Б.

Отредактировал: ledi24

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Венгрии и Словении.

«НЕО-АНУЗОЛ» СУППОЗИТОРИИ РЕКТАЛЬНЫЕ («Neoanusolum», suppositoria). Состав: висмута нитрата основного 0,075 г, цинка окиси 0,2 г, танина 0,05 г, резорцина 0,005 г, йода 0,005 г, метиленового синего 0,003 г, жировой основы достаточное количество.

Фармакологическое действие. Вяжущее и дезинфицирующее средство.

Применение. При геморрое, трещине заднего прохода по 1 суппозиторию per rectum 1—2 раза в день.

Форма выпуска. Суппозитории, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. В прохладном месте.

НЕОДИКУМАРИН (Neodicumarinum). Этиловый эфир ди-(4-оксикумаринил-3)-уксусной кислоты. Синонимы: Dicumaryl, Pelentan.

Фармакологическое действие. Антикоагулянт непрямого действия.

Показания к применению. Для профилактики и лечения тромбозов, тромбофлебитов, эмболий, тромбоэмболических осложнений при инфаркте миокарда.

Способ применения и дозы. Внутрь обычно в 1-й день по 0,3 г 2—3 раза с постепенным уменьшением дозы до 0,2—0,1 г/сут под контролем содержания в крови протромбина. Высшая разовая доза для взрослых 0,3 г, суточная 0,9 г.

Побочное действие. При длительном применении возможны кровотечения, головная боль, тошнота, понос, аллергические кожные реакции.

Противопоказания. Исходное содержание протромбина ниже 70%, геморрагические диатезы и другие заболевания, сопровождающиеся пониженной свертываемостью крови и повышенной проницаемостью сосудов, беременность, нарушение функции печени и почек, злокачественные новообразования, менструальный период.

Форма выпуска. Таблетки по 0,1 г, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список А. В защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

В аптечную сеть поступает близкий по составу и действию на организм препарат «Дикумарин» в таблетках 0,1 г, в упаковке 10 штук.

Этот препарат под названием «Пелентан» («Pelentan»), таблетки по 0,3 г, в упаковке 10 штук, поступает из Чехо-Словакии.

Срок годности 4 года.

НЕОМИЦИНА СУЛЬФАТ (Neomycini sulfas). Синонимы: колимицин, Neomin.

Фармакологическое действие. Обладает широким спектром антимикробного действия. Активен в отношении многих грамотрицательных бактерий и кокков (эшерихии, сальмонелла, шигелла, палочка сибирской язвы, менингококк). Из грамположительных кокков к нему чувствительны стафилококки, стрептококки и энтерококки.

При пероральном введении мало всасывается.

Показания к применению. Инфекции желудочно-кишечного тракта (дизентерия, колит, энтероколит); в предоперационном периоде при подготовке больных к операции на желудочно-кишечном тракте; инфицированные раны, абсцессы, фурункулы, флегмоны, панариций, пиодермия, ожоги и др.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,1—0,2 г 2 раза в сутки. Детям грудного и дошкольного возраста из расчета 4 мг/кг 2 раза в сутки. Курс лечения 5—7 дней. Для местного применения 2% мазь

Отредактировал: ledi24

1—2 раза в сутки или раствор на стерильной дистиллированной воде, содержащий 5000 ЕД в 1 мл.

Ввиду высокой ото- и нефротоксичности внутримышечное введение недопустимо.

Побочное действие. Потеря аппетита, тошнота, понос, рвота, дисбактериоз.

Противопоказания. Нарушение выделительной функции почек, поражение слухового нерва, непроходимость желудочно-кишечного тракта; нельзя назначать препарат в сочетании со стрептомицином, канамицином, мономицином, гентамицином, флоримицином.

Форма выпуска. Таблетки по 0,25 г (250 000 ЕД), в упаковке 10 штук; мазь 2% (1 г 20 000 ЕД) по 15 г.

Условия хранения. В прохладном месте.

Срок годности. Мазь $2^1/_2$ года, таблетки 2 года.

НЕРОБОЛИЛ (Nerobolil). 19-Норандростенолон-фенилпропионат. Синонимы: Nandroloni, Phenobolilum.

Фармакологическое действие. Активный анаболический стероид пролонгированного действия.

Применение. В тех же случаях, что и метандростенолон. Вводят внутримышечно по 1—2 мл (25—50 мг) 1 раз в неделю; детям соответственно возрасту от 0,5 до 1 мл на инъекцию.

Противопоказания. Рак предстательной железы.

Форма выпуска. Ампулы по 1 мл (25 мг), в упаковке 3 штуки.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

Поставляется из Венгрии.

НЕУЛЕПТИЛ (Neuleptil). 2-Циан-10[3-(4-оксипиридино)-пропил]-фенотиазин. Синонимы: Neulactil, Periciazinum.

Фармакологическое действие. Нейролептическое средство. Потенцирует действие наркотиков, снотворных и обезболивающих средств. Обладает адреналитической и холинолитической активностью, оказывает противорвотное действие.

Показания к применению. Психопатоподобные состояния различной этиологии (шизофрения, эпилепсия, психопатии и др.).

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,02—0,03 г ежедневно в 2—3 приема с постепенным повышением дозы до 0,04—0,07 г в день.

Побочное действие. Возможны аллергические реакции, экстрапирамидные расстройства.

Форма выпуска. Капсулы по 0,01 г, в упаковке 10 капсул, 4% раствор во флаконах по 125 мл.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности. Капсулы 5 лет, капли 4 года.

Поступает из-за рубежа.

НЕФТЬ НАФТАЛАНСКАЯ РАФИНИРОВАННАЯ (Naphtalanum liquidum raffinatum). Сложная смесь углеводородов и смол.

Применение. При заболеваниях кожи (экзема, нейродермит, фурункулез; рожистое воспаление и др.), воспалительных заболеваниях сосудов и мышц, невралгиях, радикулитах, плекситах, ожогах, язвах, пролежнях и др. per se или в смеси с другими препаратами в виде мазей, паст, суппозиториев.

Форма выпуска. Нефть нафталанская рафинированная 100 г, линимент нефти нафталанской рафинированной (Linimentum naphtalani liquidi) в упаковках по 50 г 10%, цинко-нафталанная паста (Pasta Zinci-naphthalani) в упаковке по 40 г.

Отредактировал: ledi24

Условия хранения. В хорошо укупоренной таре.

Срок годности не ограничен.

НИАЛАМИД (Nialamidum). 1-[2-(Бензилкарбамоил)-этил]-2 изоникотиноилгидразин. Синонимы: Nuredal, Nyazin.

Фармакологическое действие. Оказывает активное антидепрессивное и стимулирующее влияние на центральную нервную систему. Ингибитор моноаминоксидазы.

Показания к применению. В качестве антидепрессанта и психостимулятора при депрессивных состояниях различной этиологии, апатоабулических состояниях, моторной заторможенности, астении, олигофрении; при стенокардии, невралгии тройничного нерва и других болевых синдромах.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,05—0,075 г/сут (в 2 приема — утром и днем). При необходимости дозу увеличивают постепенно на 25—50 мг/сут до 200—350 мг в день (в резистентных случаях — иногда до 800 мг). Длительность курса лечения от 1 до 6 мес.

Побочное действие. В отдельных случаях — диспептические явления, бессонница, головная боль, сухость во рту, задержка стула.

Противопоказания. Нарушения функции печени и почек, декомпенсация сердечной деятельности, нарушения мозгового кровообращения, острые ажитированные состояния. Одновременно с ниаламидом (и в течение 2 нед. после его отмены) нельзя назначать симпатолитические средства; несовместим с некоторыми пищевыми продуктами (сыр).

Форма выпуска. Таблетки по 0,025 г, в упаковке 50 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 4 года.

НИГЕДАЗА (Nigedasa). Препарат выделен из семян чернушки дамасской (Nigella damascena).

Фармакологическое действие. Фермент липолитического действия, вызывает гидролитическое расщепление жиров растительного и животного происхождения.

Показания к применению. Для возмещения недостающей или отсутствующей липолитической активности дуоденального сока, обусловленной патологией органов пищеварения (панкреатиты, холецистопанкреатиты, хронические гепатиты, хронические гастриты, энтероколиты и т. д.).

Способ применения и дозы. Внутрь по 1—2 таблетки за 10—30 мин. до еды, запивая водой, при ахилии, гипо- и анацидных состояниях — 1—2 столовыми ложками натурального желудочного сока. Курс лечения 3—4 нед., при необходимости может быть более длительным.

Побочное действие. У больных хроническим колитом может появиться боль в животе, которая при уменьшении дозы исчезает.

Форма выпуска. Таблетки по 0,15 г, растворимые в кишечнике, в упаковке 30 штук.

Условия хранения. При температуре не выше 10°С, в сухом, защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

НИЗОРАЛ (Nizoral). Содержит 200 мг кетоконазола.

Фармакологическое действие. Противогрибковый оральный препарат широкого спектра действия. Тормозит биосинтез эргостерола, триглицеридов и фосфолипидов, необходимых для синтеза клеточной стенки грибов, что изменяет проницаемость клеточной стенки. Грибы неспособны образовывать нити, колонии.

Показания к применению. Дерматомикоз и онихомикоз, вызван-

Отредактировал: ledi24

ные дрожжевыми грибами; микоз волосистой части головы, вызванный нитевыми грибами; влагалищный микоз, хронический мукокутанный кандидоз, отрубевидный лишай.

Способ применения и дозы. Принимать 1 раз в день до или во время еды. При дерматомикозах и отрубевидных лишаях 1 таблетку в день в течение 2—8 нед. При влагалищных кандидозах 2 таблетки в день в течение 5 дней; при заражениях полости рта и желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы 1—2 таблетки в день в течение 2 нед.

Для профилактического лечения 1 таблетка в день, в зависимости от характера основного заболевания лечение продолжают иногда в течение нескольких месяцев.

Для лечения микоза волосистой части головы и общего микоза детям с массой тела до 20 кг назначают из рачета 50 мг/сут, при массе тела 20—40 кг—100 мг/сут.

Побочное действие. Тошнота, рвота, понос, головная боль, зуд.

Противопоказания. Сверхчувствительность к препарату; беременность, период лактации; недостаточность печени и почек.

Форма выпуска. Таблетки по 0,2 г, в упаковке 30 штук.

Условия хранения. Список Б. Обычные.

Срок годности 5 лет

Поставляется из Венгрии.

«НИКОВЕРИН» («Nicoverinum»). Состав: папаверина гидрохлорида 0,02 г, кислоты никотиновой 0,05 г.

Применение. Как спазмолитическое и сосудорасширяющее средство при гипертонии, стенокардии, мигрени, эндартерните по 1 таблетке 2—3 раза в день.

Форма выпуска. Таблетки в упаковке по 10 штук.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности 6 лет

НИКОДИН (Nikodinum). Оксаметиламид пиридин-3-карбоновой (никотиновой) кислоты. Синонимы: Bilizorin, Isochol, Nicoform.

Фармакологическое действие. Обладает желчегонным, бактериостатическими и бактерицидными свойствами.

Показания к применению. Холециститы, холангиты, гепатохолециститы, желчнокаменная болезнь, инфекции мочевыводящих путей, гастроэнтериты.

Способ применения и дозы. Внутрь до еды по 0,5—1 г 3—4 раза в день, запивая $^1/_2$ стакана воды. При лихорадочных состояниях дозу увеличивают до 8 г/сут, после снижения температуры тела постепенно уменьшают до 3—4 г, затем до 0,5—1 г в течение 10—14 дней. Курс лечения при необходимости повторяют.

Побочное действие. Усиление диспептических явлений при ана цидных гастритах, иногда усиление боли в правом подреберье.

Форма выпуска. Таблетки по 0,5 г, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. В сухом, защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

НИКОТИНАМИД (Nicotinamidum). Амид никотиновой кислоты. Синонимы: Aminicotin, Nicofort, Nicovit.

Применение. В тех же случаях, что и никотиновая кислота. Назначают внутрь взрослым по 0,015—0,025 г. Детям по 0,005—0,01 г 1—2 раза в день. Дозы при пеллагре 0,05—0,01 г 3—4 раза в день; для детей 0,01—0,05 г 2—3 раза в день в течение 15—20 дней. При других заболеваниях взрослым по 0,02—0,05 г в день, детям по 0,005—0,01 г 2—3 раза в день. Парентерально (внутривенно, внутримышечно и подкожно) вводят по 1—2 мл 1%, 2,5% и 5% раствора 1—2 раза в день

Отредактировал: ledi24

В отличие от никотиновой кислоты не дает сосудистой реакции.

Противопоказания. Тяжелая форма гипертонии и стенокардии.

Форма выпуска. Порошок; таблетки в упаковке по 50 штук по 0,005 г, по 0,025 г и по 0,015 г; ампулы по 1 мл в упаковке по 10 штук 1% раствора, 2,5% раствора и по 2 мл 5% раствора.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности. Порошок 5 лет; таблетки и ампулы 3 года.

НИКОТИНОВАЯ КИСЛОТА (Acidum nicotinicum). Пиридинкарбоновая-3 кислота. Синонимы: Витамин PP, Nicovit.

Фармакологическое действие. Никотиновая кислота и амид никотиновой кислоты тесно связаны с коферментами кодегидразы I и кодегидразы II (НАД и НАДФ), переносящими водород и осуществляющими окислительно-восстановительные функции.

Показания к применению. Пеллагра (авитаминоз PP). Заболевания печени. Спазм сосудов. Атеросклероз (снижает содержание холестерина в крови). Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, энтероколиты, колиты, длительно не заживающие раны, язвы и др.; как симптоматическое неспецифическое средство при новообразовании в желудочно-кишечном тракте (таблетки никотиновой кислоты с календулой).

Способ применения и дозы. Для профилактики взрослым внутрь 0,015—0,025 г, детям 0,005—0,02 г в день. При пеллагре взрослым внутрь по 0,1 г 2—3 раза в день в течение 15—20 дней. Парентерально вводят 1% раствор натрия никотината по 1 мл 1—2 раза в день в течение 10—15 дней. Детям внутрь от 0,005 до 0,05 г 2—3 раза в день. При других показаниях внутрь взрослым 0,02—0,05 и до 0,1 г, детям от 0,005 до 0,03 г 2—3 раза в день; при новообразованиях по $^1/_4$—2 таблетки никотиновой кислоты с календулой 2 раза в день.

Побочное действие. Покраснение лица и верхней половины туловища с ощущением покалывания и жжения, головокружение, приливы крови к голове; при длительном применении больших доз возможна жировая инфильтрация печени.

Форма выпуска. Порошок, таблетки по 0,05 г, в упаковке 50 штук; в ампулах по 1 мл 1% раствора, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности. Порошок 10 лет, ампулы 4 года, таблетки 3 года.

НИКОФЛЕКС СПОРТИВНЫЙ КРЕМ (Nicoflex). Содержит: капсаицин 0,0075 г, этилникотинат 1,00 г, этиленгликоль салицилат 4,50 г, лавандовое масло 0,05 г.

Фармакологическое действие. Современный спортивный крем для разогрева мышц. Специальный состав и наличие в нем активных веществ обеспечивают полное разогревание мышц, подготавливая их к спортивной деятельности.

Применение. Артрозы, миалгии, спондилоартрозы, невралгии, хронический полиартрит, прочие артриты. У спортсменов — для повышения тонуса мышц.

Способ применения. На мышечную область, подлежащую разогреванию, выдавить 1—2 г (полоску крема длиной 4—5 см) и слабым массированием в течение 3—4 мин втирать до слабого покраснения кожи.

Форма выпуска. В тюбиках по 50 г.

Условия хранения. В прохладном месте.

Срок годности 2 года.

Поставляется из Венгрии.

Отредактировал: ledi24

НИКОШПАН (Nicospan). Состав: но-шпы 0,078 г, кислоты никотиновой 0,22 г.

Фармакологическое действие. Оказывает выраженное сосудорасширяющее действие.

Показания к применению. Спазмы сосудов головного мозга и периферических сосудов.

Способ применения и дозы. Внутрь после еды по 1 таблетке 1—3 раза в день.

Побочное действие. Возможны покраснения лица, чувство жара.

Форма выпуска. Таблетки по 0,1 г, в упаковке 20 штук.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности 5 лет

Поставляется из Венгрии.

НИСТАТИН (Nistatinum). Антибиотик, получаемый из мицелия Streptomyces noursei. Синонимы: Fungistatin, Mycostatin.

Фармакологическое действие. Высокоактивен в отношении дрожжеподобных грибов рода Candida. Неактивен в отношении бактерий. Не обладает кумулятивным свойством. Малотоксичен.

Показания к применению. Для лечения и профилактики заболеваний, вызванных дрожжеподобными грибами рода Candida (кандидоз слизистых оболочек, кожи и внутренних органов) Особенно целесообразно профилактическое применение при лечении препаратами тетрациклинового ряда детей, лиц пожилого возраста и ослабленных больных.

Способ применения и дозы. Внутрь по 500 000 ЕД 3—4 раза или по 250 000 ЕД 6—8 раз в сутки. Детям до 1 года 200 000 300 000 ЕД, от 1 года до 3 лет 300 000—400 000 ЕД, старше 3 лет 500 000—750 000 ЕД/сут в 3—4 приема. Курс лечения 10—14 дней. Местно мазь наносят на пораженную поверхность 2 раза в день Суппозитории и глобули по 1 штуке (250 000—500 000 ЕД) 2 раза в сутки.

Побочное действие. Возможны тошнота, рвота, понос, иногда повышение температуры, озноб.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к препарату

Форма выпуска. Таблетки, покрытые оболочкой, в упаковках по 20 штук по 250 000 ЕД и по 500 000 ЕД.

Мазь 10% (в 1 г —100 000 ЕД) по 15 г

Суппозитории ректальные по 250 000 ЕД, в упаковке 10 штук, по 500 000 ЕД, в упаковке 10 штук; суппозитории вагинальные по 250 000 ЕД, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В сухом, защищенном от света месте при комнатной температуре.

Срок годности 2 года.

НИТАЗОЛ (Nitazolum). 2-Ацетиламино-5-нитротиазол Синонимы Aminitrazolum, Trichocid.

Фармакологическое действие. Оказывает антипротозойное действие на трихомонады и лямблии.

Показания к применению. Трихомонадные поражения мочеполовой сферы женщин и мужчин. Лямблиоз.

Способ применения и дозы. При трихомонадной инфекции у женщин местно и внутрь. Местно: обработка женских половых органов 2,5% суспензией, затем на ночь суппозитории. Местное лечение сочетают с назначением препарата внутрь по 0,1 г 3 раза в день. Проводят 15 процедур. Повторяют 2—3 раза. При лечении мужчин назначают только внутрь по 0,1 г 3 раза в день ежедневно. Курс лечения (15 дней) повторяют 2—3 раза через 1—2 нед.

Отредактировал: ledi24

При лямблиозе внутрь взрослым по 0,1 г 3 раза в день.

Побочное действие. Возможны головная боль, тошнота, недомогание

Форма выпуска. Таблетки по 0,1 г, в упаковке 30 штук; 2,5% суспензия, в упаковке 100 г, суппозитории вагинальные по 0,12 г, в упаковке 10 штук; аэрозоль 60 г

Условия хранения. Список Б. В сухом месте

Срок годности. Таблетки 4 года, суппозитории и аэрозоль 2 года.

НИТРАЗЕПАМ (Nitrazepamum). 7-Нитро-2,3-дигидро-5-фенил-1Н-1,4-бензодиазепин-2-ОН. Синонимы. Neozepam, Eunoctin, Radedorm и др.

Фармакологическое действие. Оказывает снотворное, транквилизирующее, анксиолитическое (противотревожное) мышечно-расслабляющее (миорелаксантное) противосудорожное действие.

Показания к применению. Нарушения сна различной этиологии, неврозы различного генеза, психопатия с преобладанием тревоги и беспокойства, для купирования абстинентного синдрома при хроническом алкоголизме

Способ применения и дозы. Внутрь. В качестве снотворного средства за 30 мин до сна, взрослым 0,0025—0,01 г Максимальная разовая доза 0,02 г Детям в зависимости от возраста и состояния больного. В качестве транквилизатора и противосудорожного средства применяют 2—3 раза в день по 0,005—0,01 г. Максимальная суточная доза 0,03 г Курс лечения составляет 30—45 дней.

Побочное действие. Большие дозы вызывают сонливость, вялость, атаксию, нарушение координации движений, головную боль, в редких случаях кожный зуд, тошноту.

Противопоказания. Миастения, беременность, не следует назначать лицам, деятельность которых требует быстрой психической и физической реакции, водителям транспорта.

Форма выпуска. Таблетки по 0,005 г, в упаковке 20 штук и по 0,01 г, в упаковке 10 штук

Препарат под названием «Радедорм» («Radedorm») в таблетках по 0,005 г, в упаковке 20 штук, поступает из Германии.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности нитразепама 2 года, радедорма 5 лет

НИТРОГЛИЦЕРИН (Nitroglycerinum). Тринитрат глицерина. Синонимы: Anginine, Trinitrol.

Фармакологическое действие. Расширяет кровеносные сосуды (преимущественно коронарные артерии и сосуды мозга), расслабляет гладкую мускулатуру желудочно-кишечного тракта, желчевыводящих путей и других органов.

Показания к применению. Для купирования приступов стенокардии, иногда при дискинезии желчевыводящих путей и эмболии центральной артерии сетчатки.

Способ применения и дозы. По $^1/_2$—1 таблетке (или 1—2 капли 0,5—1% раствора) сублингвально.

Побочное действие. Шум в ушах, головная боль, головокружение, коллапс

Противопоказания. Глаукома, повышенное внутричерепное давление, нарушение мозгового кровообращения, острый период инфаркта миокарда Нитроглицерин назначают с осторожностью при выраженном атеросклерозе сосудов головного мозга.

Форма выпуска. Таблетки по 0,0005 г, в упаковке 40 штук во фла-

Отредактировал: ledi24

конах по 10 мл 1% раствора, 1% раствор в масле 0,0005 г капсулы, в упаковке 20 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте (раствор, кроме того, в прохладном месте, вдали от огня).

Срок годности всех форм 2 года.

НИТРОКСОЛИН (Nitroxolinum). 5-Нитро-8 оксихинолин Синонимы: 5-НОК, Nibiol, Niuron.

Фармакологическое действие. Обладает широким спектром антибактериального действия, активен в отношении грибов рода Candida и др.

Показания к применению. Инфекционные заболевания мочевыводящих путей (пиелонефрит, цистит, уретрит, простатит)

Способ применения и дозы. Внутрь во время еды по 0,05—0,1 г 3—4 раза в день. Максимальная суточная доза 0,8 г Курс лечения 2—3 нед. Повторные курсы проводят с 2-недельным перерывом. Для детей старше 5 лет 0,2—0,4 г 4 раза в день, моложе 5 лет 0,2 г/сут Курс лечения 2—3 нед. Повторные курсы можно проводить по 2 нед с 2-недельным перерывом.

Побочное действие. Диспептические явления.

Противопоказания. Выраженное нарушение выделительной функции почек (возможность кумуляции).

Форма выпуска. Таблетки, покрытые оболочкой, по 0,05 г, в упаковке 50 штук.

Препарат под названием 5-НОК (5-NOK) в таблетках по 0,05 г, в упаковке 50 штук, поступает из Югославии.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности нитроксолина 4 года, 5-НОК 5 лет

НИТРО-МАЗЬ (Nitro 2% volde-salva). Глицерилнитрат

Фармакологическое действие. Эффект глицерилнитратов при приступе стенокардии обусловлен преимущественно расширением венозных сосудов. Мазь, содержащая глицерилнитраты, всасывается через кожу медленно, что обусловливает длительное действие.

Показания к применению. Стенокардия.

Способ применения и дозы. Применяют только для взрослых с индивидуальной дозировкой. Эффективная разовая доза 7,5—30 мг (2—8 см) 2% мази, которую наносят на специальную бумагу размером 10·6 см и накладывают на левую верхнюю часть грудной клетки. В зависимости от состояния больного мазь можно применять 1—3 раза в течение суток.

Побочное действие. Покраснение лица, головокружение, тахикардия, головная боль. У больных, длительно принимавших нитроглицерин и резко закончивших его прием, может обостриться стенокардия.

Противопоказания. Не следует применять мазь во время беременности, лактации. Резко выраженные сужения просвета мозговых сосудов, тяжелая анемия.

Форма выпуска. В тюбиках по 45 г мази.

Условия хранения. При комнатной температуре.

Срок годности 3 года.

Поступает из Финляндии.

НИТРОНГ (Nitrong).

Фармакологическое действие. Нитронг — сосудорасширяющее средство — представляет собой нитроглицерин в лекарственной форме, обеспечивающий пролонгированное действие нитроглицерина (до 6—8 ч), аналогичен сустаку

Отредактировал: ledi24

Показания к применению. Для предупреждения приступов стенокардии.

Способ применения и дозы. Внутрь перед едой в зависимости от тяжести заболевания 1—2 таблетки по 2,6 мг 2—3 раза в день. Максимальная разовая доза 13 мг, суточная 39 мг препарата. Действие препарата наступает через 1 ч после приема. Таблетки глотать, не разжевывая.

Побочное действие. Головная боль, головокружение, ощущение жара.

Противопоказания. Кровоизлияние в мозг, повышенное внутричерепное давление, первые дни после острого инфаркта миокарда.

Форма выпуска. Таблетки по 2,6 мг, в упаковке 50 штук и 100 штук.

Условия хранения. Список Б

Срок годности 5 лет

Поставляется из Финляндии и Словении

НИТРОСОРБИД (Nitrosorbidum). 1,4,3,6-Диангидро-D-сорбита динитрат Синонимы: Carvasin, Dinitrate, Isoket, Isosorbil.

Фармакологическое действие. Аналогичен эринриту Оказывает менее сильное, но более продолжительное (3—5 ч) действие. Медленно всасывается из желудочно-кишечного тракта (через 20—30 мин после приема)

Показания к применению. Для предупреждения приступов стенокардии; иногда применяется при спазмах периферических сосудов.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,005—0,01 г 2—3 раза в день. Курс лечения (15—20 дней) при необходимости может быть повторен.

Побочное действие. Головокружение, шум в ушах, головная боль, тошнота.

Противопоказания. Глаукома, повышенное внутричерепное давление, острое нарушение мозгового кровообращения, острый период инфаркта миокарда; необходима осторожность при выраженном атеросклерозе сосудов мозга, артериальной гипотонии.

Форма выпуска. Таблетки по 0,01 г, в упаковке 25 штук.

Условия хранения. Список Б. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

НИТРОФУНГИН (Nitrofungin). Состав: 2-хлор-4-нитрофенола 1 г, триэтиленгликоля 10 г, спирта этилового 50% до 100 мл.

Фармакологическое действие. Обладает противогрибковой активностью.

Показания к применению. Грибковые заболевания кожи: эпидермофития, трихофития, грибковая экзема; кандидоз кожи

Способ применения и дозы. Наружно. Смазывают пораженные места 2—3 раза в день до исчезновения клинических симптомов заболевания, затем 1—2 раза в неделю в течение 4—6 нед.

Форма выпуска. Спиртовой раствор во флаконах по 25 мл.

Условия хранения. В защищенном от света месте.

Срок годности 4 года.

Поставляется из Чехо-Словакии.

НИТТИФОР (Nittifor). Ниттифор 0,5% водно-спиртовой раствор, содержащий в качестве действующего вещества перметрин [3-феноксибензил (±)-цис, транс-3-(2,2-диметил цикло пропанкарбоксилат)], относящийся к группе синтетических пиретроидов.

Фармакологическое действие. Препарат оказывает педикуле-

Отредактировал: ledi24

цидное действие, губительно действует на яйца насекомых, половозрелых особей и личинок.

Показание к применению. Для уничтожения головных и лобковых вшей.

Способ применения. Волосы головы или волосистые части тела обильно увлажняют раствором «Ниттифор» и ватным или марлевым тампоном (можно губкой) втирают препарат в корни волос Ниттифор наносят из расчета 10—60 мл на одного человека в зависимости от густоты волос. Голову повязывают косынкой. Через 40 мин после обработки препарат смывают теплой проточной водой с мылом или шампунем. После мытья волосы расчесывают частым гребнем для удаления погибших насекомых.

Форма выпуска. Во флаконах темного стекла по 60 мл.

Условия хранения. Список Б В сухом прохладном месте, вдали от огня.

Срок годности 2 года.

Поставляется из Венгрии.

НОВИКОВА ЖИДКОСТЬ (Liquor Novicovi). Состав: танина 1 г, бриллиантового зеленого 0,2 г, спирта этилового 96% 0,2 г, масла касторового 0,5 г, коллодия 20 г

Фармакологическое действие. Антисептическое средство

Показания к применению. Мелкие кожные повреждения

Способ применения. Наружно, наносят на мелкие кожные повреждения.

Противопоказания. Обильные кровотечения, инфицированные ранения.

Форма выпуска. Во флаконах по 20 мл.

Условия хранения. В сосуде с притертой пробкой, вдали от огня

Срок годности 1 год.

НОВОИМАНИН (Novoimaninum). Антибактериальный препарат, получаемый из растения зверобой продырявленный (Hypericum perforatum L.).

Фармакологическое действие. Активен в отношении грамположительных бактерий, в том числе стафилококков, устойчивых к пенициллину. Обладает способностью подсушивать раневую поверхность и стимулировать регенерацию тканей.

Показания к применению. Абсцессы, флегмоны, инфицированные раны, ожоги II и III степени, язвы, пиодермии, маститы, риниты, фарингиты, гаймориты.

Способ применения и дозы. Наружно в виде раствора для влажных повязок, промываний полостей, электрофореза ингаляций и капель (в ухо и нос)

Спиртовой раствор перед употреблением разводится по показаниям 1:5, 1·10, 1:25, 1:50, 1:100 (желательно ex tempore) стерильной дистиллированной водой, стерильным 10% раствором глюкозы или стерильным 0,25% раствором анестезина

Форма выпуска. 1% спиртовой раствор по 15 мл.

Условия хранения. Список Б. В прохладном месте при температуре не выше 10°С.

Срок годности 2 года

НОВОКАИН (Novocainum). β-Диэтилового эфира парааминобензойной кислоты гидрохлорид. Синонимы: Procaini hydrochloridum, Aminocaine, Citocain, Pancain, Syntocain.

Фармакологическое действие. Местноанестезирующее средство.

Отредактировал: ledi24

Показания к применению. Инфильтрационная, проводниковая, эпидуральная и спинномозговая анестезия, вагосимпатическая и паранефральная блокада; для потенцирования действия основных наркотических средств при общей анестезии; для купирования боли при язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки, при трещинах заднего прохода, геморрое и др

Способ применения и дозы. При инфильтрационной анестезии высшие дозы в начале операции не более 500 мл 0,25% раствора или 150 мл 0,5% раствора, далее на каждый час до 1000 мл 0,25% раствора или 400 мл 0,5% раствора в течение каждого часа. Для проводниковой анестезии применяют 1 2% растворы, или перидуральной 20—25 мл 2% раствора, для спинномозговой 2—3 мл 5% раствора, при паранефральной блокаде 50—80 мл 50% раствора, при вагосимпатической блокаде 30—100 мл 0,25% раствора, как местноанестезирующее и спазмолитическое средство препарат применяют в суппозиториях по 0,1 г

Побочное действие. Головокружение, слабость, гипотония, аллергия.

Противопоказания. Индивидуальная непереносимость.

Форма выпуска. Порошок; ампулы по 2 мл 0,5%, 1% и 2% раствора в упаковке по 10 штук, ампулы по 5 мл 0,5% и 2% раствора в упаковке по 10 штук; ампулы по 10 мл 0,5%, 1% и 2% раствора в упаковке по 10 штук; ампулы по 1 мл 2% раствора в упаковке по 10 штук; по 400 мл 0,25% и 0,5% раствора, суппозитории ректальные, содержащие 0,1 г новокаина, в упаковке по 10 штук.

Условия хранения. Список Б. Порошок в хорошо укупоренной темной таре, ампулы и суппозитории в прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности. Порошок 8 лет, растворы для инъекций 3 года, суппозитории 2 года.

НОВОКАИНАМИД (Novocainamidum). β-Диэтиламиноэтиламида парааминобензойной кислоты гидрохлорид Синонимы: Amidoprocain, Cardiorytmin, Procardyl, Procainamidi hydrochloride.

Фармакологическое действие. Понижает возбудимость мышц сердца, подавляет эктопические очаги возбуждения, а также обладает местноанестезирующим свойством.

Показания к применению. Нарушения сердечного ритма (экстрасистолия, пароксизмальная тахикардия, пароксизмы мерцания предсердий и др.)

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,5—1 г 3—4 раза в сутки; внутримышечно 5—10 мл 10% раствора, внутривенно (капельно) для купирования острых приступов 2—10 мл 10% раствора в 5% растворе глюкозы или растворе натрия хлорида

Побочное действие. Коллаптоидные реакции, общая слабость, головная боль, тошнота, бессонница.

Противопоказания. Выраженная сердечная недостаточность, нарушение проводимости, повышенная чувствительность к препарату

Форма выпуска. Таблетки по 0,25 г, в упаковке 20 штук; ампулы по 5 мл 10% раствора, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности. Ампулы 5 лет, таблетки 3 года.

«НОВОМИГРОФЕН» («Novomigrophenum»). Состав: амидопирина 0,2 г, фенацетина 0,1 г, кофеина 0,015 г, лимонной кислоты 0,015 г, наполнителей не более 15%

Применение. В качестве анальгезирующего средства при головной

Отредактировал: ledi24

боли, невралгии, как жаропонижающее при простудных заболеваниях по 1 таблетке 2—3 раза в день.

Форма выпуска. Таблетки в упаковке по 6 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте

Срок годности 2 года.

НОЗЕПАМ (Nozepamum). 7 Хлор-2,3 дигидро-3 окси-5 фенил-1Н-1,4-бензодиазепин-2-ОН Синонимы: Tazepam, Oxazepam, Adumbran, Serenal и др.

Фармакологическое действие. Транквилизатор бензодиазепинового ряда. Оказывает успокаивающее действие на центральную нервную систему.

Показания к применению. Неврозы, психопатия, неврозоподобные и психопатоподобные расстройства, сопровождающиеся страхом, тревогой, потенцирует действие алкоголя и снотворных препаратов. Может понижать тонус мышц и обладает противосудорожной активностью.

Способ применения и дозы. Внутрь после еды. Начальная доза 0,005—0,01 г, средняя разовая доза 0,02—0,03 г 3—4 раза в день, суточная доза в пределах 0,03—0,09 г.

Побочное действие. Сухость во рту, сонливость, вялость, мышечная слабость, расстройство аккомодации, возможны аллергические реакции и диспептические явления.

Противопоказания. Острые заболевания печени и почек, миастения

Форма выпуска. Таблетки по 0,01 г в упаковке 50 штук

Препарат под названием «Тазепам» («Tazepam») в таблетках по 0,01 г, в упаковке 50 штук поступает из Польши.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности нозепама 2 года, тазепама 3 года

НОЛИЦИН (Nolicin). Уроантисептик сильного бактерицидного действия группы хинолонов.

Фармакологическое действие. Новый синтетический пероральный уроантисептик, обладающий расширенным и частично системным спектром действия. Принадлежит к препаратам хинолиновой группы и аналогичен налидиксиновой, оксолиновой и пипемидиновой кислотам. Активен в отношении большинства грамотрицательных бактерий, а также в отношении некоторых грамположительных микроорганизмов.

Показания к применению. Острые и хронические инфекции мочевых путей.

Способ применения и дозы. Обычная суточная дозировка составляет 1 таблетку по 400 мг два раза в день. Максимальная суточная дозировка —1500 мг.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к препаратам хинолиновой группы, печеночная недостаточность. Нолицин не следует принимать кормящим матерям и в течение первых 3 месяцев беременности.

Форма выпуска. Таблетки по 400 мг в упаковке по 20 штук

Срок годности 5 лет

Поставляется фирмой «КРКА», Словения

НОНАХЛАЗИН (Nonachlazinum). 2-Хлор-10[3-[1,4-Диазабицикло-(4,3,0)-нонанил-4]-пропионил]-2-фенотиазина дигидрохлорид.

Фармакологическое действие. Увеличивает кровоток и улучшает кровоснабжение сердца, а также обладает спазмолитическими свойствами, устраняя спазмы мускулатуры кишечника

Отредактировал: ledi24

Показания к применению. Ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда с постинфарктной стенокардией.

Способ применения и дозы. Внутрь за час до еды по 0,03 г 3—4 раза в день, суточная доза может быть увеличена до 0,18—0,24 г. Курс лечения 3—4 нед.

Противопоказания. Выраженные нарушения функции печени и почек, одновременное сочетание с β-адреноблокаторами.

Форма выпуска. Таблетки, покрытые оболочкой, по 0,03 г, в упаковке 100 штук.

Условия хранения. Список Б. В сухом прохладном, защищенном от света месте

Срок годности 3 года.

НОН-ОВЛОН (Non-Ovlon). Состав 1 драже: норэтистерона ацетат 0,001 г, этинилэстрадиол 0,00005 г

Фармакологическое действие. Оказывает угнетающее влияние на гонадотропную функцию гипофиза (норэтистерона ацетат уменьшает выделение лютеинизирующего гормона, а этинилэстрадиол — фолликулостимулирующего), что тормозит овуляцию.

Показания к применению. В качестве противозачаточного средства, а также при дисфункциональных маточных кровотечениях, функциональном бесплодии, недоразвитии матки.

Способ применения и дозы. Как контрацептивное средство назначают внутрь по 1 драже ежедневно в течение 21 дня, начиная с 5-го дня менструального цикла. Препарат целесообразно принимать вечером после еды (желательно в один и тот же час)

Побочное действие. В начале лечения возможны тошнота, увеличение массы тела, нагрубание молочных желез.

Противопоказания. Беременность, угрожающий аборт, опухоли, наклонность к тромбоэмболиям, отосклероз, цирроз печени, гепатит

Форма выпуска. Драже, в упаковке 21 штука.

Условия хранения. Список Б. В сухом месте.

Срок годности 3 года.

Поставляется из Германии.

НОРАДРЕНАЛИНА ГИДРОТАРТРАТ (Noradrenalini hydrotartras). 1-1-(3,4-Диоксифенил)-2-аминоэтанола гидротартрат. Синонимы Arterenol, Norexadrine.

Фармакологическое действие. Стимулирует преимущественно α-адренорецепторы. По сравнению с адреналином оказывает более сильное вазопрессорное действие, в меньшей степени стимулирует сокращение сердца; оказывает слабое бронхолитическое влияние.

Показания к применению. Острое падение АД при травмах, хирургических вмешательствах, отравлениях, кардиогенном шоке средней тяжести, иногда при внутренних кровотечениях и др.

Способ применения и дозы. Внутривенно (капельно) 2—4 мг препарата (1 2 мл 0,2% раствора) в 500 мл 5% раствора глюкозы (под контролем АД)

Побочное действие. При быстром введении тошнота, головная боль, озноб, сердцебиение, при попадании под кожу некрозы (поэтому необходим постоянный контроль положения иглы в вене)

Противопоказания. При фторотановом наркозе. Необходима осторожность при выраженном атеросклерозе, недостаточности кровообращения, полной атриовентрикулярной блокаде.

Форма выпуска. По 1 мл 0,2% раствора, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б В защищенном от света месте.

Срок годности 2 года

Отредактировал: ledi24

НОРАКИН (Norakin). 1-Фенил-1 [бицикло-(2,2,2)-гептен-2-ил-5]-3-(N-пиперидино)-пропанола-1 гидрохлорид. Синонимы: Akineton, Biperiden.

Фармакологическое действие. Оказывает корригирующее действие при паркинсонизме и треморе.

Показания к применению. Паркинсонизм различной этиологии, спастическая кривошея и др., корректор нейролептической терапии.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,001—0,002 г 2—3 раза в день, при необходимости дозу повышают до 0,005—0,01 г/сут.

Побочное действие. Головная боль, головокружение, тошнота.

Противопоказания. Глаукома.

Форма выпуска. Таблетки по 0,002 г, в упаковке 100 штук.

Условия хранения. Список А.

Срок годности 5 лет

Поставляется из Германии

НОРКОЛУТ (Norcolut). Синонимы: Norethisterone, Anovule, Anzolan, Hormoluton.

Фармакологическое действие. Гестагенный гормональный препарат, назначаемый перорально.

Показания к применению. Дисфункциональные маточные кровотечения, предменструальный синдром, расстройства цикла, сопровождаемые укорочением секреторной фазы, кистозная грандулярная гиперплазия эндометрия, эндометриоз, мастодиния, аденомиоз.

Способ применения и дозы. В зависимости от заболевания норколут имеет различные схемы назначения и дозировки. При менструальном синдроме, мастодинии, а также нерегулярных циклах препарат назначают по 1—2 таблетки в сутки от 16-го до 25-го дня цикла.

Допустимо совместное назначение норколута с одним из эстрогенных гормонов.

При дисфункциональных маточных кровотечениях, кистозной грандулярной гиперплазии эндометрия, в том случае если функциональный характер кровотечения подтвержден гистологическим анализом, проведенным в течение первых 6 мес, норколут назначают для прекращения кровотечения на протяжении 6—12 дней по 1—2 таблетки, а для предупреждения рецидивов кровотечения — в той же дозе от 16-го до 25-го дня цикла.

При эндометриозах, аденомиозах препарат назначают в течение 6 мес по 1 таблетке в сутки с 5-го по 25-й день цикла или же по схеме постоянного курса, начиная с $^1/_2$ таблетки в сутки, на 5-й день цикла во избежание маточных кровотечений постепенно с осторожностью повышают дозу на $^1/_2$ таблетки в каждые 2—3 нед в течение 4—6 мес.

Побочное действие. Возможна тошнота, исчезающая самостоятельно в последующие циклы. Иногда возникают отек, аллергические кожные реакции, парестезия, утомляемость, нарушение функции желудочно-кишечного тракта.

Противопоказания не выявлены. Однако тактика назначения препарата должна быть тщательно взвешена, особенно в случае постоянного и длительного применения норколута при гепатите, расстройстве функции печени, склонности к тромбозам, раке молочной железы и половых органов.

Форма выпуска. Таблетки по 0,05 г, в упаковке 20 штук.

Условия хранения. В сухом прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Венгрии.

Отредактировал: ledi24

НОРСУЛЬФАЗОЛ (Norsulfazolum). 2-(пара-Аминобензолсульфамидо)-тиазол. Синонимы: Cibazol, Sulphasol.

Фармакологическое действие. Сульфаниламидный препарат. Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий.

Показания к применению. Пневмония, церебральный менингит, гонорея, стафилококковый и стрептококковый сепсис, дизентерия и др.

Способ применения и дозы. Внутрь. При пневмонии и менингите на первый прием 2 г, затем по 1 г каждые 4—6 ч (курсовая доза 20—30 г); при стафилококковых инфекциях на первый прием 3—4 г, затем по 1 г 4 раза в день в течение 3—6 дней. При лечении дизентерии по 6—4—3 г/сут по специальной схеме. Детям дозы уменьшают соответственно возрасту. Высшие дозы для взрослых внутрь: разовая 2 г, суточная 7 г

Побочное действие. Возможны диспептические явления, аллергические реакции, лейкопения, невриты, нарушение функции почек (кристаллурия).

Противопоказания. Повышенная чувствительность к сульфаниламидным препаратам.

Форма выпуска. Порошок, таблетки в упаковках 10 штук по 0,25 г и по 0,5 г с риской.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности. Порошок 5 лет, таблетки 10 лет.

НОРСУЛЬФАЗОЛ-НАТРИЙ (Norsulfazolum-natrium). Натриевая соль норсульфазола. Синонимы: Norsulfazolum solubile, Sulfathiazolum sodium.

Применение. Обладает свойствами, аналогичными норсульфазолу и применяется в тех же случаях, а также при инфекционных заболеваниях глаз. Вводят внутривенно при необходимости создания в крови высокой концентрации препарата по 10—20 мл 5—10% раствора В офтальмологии применяют 10% раствор по 2 капли 4 раза в день

Побочное действие и противопоказания те же, что и для норсульфазола.

Форма выпуска. Порошок.

Условия хранения. Список Б. В сухом, защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

НОРЭТИСТЕРОН (Norethisteron). В качестве действующего вещества содержит синтетический прогестаген норэтистерона. Синонимы: Norlutate, Norlutin acetate.

Фармакологическое действие. Является синтетическим гестагенным гормональным препаратом, оказывает эффективное действие на эндометрий и тормозит овуляцию.

Показания к применению. Вторичная аменорея, дисфункциональные кровотечения, полименорея с укороченной фазой желтого тела, эндометриоз, рак эндометрия, мастодиния и диффузная мастопатия.

Способ применения и дозы. Применяют перорально. В зависимости от вида заболевания норэтистерон имеет разные схемы применения. При вторичной аменорее назначают по 5 мг препарата в течение 2 последующих дней. При дисфункциональных кровотечениях — в течение 10 дней ежедневно по 5 мг норэтистерона + 0,05 мг местранола; при эндометриозе — начиная с 5-го дня цикла ежедневно по 10 мг препарата в течение нескольких месяцев.

Противопоказания. Беременность, нарушение функции печени.

Форма выпуска. Упаковка, содержащая 21 драже по 0,5 мг

Условия хранения. Обычные. Список Б.

Отредактировал: ledi24

Срок годности 5 лет.
Поставляется из Германии.

НО-ШПА (No-spa). 6,7,3′,4′-Тетраэтокси-1-бензал-1,2,3,4-тетрагидроизохинолина гидрохлорид. Синоним: Drotaverium.

Фармакологическое действие. Оказывает выраженное спазмолитическое действие.

Показания к применению. Спазм желудка и кишечника, спазматические запоры, приступы желчно- и мочекаменной болезни, стенокардия.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,04—0,08 г 2—3 раза в день; внутривенно (медленно) 2—4 мл 2% раствора, при необходимости внутриартериально (облитерирующий эндартериит).

Побочное действие. Головокружение, сердцебиение, потливость, чувство жара, аллергический дерматит

Форма выпуска. Таблетки по 0,04 г, в упаковке 100 штук, ампулы емкостью 2 мл, содержащие 0,04 г препарата, в упаковке 50 штук.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности 5 лет.
Поставляется из Венгрии.

НОФЕЛАН (Nofelan). Ферментативный гидролизат белка со значительно пониженным содержанием фенилаланина, изготовляемый из белков коровьего молока, содержащий соответствующее количество всех аминокислот, необходимых для питания больных фенилкетонурией. Обогащен витаминами и минеральными солями.

Показания к применению. Применяют исключительно для лечения детей, больных фенилкетонурией в возрасте старше 1 года. Лечение проводят под постоянным контролем уровня фенилаланина в крови. Диету, назначаемую на базе нофелана, содержащую малое количество фенилаланина, следует пополнять углеводами и жирами в количествах, соответствующих потребностям здорового ребенка.

Способ применения и дозы. Суточную дозу дают в 2—3 приема. Дозу рассчитывают индивидуально по содержанию в крови фенилаланина.

Побочное действие. Рвота, тошнота и нежелание принимать нофелан, в исключительных случаях, особенно у детей старшего возраста, непереносимость препарата.

Противопоказания. Нофелан не назначают детям в возрасте до 1 года из-за отсутствия жиров и углеводов. Препарат не применяют при других заболеваниях, кроме фенилкетонурии.

Форма выпуска. Порошок. Упаковка 400 г

Условия хранения. В сухом месте при комнатной температуре.

Срок годности 3 года.
Поставляется из Польши

«ОБЛЕКОЛ» («Oblecolum»). Коллагеновая пленка с облепиховым маслом. В 1 г пленки содержится 0,01 г (1%) облепихового масла.

Фармакологическое действие. Оказывает ранозаживляющее действие (стимулирует репаративные процессы в ране, способствует оздоровлению и росту грануляций, ускоряет эпителизацию).

Показания к применению. Применяют для лечения различных ран: скальпированных, послеоперационных, поверхностных ожоговых ран II и III степени (при подготовке их к дерматопластике), ссадин, трофических язв.

Способ применения и дозы. Наружно. После санации раны накладывают облекол. Препарат стерильно извлекают из полиэтиленового пакета, вырезают пленку по размеру раневой поверхности, пинцетом помещают ее на 10—20 с в изотонический раствор натрия хлорида или

Отредактировал: ledi24

раствор фурацилина и накладывают на раневую поверхность, плотно прижимая ее ко дну раны. Поверх пленки накладывают обычную асептическую повязку. Смену повязки проводят через 2—3 дня. В зависимости от характера и степени тяжести раневого процесса на курс лечения требуется от 3 до 15 аппликаций.

Побочное действие. В первые часы наложения пленки возможны ощущения боли и жжение раны.

Противопоказания. Профузное кровотечение и обильное гнойное отделяемое из раны.

Форма выпуска. Пленки стерильные, упакованные в полиэтиленовые пакеты по 10 штук размером 5·5 см и 10·10 см.

Условия хранения. В сухом прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

ОБЛЕПИХОВОЕ МАСЛО (Oleum Hippopheae). Получают из плодовой мякоти облепихи. Содержит смесь каротинов и каротиноидов (180 мг%), токоферолы (110 мг%) и глицериды олеиновой, линолевой, пальмитиновой и стеариновой жирных кислот.

Применение. Наружно при ожогах, пролежнях, лучевых поражениях кожи, кольпитах (курс лечения 10—15 процедур), эндоцервицитах и эрозиях шейки матки (курс лечения 8—12 процедур) Внутрь назначают при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, поражениях пищевода.

Форма выпуска. Во флаконах темного стекла по 100 мл.

Условия хранения. В сухом прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности $1^1/_2$ года

«ОВИДОН» (Ovydon). Этинилэстрадиол.

Фармакологическое действие. Противозачаточное средство для перорального применения.

Показания к применению. В качестве противозачаточного средства.

Способ применения и дозы. Как контрацептивное средство назначают внутрь по 1 драже ежедневно в течение 21 дня, начиная с 5-го дня менструального цикла. Препарат целесообразно принимать вечером после еды (желательно в один и тот же час)

Побочное действие. В начале лечения возможны тошнота, увеличение массы тела, нагрубание молочных желез.

Противопоказания. Опухоли, наклонность к тромбоэмболиям, отосклероз, цирроз печени, гепатит.

Форма выпуска. Таблетки, в упаковке 21 штука.

Условия хранения. Список Б. В сухом месте.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Венгрии.

ОДУВАНЧИКА КОРЕНЬ (Radix Taraxaci). Содержит горький гликозид (тараксацин), смолы, инулин (до 40%) и другие вещества.

Применение. Как горечь для возбуждения аппетита, как желчегонное при запорах в виде настоя (1 чайная ложка на стакан кипятка) по $^1/_4$ стакана за 30 мин до еды 3—4 раза в день.

Форма выпуска. Корень одуванчика цельный и резаный.

Условия хранения. В сухом прохладном месте.

Срок годности 5 лет

ОКСАЗИЛ (Oxazylum). N-Био (2-диэтиламиноэтил)-оксамидабис-(о-хлорбензил-хлорид) Синонимы: Ambenonii chloridum, Mysuran chloride.

Отредактировал: ledi24

Фармакологическое действие. Антихолинэстеразное средство.

Показания к применению. Миастения, парезы и параличи после травм, менингита и энцефалита; восстановительный период после полиомиелита, боковой амиотрофический склероз; периферический паралич лицевого нерва.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,001—0,01 г после еды 2—4 раза в день. Высшая разовая доза 0,025 г; суточная 0,05 г.

Побочное действие. Гиперсаливация, обильное потоотделение, диспептические явления, частое мочеиспускание, нарушение зрения, головная боль, головокружение, подергивание мышц языка и скелетной мускулатуры.

Противопоказания те же, что и для прозерина.

Форма выпуска. Таблетки по 0,005 г, в упаковке 50 штук.

Условия хранения. Список А. В защищенном от света месте.

Срок годности 5 лет

ОКСАФЕНАМИД (Oxaphenamidum). пара-Оксафенилсалициламид. Синоним: Driol.

Фармакологическое действие. Усиливает образование и выделение желчи, уменьшает спазмы желчных путей; понижает содержание холестерина в крови.

Показания к применению. Как желчегонное средство при хронических холециститах, холангитах, желчнокаменной болезни и др.

Способ применения и дозы. Внутрь до еды по 0,25—0,5 г 3 раза в день в течение 15—20 дней; при необходимости курс лечения продлевают и повторяют

Побочное действие. Иногда послабляющее действие.

Форма выпуска. Таблетки по 0,25 г, в упаковке 50 штук.

Условия хранения. В защищенном от света месте

Срок годности 4 года.

ОКСАЦИЛЛИНА НАТРИЕВАЯ СОЛЬ (Oxacillinum-natrium). Моногидрат натриевой соли 3-фенил-5-метил-4-изоксазолилпенициллина. Синонимы: Cryptocillin, Resistopen.

Фармакологическое действие. Эффективен в отношении пенициллиназообразующих микроорганизмов, устойчивых к бензилпенициллину и феноксиметилпенициллину. Сохраняет активность в кислой среде желудка. Хорошо всасывается из желудочно-кишечного тракта. Выделяется в больших количествах почками. Не обладает кумулятивным свойством. Малотоксичен.

Показания к применению. Инфекции, вызванные пенициллиназообразующими стафилококками, устойчивыми к бензилпенициллину и феноксиметилпенициллину (септицемия, пневмония, эмпиема, абсцессы, флегмоны, холецистит, пиелит, цистит, остеомиелит, послеоперационные раневые инфекции, инфицированные ожоги и др.)

Способ применения и дозы. Внутрь назначают новорожденным и недоношенным детям в суточной дозе 90—150 мг/кг, детям в возрасте до 3 мес 200 мг/кг, от 3 мес до 2 лет 1 г, от 2 до 6 лет 2 г; детям старше 6 лет и взрослым по 0,25—0,5 г (до 1 г) 4—6 раз в сутки за 1 ч до еды или через 2—3 ч после еды. Средняя суточная доза 3 г. При тяжелых инфекциях дозы увеличивают до 6—8 г/сут.

Внутримышечно вводят в сутки новорожденным и недоношенным детям 20—40 мг/кг, детям в возрасте до 3 мес 60—80 мг/кг, от 3 мес до 2 лет 1 г, от 2 до 6 лет 2 г, старше 6 лет и взрослым 2—4 г

Побочное действие. Аллергические реакции; при приеме внутрь нарушения желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота, понос).

Противопоказания. Повышенная индивидуальная чувствитель-

Отредактировал: ledi24

ность к препаратам группы пенициллина и аллергические заболевания.

Форма выпуска. Таблетки по 0,25 г, в упаковке 20 штук; капсулы по 0,25 г, в упаковке 10 штук; во флаконах по 0,25 г и 0,5 г в комплекте с растворителем 2 мл (1:1)

Условия хранения. Список Б. В сухом месте при комнатной температуре.

Срок годности. Ампулы 2 года; таблетки и капсулы 3 года.

ОКСИДЕВИТ (Oxidevitum). 9,10-Секохолестатриен-5Z, 7E,10 (19)-диол-1α, 3β. Синонимы: 1β-оксихолекальциферол; 1α-оксивитамин D_3; 1α-кальцидиол; 1αOHD_3.

Фармакологическое действие. Является синтетическим аналогом 1α, 25-диоксивитамина D_3 — метаболита витамина D_3, образующегося в почках и осуществляющего основные функции витамина D в организме.

Оксидевит регулирует обмен кальция и фосфора, стимулирует всасывание кальция и фосфора в кишечнике, их реабсорбцию в почках. Обладает антирахитической активностью более высокой, чем у витамина D.

Нормализует фосфорно-кальциевый обмен.

Подобно витамину D, оксидевит в дозах, превышающих физиологическую потребность, может оказывать токсическое действие. Препарат токсичнее витамина D, однако в отличие от него не кумулирует в организме, а подвергается быстрому катаболизму и выведению, поэтому при прекращении поступления препарата гиперкальциемия обычно проходит самостоятельно.

Показания к применению. Применяют при заболеваниях и состояниях, сопровождающихся различными остеопатиями и требующих коррекции фосфорно-кальциевого обмена. Назначают при рахите и рахитоподобных заболеваниях: витамин D-резистентном рахите, почечно-тубулярном ацидозе, болезни Дебре — де Тони — Фанкони, витамин D-зависимом рахите, а также при несовершенном костеобразовании.

Оксидевит показан при заболеваниях почек, сопровождающихся нарушением метаболизма витамина D и минерального обмена, при хронической почечной недостаточности в терминальной стадии, находящимся на лечении гемодиализом с целью предупреждения ренальной остеодистрофии.

Назначают также с профилактической целью больным после трансплантации почки. Показан при костной патологии (остеопороз и остеомаляция) различного генеза: климактерический, инволюционный и ювенильный остеопороз, стероидные остеопатии; послеоперационная гиперпаратиреоидная остеодистрофия, гипокальциемия при гипопаратиреозе и псевдогипопаратиреозе, тиреотоксикозе, а также при остеопорозах, связанных с нарушением всасывания в кишечнике.

Способ применения и дозы. Применяют внутрь независимо от приема пищи.

Детям при рахитоподобных заболеваниях назначают 0,0005—0,003 мг/сут в зависимости от возраста и массы тела в течение 2—3 мес, иногда до 1 года.

При рахите применяют по 0,001 мг/сут ежедневно в течение 10 дней. Проводят 3 курса с перерывом между ними 2 нед.

При хронической почечной недостаточности (ХПН) детям, находящимся на лечении гемодиализом, с целью купирования остео-

Отредактировал: ledi24

дистрофии назначают по 0,001 мг/сут с одновременным применением витамина D_2 по 2000 МЕ ежедневно в течение длительного времени

Взрослым при ХПН, находящимся на гемодиализе, назначают 0,001—0,002 мг/сут ежедневно или через день с последующим снижением дозы до 0,0005 мг в зависимости от нормализации содержания кальция в крови и активности щелочной фосфатазы.

Курсы по 2—3 мес рекомендуется повторять 2—3 раза в году

При ХПН требуется предварительная коррекция гиперфосфатемии.

Больным после трансплантации почек с профилактической целью назначают по 0,00025—0,001 мг/сут ежедневно или через день

При костной патологии (остеопороз, остеомаляция) различного генеза препарата применяют по 0,0005—0,003 мг/сут в течение длительного времени (от 2—3 мес до 1 года и более)

Терапию оксидевитом необходимо проводить под постоянным контролем содержания кальция и фосфора в крови, а также активности щелочной фосфатазы (при ХПН еженедельный контроль)

Побочное действие. Возможна аллергическая реакция, а при передозировке гиперкальциемия, которая обычно проходит через 2—3 дня после отмены препарата. Повторно препарат назначают в меньших дозах.

Противопоказания. Гиперкальциурия (уролитиаз)

Форма выпуска. Капсулы по 0,001 мг (темно-желтого цвета) по 50 штук в упаковке, 0,0005 мг (коричневого цвета) по 50 штук в упаковке и 0,00025 мг (красного цвета) по 50 штук в упаковке

Условия хранения. В сухом, защищенном от света месте при температуре +10°С

Срок годности 2 года

ОКСИКОБАЛАМИН (Oxycobalaminum). Со α[α-5,6 диметил бензимидазолил)]-Coβ-оксикобамида гидрохлорид.

Фармакологическое действие. Являясь метаболитом цианокобаламина (витамина B_{12}), он участвует в обмене углеводов, белков и липидов, в синтезе лабильных метильных групп, в образовании холина, метионина, креатина, нуклеиновых кислот, восстановлении сульфгидрильных соединений в эритроцитах. Стимулирует функцию костного мозга и нормализует кроветворение.

Показания к применению. Хронические анемии, протекающие с дефицитом витамина B_{12} (независимо от причин), неврологические заболевания (полиневриты, радикулиты, боковой амиотрофический склероз и рассеянный склероз), при комплексной терапии больных сахарным диабетом с диабетической периферической нефропатией, при некоторых кожных заболеваниях (псориаз и др.)

Способ применения и дозы. Внутримышечно или подкожно. При неврологических заболеваниях вводят в суточной дозе 0,0002 г (200 мкг) — 0,0005 г (500 мкг) ежедневно 10—20 дней; в комплексной терапии кожных заболеваний в суточной дозе 0,0002 г (200 мкг) ежедневно 15—20 дней, в тяжелых случаях — 0,0005 г (500 мкг) через день 10 дней. При B_{12}-дефицитных анемиях по 0,0001 г (100 мкг) ежедневно или через день 20—25 дней.

Длительность лечения и назначение повторных курсов зависят от характера заболевания и эффективности лечения.

Побочное действие. Возможны аллергические реакции

Противопоказания. Эритремия и эритроцитоз, доброкачественные и злокачественные новообразования, за исключением случаев,

Отредактировал: ledi24

сопровождающихся мегалобластической анемией и дефицитом витамина B_{12}.

Форма выпуска. Ампулы по 1 мл 0,005% раствора, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. В защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

ОКСИЛИДИН (Oxylidinum). 3-Бензоил-оксихинуклидина гидрохлорид. Синоним: Benzoclidini hydrochloridum.

Фармакологическое действие. Дает седативный и гипотензивный эффект, усиливает действие снотворных, наркотических, аналгезирующих и местноанестезирующих средств.

Показания к применению. Нерезко выраженные депрессии различного генеза, психопатии и психоподобные состояния, невротические и неврозоподобные расстройства с повышенной возбудимостью, психической напряженностью, нарушением сна, психические расстройства на фоне органической недостаточности центральной нервной системы различной этиологии, при гипертонической болезни с церебральными нарушениями.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,02—0,06 г на прием до 0,2—0,3 г/сут; внутримышечно по 1 мл 2% раствора 2 раза в день, при необходимости дозу увеличивают до 4—6 мл 5% раствора в сутки.

Побочное действие. При повышенной чувствительности к препарату возможны сухость во рту, тошнота, жажда, полиурия, ощущение легкого опьянения, кожные высыпания.

Противопоказания. Выраженная гипотония, заболевания почек с нарушением функции.

Форма выпуска. По 0,02 г, в упаковках 100 таблеток и ампулы по 1 мл, в упаковке 10 штук 2% раствора и 5% раствора.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности. Ампулы 2 года, таблетки 5 лет.

ОКСИПРОГЕСТЕРОНА КАПРОНАТ (Oxyprogesteroni caproas). Прегнен-4-ол-17α-дион-3,20-капронат. Синонимы: Primolut — Depot, Progestero — retard.

Фармакологическое действие. Синтетический аналог прогестерона: обладает такими же биологическими свойствами.

Показания к применению. Привычный и угрожающий выкидыш; предупреждение выкидыша при оперативном вмешательстве во время беременности; аменорея и полименорея.

Способ применения и дозы. Внутримышечно 0,5—2 мл 12,5% масляного раствора 1 раз в неделю.

Побочное действие. Тахикардия при длительном применении больших доз.

Форма выпуска. Ампулы по 1 мл 12,5% масляного раствора, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 5 лет

ОКСИТОЦИН (Oxytocin). Полипептидный гормон задней доли гипофиза.

Фармакологическое действие. Вызывает сильные сокращения мускулатуры матки (особенно беременной).

Показания к применению. Для стимулирования родовой деятельности, при гипотонических маточных кровотечениях в послеродовом периоде.

Способ применения и дозы. Внутривенно капельно по 1 мл в 500 мл

Отредактировал: ledi24

5% раствора глюкозы; при слабой родовой деятельности и затяжных родах внутримышечно или в шейку матки 0,5—1 мл.

Побочное действие. Возможны резкие схватки с развитием внутриматочной гипоксии.

Противопоказания. Угрожающий разрыв матки; поперечное и косое положение плода, несоответствие величины головки плода размерам таза.

Форма выпуска. Ампулы по 1 мл (5 ЕД), в упаковке 5 штук.

Условия хранения. Список Б. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

Поставляется из Венгрии.

ОКСИФЕРРИСКОРБОН НАТРИЯ (Oxyferriscorbone sodique). Состав: комплекса фери-феро-2,3-дицето-L-гулоната натрия 15 мг, комплекса железа с алоксанатом натрия 15 мг.

Фармакологическое действие. Оказывает противовоспалительное и аналгезирующее действие.

Показания к применению. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, пептическая язва тонких кишок и пищевода.

Способ применения и дозы. Внутримышечно по 30—60 мг в течение 15—20 дней.

Форма выпуска. Порошок для инъекций по 0,03 г во флаконе.

Срок годности 3 года.

ОКСИЦЕЛОДЕКС (Oxycelodexum). Кровоостанавливающий пломбировочный материал, состоящий из порошка окисленной целлюлозы, полиглюкина и воды.

Показания к применению. Кровотечения из мелких кровеносных сосудов при чрескожной пункционной биопсии печени и чрескожной чреспеченочной гепатохолангиографии, а также кровотечения после экстракции зубов.

Способ применения и дозы. Оксицелодекс готовят непосредственно перед применением. Строго соблюдая правила асептики, полиглюкин с помощью шприца вливают во флакон с порошком окисленной целлюлозы и энергично встряхивают в течение 3—5 мин до получения однородной пастообразной массы. Чтобы избежать комкообразования или прилипания порошка ко дну флакона, следует в момент введения полиглюкина флакон с порошком держать в наклонном положении. Затем препарат переносят шпателем в шприц для пункционной биопсии и вводят в пункционный канал.

При кровотечении после экстракции зубов оксицелодекс шпателем помещают в зубную ямку и прижимают марлевой салфеткой. Как правило, препарат применяют однократно.

Количество оксицелодекса, получаемого из одной упаковки, достаточно для применения 1—2 больным. Препарат не раздражает окружающие ткани и не вызывает токсических явлений.

Форма выпуска. Флаконы по 2,5 г порошка окисленной целлюлозы и ампулы по 10 мл 20% раствора полиглюкина.

Условия хранения. В сухом, защищенном от света месте при температуре от —10 до +5°С.

Срок годности 2 года.

«ОКСИЦИКЛОЗОЛЬ» («Oxycyclosolum»). Состав: окситетрациклина гидрохлорида 0,3 г, преднизона 0,1 г, пентола 3 г, пропеллента 70 г

Фармакологическое действие. Оказывает противовоспалительное, антиаллергическое и антимикробное действие.

Отредактировал: ledi24

Показания к применению. Ожоги и инфицированные раны, размер которых не превышает 15—20 см².

Способ применения. Наносят на пораженные кожные покровы ежедневно или 2—3 раза в неделю.

Противопоказания. Обширные гранулирующие раны, повышенная чувствительность к тетрациклинам, грибковые поражения кожи.

Форма выпуска. Аэрозоль в баллоне емкостью 70 г.

В Польше производится оксикорт аэрозоль. Содержит окситетрациклина гидрохлорида 0,3 г, гидрокортизона 0,1 г и растворителя до 75 г.

Условия хранения. В защищенном от света месте при комнатной температуре.

Срок годности 1 год.

ОКСОДОЛИН (Oxodolinum). 1-Оксо-3-(3′-сульфамоил 4′-хлорфенил)-3-оксиизоиндолин. Синонимы: Hygroton, Chlortalidon.

Фармакологическое действие. Диуретическое (салуретическое) средство пролонгированного действия с умеренным натрийуретическим эффектом. Оказывает также гипотензивное действие. Относится к группе сульфаниламидов. Диуретический эффект начинается через 4—6 ч и длится более суток.

Показания к применению. Взрослым в качестве диуретического (салуретического) средства при застойных явлениях в малом и большом круге кровообращения; циррозе печени с портальной гипертензией, нефрозах и нефритах (за исключением тяжелых прогрессирующих форм с уменьшением скорости клубочковой фильтрации), токсикозе беременных (нефропатия, отеки, эклампсия); предменструальном синдроме, несахарном мочеизнурении, диспротеинемических отеках, ожирении. Используется при гипертонической болезни и симптоматических гипертониях. Возможна комбинация с другими салуретиками (фуросемид, триамтерен, верошпирон и др.).

Способ применения и дозы. Внутрь обычно утром до еды. Дозы подбирают индивидуально в зависимости от тяжести заболевания и оказываемого эффекта. В качестве диуретического средства разовая доза колеблется от 0,025 до 0,1 г. Возможна комбинация с быстродействующим диуретиком — фуросемидом; при гипертонической болезни и симптоматических гипертониях назначают по 0,025—0,1 г один раз в день (утром), чаще с резерпином. Параллельно целесообразно назначать препараты калия внутрь.

Побочное действие. Высокие дозы могут привести к развитию гипокалиемии, сопровождающейся изменениями на ЭКГ, слабости, головокружения, головной боли, тошноты. Возможны диспептические явления, у больных диабетом повышение уровня сахара в крови, гиперурикемия с клиническими признаками подагры.

В процессе лечения оксодолином необходим контроль за уровнем мочеотделения, электролитным составом крови, АД.

Противопоказания. Гипокалиемия, тяжелые формы нефрозов и нефритов, острая почечная недостаточность с анурией, печеночная кома, острый гепатит, тяжелые формы сахарного диабета и подагры.

Форма выпуска. Таблетки по 0,05 г, в упаковке 50 штук.

Условия хранения. Список Б. В сухом прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

ОКСОЛИНОВАЯ МАЗЬ (Unguentum Oxolini). 1,2,3,4-Тетрагидро-1,2,3,4-тетраоксинафталина дигидрат.

Фармакологическое действие. Действующим веществом мази

Отредактировал: ledi24

является оксолин, обладающий антивирусной активностью в отношении вируса гриппа и вируса герпеса простого.

Показания к применению. Вирусные заболевания глаз, кожи, вирусные риниты. С профилактической целью применяется при гриппе. Для лечения пузырькового и опоясывающего лишая, бородавок, контагиозного моллюска, герпетиформного дерматита Дюринга, чешуйчатого лишая.

Способ применения и дозы. Наружно при лечении аденовирусного кератоконъюнктивита, вирусных кератитов (за веко 0,25% мазь 1—3 раза в день). Для лечения вирусного ринита смазывают слизистую оболочку носа 0,25% мазью 2—3 раза в день в течение 3—4 дней, а для профилактики гриппа 2 раза в день в период подъема и максимального развития эпидемической вспышки гриппа (на протяжении 25 дней) или при контакте с больным гриппом.

При простом, пузырьковом и опоясывающем лишае, контагиозном моллюске и других кожных заболеваниях наносят на поврежденную кожу 3% мазь 2—3 раза в день в течение 2 нед — 2 мес.

Побочное действие. Скоропроходящее чувство жжения.

Форма выпуска. 0,25% мазь в упаковке по 10 г, 3% мазь в упаковке по 30 г.

Срок годности 2 года.

ОКТИЦИЛ (Octicylum). 2-Октилциклопропан-карбоновой кислоты.

Фармакологическое действие. Оказывает фунгистатическое и фунгицидное действие.

Показания к применению. Различные формы эпидермофитии и руброфитии, для лечения отрубевидного лишая, эритразмы.

Способ применения и дозы. Наружно. Мазь наносят на пораженный участок кожи 2 раза в день, ежедневно. Курс лечения продолжается 4—8 нед. При дисгидротической форме эпидермофитии вначале устраняют острые воспалительные явления, затем смазывают 1% спиртовым раствором пораженные участки кожи 2 раза в день. На ночь смазывают мазью и накладывают марлевую повязку.

Форма выпуска. 1% спиртовой раствор по 200 мл во флаконе, 1% мазь по 50 г в банках или тубах.

Условия хранения. Мазь в обычных условиях, раствор в прохладном месте.

Срок годности. Раствор 3 года, мазь 2 года.

ОЛЕАНДОМИЦИНА ФОСФАТ (Oleandomycini phosphas). Получен из культуральной жидкости штамма Streptomyces antibioticus. Синонимы: Amimycin, Oleandocyn.

Фармакологическое действие. По спектру действия подобен эритромицину. Активен в отношении грамположительных микроорганизмов, особенно стафилококков, стрептококков и пневмококков.

Хорошо всасывается в кровь, легко диффундирует в органы и биологические жидкости организма. Не обладает кумулятивным свойством. Малотоксичен.

Показания к применению. Пневмония, скарлатина, дифтерия, ангина, сепсис, тонзиллит, ларингит, флегмоны, гнойный холецистит, остеомиелит, стафилококковый, стрептококковый и пневмококковый сепсис и другие заболевания, вызванные чувствительными к нему микроорганизмами.

Способ применения и дозы. Внутрь после еды по 0,25—0,5 г/сут в 4—6 приемов. Высшая суточная доза для взрослых 2 г. Для детей до 3 лет 0,02 г/кг, от 3 до 6 лет 0,25—0,5 г, от 6 до 14 лет 0,5—1 г, старше 14 лет 1—1,5 г/сут. Курс лечения 5—7 дней.

Отредактировал: ledi24

Побочное действие. Аллергические реакции (кожный зуд, крапивница, ангионевротический отек).

Противопоказания. Повышенная индивидуальная чувствительность к препарату, поражение паренхимы печени.

Форма выпуска. Таблетки, покрытые оболочкой, 0,125 г (125 000 ЕД), в упаковке 25 штук, диски по 15 мкг, в упаковке 100 штук.

Условия хранения. Список Б. В сухом месте при комнатной температуре.

Срок годности 3 года.

ОЛЕТЕТРИН (Oletetrinum). Состав: тетрациклина 2 части, олеандомицина 1 часть. Синонимы: Sigmamycin, Tetraolean.

Фармакологическое действие. Обладает широким спектром антимикробного действия. Один из его компонентов — тетрациклин — действует на грамотрицательные и грамположительные микробы, риккетсии, крупные вирусы и некоторые простейшие, наличие в препарате олеандомицина определяет его активность в отношении ряда грамположительных микроорганизмов.

Не обладает кумулятивным свойством. Хорошо всасывается, быстро создавая терапевтические концентрации в тканях и жидкостях организма. Малотоксичен.

Показания к применению. Очаговая и крупозная пневмония, бронхиты, синуиты, бронхоэктатическая болезнь, отит, различные септические процессы, рожистое воспаление, ангина, гнойный менингит, инфекции мочеполового тракта, гонорея, туляремия, бруцеллез и др.

Способ применения и дозы. Внутрь в течение 5—14 дней по 250 мг 4—6 раз в сутки; детям с массой тела до 10 кг назначают 25 мг/(кг·сут), от 10 до 15 кг — 250 мг/сут, от 15 до 20 кг — 375 мг, от 20 до 30 кг — 500 мг, от 30 до 40 кг — 725 мг, от 40 до 50 кг — 1 г/сут. Внутримышечно по 100 мг 2—3 раза в сутки; детям вводят 10—20 мг/кг в 2 приема. Внутривенно по 500 мг 2 раза в сутки, детям 15—25 мг/кг в 2 приема.

Побочное действие. Тошнота, рвота, стоматит, аллергические сыпи.

Противопоказания. Нарушения функции печени; с осторожностью применять больным с повышенной индивидуальной чувствительностью к тетрациклину и олеандомицину.

Форма выпуска. Таблетки 0,125 г, в упаковке 12 штук, капсулы по 0,25 г, в упаковке 20 штук.

По импорту препарат поступает под названием «Тетраолеан» (сигмамицин) во флаконах для внутримышечных инъекций по 100 мг и для внутривенного введения по 250 мг и 500 мг.

Условия хранения. Список Б. В сухом помещении при температуре не выше 20°С.

Срок годности. Капсулы и таблетки 2 года; тетраолеан для внутримышечных инъекций 2 года, для внутривенных инъекций 3 года.

ОЛИВОМИЦИН (Olivomycinum). Антибиотик, продуцируемый лучистым грибом Actinomyces olivoreticuli. В медицинской практике применяют натриевую соль оливомицина.

Фармакологическое действие. Обладает противоопухолевой активностью. При приеме внутрь плохо всасывается, при введении под кожу и внутримышечно вызывает инфильтраты. Существенного влияния на кроветворение не оказывает.

Показания к применению. Опухоли яичка (семинома, эмбриональный рак, тератобластомы) в стадии генерализации, тонзиллярные

Отредактировал: ledi24

опухоли (лимфоэпителиомы, ретикулосаркомы, рак из клеток переходного эпителия, цитобластомы), ретикулосаркомы с поражением периферических узлов, меланомы в стадии диссеминации.

Способ применения и дозы. Ежедневно или через день. Внутривенно медленно (в течение 2—3 мин) или капельно. Лечение начинают с 0,002 г, при хорошей переносимости дозу постепенно доводят до 0,01 г. На курс (10—20 введений) требуется 0,1—0,2 г оливомицина. Детям вводят по 0,05—0,2 мг/кг. При благоприятных результатах через 3—4 нед курс лечения повторяют.

Побочное действие. Понижение или потеря аппетита, тошнота, рвота, повышение температуры, грибковые поражения слизистой оболочки полости рта.

Противопоказания. Терминальная стадия болезни, резкое истощение, тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы, тромбоцитопения.

Форма выпуска. Порошок по 0,02 г во флаконе.

Условия хранения. Список А. В защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

ОЛИМЕТИН (Olimetinum). Состав одной капсулы: масла мяты перечной 0,0085 г, масла терпентинного очищенного 0,01705 г, масла эфирного аирного 0,0125 г, масла оливкового 0,46025 г, серы очищенной 0,0017 г.

Фармакологическое действие. Оказывает спазмолитическое, желчегонное, а также мочегонное и противовоспалительное действие.

Показания к применению. Почечно- и желчнокаменная болезнь.

Способ применения и дозы. Внутрь после еды по 2 капсулы 3—5 раз в день. С целью профилактики (после отхождения конкрементов) по 1 капсуле в день в течение длительного времени.

Противопоказания. Нарушения мочеотделения, острые и хронические гломерулонефриты, гепатиты, язвенная болезнь желудка.

Форма выпуска. Капсулы по 0,5 г, в упаковке 12 штук.

Условия хранения. В сухом прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

ОЛЬХИ СОПЛОДИЯ (ольховые шишки) (Fructus Alni). Содержат дубильные вещества, составной частью которых являются танин (около 2%) и галловая кислота (до 4%).

Применение. В качестве вяжущего средства при острых и хронических энтеритах и колитах в виде отвара (2 чайные ложки на стакан кипятка) по 1 столовой ложке 3—4 раза в день.

Форма выпуска. В упаковке по 100 г.

Условия хранения. В сухом прохладном месте.

Срок годности 3 года.

ОМНАДРЕН-250 (Omnadren-250). Синоним: Sustanon-250.

Фармакологическое действие. Комбинированный гормональный препарат — смесь разных эфиров тестостерона.

Применение. Мужчинам при недостаточной функции половых желез, женщинам при раке молочной железы. Вводят внутримышечно по 1 мл 1 раз в месяц.

Побочное действие и противопоказания те же, что и для других препаратов тестостерона.

Форма выпуска. Ампулы по 1 мл, в упаковке 5 штук или 1 штука.

Условия хранения. В прохладном месте.

Срок годности 3 года.

Поставляется из Польши.

Отредактировал: ledi24

ОМНОПОН (Omnoponum). Смесь гидрохлоридов алкалоидов опия. Синонимы: Pantopon, Domopon и др.

Фармакологическое действие, показания к применению, побочное действие и противопоказания такие же, как для морфина. Назначают внутрь по 0,01—0,02 г, подкожно по 1 мл 1% или 2% раствора. Детям (старше 2 лет) в зависимости от возраста.

Форма выпуска. Ампулы по 1 мл, в упаковке 10 штук 1% и 2% раствора.

Условия хранения. Список А. В защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

ОПТИМОЛ ГЛАЗНЫЕ КАПЛИ (Optymol). Состав глазных капель: 1 мл содержит 2,5 мг (0,25%) или 5 мг (0,5%) тимололмалеата. Синонимы: Timoptic, Timololmaleat, окупрес-Е.

Фармакологическое действие. Снижает внутриглазное давление, не влияя на размер зрачка или остроту зрения благодаря усилению аккомодации; у больных катарактой устраняет явления, связанные с неспособностью видеть вблизи области помутнения хрусталика, когда сужается зрачок. По сравнению с пилокарпином более эффективен с меньшими побочными реакциями.

Показания к применению. Для снижения повышенного внутриглазного давления при гипертензии, хронической открытоугольной глаукоме, глаукоме афакического глаза, включая больных, пользующихся контактными линзами.

Способ применения и дозы. Вводят в пораженный глаз по 1 капле 0,25% раствора в день. При неадекватной клинической картине вводят по 1 капле 0,5% раствора 2 раза в день.

Побочное действие. Обычно переносится хорошо; возможны слабое раздражение глаза, незначительное урежение частоты сердечных сокращений в покое; местные реакции гиперчувствительности.

Противопоказания. Гиперчувствительность к оптимолу.

Форма выпуска. Глазные капли во флаконах по 5 мл 0,25% или 0,5% раствора.

Условия хранения. В сухом прохладном месте.

Срок годности 2 года.

Поставляется из Финляндии. Из Швейцарии — Тимоптик, Германии — Арутимол.

ОРАЗА (ГРАНУЛЫ) (Orazum).

Фармакологическое действие. Кислотоустойчивый комплекс амилолитических и протеолитических ферментов, способствующий перевариванию основных пищевых веществ.

Показания к применению. Гастриты с пониженной кислотностью, хронический гепатохолецистит, язвенная болезнь желудка с пониженной секрецией, подострый и хронический панкреатит, хронический спастический колит с наклонностью к запорам.

Способ применения и дозы. Внутрь по $^1/_2$—1 чайной ложке во время или сразу после еды 3 раза в день. Курс лечения 2—4 нед.

Побочное действие. У больных, страдающих диареей, возможно усиление поноса.

Форма выпуска. Гранулы в банках по 100 г.

Условия хранения. В сухом прохладном месте.

Срок годности 2 года.

ОРАП (Orap). 1-[1-[4,4-Бис-(пара-фторофенил)-бутил]-4-пиперидил]-2-бензимидазолинон. Синонимы: Opigan, Pimozid.

Отредактировал: ledi24

Фармакологическое действие. Нейролептик, не вызывающий вегетативных реакций (гипотонии); оказывает широкое действие, подавляет галлюцинации и бредовые идеи, нормализует процессы мышления. Максимум действия наблюдается через 2 ч после приема препарата и длится 6 ч, полностью действие препарата прекращается через 24 ч.

Показания к применению. Параноидные состояния, психотические и невротические состояния с параноидной симптоматикой. Может применяться для амбулаторной терапии больных шизофренией и симптоматического лечения агрессивности и возбуждения при острых психозах.

Способ применения и дозы. Внутрь по 1 таблетке (1 мг) 1 раз в сутки (утром или вечером). Дозировка индивидуальная, начальная доза — 1 таблетка в сутки — может быть повышена до 8 таблеток (8 мг). Оптимальная суточная поддерживающая доза в среднем 5 таблеток (5 мг).

Побочное действие. При назначении больших доз препарата иногда наблюдаются экстрапирамидные расстройства (дрожь или ригидность). Эти явления исчезают при снижении дозы или назначении противопаркинсонических препаратов. В редких случаях отмечаются слюнотечение и потливость.

Противопоказания не установлены.

Форма выпуска. Таблетки по 0,001 г, в упаковке 50 штук и по 0,004 г, в упаковке 20 штук.

Условия хранения. При температуре 15—25°С.

Срок годности 3 года.

Поставляется из Венгрии.

ОРНИД (Ornidum). Орто-бромбензил-N-этил-N,N-диметиламмония бромид. За рубежом выпускают аналогичный препарат под названием Bretylan.

Фармакологическое действие. Препарат симпатолитического действия. Задерживает выделение норадреналина из нервных окончаний, не оказывая блокирующего действия на адренорецепторы. Оказывает гипотензивное действие.

Показания к применению. Гипертоническая болезнь, желудочковые тахиаритмии, экстрасистолии (особенно при рефрактерности к другим препаратам).

Способ применения и дозы. Под кожу и внутримышечно по 0,5—1 мл 5% раствора 2—3 раза в день в течение нескольких недель. Препарат можно комбинировать с другими гипотензивными средствами.

Побочное действие. Ортостатический коллапс, слабость, головокружение, тошнота, рвота, набухание слизистой оболочки носа, чувство жара, боль в области сердца, болезненность в икроножных мышцах, кратковременное ухудшение зрения.

Противопоказания. Выраженный атеросклероз, инфаркт миокарда, острые нарушения мозгового кровообращения, феохромоцитома. Необходима осторожность при недостаточности функции почек.

Форма выпуска. Ампулы по 1 мл 5% раствора, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

ОРОНАЗОЛ (Oronazol). Противогрибковый препарат широкого спектра действия. Синоним: кетоконазол.

Фармакологическое действие. Первый активный при приеме внутрь

Отредактировал: ledi24

противогрибковый препарат. Спектр его действия включает дерматофиты (Microsporum, Trichophyton, Epidermophyton), дрожжеподобные грибы (Candida, Cryptococcus, Pityriosporum), диморфные грибы (Histoplazma capsulatum, Coccidioides, Paracoccidioides) и многие другие виды грибов. Максимальная концентрация в сыворотке достигается спустя 1—2 часа после приема препарата. Период полувыведения составляет около 8 часов.

Показания к применению. Поверхностные и глубокие микозы кожи, волосистой части головы и ногтей, вызванные дерматофитами или дрожжеподобными грибами (дерматомикозы, онихомикозы, хронический кандидоз кожи и слизистых, пестрая перхоть и др.); кандидамикоз полости рта и пищеварительного тракта, системные микозы (системный кандидоз, кандидоурия, паракокцидиомикоз, гистоплазмоз, кокцидомикоз и др.); профилактика грибковых инфекций у лиц с пониженным иммунитетом (например, онкологические больные); продолжение парентеральной терапии миконазолом.

Способ применения и дозы. Взрослые и дети весом более 40 кг принимают ороназол один раз в день по 1 таблетке 200 мг утром во время завтрака. В тех случаях, когда инфекция устойчива, доза может быть увеличена до 2 таблеток (400 мг) в один прием в день. Детям, вес которых меньше 40 кг, назначается от 50 до 100 мг в день один раз в зависимости от массы тела (приблизительно от 3 до 5 мг/кг/день). Рекомендуется принимать ороназол еще неделю после исчезновения симптомов заболевания. Терапия дерматомикозов в среднем продолжается от 2 до 6 недель, инфекции волосистой части головы — 1—2 месяца, онихомикозов — от 6 до 12 месяцев, а системных микозов — до года и дольше.

Ороназол не прописывают кормящим матерям. В случае появления клинических симптомов, повышения уровня печеночных ферментов и возможной реакции печени терапию следует прекратить и обратиться к лечащему врачу. Необходима значительная осторожность при назначении препарата больным с пониженной функцией коры надпочечников. Прием H_2 антагонистов, антацидов или антихолинэргических препаратов возможен только спустя не менее 2 часов после приема ороназола. Нельзя употреблять рифампицин одновременно с ороназолом. Совмещение его с циклоспорином А увеличивает уровень последнего в крови, и этот уровень требуется контролировать.

Побочное действие. Тошнота и рвота отмечаются у 3—5% больных, еще реже сыпь или боли в желудке. Бывает временное увеличение ферментов печени, редко — гинекомастия.

Противопоказания. Беременность, острые заболевания печени, повышенная чувствительность к препарату.

Форма выпуска. Таблетки по 200 мг, в упаковке 20 штук.

Срок годности 5 лет.

Выпускается фирмой «КРКА», Словения в сотрудничестве с фирмой «Janseen Pharmaceutical», Бельгия.

ОРТОФЕН (Ortophenum). Натриевая соль-2[(2,6-дихлорфенил)-амино]фенилуксусной кислоты. Синонимы: Voltaren, Diclofenac-Natrium.

Фармакологическое действие. Нестероидный противовоспалительный препарат, оказывает противовоспалительное, аналгезирующее и жаропонижающее действие.

Показания к применению. Ревматоидный артрит, острый ревматизм, остеоартроз, анкилозирующий спондилоартрит (болезнь Бехтерева), артрозы, спондилоартроз и другие воспалительные и дегенеративные заболевания суставов.

Отредактировал: ledi24

Способ применения и дозы. Внутрь и внутримышечно. Внутрь во время или после еды (не разжевывая) по 1—2 таблетки 1—3 раза в день в зависимости от клиники заболевания и переносимости препарата. По достижении лечебного эффекта дозу уменьшают до минимальной поддерживающей. Курс лечения может продолжаться длительно при обязательном контроле за свертываемостью крови. Внутримышечно взрослым, как правило, назначают по 1 ампуле ортофена (вольтарена) в день (вводят в верхний наружный квадрант ягодичной мышцы). В тяжелых случаях препарат вводят 2 раза в день. Затем больному дают ортофен (вольтарен) в таблетках.

Побочное действие. Боль в эпигастральной области, отрыжка, тошнота, рвота, понос, головокружение, головная боль, кожные аллергические реакции, повышение АД.

Противопоказания. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, беременность в первые 3 мес. Осторожность необходима при назначении больным, страдающим желудочно-кишечными заболеваниями.

Форма выпуска. Таблетки, покрытые кишечно-растворимой пленкой, по 0,025 г, в упаковке 30 штук.

Условия хранения. Список Б. В сухом, защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

«ОСАРБОН» («Osarbonum»). Состав: осарсола 0,25 г, глюкозы 0,3 г, кислоты борной 0,3 г, жировой основы 2 г.

Фармакологическое действие. Оказывает антипротозойное действие в отношении трихомонад.

Показания к применению. Трихомонадные заболевания мочеполового тракта у женщин и мужчин.

Способ применения и дозы. Местно. Вводят во влагалище по 1 суппозиторию в день в течение 10 дней.

Форма выпуска. Суппозитории вагинальные, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

ОСАРСОЛ (Osarsolum). 3-Ацетамино-4-оксифенилмышьяковая кислота. Синоним: Acetarsolum.

Фармакологическое действие. Оказывает антипротозойное действие в отношении трихомонад, дизентерийной амебы. Эффективен при спирохетозах.

Показания к применению. Трихомонадный кольпит.

Способ применения и дозы. При трихомонадных кольпитах вводят во влагалище смесь осарсола и борной кислоты по 0,25 г 1 раз в 2—3 дня в течение 2—3 нед.

Побочное действие. Полиневрит, дерматит, раздражение почек, повышение температуры тела, рвота, понос, желтуха.

Противопоказания. Наличие белка в моче, заболевания печени, сердца, желудочно-кишечного тракта, туберкулез, беременность, сахарный диабет.

Форма выпуска. Порошок.

Условия хранения. Список А. В хорошо укупоренных банках оранжевого стекла.

Срок годности 8 лет

«ОСАРЦИД» («Osarcidum»). Состав: осарсола 0,3 г, кислоты борной 0,3 г, глюкозы 0,3 г, стрептоцида белого 0,3 г, жировой основы 2,9 г.

Отредактировал: ledi24

Фармакологическое действие. Противовоспалительное средство. Оказывает антипротозойное действие в отношении трихомонад.

Показания к применению. Трихомонадный кольпит.

Способ применения и дозы. Местно во влагалище в виде вагинальных суппозиториев по 1 суппозиторию в день в течение 10 дней.

Форма выпуска. Вагинальные суппозитории, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список А. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

ОФТАН-IDU (ГЛАЗНЫЕ КАПЛИ) (Ophtan-idu). Содержит идоксуридин. Синонимы: Kerecid, Idoxuridinum.

Фармакологическое действие. Идоксуридин блокирует репродукцию Herpes simplex путем изменения нормального синтеза ДНК.

Показания к применению. Лечение кератита, вызванного простым герпесом. Идоксуридин контролирует инфекцию, но не влияет на рубцы, васкуляризацию и конечную, прогрессирующую потерю зрения.

Способ применения и дозы. В начале лечения по одной капле в оба инфицированных глаза, каждый час днем и через каждые 2 ч ночью. После окончания курса лечения (2—4 дня) для профилактики рецидивов следует продолжать лечение еще в течение 3—5 дней, закапывая каждые 2 ч днем и 1 раз ночью.

Побочное действие. Иногда небольшое раздражение, зуд, краснота отмечаются в области век или глаза. Противопоказано одновременное местное применение кортикостероидов.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к идоксуридину. Беременность.

Форма выпуска. Глазные капли 10 мл.

Условия хранения. В прохладном месте (не выше +15°С).

Срок годности 3 года.

Поставляется из Финляндии.

ПАВЕСТЕЗИН (Pavesthesinum). Состав: анестезина 0,3 г, папаверина гидрохлорида 0,05 г.

Применение. При гастралгиях, спазмах кишечника. Назначают внутрь по 1 таблетке 2—3 раза в день.

Форма выпуска. Таблетки, в упаковке 6 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

ПАЛИН (Palin). Капсула содержит 200 мг пипемидиновой кислоты.

Показания к применению. Острые и хронические инфекции мочевыводящих путей, вызванные бактериями, чувствительными к пипемидиновой кислоте.

Способ применения и дозы. Средняя доза для взрослых по 2 капсулы 2 раза в сутки утром и вечером. Курс лечения обычно продолжается 10 дней, при необходимости и более.

Побочное действие. Аллергические реакции в виде кожной сыпи.

Противопоказания. Не отмечены.

Форма выпуска. Капсулы по 200 мг, в упаковке 20 штук.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Югославии.

ПАМБА (Pamba). Пара-Аминометилбензойная кислота.

Фармакологическое действие. Антифибринолитическое средство. Не дает побочных явлений и тромбоэмболических осложнений.

Показания к применению. Кровотечения, связанные с местным

Отредактировал: ledi24

или общим фибринолизом. Применяется в хирургии: при операциях на предстательной железе, легких, щитовидной железе, селезенке; в гинекологии и акушерстве; стоматологии и оториноларингологии.

Способ применения и дозы. Применяют по 1 таблетке 4 раза в день.

Противопоказания. Тромбозы.

Форма выпуска. Таблетки по 0,25 г, в упаковке 10 штук.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Германии.

«ПАНГЕКСАВИТ» («Panhexavitum»). Состав: ретинола ацетата 0,00568 г (16 500 МЕ), тиамина бромида 0,00645 г, рибофлавина 0,005 г, пиридоксина гидрохлорида 0,005 г, никотинамида 0,05 г, кальция пантотената 0,01 г.

Показания к применению. Гиповитаминозы и авитаминозы. Понижение остроты зрения. Некоторые дерматологические заболевания (ихтиоз, псориаз, трихофития).

Способ применения и дозы. Внутрь взрослым по 1 таблетке 3 раза в день. Детям в возрасте до 1 года по $^1/_2$ таблетки 1 раз в день; от 1 года до 3 лет по $^1/_2$ таблетки 2 раза в день; от 3 до 7 лет по 1 таблетке 2 раза в день; старше 7 лет по 1 таблетке 3 раза в день.

Форма выпуска. Таблетки, покрытые оболочкой, в упаковке 50 штук.

Условия хранения. В хорошо укупоренной таре оранжевого стекла в прохладном, защищенном от света сухом месте.

Срок годности 2 года.

ПАНЗИНОРМ ФОРТЕ (Panzynorm forte). Состав 1 таблетки: экстракта слизистой оболочки желудка 200 мг (соответствует 200 мг пепсина), сухого экстракта желчи рогатого скота 30 мг, панкреатина 200 мг. Наружная оболочка таблетки содержит экстракт слизистой оболочки желудка, который освобождается в желудке; ядро таблетки, содержащее панкреатин и желчь, распадается в двенадцатиперстной кишке.

Фармакологическое действие. Заменяет ферменты желудка и поджелудочной железы и стимулирует их выделение.

Показания к применению. Нарушение пищеварения различного генеза, гипофункция поджелудочной железы, атрофический гастрит, гастродуоденит, гепатит, холецистит, после операций на желудочно-кишечном тракте, поджелудочной железе и печени.

Способ применения и дозы. Внутрь по 1 таблетке во время еды 3 раза в день.

Форма выпуска. Таблетки, в упаковке 30 штук.

Условия хранения. В прохладном месте.

Срок годности 3 года.

Поставляется из Югославии.

ПАНКРЕАТИН (Pancreatinum). Препарат поджелудочной железы убойного скота, содержащий преимущественно трипсин и амилазу.

Применение. При ахилии, панкреатитах и расстройствах пищеварения, связанных с заболеваниями печени и поджелудочной железы, анацидном и гипацидном гастрите, хронических энтероколитах по 0,5—1 г (детям в зависимости от возраста от 0,1 до 0,5 г).

Форма выпуска. Порошок, содержащий в 1 г 25 ЕД амилазы и другие ферменты, таблетки по 0,25 г, растворимые в кишечнике, в упаковке 60 штук.

Из Финляндии поступают таблетки по 0,5 г в упаковке по 100 штук.

Отредактировал: ledi24

содержащие по 12 500 ЕД амилазы и протеазы и 100 ЕД липазы.

Условия хранения. В сухом прохладном месте.

Срок годности 2 года.

ПАНТЕНОЛ АЭРОЗОЛЬ (Panthenol-Spray). Содержит вещество, близкое по структуре и действию к пантотеновой кислоте. Синонимы: Dexpanthenol, Pantevil.

Фармакологическое действие. Оказывает выраженное противовоспалительное действие, способствуя грануляции и эпителизации различных ран.

Показания к применению. При всех видах ран и ссадинах, ожогах, асептических послеоперационных ранах, плохо приживающихся кожных трансплантатах, язвах, трещинах, солнечных ожогах, герпесах.

Способ применения и дозы. Перед употреблением хорошо взбалтывают аэрозоль и орошают пораженные участки на расстоянии 10—20 см несколько раз в день. При распылении флакон следует держать в вертикальном положении. При повторном распылении регулировать толщину образуемого слоя.

Побочное действие. Не отмечено.

Противопоказания. Не наблюдались.

Форма выпуска. Аэрозольный флакон по 140 г.

Условия хранения. Хранить в прохладном месте, недоступном для детей. Нельзя распылять вблизи от источника тепла.

Срок годности 3 года.

Поставляется из Германии.

ПАНТОГАМ (Pantohamum). Кальциевая соль D-(+)-гомопантотеновой кислоты. Синоним: Hopatenic acid.

Фармакологическое действие. Сочетает стимулирующую активность в отношении различных проявлений церебральной недостаточности экзогенно-органического генеза с противосудорожными свойствами, уменьшает моторную возбудимость, активирует умственную деятельность и физическую работоспособность.

Показания к применению. Детям при умственной недостаточности (задержка психического развития) и олигофрении, при задержке развития речи. Назначают в качестве корректора при побочном действии нейролептических средств, при нейролептическом экстрапирамидном синдроме. При подкорковых гиперкинезах различной этиологии, при расстройстве мочеиспускания у детей и взрослых. Применяют в комплексной терапии для лечения эпилепсий, последствий нейроинфекции и травм черепа.

Способ применения и дозы. Самостоятельно или в комплексной терапии. Внутрь через 15—30 мин после еды. Разовая доза для взрослых 0,5—1 г, для детей 0,25—0,5 г, суточная доза для взрослых 1,5—3 г, для детей 0,75—3 г. Курс лечения 1—4 мес, в отдельных случаях до 6 мес. Через 3—6 мес можно провести повторный курс лечения.

Побочное действие. Возможны аллергические реакции (ринит, конъюнктивит, кожные высыпания).

Форма выпуска. Таблетки, в упаковке 50 штук по 0,25 г и по 0,5 г

Условия хранения. В сухом, защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

ПАНТОКРИН (Pantocrinum). Жидкий спиртовой экстракт из неокостенелых рогов (панты) марала, изюбра и пятнистого оленя.

Применение. Как стимулятор центральной нервной системы при астенических состояниях, гипотонии, неврастении, неврозах, слабости

Отредактировал: ledi24

сердечной мышцы внутрь по 30—40 капель или по 1—2 таблетки за $^1/_2$ ч до еды 2—3 раза в день, подкожно по 1—2 мл в день. Курс лечения (2—3 нед) после 10-дневного перерыва может быть повторен.

Противопоказания. Выраженный атеросклероз, органические заболевания сердца, стенокардия, повышенная свертываемость крови, тяжелые формы нефрита, диарея.

Форма выпуска. Во флаконах по 50 мл из пантов марала, из пантов пятнистого оленя; ампулы по 1 мл в упаковке по 10 штук; таблетки по 0,15 г в упаковке по 150 штук.

Условия хранения. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности. Все формы 2 года.

ПАНТОЦИД (Pantocidum). N-Дихлор-пара-карбоксибензол-сульфамид. Применяют таблетки сложного состава: пантоцида 0,0082 г, безводного карбоната натрия 0,0036 г, натрия хлорида 0,1082 г.

Применение. В качестве дезинфицирующего средства для обеззараживания воды (1 таблетка на 0,5—0,75 л воды), дезинфекции рук (1—1,5% растворы), спринцеваний и обработки ран (0,1—0,5% растворы).

Форма выпуска. Таблетки по 0,0082 г, в упаковке 20 штук.

Условия хранения. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

ПАПАВЕРИНА ГИДРОХЛОРИД (Papaverini hidrochloridum). 6,7-Диметокси-1-(3,4-диметоксибензил)-изохинолина гидрохлорид.

Фармакологическое действие. Миотропный спазмолитический препарат. В больших дозах понижает возбудимость сердечной мышцы, замедляет внутрисердечную проводимость.

Показания к применению. Спазмы сосудов головного мозга, стенокардия, эндартериит, холецистит, пилороспазм, спастические колиты, спазм мочевыводящих путей, бронхоспазм.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,04—0,06 г 3—5 раз в сутки, подкожно по 1—2 мл 2% раствора 2—4 раза; при остром спазме коронарных сосудов и гладкой мускулатуры органов брюшной полости внутривенно (медленно) 1 мл 2% раствора. Внутрь назначают per se, а также в комбинации с фенобарбиталом и др. Входит в состав суппозиториев. Высшая разовая доза для взрослых внутрь 0,4 г, суточная 0,6 г; парентерально разовая доза 0,1 г, суточная 0,3 г.

Побочное действие. Атриовентрикулярная блокада, желудочковая экстрасистолия; при внутривенном введении снижение АД, запор.

Форма выпуска. Порошок, таблетки по 0,01 г для детей, в упаковке 10 штук, таблетки по 0,04 г, в упаковке 10 штук, ампулы по 2 мл 2% раствора, в упаковке 10 штук, суппозитории ректальные по 0,02 г, в упаковке 10 штук, сложные таблетки следующего состава:

Папаверина гидрохлорида	0,02 г	0,02 г	0,02 г	0,03 г	0,02 г
Теобромина	0,25 г	0,025 г	—	0,25 г	—
Фенобарбитала	—	0,02 г	—	—	0,05 г
Платифиллина гидротартрата	—	—	0,05 г	0,003 г	—
	№ 10	№ 10	№ 10	№ 10	№ 10

Условия хранения. Список Б. В хорошо укупоренной таре в защищенном от света месте.

Срок годности. Порошок и таблетки 5 лет; таблетки для детей 3 года; ампулы 1 год; сложные таблетки 4 года.

Отредактировал: ledi24

ПАПАЗОЛ (Papazolum). Состав: дибазола 0,03 г, папаверина гидрохлорида 0,03 г.

Применение. При гипертонической болезни и стенокардии по 1 таблетке 2—3 раза в день.

Форма выпуска. Таблетки, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности 5 лет.

ПАПОРОТНИКА МУЖСКОГО ЭКСТРАКТ ГУСТОЙ (Extractum Filicis maris spissum).

Фармакологическое действие. Антигельминтное средство (действует преимущественно на ленточных глистов)

Показания к применению. Тениидозы, дифиллоботриоз, гименолепидоз.

Способ применения и дозы. Внутрь (после специальной подготовки). При тениидозах и дифиллоботриозе назначают в течение одного дня 4—7 г; при гименолепидозе натощак в течение 20—30 мин 1,5—2 г. Детям дозы уменьшают в соответствии с возрастом.

Высшая разовая доза для взрослых внутрь 8 г (однократно)

Побочное действие. Тошнота, рвота, понос, головокружение, головная боль, ослабление сердечной деятельности, дегенеративные изменения печени.

Противопоказания. Декомпенсация сердечной деятельности, болезни печени и почек, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, острые желудочно-кишечные и лихорадочные заболевания, резкое истощение, анемия, активный туберкулез, беременность. Препарат не назначают детям в возрасте до 2 лет

Форма выпуска. Капсулы по 0,5 г, в упаковке 14 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

ПАРАТИРЕОИДИН (Parathyreoidinum). Гормональный препарат, получаемый из околощитовидных желез убойного скота. Синоним: Parathyreocrinum.

Фармакологическое действие. Повышает содержание кальция в крови и устраняет синдром тетании, вызванный недостаточной функцией околощитовидных желез.

Показания к применению. Гипопаратиреоз, различные формы тетании, спазмофилия, аллергические заболевания (бронхиальная астма, крапивница и др.).

Способ применения и дозы. Подкожно и внутримышечно 1—2 мл ежедневно или через день. При остром приступе тетании взрослым вводят 2—4 мл (детям до 2 лет по 0,25—0,5 мл, от 2 до 6 лет по 0,5—1,5 мл, от 6 до 12 лет по 1,5—2 мл) каждые 2—3 ч до прекращения судорог. Одновременно назначают кальция хлорид внутривенно (5—10 мл 10% раствора) или внутрь (1 столовая — 1 десертная ложка 5% раствора 5—6 раз в день) Высшая разовая доза для взрослых 5 мл, суточная 15 мл.

Противопоказания. Повышенное содержание кальция в крови.

Форма выпуска. Ампулы по 1 мл, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

ПАРАЦЕТАМОЛ (Paracetamolum). пара-Ацетаминофенол. Синонимы: Alvedon, Dolamin.

Фармакологическое действие. По характеру фармакодинамики

Отредактировал: ledi24

аналогичен фенацетину; обладает жаропонижающим, болеутоляющим и противовоспалительным свойствами.

Применение. При невралгии, головной боли, воспалительных процессах по 0,2—0,4 г 2—3 раза в день.

Побочное действие и противопоказания те же, что и при применении фенацетина.

Форма выпуска. Таблетки по 0,2 г, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности 3 года.

ПАРКОПАН (Parkopan). 1-Фенил-1 циклогексил-3(N-пиперидино)-пропанола-1 гидрохлорид. Синонимы: Cyclodol, Artane, Parkinsa, Romparkin.

Фармакологическое действие. Препарат аналогичен циклодолу

Способ применения и дозы. По 0,002—0,004 2—3 раза в день при паркинсоническом синдроме различной этиологии

Форма выпуска. Таблетки по 0,005 г, в упаковке 100 штук; 0,002 г, в упаковке 100 штук.

Условия хранения. Список А. В хорошо укупоренной таре в защищенном от света месте.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Германии.

ПАРЛОДЕЛ (Parlodelum). 2-Бром α-эргокриптин; полусинтетическое производное алкалоида спорыньи — эргокриптина. Синонимы: Bromocriptinum, Pravidel.

Фармакологическое действие. Активизирует дофаминовые рецепторы, подавляет секрецию гормона передней доли гипофиза пролактина, не влияя на другие гормоны гипофиза. Уменьшает содержание гормона роста в крови, снижает секрецию АКТГ, подавляет физиологическую лактацию.

Показания к применению. Аменорея и бесплодие, связанные с повышенным содержанием пролактина, для подавления лактации, при болезни Иценко — Кушинга и Паркинсона.

Способ применения и дозы. Препарат применяют во время еды. При галакторее, пролактинозависимой аменорее, бесплодии по $^1/_2$ таблетки 2—3 раза в день, постепенно повышают дозы до 1 таблетки 2—3 раза в день. Лечение продолжают до полного прекращения секреции молока, нормализации менструального цикла.

Для угнетения лактации назначают по 1 таблетке 2 раза в день в течение 14 дней.

При предменструальном синдроме назначают $^1/_2$ таблетки в день с 14-го цикла, повышая постепенно дозу до 1 таблетки 2 раза в день до появления менструации.

При акромегалии начинают лечение с 1 таблетки в день, постепенно повышая дозу в течение 1 2 нед до 4—8 таблеток в сутки равными дозами через каждые 6 ч.

При болезни Паркинсона эффект наступает при дозах 10—15 мг в день. В комбинации с леводопой используют более низкие дозы. Начальная доза может быть 2,5 мг 2 раза в день при постепенном увеличении дозы на 5 мг с одновременным снижением дозы леводопы или отменой ее.

При болезни Иценко — Кушинга 3 таблетки в день, затем дозу уменьшают до 2—1 таблетки. Через 2—3 нед назначают поддерживающую терапию по 1 таблетке 1 раз в день. Курс лечения 6—8 нед.

Побочное действие. В первые дни лечения возможны тошнота, рвота, головокружение, в редких случаях оказывает гипотензивное действие.

Отредактировал: ledi24

Противопоказания. Гипотония, заболевание желудочно-кишечного тракта. При лечении парлоделом противопоказано использование оральных контрацептивов; не следует назначать парлодел больным, принимающим ингибиторы моноаминоксидазы.

Форма выпуска. Таблетки по 0,0025 г (2,5 мг), в упаковке 30 штук, 100 штук.

Условия хранения. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

ПАРМИДИН (Parmidinum). Бис-N-метилкарбамат-2,6-бис (оксиметил) пиридин. Синонимы: Anginin, Sospitan, Prodectin.

Фармакологическое действие. Уменьшает атеросклеротический процесс, способствует улучшению кровообращения, оказывает антибрадикининовое действие.

Показания к применению. Атеросклероз сосудов мозга, сердца, конечностей, диабетическая ретинопатия, тромбоз вен сетчатки, облитерирующий эндартериит, трофические язвы голени.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,25 г 3—4 раза в день, при необходимости до 3 г/сут. Курс лечения 2—6 мес.

Побочное действие. Возможны диспептические и аллергические реакции, головная боль.

Форма выпуска. Таблетки по 0,25 г, в упаковке 100 штук.

Условия хранения. В защищенном от света месте.

Срок годности 4 года.

ПАРТУСИСТЕН (Partusisten). Фенотерол гидробромид, относится к группе β-адреностимуляторов.

Показания к применению. Угрожающие преждевременные роды. Препарат не оказывает отрицательного влияния на плод и на новорожденного.

Способ применения и дозы. Применяют внутривенно (капельно) и внутрь в виде таблеток.

Внутрь назначают по 5 мг каждые 2—3 ч, суточная доза до 40 мг. Длительность курса лечения 1—3 нед. Внутривенно вводят капельно (0,5 мг в 250—500 мл 5% раствора глюкозы по 15—20 капель в минуту до угнетения сократительной деятельности матки), применяют партусистен в специализированных лечебных учреждениях под тщательным врачебным наблюдением.

Побочное действие. Тахикардия, мышечная слабость, снижение АД, потливость, тошнота, рвота.

Противопоказания. Порок сердца, нарушение сердечного ритма, тиреотоксикоз, глаукома.

Форма выпуска. Таблетки по 0,005 г, в упаковке 50 штук, ампулы 0,0005 г, в упаковке 5 ампул.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Югославии.

ПАСОМИЦИН (Pasomycinum). Дигидрострептомицина парааминосалицилат. Синоним: Streptopas.

Фармакологическое действие. Спектр антибактериального действия подобен дигидрострептомицину. Внутримышечное введение 0,5—1 г обеспечивает больший уровень стрептомицина и ПАСК в сыворотке крови и тканях организма, чем при раздельном введении разовых доз стрептомицина внутримышечно, а ПАСК внутрь. Малотоксичен, не кумулирует, из организма выводится почками.

Показания к применению. Различные формы туберкулеза: не-

Отредактировал: ledi24

специфические пневмонии, гнойные процессы, вызванные чувствительными к дигидрострептомицину возбудителями.

Способ применения и дозы. Внутримышечно по 1 г/сут в 2—3 мл 0,25—0,5% раствора новокаина или дистиллированной воды для инъекций. Детям дозы уменьшают в соответствии с возрастом.

Побочное действие. Возможны расстройства вестибулярного аппарата и понижение остроты слуха, кожный зуд, головокружение, тошнота.

Противопоказания. Необходима осторожность при назначении больным с острым и хроническим нефритом, при неврите слухового нерва. Нельзя назначать одновременно с канамицином, флоримицином, мономицином и другими антибиотиками, обладающими ото- и нефротоксичностью.

Форма выпуска. Во флаконах по 0,5 г (500 000 ЕД) в комплекте с 0,5% раствором новокаина по 2 мл в ампуле.

Условия хранения. Список Б. В сухом, защищенном от света месте.

Срок годности 3 года

ПАССИФЛОРЫ ЭКСТРАКТ ЖИДКИЙ (Extractum Passiflorae fluidum).

Применение. Как успокаивающее средство при неврастении, бессоннице, вегетативных нарушениях в период климакса и преклимакса по 30—40 капель 3 раза в день в течение 20—30 дней.

Противопоказания. Стенокардия, инфаркт миокарда, выраженный атеросклероз

Форма выпуска. Во флаконах по 25 г

Условия хранения. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 5 лет.

ПАСТУШЬЕЙ СУМКИ ТРАВА (Herba Bursae pastoris). Содержит витамин К, ацетилхолин, холин, соли калия, органические кислоты, дубильные вещества.

Применение. Как кровоостанавливающее средство при атонии матки и маточных кровотечениях внутрь в виде настоя (10,0:200,0) по 1 столовой ложке 3 раза в день или в виде экстракта (Extractum Bursae pastoris fluidum) по 20—25 капель 2—3 раза в день.

Форма выпуска. Трава резаная в упаковке по 75 г, жидкий экстракт во флаконах (Extractum Bursae pastoris fluidum) по 25 г.

Условия хранения. В прохладном, защищенном от света месте

Срок годности 3 года.

ПАФЕНЦИЛ (Paphencylum) N-[пара-(ди)2-Хлорэтил) амино фенацетил]-п-аминобензойная кислота.

Фармакологическое действие. Оказывает противолейкозное действие.

Показания к применению. Хронический лимфолейкоз, лимфосаркома, лимфогранулематоз (в комплексе с другими препаратами и для поддерживающего лечения)

Способ применения и дозы. Внутрь в суточной дозе от 50 до 100 мг в 2—4 приема с интервалом 4—6 ч ежедневно. В случае быстрого уменьшения числа лейкоцитов принимают 2—3 раза в неделю. Курсовая доза 600—3000 мг (в среднем 1500 мг на курс) В отдельных случаях повышают курсовую дозу до 4000 мг При хроническом лимфолейкозе суточные дозы не должны превышать 75 мг, а курсовые 1000—1200 мг До начала лечения и 2 раза в неделю во время лечения проводят полный анализ крови К концу курса лечения число

Отредактировал: ledi24

лейкоцитов исследуют через день После основного курса лечения назначают поддерживающую терапию (50- 75 мг 1 2 раза в неделю) под контролем состояния кроветворения

Побочное действие. Возможно угнетение костномозгового кроветворения с развитием лейкопении, тромбоцитопении, реже анемии. В редких случаях наблюдаются понижение аппетита, тошнота, рвота

Противопоказания. Терминальная стадия заболевания при глубоком угнетении гемопоэза (число тромбоцитов ниже $100 \cdot 10^9$/л и гранулоцитов менее $1{,}5 \cdot 10^9$/л), заболевания почек и печени, значительное снижение их функций

Форма выпуска. Таблетки по 0,025 г (25 мг), в упаковке 50 штук

Условия хранения. Список Б В защищенном от света месте в плотно закрытых флаконах.

Срок годности 2 года

ПАХИКАРПИНА ГИДРОЙОДИД (Pachycarpini hydroiodidum). d-Спартеина гидройодид.

Фармакологическое действие. Ганглиоблокатор, повышает тонус и усиливает сокращение мускулатуры матки.

Показания к применению. Спазмы периферических сосудов, ганглиолиты, миопатия, для стимуляции родов, в послеродовом периоде для уменьшения кровотечения

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,05—0,1 г 2- 3 раза в день, подкожно и внутримышечно 3—5 мл 3% раствора

Высшая разовая доза 0,2 г, суточная 0,6 г

Противопоказания. Гипотония, выраженный атеросклероз, стенокардия, заболевания печени и почек, беременность.

Форма выпуска. Таблетки по 0,1 г, в упаковке 12 штук, ампулы по 2 мл 3% раствора, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б

Срок годности. Таблетки 4 года, ампулы 3 года

«ПЕКТУСИН» («Pectusinum»). Состав. ментола 0,004 г, масла эвкалиптового 0,0005 г, сахарной пудры 0,75 г, натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы 0,012 г, кальция стеарата 0,0035 г

Фармакологическое действие. Противокашлевое средство

Применение. При воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей по 1 таблетке сублингвально до полного рассасывания

Форма выпуска. Таблетки, в упаковке 10 штук

Условия хранения. В сухом месте

Срок годности 3 года

ПЕЛОИДИН (Peloidinum). Экстракт иловой лечебной грязи

Фармакологическое действие. Биогенный стимулятор

Показания к применению. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, гастриты, колиты, гнойные раны.

Способ применения и дозы. Внутрь по 40- 50 мл 2 раза в день (утром и вечером) в подогретом виде за 1 2 ч до еды или через 1 2 ч после еды (небольшими глотками в течение нескольких минут), при колитах назначают в виде клизм 2 раза в день по 100 мл катетером на глубину 14 16 см Курс лечения при язвенной болезни 4—6 нед, при колитах 10 15 дней При гнойных ранах препарат применяют для промывания и смачивания повязок.

Форма выпуска. Во флаконах по 500 мл

Условия хранения. В прохладном, защищенном от света месте

Срок годности 2 года

Отредактировал: ledi24

ПЕЛОИДОДИСТИЛЛЯТ (Peloidodistillatum). Препарат получаемый из лиманной грязи

Фармакологическое действие. Биогенный стимулятор

Показания к применению. Блефариты, конъюнктивиты, кератиты, помутнение стекловидного тела, миопический хориоретинит и др., артриты, радикулиты, миалгия.

Способ применения и дозы. Подкожно по 1 мл 1 раз в день, всего на курс лечения 30—35 инъекций.

Противопоказания. Тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, беременность после 7 мес, острые желудочно-кишечные расстройства, далеко зашедший нефрозонефрит

Форма выпуска. Ампулы по 1 мл, в упаковке 10 штук

Условия хранения. В защищенном от света месте

Срок годности 4 года

ПЕНИЦИЛЛИНАЗА (Penicillinasum). Фермент, расщепляющий лактамное кольцо пенициллина. Продуцируется Bac licheniformis 749/с. Синоним. Neutropen.

Фармакологическое действие. Обладает специфическим свойством инактивировать пенициллин.

Показания к применению. Аллергические реакции и анафилактический шок, вызванные препаратами группы пенициллина

Способ применения и дозы. Внутримышечно 1670 МЕ сразу после развития аллергической реакции, при необходимости вводят повторно через 2 дня в той же дозе (не более 3 инъекций с интервалами 2 дня)

Побочное действие. При повторном введении сенсибилизация организма и аллергические осложнения

Противопоказания. Профессиональные аллергические заболевания у лиц, занятых производством или длительно работающих с препаратами пенициллина; повторное введение при непереносимости и повышенной чувствительности к препарату.

Форма выпуска. Во флаконах по 1670 МЕ.

Условия хранения. При температуре не выше 20°С.

Срок годности 3 года.

ПЕНТАГАСТРИН (Pentagastrinum). N трет Бутилоксикарбонил β-аланил-L-триптофил-L-метионил-L-аспарагинил-L-фенилаланиламид (пентапептид) Синонимы: Acignost, Hastrodiagnost, Peptavlon.

Фармакологическое действие. Диагностическое средство. Обладает способностью сильно стимулировать секрецию желудка.

Показания к применению. В качестве стимулятора желудочной секреции, для диагностики заболеваний желудка (определения секреторной способности и кислотообразующей функции желудка)

Способ применения и дозы. Вводят под кожу (0,025% раствор) из расчета 6 мкг (0,006 мг) на 1 кг массы тела больного. После введения исследуют желудочный сок через каждые 15 мин в течение 1 ч и более.

Побочное действие. Возможны слюнотечение, тошнота, кратковременное снижение АД, неприятные ощущения в брюшной полости

Форма выпуска. Ампулы по 2 мл 0,025% раствора, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 2 года

«ПЕНТАЛГИН» («Pentalginum»). Состав амидопирина 0,3 г

Отредактировал: ledi24

анальгина 0,3 г, кофеин-бензоата натрия 0,05 г, фенобарбитала 0,01 г, кодеина 0,015 г

Применение. Как аналгезирующее и жаропонижающее средство по 1 таблетке на прием

Форма выпуска. В упаковке 10 таблеток.

Условия хранения. Список Б. В сухом, защищенном от света месте

Срок годности 1 год.

ПЕНТАМИН (Pentaminum). 3-Метил-1,5-бис-(N,N-диметил-N-этиламмоний)-3-азапентана дибромид.

Фармакологическое действие. Активный ганглиоблокатор.

Показания к применению. Гипертоническая болезнь (I—II стадии) и кризы, спазмы периферических сосудов, кишечника и желчевыводящих путей, почечная колика, приступы бронхиальной астмы.

Способ применения и дозы. Внутримышечно 0,5—3 мл 5% раствора 2—3 раза в день.

Высшая разовая доза 3 мл 5% раствора, суточная 9 мл 5% раствора.

Побочное действие и противопоказания те же, что и при применении бензогексония.

Форма выпуска. Ампулы по 1 мл 5% раствора, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 5 лет

ПЕНТАЦИН (Pentacinum). Кальций-тринатриевая соль диэтилентриаминопентауксусной кислоты.

Фармакологическое действие. Комплексообразующее соединение.

Показания к применению. Отравления плутонием, радиоактивным иттрием, цезием, цинком, свинцом и смесью продуктов деления урана, а также для выявления носительства этих радионуклидов.

Способ применения и дозы. Внутривенно (медленно) по 5 мл 5% раствора (в острых случаях 30 мл 5% раствора) через 1—2 дня. Курс лечения (10—20 инъекций) при необходимости повторяют через 3—4 мес

Побочное действие. Возможны головокружение, головная боль, боль в конечностях и в области грудной клетки, иногда тошнота, рвота, нарушения коронарного кровообращения, функции почек (из-за выведения радионуклидов), изменения электролитного баланса

Противопоказания. Лихорадочные состояния, нарушение функции почек, коронароспазмы

Форма выпуска. Ампулы по 5 мл 5% раствора, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 8 лет

«ПЕНТОВИТ» («Pentovitum»). Состав: тиамина бромида 0,0129 г, пиридоксина гидрохлорида 0,005 г, никотинамида 0,02 г, кислоты фолиевой 0,003 г, цианокобаламина 0,00005 г (50 мкг)

Применение. В комплексной терапии заболеваний нервной системы (радикулиты, невриты, невралгии, астенические состояния и др.) по 1—2 таблетки 3 раза в день после еды. Курс лечения 3—4 нед.

Форма выпуска. Таблетки, покрытые оболочкой, в упаковке 100 штук.

Условия хранения. В хорошо укупоренной таре оранжевого стекла в прохладном сухом, защищенном от света месте

Срок годности 3 года.

ПЕНТОКСИЛ (Pentoxylum). 4-Метил-5-оксиметилурацил.

Отредактировал: ledi24

Фармакологическое действие. Стимулирует лейкопоэз, повышает фагоцитарную активность лейкоцитов и ретикулоэндотелиальной системы.

Показания к применению. Лейкопения различной этиологии, алиментарная токсическая алейкия, агранулоцитарная ангина, некоторые лекарственные агранулоцитозы, хронические отравления бензолом.

Способ применения и дозы. Внутрь взрослым по 0,2 0,4 г 3 4 раза в день после еды, детям в соответствии с возрастом В среднем на курс лечения (15 20 дней) 6- 10 г препарата

Побочное действие. Диспептические явления

Противопоказания. Лимфогранулематоз, злокачественные новообразования костного мозга

Форма выпуска. Порошок, таблетки, покрытые оболочкой, по 0,2 г, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В хорошо закрытых флаконах

Срок годности. Порошок 5 лет, таблетки 4 года

ПЕПСИДИЛ (Pepsidilum). Раствор в хлористоводородной кислоте продуктов ферментного гидролиза ткани слизистой оболочки желудка свиней, содержащий все составные части секрета желудочных желез.

Фармакологическое действие. Пепсин основной лечебный фактор препарата обусловливает пищеварение белков в желудке.

Показания к применению. Гипацидные и анацидные гастриты

Способ применения и дозы. Внутрь во время еды по 1 2 столовые ложки (лучше через трубочку) 3 раза в день.

Форма выпуска. Во флаконах по 450 мл

Условия хранения. При температуре 4°С

Срок годности 6 мес

ПЕПСИН (Pepsinum). Препарат, содержащий протеолитический фермент Получают из слизистой оболочки желудка свиней

Применение. При расстройствах пищеварения (ахилия, гипо и анацидные гастриты, диспепсия и т д.) внутрь перед или во время еды по 0,2- 0,5 г (детям от 0,05 до 0,3 г) 2 3 раза в день в порошке или в 1 - 3% растворе разведенной хлористоводородной кислоты.

Форма выпуска. Порошок

Условия хранения. В прохладном, защищенном от света месте

Срок годности 1 год

ПЕРИТОЛ (Peritol). Синонимы. Adekin, Apetigen, Cyprodin и др.

Фармакологическое действие. Антигистаминное средство

Показания к применению. Аллергические состояния (крапивница, сывороточная болезнь, сенная лихорадка, вазомоторный ринит, лекарственная экзантема, кожный зуд, аллергические реакции на укусы насекомых)

Способ применения и дозы. Детям до 6 мес перитол не назначают В возрасте от 6 мес до 2 лет препарат назначают с осторожностью в суточной дозе до 0,4 мг/кг (максимальный срок лечения 3- 4 нед), от 2 до 6 лет по 6 мг в день (по $^1/_2$ таблетки 3 раза в день) или по 1 чайной ложке сиропа 3 раза в день, от 6 до 14 лет по 10 мл сиропа 3 раза или по 1 таблетке 3 раза в день. Взрослым назначают по 12 мг (по 1 таблетке 3 раза в день) или по 10 мл сиропа 3 раза в день.

Противопоказания. Глаукома, предрасположенность к отекам задержка мочи, беременность.

Отредактировал: ledi24

Форма выпуска. Таблетки по 4 мг, в упаковке 20 штук, сироп во флаконе по 100 мл

Срок годности 5 лет

Поставляется из Венгрии

ПЕРТУССИН (Pertussinum). Состав: экстракта чабреца или экстракта тимиана 12 г, калия бромида 1 г, сиропа сахарного 82 г, спирта этилового 80% 5 мл.

Фармакологическое действие. Отхаркивающее и смягчающее кашель средство.

Показания к применению. Бронхиты и другие заболевания верхних дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем; коклюш.

Способ применения и дозы. Внутрь по 1 столовой ложке 3 раза в день взрослым, детям от $^1/_2$ чайной до 1 десертной ложки 3 раза в день

Форма выпуска. Во флаконах по 125 г

Условия хранения. В сухом прохладном месте.

Срок годности 4 года.

ПЕРЦА ВОДЯНОГО ТРАВА (ГОРЦА ПЕРЕЧНОГО ТРАВА) (Herba Polygoni hydropiperis). Содержит флавоновые гликозиды (рутин, кверцитрин, гиперозид), флавоноиды (кверцетин, изорамнетин), витамин К, гликозид полигопеперин, дубильные вещества (3,8%), органические кислоты.

Применение. Как кровоостанавливающее средство преимущественно при маточных кровотечениях в виде настоя (20,0:200,0) по 1 столовой ложке 3—4 раза в день.

Форма выпуска. Трава резаная в бумажных пакетах по 100 г

Условия хранения. В сухом прохладном месте.

Срок годности 2 года

ПЕРЦА ВОДЯНОГО ЭКСТРАКТ ЖИДКИЙ (Extractum Polygoni hydropiperis fluidum). Спиртовое извлечение 1:1 на 70% спирте из травы водяного перца.

Применение. Как кровоостанавливающее средство при маточных кровотечениях по 30—40 капель 3—4 раза в день.

Форма выпуска. Во флаконах по 25 мл.

Условия хранения. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности $2^1/_2$ года.

ПЕРЦА СТРУЧКОВОГО НАСТОЙКА (Tinctura Capsici). Состав: стручкового перца мелконарезанного с семенами 100 г, спирта 90% до 1 л.

Применение. Наружно как раздражающее и отвлекающее средство при невралгиях, радикулитах, миозитах и др.

Форма выпуска. Во флаконах по 50 мл, 100 мл.

Условия хранения. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 4 года.

ПЕРЦОВЫЙ ПЛАСТЫРЬ (Emplastrum Capsici). Изготовлен на основе экстракта стручкового перца.

Применение. Как обезболивающее средство при радикулитах, невралгиях, миозитах, люмбаго и т. д.

Форма выпуска. Пластырная масса, нанесенная на куски хлопчатобумажной ткани размером 12·18 см, в бумажных пакетах в упаковке по 2 штуки и 10·6 см в упаковке по 2 штуки.

Условия хранения. В сухом прохладном месте.

Срок годности 2 года.

Отредактировал: ledi24

ПЕТИЛИЛ (Petylyl).

Фармакологическое действие. Входит в группу трициклических антидепрессантов.

Показания к применению. Эндогенные депрессии, психогенные депрессии, психоневрозы.

Способ применения и дозы. Вначале 2—3 драже в день, возможно повышение до 6—8 драже в день. Для поддерживающей терапии 3—4 драже в день.

Побочное действие. Иногда нарушение сна.

Форма выпуска. Драже по 25 мг, в упаковке 50 штук

Срок годности 5 лет

Поставляется из Германии

ПИЖМЫ ЦВЕТКИ (Flores Tanaceti). Содержит эфирное масло (0,3—2%), основной составной частью которого является туйон, горькое вещество танацетин, флавоноиды, дубильные вещества, органические кислоты.

Применение. В качестве противоглистного (аскариды, острицы) и желчегонного средства в виде настоя (1 столовая ложка на стакан кипящей воды) по 1 столовой ложке 3 раза в день

Противопоказания. Беременность.

Форма выпуска. В упаковке по 75 г

Условия хранения. В сухом прохладном месте

Срок годности не установлен.

ПИКАМИЛОН (Picamilonum). Натриевая соль N-никотиноил γ-аминомасляной кислоты.

Фармакологическое действие. Улучшает кровоснабжение и функциональное состояние мозга, что обусловлено уменьшением сосудистого сопротивления, а также благоприятным влиянием на метаболизм мозга. Восстанавливает физическую и умственную работоспособность. Уменьшает угнетающее влияние этанола на центральную нервную систему. Быстро проникает через гематоэнцефалический барьер, длительно удерживается в тканях организма.

Показания к применению. У взрослых в качестве ноотропного и вазоактивного средства при острых нарушениях мозгового кровообращения (легкая степень и средней тяжести), хронической недостаточности мозгового кровообращения, вегетососудистой дистонии. Как транквилизатор препарат назначают при состояниях, сопровождающихся тревогой, страхом, повышенной раздражительностью, эмоциональной лабильностью.

Пикамилон показан при астенических состояниях различной этиологии, депрессивных расстройствах у лиц старшей возрастной группы, сенильных психозах.

Препарат назначают лицам, находящимся в напряженных и экстремальных условиях деятельности, в том числе спортсменам, для восстановления работоспособности и повышения устойчивости к физическим и умственным нагрузкам. Пикамилон назначают самостоятельно или в комплексной терапии.

Способ применения и дозы. Пикамилон принимают внутрь независимо от приема пищи.

При цереброваскулярных заболеваниях назначают в разовой дозе от 0,02 до 0,05 г 2—3 раза в день. Суточная доза 0,06—0,15 г Курс лечения 1—2 мес. Повторный курс лечения рекомендуется через 5—6 мес.

При депрессивных состояниях принимают 0,04—0,2 г/сут (в 2—

Отредактировал: ledi24

3 приема), оптимальный вариант — 0,06—0,12 г/сут в течение $1^1/_2$-3 мес.

В качестве антиастенического средства и как транквилизатор назначают по 0,04—0,08 г/сут, в отдельных случаях — до 0,2—0,3 г/сут в течение 1—$1^1/_2$ мес.

При алкоголизме в период абстиненции по 0,1—0,15 г/сут коротким курсом — 6—7 дней; при более стойких нарушениях вне абстиненции — в суточной дозе 0,04—0,06 г в течение 4—5 нед.

Для восстановления работоспособности и при повышенных нагрузках — в суточной дозе 0,06—0,08 г в течение 1—$1^1/_2$ мес, для спортсменов в той же дозе в течение 2 нед тренировочного периода.

Побочное действие. Возможны: усиление раздражительности, возбуждение, ощущение тревоги, головокружение, головная боль, легкая тошнота, аллергическая сыпь, зуд кожных покровов. В этом случае следует уменьшить дозу или отменить препарат.

Противопоказания. Индивидуальная непереносимость препарата, острые и хронические заболевания почек.

Форма выпуска. В таблетках по 0,02 г 30 штук и 0,05 г 30 штук.

Условия хранения. Список Б. В сухом, защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

ПИЛОКАРПИНА ГИДРОХЛОРИД (Pilocarpini hydrochloridum). Алкалоид, полученный из растения Pilocarpus Pinnatifolins Jaborandi.

Фармакологическое действие. Стимулирует периферические м-холинореактивные системы.

Показания к применению. В офтальмологии как миотическое средство для понижения внутриглазного давления, а также при тромбозе центральной вены сетчатки, острой непроходимости артерий, атрофии зрительного нерва.

Способ применения и дозы. В виде глазных капель (1—6% раствор) или мазей

Форма выпуска. Порошок, 1% раствор с метилцеллюлозой по 5 мл во флаконе, в тюбик-капельницах по 1,5 мл, в упаковке по 2 штуки, пленки глазные по 0,0027 г, в упаковке 30 штук.

По импорту из Финляндии поступает пилокарпин офтан (Pilocarpin ophtan) 1% раствор по 10 мл во флаконе.

Условия хранения. Список А. В защищенном от света месте.

Срок годности. Порошок 6 лет, ампулы и пленки 2 года; пилокарпин офтан во флаконах 2 года.

ПИНАБИН (Pinabinum) — 50% раствор тяжелой фракции эфирных масел (из хвои сосны или ели) в персиковом масле

Фармакологическое действие. Оказывает спазмолитическое действие на мускулатуру мочевыводящих путей, бактериостатическое действие.

Показания к применению. Почечнокаменная болезнь, почечная колика.

Способ применения и дозы. Внутрь по 5 капель 3 раза в день на сахаре за 15—20 мин до еды. Курс лечения 4—5 нед; при почечной колике однократно до 20 капель на сахаре.

Побочное действие. Большие дозы препарата могут вызвать раздражение слизистой оболочки желудка и кишечника, гипотензию и общее угнетение.

Противопоказания. Нефриты, нефрозы.

Отредактировал: ledi24

Форма выпуска. Во флаконах по 25 мл 50% раствора в персиковом масле.

Условия хранения. Список Б. В прохладном месте.

Срок годности 3 года.

ПИОНА НАСТОЙКА (Tinctura Paeoniae). Настойка 10% травы и корней пиона уклоняющегося на 40% спирте.

Фармакологическое действие. Оказывает успокаивающее влияние на центральную нервную систему.

Показания к применению. Неврастения, бессонница, церебральные ангиопатии, вегетативно-сосудистые нарушения различной этиологии

Способ применения и дозы. Внутрь от 30—40 капель до 1 чайной ложки 3 раза в день в течение 30 дней.

Форма выпуска. Во флаконах по 200 мл.

Условия хранения. В прохладном месте.

Срок годности 1 год.

ПИОЦИД (Pyocidum). Состав: кислоты серной обезвоженной 0,25 мл, эфира для наркоза 0,25 мл.

Применение. Наружно в качестве обезвоживающего и бактерицидного средства, для прижиганий в стоматологической практике при язвах инфекционно-воспалительного происхождения, гипертрофии сосочков, отслойке десенного края, амфодонтозе I и II степени.

Форма выпуска. В ампулах по 0,5 мл, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности 4 года.

ПИПЕРАЗИНА АДИПИНАТ (Piperazini adipinas). Диэтилендиамина адипинат Синонимы: Adipalit, Nematocin

Фармакологическое действие. Антигельминтное средство.

Показания к применению. Инвазии различными видами нематод. Наиболее эффективен при аскаридозе и энтеробиозе.

Способ применения и дозы. При аскаридозе назначают внутрь за 1 ч до еды или спустя 1 ч после еды по 1,5—2 г на прием (3—4 г/сут) в течение 2 дней. Детям дозы уменьшают в соответствии с возрастом. Можно назначать детям препарат в виде 5% раствора: в возрасте от 1 года до 4 лет по 1 чайной ложке (0,25 г) 2 раза в день, от 4 до 10 лет по 1 десертной ложке (0,5 г), от 10 до 14 лет по 2 столовые ложки (2 г), 15 лет и старше по 3—5 столовых ложек 2—3 раза в день. При энтеробиозе принимают в тех же дозах в течение 5 дней подряд.

Побочное действие. Тошнота, боль в животе, скоропроходящая головная боль, при передозировке мышечная слабость, тремор.

Противопоказания. Органические заболевания центральной нервной системы.

Форма выпуска. Таблетки по 0,2 г, в упаковке 10 штук, таблетки по 0,5 г, в упаковке 12 штук, 5% раствор для детей во флаконах по 100 мл.

Срок годности. Таблетки 4 года, 5% раствор во флаконах 2 года.

ПИПОРТИЛ L_4 (Piportil L_4). Пальмитат пипотиазина в 2,5% растворе в масле.

Фармакологическое действие. Пролонгированный нейролептик, действует на психотические процессы. Ослабляет седативный эффект.

Показания к применению. Шизофрения при любой клинической картине, хронический психоз с галлюцинациями. В детской психи-

Отредактировал: ledi24

атрии: детские психозы, дисгармония развития, психозы скрытого периода.

Способ применения и дозы. Препарат вводят глубоко внутримышечно. Применяют только в стационаре. Средняя доза для инъекции 100 мг (3 мл раствора) Интервалы между инъекциями в среднем 4 нед. При хронических психозах — перорально в среднем 20—30 мг (20—30 капель) в день на один прием. При стабилизации лечебного эффекта ежедневная доза может быть снижена до 10 мг (10 капель) в день.

Противопоказания. Закрытоугольная глаукома, опасность задержки мочи.

Форма выпуска. Таблетки по 10 мг, в упаковке 100 штук, капли 4% 30 мл, ампулы 25 мг (1 мл), в упаковке 3 ампулы, ампулы 100 мг (4 мл), в упаковке 1 ампула.

Срок годности 4 года.

ПИРАЗИДОЛ (Pyrazidolum). 1,10-Триметилен-8-метил-1,2,3,4-тетрагидропиразино-(1,2-а)-индола гидрохлорид. Синоним: Pirlindol.

Фармакологическое действие. Антидепрессант с широким спектром терапевтического действия.

Показания к применению. Маниакально-депрессивные психозы, шизофрения с аффективными расстройствами, депрессивные состояния, вызванные психическими расстройствами, протекающими с психомоторной заторможенностью, тревожно-депрессивным и тревожно-бредовым компонентом, анестетической, ипохондрической и неврозоподобной симптоматикой.

Способ применения и дозы. Внутрь, начиная с 50—75 мг в день (в 2 приема), с постепенным увеличением дозы на 25—50 мг. Максимальный терапевтический эффект наблюдается при дозах 150—300 мг, при необходимости дозу увеличивают до 400 мг

Побочное действие. При повышенной чувствительности сухость во рту, потливость, головокружение, тахикардия, колебания АД, нарушение сна, мышечная гипотония, дизурические явления, которые быстро исчезают при уменьшении дозы.

Противопоказания. Острые воспалительные заболевания печени, заболевания крови, отравления наркотиками, снотворными и анальгетиками. Не следует применять препарат одновременно с антидепрессантами — ингибиторами моноаминоксидазы, а также в течение 2 нед после их отмены.

Форма выпуска. Таблетки по 0,025 г, в упаковке 50 штук, по 0,05 г, в упаковке 50 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

«ПИРАМЕИН» («Pyrameinum»). Состав: амидопирина 0,3 г, кофеина 0,03 г

Применение. В качестве анальгезирующего и жаропонижающего средства при головной боли, невралгии, лихорадочных состояниях по 1 таблетке 2—3 раза в день.

Форма выпуска. Таблетки, в упаковке 6 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 4 года.

ПИРАНТЕЛЬ (Pyrantel). Синонимы: Combantrin, Pyrantel pamoat.

Фармакологическое действие. Антигельминтное средство. Поражает мышцы кишечных паразитов, блокируя в них двигательные нервные окончания. Действует на паразитов в ранней фазе развития и на их зрелые формы.

Отредактировал: ledi24

Показания к применению. Аскаридоз, энтеробиоз, анкилостомидоз.

Способ применения и дозы. Назначают внутрь в таблетках или в виде суспензии однократно из расчета 10 мг/кг. При аскаридозе препарат дают однократно по 5 мг/кг. При тяжелых формах некатороза (свыше 4000 яиц в 1 г кала) дозу удваивают.

Побочное действие. Хорошо переносится больными. В отдельных случаях возможны тошнота, рвота, понос.

Противопоказания. Беременность.

Форма выпуска. Суспензия (1 мл содержит 50 мг препарата) в упаковке по 15 мл. Таблетки по 0,25 г, в упаковке 3 штуки.

Условия хранения. В сухом, защищенном от света месте.

Срок годности. Суспензия 3 года, таблетки 4 года.

Поставляется из Польши.

ПИРАЦЕТАМ (Pyracetamum). 2-Оксо-1-пирролидинилацетамид. Синоним: Nootropyl.

Фармакологическое действие. Оказывает положительное влияние на обменные процессы мозга; повышает концентрацию АТФ в мозговой ткани, усиливает биосинтез рибонуклеиновой кислоты и фосфолипидов, стимулирует гликолитические процессы, усиливает утилизацию глюкозы.

Показания к применению. Хронические и острые нарушения мозгового кровообращения, коматозные и субкоматозные состояния после травм и интоксикаций головного мозга, заболевания центральной нервной системы, сопровождающиеся снижением интеллектуально-мнестических функций; депрессии различной этиологии, особенно резистентные к антидепрессантам; психоорганический синдром с преобладанием признаков астении и адинамии; в качестве вспомогательного средства при плохой переносимости нейролептиков с целью устранения или предотвращения вызываемых ими сомато-вегетативных, неврологических и психических осложнений; для купирования абстинентных, пре- и делириозных состояний при алкоголизме и наркоманиях, а также в случаях острого отравления алкоголем, морфином, барбитуратами и т. д.

Способ применения и дозы. При тяжелых состояниях внутримышечно или внутривенно 2—6 г/сут. При хронических состояниях 1,2—2,4 г/сут (иногда до 3,2 г/сут и более) в 3—4 приема.

Побочное действие. Возможны гиперстимуляция (повышенная раздражительность, возбудимость, нарушение сна), диспептические явления; у больных пожилого возраста изредка отмечается обострение стенокардии.

Противопоказания. Беременность, острая почечная недостаточность.

Форма выпуска. Капсулы по 0,4 г, в упаковке 60 штук; ампулы 20% раствора по 5 мл, в упаковке 10 штук, таблетки, покрытые оболочкой, по 0,2 г, в упаковке 120 штук.

Условия хранения. Список Б. В сухом, защищенном от света месте.

Срок годности. Капсулы и ампулы 3 года, таблетки 2 года.

ПИРИДИТОЛ (Pyriditolum). Бис-(2-метил-3-окси-4-оксиметил-5-метилпиридил)-дисульфаида дигидрохлорид. Синонимы: Encephabol, Pyritinol.

Фармакологическое действие. Положительно влияет на процессы метаболизма в центральной нервной системе, ускоряя проникновение глюкозы через гематоэнцефалический барьер, снижая избыточное

Отредактировал: ledi24

образование молочной кислоты, улучшая проникновение свободных жирных кислот, аминокислот и уксусной кислоты в ткани мозга. Повышает устойчивость тканей мозга к гипоксии.

Показания к применению. Астенические, адинамические и неврозоподобные состояния органического генеза, психоорганический синдром, травматическая и сосудистая энцефалопатия; лечение остаточных явлений после нейроинфекций, травм и нарушений мозгового кровообращения; комплексная терапия депрессивных состояний, резистентных к антидепрессантам, особенно в случаях, сочетающихся с сосудистой и другой органической недостаточностью центральной нервной системы; задержка психического развития, олигофрения; лечение алкогольных абстиненций и курсовое противорецидивное лечение больных алкоголизмом, особенно в случаях возникновения астенических состояний, а также в качестве корректора при терапии нейролептиками.

Способ применения и дозы. Внутрь через 15—20 мин после еды 2—3 раза в день (последний прием не позднее 17 ч) Разовая доза для взрослых составляет 0,1—0,3 г, для детей — 0,05—0,1 г; суточная доза для взрослых 0,2—0,6 г (обычно 0,3—0,4 г), для детей — 0,05—0,3 г Курс лечения при алкогольных абстиненциях продолжается до 1—3 мес, при остальных заболеваниях до 6—8 мес. При необходимости проводят повторные курсы через 1—6 мес.

Побочное действие. Головная боль, тошнота, бессонница, раздражительность и нарушение сна.

Противопоказания. Выраженное психомоторное возбуждение, эпилепсия и состояния повышенной судорожной готовности.

Форма выпуска. В таблетках, покрытых оболочкой, по 0,05 г, в упаковке 60 штук или 0,1 г, в упаковке 60 штук.

Из Индии препарат поставляется под названием «Энцефабол» в виде драже по 0,1 г, в упаковке 100 штук, сиропа во флаконах по 200 мл (каждые 5 мл сиропа содержат 0,1 г действующего вещества) Сироп назначают детям по $^1/_2$—1 чайной ложке 1—3 раза в день в зависимости от возраста.

Условия хранения. В сухом, защищенном от света месте

Срок годности всех лекарственных форм 3 года.

ПИРИДОКСАЛЬФОСФАТ (Pyridoxalphosphatum). Пиридоксаль-5-фосфат.

Фармакологическое действие. Является коферментной формой витамина B_6 (пиридоксина) Осуществляет декарбоксилирование и переаминирование аминокислот Участвует в обмене липидов Преимущество пиридоксальфосфата перед другими препаратами витамина B_6 состоит в том, что он дает быстрый терапевтический эффект и может применяться не только для лечения заболеваний, при которых назначают пиридоксин, но также при состояниях, связанных с нарушением процессов фосфорилирования пиридоксина.

Показания к применению. Те же заболевания, при которых применяют пиридоксин (витамин B_6), включая состояния, резистентные к действию последнего.

Способ применения и дозы. Внутрь через 10—15 мин после еды, взрослым 3—5 раз в день по 0,02—0,04 г, детям по 0,01—0,02 г (до 0,06 г/сут) Парентерально взрослым вводят 1—3 раза в день в разовой дозе 0,005—0,01 г, в сутки 0,005—0,03 г, детям в зависимости от возраста до 0,005—0,01 г/сут Доза и длительность курса лечения зависят от характера заболевания.

Форма выпуска. Таблетки, покрытые оболочкой, по 0,01 г, в упаковке 50 штук и по 0,02 г, в упаковке 50 штук, ампулы в комплекте

Отредактировал: ledi24

с растворителем по 0,005 г и по 0,01 г, в упаковке 5 комплектов.

Условия хранения. В сухом, защищенном от света месте.

Срок годности. Таблетки и ампулы 3 года.

ПИРИДОКСИНА ГИДРОХЛОРИД (Pyridoxini hydrochloridum). 2-Метил-3-окси-4,5-ди-(оксиметил)-пиридина гидрохлорид. Синонимы: витамин B_6, пиривитол.

Фармакологическое действие. Играет большую роль в обмене веществ. В организме фосфорилируется и превращается в кофермент пиридоксаль-6-фосфат Входит в состав ферментов, осуществляющих декарбоксилирование и переаминирование аминокислот. Участвует в обмене липидов. Предупреждает B_6-витаминную недостаточность у беременных женщин и детей раннего возраста.

Показания к применению. Алиментарная и вторичная недостаточность пиридоксина. Токсикозы беременных. Постэнцефалитный паркинсонизм и другие его виды. Хорея. Судорожный синдром у новорожденных. Пеллагра (вместе с никотиновой кислотой) Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Гипохромная микроцитарная анемия. Заболевания периферической нервной системы. Лучевая болезнь. Острый и хронический гепатит Себорейный и эксфолиативный дерматит, особенно у детей раннего возраста. Опоясывающий лишай, нефродермиты. Экссудативный диатез. Интоксикации при применении тубазида, фтивазида и других противотуберкулезных препаратов.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,02—0,05 г 1—3 раза в день; внутримышечно и подкожно по 1—2 мл 1%, 2,5% и 5% раствора. Курс лечения 1—3 мес.

Побочное действие. Аллергическая реакция (крапивница и др.) Необходима осторожность при язвенной болезни и тяжелых заболеваниях печени (не более 0,025 г в день)

Форма выпуска. Порошок, таблетки с риской по 0,002 г, в упаковке 50 штук, таблетки с риской по 0,01 г, в упаковке 50 штук, ампулы по 1 мл в упаковке по 10 штук 1% раствора и 5% раствора.

Условия хранения. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности всех форм 3 года.

ПИРИЛЕН (Pirilenum). 1,2,2,6,6-Пентаметилпиперидина паратолуолсульфонат. Синоним: Pempidini tosylas.

Фармакологическое действие. Ганглиоблокатор.

Показания к применению. Гипертоническая болезнь, гипертоническая энцефалопатия, спазмы периферических сосудов, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, токсикоз беременных.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,0025—0,005 г 3—4 раза в день.

Высшая разовая доза 0,01 г, суточная 0,03 г

Побочное действие. Запор, вздутие кишечника и др.

Противопоказания. Глаукома, нарушение функции печени и почек, выраженный атеросклероз, атония желудка и кишечника.

Форма выпуска. Таблетки по 0,005 г, в упаковке 20 штук.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности 5 лет

ПИРКОФЕН (Pyrcophenum). Состав: амидопирина 0,25 г, фенацетина 0,25 г, кофеина 0,05 г

Применение. При головной боли, невралгии, лихорадочных состояниях по 1 таблетке 2—3 раза в день.

Отредактировал: ledi24

Форма выпуска. Таблетки, в упаковке 6 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 5 лет.

ПИРОГЕНАЛ (Pyrogenalum). Липополисахарид, образующийся в процессе жизнедеятельности микроорганизмов Pseudomonas aeruginosa и др.

Фармакологическое действие. Оказывает пирогенное действие.

Показания к применению. Показания к пирогенной терапии (сифилитические поражения центральной нервной системы), рубцы после ожогов; для стимуляции восстановительных процессов после заболеваний центральной и периферической нервной системы.

Способ применения и дозы. Внутримышечно 1 раз в день или через 2—3 дня, начиная с 25 МПД[1], с постепенным повышением дозы до 50 МПД. Максимальная разовая доза 1000 МПД. Курс лечения (25—30 инъекций) при необходимости не ранее чем через 2 мес повторяют Максимальная доза для детей 500 МПД. Курс лечения 10—15 инъекций

Побочное действие. При передозировке озноб, повышение температуры тела, головная боль, рвота, боль в пояснице[2]

Противопоказания. Лихорадочные заболевания, беременность. Необходима осторожность при гипертонической болезни и сахарном диабете.

Форма выпуска. В упаковках 10 ампул по 1 мл по 10 мкг (100 МПД), по 25 мкг (250 МПД), по 50 мкг (500 МПД), по 100 мкг (1000 МПД)

Условия хранения. В защищенном от света месте при температуре от 2 до 10°С.

Срок годности не установлен.

ПИРОМЕКАИН (Pyromecainum). N-Бутил-пирролидин-карбоновой кислоты мезидида гидрохлорид.

Фармакологическое действие. Анестезирующее средство.

Показания к применению. Для поверхностной анестезии.

Способ применения и дозы. В офтальмологической, оториноларингологической и хирургической практике в виде растворов. Разовая максимальная доза 1 г Мазь пиромекаиновую 5% наносят тонким слоем (не более 1 г) на болезненный участок слизистой оболочки полости рта на 2—5 мин при воспалительных заболеваниях.

Форма выпуска. В ампулах по 10 мл, в упаковке 10 штук, 0,5% раствор, 1% раствор, 2% раствор. Мазь в тубах по 30 г

Условия хранения. Список Б.

Срок годности 2 года.

ПИРРОКСАН (Pyrroxanum). 6-[β-(3′-Фенил-пирролидил-1′)-пропионил])-бензо-1,4-диоксана гидрохлорид.

Фармакологическое действие. α-Адреноблокатор, оказывающий выраженное седативное действие.

Показания к применению. Диэнцефальные кризы симпатикотонического характера, гипертонические кризы с гиперандреналемией, для купирования морфинной и алкогольной абстиненции; при психических заболеваниях с тревожно-депрессивным синдромом

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,015—0,03 г 1—4 раза в день, подкожно и внутримышечно 1—2 мл 1% раствора.

---

[1] МПД — минимальная пирогенная доза.

[2] Минимальная пирогенная доза способна вызвать у кролика при внутривенном введении повышение температуры тела на 0,6° С.

Отредактировал: ledi24

Побочное действие. Выраженная гипотония, брадикардия, усиление боли в сердце.

Противопоказания. Тяжелые формы атеросклероза с выраженной стенокардией, нарушение мозгового кровообращения, сердечная недостаточность.

Форма выпуска. Таблетки по 0,015 г, в упаковке 50 штук, ампулы по 1 мл 1% раствора в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

ПИТУИТРИН (Pituitrinum). Гормональный препарат гипофиза.

Фармакологическое действие. Оказывает окситоцическое, вазопрессорное и антидиуретическое действие.

Показания к применению. Для возбуждения и усиления сокращений матки при слабой родовой деятельности, переношенной беременности, гипотонических кровотечениях и для нормализации инволюции матки.

Способ применения и дозы. Подкожно и внутримышечно по 0,2—1 мл; при необходимости вводят внутривенно капельно 1 мл в 500 мл 5% раствора глюкозы или очень медленно 1 мл в 40 мл 40% раствора глюкозы.

Высшие дозы: разовая 2 мл, суточная 4 мл.

Побочное действие. Большие дозы могут вызвать спазм сосудов головного мозга, коллапс, нарушение гемодинамики.

Противопоказания. Выраженный атеросклероз, миокардит, гипертоническая болезнь, тромбофлебит, сепсис, нефропатия беременных; наличие рубцов и угроза разрыва матки, неправильное положение плода.

Форма выпуска. В ампулах по 1 мл (5 ЕД), в упаковке 10 штук

Условия хранения. Список Б. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

ПЛАЗМОЛ (Plasmolum). Препарат, получаемый из крови человека.

Применение. Как неспецифическое десенсибилизирующее и обезболивающее средство при невралгиях, невритах, радикулитах и других заболеваниях нервной системы, сопровождающихся болевым синдромом, а также при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, бронхиальной астме, хронических воспалительных процессах, артритах подкожно по 1 мл ежедневно или через день. Курс лечения 10 инъекций.

Противопоказания. Декомпенсация сердечной деятельности, нефрит, эндокардит

Форма выпуска. В ампулах по 1 мл, в упаковке 10 штук

Условия хранения. При температуре не выше 10°С.

Срок годности 1 год.

ПЛАКВЕНИЛ (Plaquenil). 4-[1-Метил-4-(этил-2-оксиэтил) аминобутиламино]-7-хлорхинолин Синонимы: Ereoquin, Renmoide.

Применение. По составу и действию на организм аналогичен делагилу и применяется в тех же случаях. Назначают внутрь при малярии: в 1-й день 0,8 г и через 6—8 ч 0,4 г; во 2-й и 3-й дни по 0,4 г в один прием. При коллагенозах 0,4—0,8 г/сут

При длительном применении возможны такие же побочные явления, как и при лечении делагилом.

Форма выпуска. Таблетки (драже) по 0,2 г, в упаковке 100 штук

Отредактировал: ledi24

Условия хранения. Список Б
Срок годности 5 лет

ПЛАНТАГЛЮЦИД (Plantaglucidum). Препарат, получаемый из водного экстракта листьев подорожника большого (Plantago major L.)

Фармакологическое действие. Спазмолитическое и противовоспалительное средство.

Показания к применению. Гипацидный гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки с нормальной и пониженной кислотностью (период обострения и для профилактики рецидивов)

Способ применения и дозы. Внутрь в виде гранул 2—3 раза в день за 20—40 мин до еды по $^1/_2$—1 чайной ложке в $^1/_4$ стакана теплой воды. Курс лечения в период обострения 3—4 нед. Для профилактики рецидивов по 1 чайной ложке 1—2 раза в день в течение 1—2 мес.

Противопоказания. Гиперацидные гастриты, язвенная болезнь желудка с повышенной кислотностью.

Форма выпуска. Гранулы во флаконах по 50 г

Условия хранения. В сухом месте при температуре 18—20°С.

Срок годности 4 года.

ПЛАТИФИЛЛИНА ГИДРОТАРТРАТ (Platyphyllini hydrotartras). Винокаменная соль алкалоида, содержащегося в крестовнике широколистном (Senecio platyphyllus D.C.).

Фармакологическое действие. Оказывает преимущественно м-холинолитическое; а также сосудорасширяющее и успокаивающее действие.

Показания к применению. Спазмы гладкой мускулатуры органов брюшной полости, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, бронхиальная астма, гипертоническая болезнь, колики (кишечные, почечные, печеночные) и др., в офтальмологии для расширения зрачка.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,0025—0,005 г 2—3 раза в день, подкожно 1—2 мл 0,2% раствора.

Побочное действие. Сухость во рту, нарушение аккомодации, сердцебиение, затруднение мочеиспускания.

Противопоказания. Глаукома, органические заболевания печени и почек.

Форма выпуска. Порошок, таблетки по 0,005 г, в упаковке 10 штук, ампулы по 1 мл 0,2% раствора, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список А.

Срок годности. Порошок и ампулы 5 лет, таблетки 3 года.

ПЛАЦЕНТЫ ВЗВЕСЬ (Suspensio Placentae). Взвесь в изотоническом растворе хлорида натрия в разведении 1:2 тонко измельченной плаценты, консервированной при температуре от 2 до 4°С в течение 7 сут

Фармакологическое действие. Биогенный стимулятор.

Показания к применению. Заболевания глаз (кератиты, помутнение роговицы, ириты, помутнение стекловидного тела) и другие случаи, когда показано назначение биогенных стимуляторов.

Способ применения и дозы. Подкожно по 2 мл (предварительно вводят 0,5% раствор новокаина) 1 раз в 10 дней. Детям дозу уменьшают в соответствии с возрастом. Курс лечения (3—4 инъекции) можно повторить через 2—3 мес.

Противопоказания. Туберкулезные заболевания глаз, скрофулез, некомпенсированная глаукома, тяжелые заболевания почек и сердечно-сосудистой системы, беременность.

Отредактировал: ledi24

Форма выпуска. Ампулы по 2 мл, в упаковке 4 штуки.
Условия хранения. При комнатной температуре.
Срок годности 2 года.

ПЛАЦЕНТЫ ЭКСТРАКТ (Extractum Placentae). Водный экстракт из консервированной на холоде плаценты человека.

Фармакологическое действие. Биогенный стимулятор.
Показания к применению. Офтальмологические заболевания (блефарит, кератит и др.), миалгия, артриты, радикулиты, воспалительные заболевания.
Способ применения и дозы. Подкожно по 1 мл ежедневно или через день.
Форма выпуска. Ампулы по 1 мл, в упаковке 10 штук.
Условия хранения. В прохладном, защищенном от света месте.
Срок годности 3 года.

ПЛЕНКА КОЛЛАГЕНОВАЯ (Membrana collagenica). Готовят из раствора коллагена с добавлением хонсурида и стабилизаторов (фурацилина, борной кислоты).
Фармакологическое действие. Оказывает асептическое действие и ускоряет процессы регенерации.
Показания к применению. Неглубокие кожные раны различного происхождения и локализации, трофические язвы вне стадии обострения, подготовка ран к операции — трансплантации кожи, закрытие донорских участков для предохранения аутотрансплантата от высыхания, пролежни различного происхождения.
Способ применения и дозы. С соблюдением правил асептики пленку извлекают из упаковки, погружают в изотонический раствор хлорида натрия или 0,25% раствор новокаина, затем накладывают на дефект кожи так, чтобы края пленки на 0,5 см выходили за пределы раны. Раневую поверхность предварительно обрабатывают перекисью водорода. Поверх пленки накладывают слой влажной, затем сухой марли и фиксируют повязку. Повязку смачивают раствором натрия хлорида 2 раза в сутки. Меняют ее по мере рассасывания пленки (через 2—3 дня).
Противопоказания. Обострение хронического тромбофлебита.
Форма выпуска. Пленка коллагеновая размером 11·18 см в упаковке по 10 штук.
Условия хранения. Обычные условия.
Срок годности 3 года.

ПЛЕНКА ФИБРИННАЯ ИЗОГЕННАЯ (Membrana fibrinosa isogena).
Фармакологическое действие. Белковый препарат из фибриногена плазмы донорской крови. Биологически активный пластический материал, создающий при наложении на раневую поверхность благоприятные условия для регенерации тканей и тем самым способствующий быстрому заживлению ран, оказывает обезболивающее и кровоостанавливающее действие, предохраняет рану от механических повреждений и проникновения инфекции.
Показания к применению. В нейрохирургической практике — для замещения дефектов твердой мозговой оболочки. В практике общей хирургии — для предотвращения спаечного процесса при различных полостных операциях; для закрытия обширных скальпированных ран или дефектов кожных покровов, возникших в результате травматических повреждений, ожогов, а также для лечения трофических язв.
Способ применения и дозы. После обработки пленку накладывают

Отредактировал: ledi24

на рану, затем удаляют покрывающий пленку целлофан. При замещении твердой мозговой оболочки пленку выкраивают по форме дефекта и укладывают целлофаном вверх прямо на мозг, затем целлофан снимают. При операциях на кишечнике пленку укладывают в виде муфты и фиксируют кетгутом.

Побочное действие. Не установлено.

Противопоказания. Нецелесообразно использовать при обильном гнойном отделяемом из раны, а также при глубоких ожогах до отделения некротических тканей.

Форма выпуска. Выпускается станциями переливания крови, поставляется в лечебно-профилактические учреждения, 10·20 см в упаковке.

Условия хранения. В защищенном от света месте при температуре не выше 25°С.

Срок годности 10 лет

ПОДОРОЖНИКА ЛИСТ (Folium Plantaginis). Содержит слизь, пектиновые вещества, гликозид аукубин, витамины К и С, дубильные вещества, флавоноиды, органические кислоты.

Применение. Настой листьев подорожника (10,0:200,0) как отхаркивающее средство по 1 столовой ложке 3—4 раза в день; сок подорожника при хронических анацидных гастритах и колитах по 1 столовой ложке 3—4 раза в день за 15—30 мин до еды.

Форма выпуска. Резаные листья в упаковке по 100 г, сок подорожника (Succus Plantaginis) во флаконах по 250 мл, брикеты по 75 г.

Условия хранения. В сухом прохладном месте.

Срок годности. Все формы 3 года.

ПОДОФИЛЛИН (Podophyllinum). Смесь природных соединений, получаемая из корневищ с корнями подофила щитовидного (Podophyllum peltatum). Содержит подофиллотоксин (не менее 40%), α- и β-пелтатины.

Фармакологическое действие. Обладает цитотоксической активностью и блокирует митозы на стадии метафазы. Подавляет пролиферативные процессы в тканях и тормозит развитие папиллом.

Показания к применению. Папилломатоз гортани у детей и взрослых, папилломы мочевого пузыря и небольшие, типичные папиллярные фиброэпителиомы, локализирующиеся в любых отделах мочевого пузыря. Применяют для профилактики рецидивов в сочетании с эндовезикальной и чреспузырной электрокоагуляцией папиллом.

Способ применения и дозы. При папилломатозе у детей вначале удаляют папиллому хирургическим путем, а затем 1 раз в 2 дня смазывают участки слизистой оболочки на месте удаления 15% спиртовым раствором подофиллина. Курс лечения 14—16 смазываний (детям до 1 года применять препарат с осторожностью). У взрослых смазывают 30% спиртовым раствором 10 раз, затем удаляют папилломы и вновь смазывают 20 раз. При отсутствии воспалительной реакции смазывают ежедневно, при наличии воспалительной реакции —1 раз в 2—3 дня. В мочевой пузырь вводят через катетер 1%, 4%, 8% или 12% суспензию подофиллина в вазелиновом масле в количестве 100 мл на 30—40 мин или на 1—2 ч с недельным перерывом.

Побочное действие. При введении в мочевой пузырь возможны боль внизу живота, жжение в области мочевого пузыря, расстройство мочеиспускания (учащение и боль).

При лечении папилломатоза гортани могут наблюдаться тошнота, рвота и расстройство функций желудочно-кишечного тракта (понос и т. д.) Приготовление растворов и взвесей рекомендуется проводить в очках.

Отредактировал: ledi24

Форма выпуска. Порошок.

Условия хранения. Список А. В банках в сухом, защищенном от света месте при комнатной температуре. Спиртовые растворы не более 3 дней, масляные взвеси не более 15 дней.

Срок годности 2 года.

ПОЛИАМИН (Polyaminum). Водный раствор, содержащий 13 L-аминокислот (аланин, аргинин, валин, гистидин, глицин, изолейцин, лизин, триптофан и др.) и D-сорбит.

Фармакологическое действие. Будучи сбалансированной смесью аминокислот, препарат легко усваивается организмом и способствует положительному азотистому балансу, устранению или уменьшению белковой недостаточности.

Показания к применению. В качестве средства для парентерального белкового питания при гипопротеинемиях различного происхождения, при невозможности или резком ограничении приема пищи обычным путем в до- и послеоперационном периоде, при обширных ожогах, особенно при ожоговом истощении, травмах, переломах, нагноительных процессах, функциональной недостаточности печени и др.

Способ применения и дозы. Вводят внутривенно капельно. Начальная скорость инфузии (в течение первых 30 мин) 10—20 капель в минуту, затем темп вливания увеличивается до 25—35 капель в минуту Для введения каждых 100 мл препарата требуется не менее 1 ч. Более быстрое введение нецелесообразно, так как избыток аминокислот не усваивается организмом и выводится с мочой. Суточная доза от 400 до 1200 мл ежедневно в течение 5 дней и более. Одновременно с полиамином следует вводить растворы глюкозы (до 0,5 г/кг массы тела в 1 ч) и витаминов.

Побочное действие. При превышении скорости введения полиамина возможны гиперемия лица, ощущение жара, головная боль, тошнота, рвота.

Форма выпуска. Водный раствор во флаконах по 400 мл для инъекций.

Условия хранения. При температуре от 10 до 20°С.

Срок годности 2 года.

ПОЛИГЛЮКИН (Polyglucinum). Стерильный раствор среднемолекулярной фракции частично гидролизованного декстрана в 0,9% изотоническом растворе хлорида натрия.

Фармакологическое действие. Плазмозаменяющий противошоковый препарат.

Показания к применению. Шок (операционный, травматический, постгеморрагический), ожоги, значительные потери крови.

Способ применения и дозы. Внутривенно до 1 л/сут.

Противопоказания. Повышение внутричерепного давления при травмах черепа; кровоизлияние в мозг; сердечная недостаточность; заболевания почек.

Форма выпуска. Во флаконах по 400 мл.

Условия хранения. При температуре от —10 до 20°С.

Срок годности. При укупорке флаконов пробками П-25 1 год, ИР-21 5 лет, в упаковке из полиэтилена $1^1/_2$ года.

ПОЛИМИКСИНА «В» СУЛЬФАТ (Polymyxini «B» sulfas). Антибиотик, продуцируемый Bac. polymyxa.

Фармакологическое действие. Высокоактивен в отношении грамотрицательных микроорганизмов (большинство штаммов синегнойной палочки и эшерихий, клебсиеллы, иерсинии, энтеробактер, сальмонел-

Отредактировал: ledi24

лы, шигеллы, гемофильная палочка, бруцеллы). Большинство штаммов Proteus, а также грамположительных кокков, бактерий и микроорганизмов устойчивы к полимиксина «В» сульфату. Препарат не действует на микроорганизмы, расположенные внутриклеточно.

Показания к применению. При инфекциях, вызванных Ps. aeruginosa (сепсис, менингит, пневмония, абсцесс легкого, инфекции мочевыводящих путей, инфицированные ожоги и др.), а также при инфекциях желудочно-кишечного тракта.

Способ применения и дозы. Внутримышечно, внутривенно (капельно) и внутрь. Внутримышечно препарат вводят в дозе 0,5—0,7 мг/кг 3—4 раза в день (не более 200 мг/сут). Детям по 0,3—0,6 мг/кг 3—4 раза в день. Для внутривенного введения 25—50 мг препарата растворяют в 200—300 мл 5% раствора глюкозы и вводят капельно со скоростью 60—80 капель в минуту. Максимальная суточная доза для взрослых не должна превышать 150 мг. Для детей — внутривенно по 0,3—0,6 мг/кг после разведения в 30—100 мл 5—10% раствора глюкозы. При нарушении функции почек дозу уменьшают. Внутрь препарат применяют в виде водного раствора.

Побочное действие. Нефротоксическое и нейротоксическое. Иногда блокада нервно-мышечной проводимости (в тяжелых случаях остановка дыхания). Опасность токсических реакций возрастает при нарушении выделительной функции почек. Возможны аллергические реакции, при приеме внутрь — тошнота и снижение аппетита.

Противопоказания. Нарушение функции почек, миастения, повышенная чувствительность к препарату. Недопустимо применение совместно с курареподобными и курарепотенцирующими средствами, а также с антибиотиками группы аминогликозидов (стрептомицин, мономицин, канамицин и др.).

Форма выпуска. Во флаконах по 250 000 ЕД, 500 000 ЕД.

Условия хранения. Список Б. В сухом, защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

ПОЛИМИКСИНА «М» СУЛЬФАТ (Polymyxini «M» sulfas). Антибиотик, продуцируемый одним из штаммов Bac. polymyxa.

Фармакологическое действие. Активен в отношении грамотрицательных бактерий (эшерихии, шигеллы, сальмонеллы, синегнойная палочка). При введении внутрь слабо всасывается из желудочно-кишечного тракта, в связи с чем эффективен только при лечении кишечных инфекций и местно. При местном применении малотоксичен.

Показания к применению. Инфекционные энтероколиты, дизентерия, а также местно при инфицированных ожогах, вяло заживающих ранах, пролежнях, некротических язвах, гнойных отитах и др.

Способ применения и дозы. Внутрь в течение 5—10 дней по 500 000—1 000 000 ЕД 4—6 раз в сутки. Суточная доза 2 000 000—3 000 000 ЕД. Для детей суточная доза 100 000 ЕД/кг массы тела в 3—4 приема. Местно применяют мазь, содержащую 2 мг антибиотика в 1 г мазевой основы, или раствор (10 000—20 000 ЕД/мл изотонического раствора хлорида натрия или 0,5—1% раствора новокаина). Суточная доза 15 000—20 000 ЕД/кг

Побочное действие. Длительное применение может вызвать изменения в почках.

Противопоказания. Функциональные и органические поражения почек.

Форма выпуска. Во флаконах по 500 000 ЕД, 1 000 000 ЕД, таблетки по 500 000 ЕД, в упаковке 50 штук, мазь 2% (в 1 г 20 000 ЕД) по 15 г.

Условия хранения. Список Б. При комнатной температуре.

Отредактировал: ledi24

Срок годности. Раствор для инъекций во флаконах и таблетки 3 года, мазь 1 год.

ПОЛИМИНЕРОЛ (Polyminerol). Стандартизованный в коллоидном и солевом соотношении раствор маточника Поморийского озера, содержащий соли магния, кальция, хлора, фтора, брома, железа и др. Преобладают соли магния.

Применение. В стоматологической практике (при гингивите, пиорее, сопровождающихся кровоточивостью) в виде полосканий или повязок в смеси с флетчером.

Форма выпуска. Во флаконах по 100 мл.

Срок годности 3 года.

Поставляется из Болгарии.

ПОЛИСПОНИН (Polysponinum). Сухой экстракт из корневищ с корнями диоскореи ниппонской (Dioscorea nipponica Marino). Содержит водорастворимые стероидные гликозиды (сапонины).

Фармакологическое действие. Оказывает умеренное гипохолестеринемическое действие.

Показания к применению. Атеросклероз сосудов головного мозга, сосудов сердца и при сочетании атеросклероза с гипертонической болезнью.

Способ применения и дозы. Внутрь после еды по 0,1 г 2—3 раза в день в течение 20—30 дней, через 7—10 дней цикл лечения повторяют. Курс лечения не менее 3 мес. После 4—6 месячного перерыва курс лечения можно повторить.

Побочное действие. При длительном приеме больших доз возможны кожный зуд, потливость, потеря аппетита.

Форма выпуска. Таблетки по 0,1 г, в упаковке 100 штук.

Условия хранения. В сухом, защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

«ПОЛИФЕР» («Polypherum»).

Фармакологическое действие. Препарат полифункционального действия, обладающий наряду с гемодинамической функцией способностью стимулировать гемопоэз.

При внутривенном введении «Полифера» в дозе 400—1200 мл увеличивается объем циркулирующей плазмы без нарушения кислотно-основного состояния, электролитного равновесия, белкового состава и свертывающей системы крови.

Показания к применению. Шок, развивающийся в результате травмы, острая кровопотеря, операционный шок, сопровождающийся выраженной кровопотерей, послеоперационный период с целью профилактики шока и стимуляции гемопоэза, наряду с гемотрансфузиями для восполнения кровопотери при плановых и экстренных операциях.

Способ применения и дозы. Внутривенно: капельно или струйно. Дозы и скорость введения выбирают в соответствии с показаниями к применению и состоянием больного (артериальное и венозное давление, частота пульса и дыхания). Разовая доза 400—1200 мл. При необходимости количество вводимого препарата может быть увеличено до 2000 мл. Препарат применяют только в стационарных условиях или в реанимационных отделениях поликлиник.

Побочное действие. Как правило, не наблюдается. Однако после первых 10 и последующих 30 капель необходимо сделать перерыв на 3 мин для биологической пробы. В случае развития аллергических реакций (уртикарные высыпания, кожный зуд, отек типа Квинке, учаще-

Отредактировал: ledi24

ние пульса, снижение АД и повышение температуры тела) введение полифера прекращают.

Противопоказания. Травма черепа, протекающая с повышением внутричерепного давления, а также все случаи, когда противопоказано внутривенное введение больших доз жидкости (отек легких, отечно-асцитический синдром другой этиологии).

Форма выпуска. Во флаконах по 400 мл для инъекций.

Условия хранения. В сухом месте при температуре от 10 до 25°С. Препарат выдерживает замораживание и может при температуре до —10°С транспортироваться. Замерзание не является противопоказанием к его применению при условии сохранения герметичности упаковки.

Срок годности 3 года.

ПОЛУДАН (Poludanum). Биосинтетический полирибонуклеотидный комплекс полиаденниловой и полиуридиловой кислот (в эквимолярных соотношениях).

Фармакологическое действие. Обладает интерфероногенной и противовирусной активностью, которая проявляется в виде стимулирования выработки эндогенного интерферона в клетках и тканях организма при различных путях введения. Образование интерферона препятствует проникновению в клетки и размножению вируса.

Показания к применению. Вирусные заболевания глаз у взрослых: аденовирусные и герпетические конъюнктивиты, кератоконъюнктивиты, кератиты и кератоиридоциклиты (кератоувеиты), иридоциклиты, хориоретиниты, невриты зрительного нерва.

Способ применения и дозы. Применяют в виде глазных капель. Раствор полудана, предназначенный для инстилляций в глаз, готовят путем растворения содержимого ампулы (200 мкг порошка) в 2 мл дистиллированной воды. Готовый раствор может быть использован в течение 7 дней.

Для лечения конъюнктивитов и поверхностных кератитов раствор полудана закапывают в конъюнктивальный мешок больного глаза 6—8 раз в день. По мере стихания воспалительных явлений число инстилляций сокращают до 3—4 раз в день.

Для субконъюнктивальных введений содержимое ампулы ex tempore растворяют в 1 мл воды для инъекций и вводят по 0,5 мл (100 мкг) под конъюнктиву глаза ежедневно или через день. На курс лечения назначают по 15—20 инъекций. Препарат в виде субконъюнктивальных инъекций используют также для лечения глубоких кератитов, кератоиридоциклитов и поражений внутренних оболочек глаза вирусного генеза.

Форма выпуска. Порошок в ампулах по 0,0002 г (200 мкг), в упаковке 10 ампул.

Условия хранения. Сухой препарат в запаянных ампулах хранят в холодильнике. Раствор для глазных капель можно хранить в холодильнике не более 1 нед.

Препарат применяют в стационарных условиях.

Срок годности 2 года.

ПОЛЫНИ ГОРЬКОЙ ТРАВА (Herba Absinthii). Содержит горькие вещества (абсинтин и анабсинтин), эфирное масло (0,5—2 %), дубильные вещества, флавононд артемизетин и др.

Применение. В качестве средства, повышающего аппетит и улучшающего пищеварение, при понижении функции желудочно-кишечного тракта: за 30 мин до еды 3 раза в день настой (10,0:200,0) по 1 столовой ложке или настойка по 15—20 капель.

Отредактировал: ledi24

Форма выпуска. Трава резаная в упаковке по 100 г, настойка (Tinctura Absinthi) во флаконах по 25 мл, густой экстракт (Extractum Absinthi spissum) 10 г.

Условия хранения. В сухом прохладном месте.

Срок годности. Трава 2 года, экстракт 3 года, настойка 10 лет.

ПОСТИНОР (Postinor). Одна таблетка содержит 0,75 мг D-норгестрела.

Фармакологическое действие. Принятый непосредственно после полового акта D-норгестрел в дозе 0,75 мг способен предупредить нежелательную беременность.

Показания к применению. Препарат рекомендуется для предупреждения беременности женщин, не живущим регулярной половой жизнью (при частоте половых актов не более 1 раза в неделю и соответственно 4 раз в месяц).

Способ применения и дозы. Внутрь 1 таблетку обязательно в течение часа после полового акта. Новую дозу (1 таблетку) необходимо принять в том случае, если половой акт повторится по истечении 3 ч (если в течение 3 ч, то прием второй таблетки не нужен). При многократных половых актах препарат следует принимать по схеме: 1 таблетку после первого акта, 1 таблетку спустя 3 ч и 1 таблетку через 24 ч после первого акта.

Побочное действие. В некоторых случаях возможны тошнота и кровотечение.

Противопоказания. Заболевание печени и желчевыводящих путей, желтуха во время беременности в анамнезе.

Форма выпуска. Таблетки в блистерах по 10 штук.

Условия хранения. Обычные.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Венгрии.

ПОЧЕЧНОГО ЧАЯ ЛИСТЬЯ (Folium Orthosiphonis). Содержат: тритерпеновые сапонины, гликозид ортосифонин, 5—6% дубильных веществ.

Применение. Как диуретическое средство до еды при заболеваниях почек, отеках на почве недостаточности кровообращения, при холециститах (как умеренное спазмолитическое средство) после еды в виде настоя (3,5:200,0) в теплом виде по полстакана 1—2 раза в день.

Форма выпуска. В картонных коробках по 50 г, брикеты по 60 г.

Условия хранения. В сухом, хорошо провстриваемом помещении.

Срок годности. Резаный лист 4 года, брикеты 3 года.

ПРАЗОЗИН (Prazosinum). 1-(4-Амино-6,7-диметокси-2-хиназолил)-4-(2-фуроил) пиперазина гидрохлорид. Синонимы: Adversuten, Furazosin hydrochlorid, Hypovase, Minipress, Pratsiol, Sinetens и др.

Фармакологическое действие. α-Адреноблокирующий препарат, действие которого направлено избирательно на постсинаптические α_1-адренорецепторы. Кроме того, препарат угнетает фермент фосфодиэстеразу, что способствует расслаблению гладкой мускулатуры сосудов. Блокада α_1-адренорецепторов и непосредственное влияние на тонус сосудистой мускулатуры приводят к понижению АД и уменьшению периферического сопротивления сосудов. Гипотензивное действие празозина сохраняется несколько дней после отмены препарата, оно усиливается диуретиками и другими антигипертензивными средствами (метилдофа, клофелин и др.). Празозин уменьшает постнагрузку на сердце. Около 10% препарата выводится почками в неизменном виде.

Отредактировал: ledi24

Показания к применению. Артериальная гипертензия любого происхождения, застойная сердечная недостаточность.

Способ применения и дозы. Назначают внутрь независимо от приема пищи. В первые дни принимают по 0,5 мг перед сном. Далее назначают по 1 мг 3—4 раза в день. Постепенно дозы увеличивают, добиваясь гипотензивного эффекта. Стойкое понижение АД может развиться через 4—8 нед. Поддерживающая доза подбирается индивидуально и может составлять от 3 до 20 мг/сут, чаще она равняется 6—15 мг/сут. Суточную дозу принимают в 3—4 приема. При назначении монотерапии следует учитывать возможность развития ранней (на 3—5-й день) или поздней (через несколько месяцев) толерантности (привыкания) к препарату. Это требует увеличения разовой дозы празозина на 1 мг или больше либо назначения диуретиков.

При недостаточном или медленно развивающемся гипотензивном эффекте празозин комбинируют с диуретиками или другими антигипертензивными средствами. В этом случае дозу празозина уменьшают до 1—2 мг 3 раза в день при одновременном добавлении препарата, который вводят в схему лечения, а затем вновь постепенно повышают, подбирая необходимый режим лечения. Длительность лечения празозином не ограничивается.

При застойной сердечной недостаточности празозин назначают в дозе 3—20 мг в день в 3—4 приема.

Побочное действие. В течение 1—2 ч после приема первой дозы празозина возможна коллаптоидная реакция с потерей сознания (обморок). Во избежание этого осложнения первую дозу принимают перед сном. Коллаптоидное состояние может развиться при быстром повышении дозы празозина или при введении в лечебную схему других антигипертензивных средств, в том числе диуретиков. Возможны также головная боль, головокружение, сонливость, раздражительность, депрессия, сердцебиения, слабость, тошнота, сухость во рту и др. Обычно побочные явления исчезают самостоятельно без понижения дозы, если этого не происходит, то следует уменьшить дозу или отменить препарат.

Противопоказания. Индивидуальная непереносимость препарата. Не назначают беременным и детям.

Форма выпуска. В таблетках (с риской) по 0,001 г (1 мг), в упаковке 50 таблеток и по 0,005 г (5 мг) в упаковке 50 таблеток.

Из Финляндии поступает под названием «Пратсиол» в таблетках по 0,001 г по 100 таблеток в упаковке.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

ПРЕГНИН (Praegninum). Прегнен-4-ин-20-ол-17β-он-3. Синонимы: Pregnoral, Progestoral.

Фармакологическое действие. Синтетический аналог прогестерона; сходен с ним по биологическому действию, но несколько менее активен.

Показания к применению. Нарушения функции яичников, связанные с недостаточностью желтого тела (дисфункциональные маточные кровотечения, аменорея, гипо- и олигоменорея, альгоменорея, бесплодие и др.).

Способ применения и дозы. Сублингвально по 0,01—0,02 г 2—3 раза в день. При необходимости дозу увеличивают до 0,05—0,06 г в день и комбинируют с андрогенами. Высшие дозы (для взрослых): разовая 0,02 г, суточная 0,06 г.

Форма выпуска. Таблетки по 0,01 г, в упаковке 10 штук.

Отредактировал: ledi24

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.
Срок годности 4 года.

ПРЕГЭСТРОЛ (Praegoestrolum).

Фармакологическое действие. Гормональный препарат, содержащий в одной таблетке прегнина 0,01 г, этинилэстрадиола 0,00001 г

Показания к применению. Климактерический синдром.

Способ применения и дозы. 1—2 таблетки в день в течение 15—20 дней. Лечение повторяют после 2—3-недельного перерыва.

Побочное действие. Диспептические явления.

Противопоказания. Не рекомендуется применять больным с опухолями, а также женщинам, перенесшим операцию по поводу опухолей при частично сохраненных половых органах.

Форма выпуска. Таблетки, в упаковке 20 штук.

Условия хранения. Список Б. В сухом прохладном месте.

Срок годности 2 года.

ПРЕДИАН (Predian). 1-(3-Азабицикло [3, 3, 0]-окти-3-ил)-3-(пара-толил-сульфонил)-мочевина. Синонимы: Gliclazid, Diamicron

Фармакологическое действие. Снижает адгезивность и агрегацию тромбоцитов и повышает фибринолитическую активность.

Показания к применению. Для лечения сахарного диабета в пожилом возрасте, не компенсируемого только диетой.

Способ применения и дозы. Доза устанавливается в зависимости от индивидуальной реакции. Назначают внутрь, начиная с приема 0,04—0,08 ($^1/_2$ таблетки —1 таблетка) и повышают до достижения адекватного контроля. Взрослым обычно назначают от 0,04 до 0,32 г При этом необходимо учитывать, что одновременное применение сульфаниламидов, фенилбутазона, салицилатов, производных пирразолона и β-блокаторов потенцирует гипогликемизирующее действие предиана.

Побочное действие. Возможны тошнота, головная боль, сыпь, нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта, гипогликемия.

Противопоказания. С осторожностью назначают больным с нарушениями функции печени и почек.

Форма выпуска. Таблетки по 0,08 г, в упаковке 60 штук.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Югославии.

ПРЕДНИЗОЛОН (Prednisolonum). Прегнандиен-1,4-триол-11β, 17α, 21-дион-3,20. Синонимы: Dacortin, Metacortalon, Nisolone, Prenolone.

Фармакологическое действие. Дегидрированный аналог гидрокортизона; по активности и свойствам близок к преднизона ацетату.

Применение. В тех же случаях, что и кортизона ацетат, внутрь по 0,025—0,05 г/сут (в 2—3 приема), затем дозу уменьшают до 0,01—0,005—0,0025 г. Высшая разовая доза для взрослых 0,015 г, суточная 0,1 г. При острой недостаточности надпочечников, шоке и в других неотложных случаях, требующих немедленного повышения уровня кортикостероидов в крови, вводят внутривенно по 0,03 г в 1 мл. Наружно в виде 0,5% мази при кожных заболеваниях (экзема, эритродермия и др.) В офтальмологии (аллергические заболевания глаз и др.) в виде капель (0,3% раствор).

Побочное действие и противопоказания те же, что и для кортизона ацетата.

Форма выпуска. Таблетки по 0,005 г, в упаковке 100 штук, мазь 0,5% по 10 г, в упаковке.

Из Индии и Венгрии препарат поступает в ампулах (30 мг в 1 мл)

Отредактировал: ledi24

в упаковке по 3 штуки, во флаконах (0,3% раствор) по 5 мл для глазных капель и мазь 0,5% по 20 г.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности. Все лекарственные формы 2 года.

ПРЕДНИЗОЛОНГЕМИСУКЦИНАТ (Prednisolonhemisuccinas). Прегнадиен-1,4-триол-11β, 17α 21-дион-3,20-сукцината динатриевая соль. Синоним: Di-Adresson.

Фармакологическое действие. Глюкокортикоидный гормональный препарат. Влияет на углеводный, белковый и жировой обмен, способствует накоплению гликогена в печени, тормозит выведение натрия и воды из организма и способствует удалению калия.

Показания к применению. Острые аллергические реакции, бронхиальная астма и астматический статус, для профилактики и лечения тиреотоксической реакции и тиреотоксического криза, для лечения шока (посттравматического, послеоперационного, токсического, ожогового, кардиогенного и др.), при инфаркте миокарда, при острой недостаточности надпочечников, при острой печеночно-почечной недостаточности, при инфекционно-аллергическом миокардите, ревматическом и деформирующем артрозе, при системной красной волчанке, при циррозе печени и остром гепатите.

Способ применения и дозы. Внутривенно (струйно или капельно) или внутримышечно. Содержимое ампулы (25 мг) растворяют в 5 мл воды для инъекций. При капельном введении полученный раствор добавляют к 0,25—0,5 л изотонического раствора хлорида натрия, 5% раствора глюкозы или полиглюкина. Число капель в минуту (25—70) зависит от исходного АД и скорости его восстановления.

Обычно вводят вначале внутривенно струйно, затем капельно. В зависимости от заболевания и его тяжести лечение преднизолонгемисукцинатом проводят по специальным схемам в условиях скорой помощи и в стационарах (см. инструкцию по применению).

Во всех случаях препарат вводят внутривенно струйно или капельно, дробными дозами в зависимости от тяжести состояния больного. При невозможности внутривенного введения препарат вводят внутримышечно в тех же дозах, растворив содержимое ампулы (25 мг) в 5 мл воды для инъекций.

Растворы препарата несовместимы с тетрациклинами, окситетрациклином, левомицетином.

Побочное действие. Может вызвать нарушение электролитного обмена, гипергликемию, гликозурию, психические расстройства, повышение АД, обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и др. Длительное применение препарата может привести к угнетению функции коры надпочечников и стероидной зависимости.

Противопоказания. Активная форма туберкулеза, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, острые психозы и хронические психические заболевания в стадии обострения, декомпенсированная сердечная недостаточность, гипертоническая болезнь II—III стадии, декомпенсированный сахарный диабет, тромбофлебит, недостаточность выделительной и реабсорбционной функции почек, беременность.

Форма выпуска. В ампулах емкостью 5 мл с содержанием 0,025 г (25 мг) препарата, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

ПРЕДНИЗОНА АЦЕТАТ (Prednisoni acetas). Прегнадиен-1,4-

Отредактировал: ledi24

диол-17α, 21-трион-3,11,20-ацетат. Синонимы: Decortin, Dehydrocortison, Metacorten.

Фармакологическое действие. Глюкокортикостероид; по действию аналогичен кортизона ацетату, но активнее в 3—5 раз.

Способ применения и дозы. Назначают внутрь. Начальная доза для взрослых 0,025—0,05 г в день (в 2—3 приема), затем дозу уменьшают до 0,01—0,0056—0,0028 г. Высшая разовая доза для взрослых 0,015 г, суточная 0,1 г.

Показания к применению, побочное действие и противопоказания те же, что и при применении гидрокортизона ацетата.

Форма выпуска. Таблетки по 0,0056 г, в упаковке 30 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 4 года.

ПРЕПАРАТ АСД (Preparatum ASD). Продукт, получаемый из ткани животных.

Фармакологическое действие. Антисептическое средство. Стимулирует процессы регенерации эпидермиса.

Применение. Наружно для компрессов при экземах.

Форма выпуска. Во флаконах по 200 мл.

Условия хранения. В защищенном от света месте.

Срок годности не установлен.

ПРЕСОЦИЛ (Presocyl). Состав: преднизолона 0,75 мг, хлорохина фосфата 40 мг, кислоты ацетилсалициловой 200 мг.

Применение. При хронических ревматических процессах (полиартрит, мышечный ревматизм) и воспалительных процессах опорно-двигательного аппарата по 1—2 таблетки 2—3 раза в день.

Форма выпуска. Таблетки, в упаковке 30 штук.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Венгрии.

ПРЕФИЗОН (Prephyson). Стандартизированный комплексный экстракт передней доли гипофиза.

Показания к применению. Болезнь Дауна, кахексия Симондса, гипофизарное ожирение, адипозогенитальная дистрофия, гипогенитализм и др.

Способ применения и дозы. Подкожно и внутримышечно (при необходимости внутривенно с водой для инъекций или 5% раствором глюкозы) по 1—2 мл в день.

Форма выпуска. В ампулах по 1 мл (25 ЕД), в упаковке 10 штук.

Срок годности 2 года.

ПРЕФУЗИН (Prefusinum). Комбинированный препарат, содержащий фузидиевую кислоту и преднизолон. Используется в виде геля.

Фармакологическое действие. Оказывает антибактериальное, противовоспалительное и десенсибилизирующее действие. Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных кокков (стафилококки, в том числе множественноустойчивые, менингококки, гонококки) и некоторых грамположительных бактерий (коринебактерии, клостридии). Менее активен в отношении стрептококков, пневмококков.

Показания к применению. Назначаются взрослым при гнойно-воспалительных заболеваниях кожи, вызываемых чувствительными к фузидиевой кислоте микроорганизмами (поверхностные стрептостафилодермии, фолликулиты, фурункулез, инфицированные ссадины, микробная экзема), а также при идиопатической экземе, нейродермите, почесухе, пузырчатых дерматозах, осложненных вторичной инфекцией.

Отредактировал: ledi24

Способ применения и дозы. Префузин наносят на пораженную поверхность кожи тонким слоем 1—2 раза в день после удаления гноя и некротических масс. Курс лечения обычно 7—14 дней.

Побочное действие. Возможны гиперемия, зуд кожи и аллергические реакции (сыпь).

Противопоказания. Повышенная индивидуальная чувствительность к фузидиевой кислоте и преднизолону; грибковые и сифилитические заболевания кожи, кожные реакции после вакцинации, беременность. Препарат не применяют у детей.

Форма выпуска. В тубах по 15 г.

Условия хранения. В сухом прохладном месте.

Срок годности 2 года.

ПРИМАХИН (Primachinum). 8-(4-Амино-1-метилбутиламино)-6-метокси-хинолин. Синонимы: Avlon, Neo-Quipenyl.

Фармакологическое действие. Оказывает антипротозойное действие на половые формы, шизонты и параэритроцитарные формы всех видов малярийных плазмодиев.

Показания к применению. Трехдневная, четырехдневная и тропическая малярия. Профилактика отдаленных рецидивов.

Способ применения и дозы. Внутрь, суточная доза для взрослых 0,027 г (27 мг). Курс лечения 14 дней. Детям дозы уменьшают в соответствии с возрастом.

Побочное действие. Боль в животе, диспептические явления, общая слабость, боль в области сердца, цианоз, метгемоглобинемия, анемия, лейкопения, гемолиз эритроцитов.

Противопоказания. Заболевания крови и кроветворных органов, болезни почек, стенокардия, ревматизм, системная красная волчанка. Нельзя назначать примахин одновременно с препаратами, угнетающими кроветворение.

Форма выпуска. Таблетки по 0,009 г примахина.

Условия хранения. Список Б. В банках темного стекла.

Срок годности 3 года.

ПРОГЕСТЕРОН (Progesteronum). Прегнен-4-дион-3,20. Синонимы: Progestin, Progelan.

Фармакологическое действие. Синтетический гормон желтого тела.

Показания к применению. Аменорея, ановуляторные маточные кровотечения, бесплодие, недоношенная беременность, альгоменорея на почве гипогенитализма.

Способ применения и дозы. Внутримышечно или подкожно по 1 мл 1% или 2,5% раствора в течение 6—8 дней. При угрожающем выкидыше вводят по 1 мл 1% раствора ежедневно или через день до полного исчезновения симптомов, указывающих на возможность выкидыша; при привычном аборте препарат вводят до IV месяца беременности. Высшая доза для взрослых 2,5 мл 1% раствора или 1 мл 2,5% раствора.

Форма выпуска. Ампулы по 1 мл 1% или 2,5% раствора в масле, в упаковках по 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности. Раствор в масле 5 лет, в оливковом масле 6 лет.

ПРОДИГИОЗАН (Prodigiosanum). Высокополимерный липополисахаридный комплекс, выделенный из макроорганизмов.

Фармакологическое действие. Оказывает неспецифическое стимулирующее действие.

Показания к применению. В комплексном лечении вяло зажи-

Отредактировал: ledi24

вающих трофических язв, для ускорения развития грануляций, устранения отечности тканей после операций.

Способ применения и дозы. Вводят внутримышечно. Дозу устанавливают индивидуально. Для взрослых 25—100 мкг (0,5—2 мл 0,005% раствора) на инъекцию. Для детей — начиная с 10—20 мкг, но не более 50—75 мкг.

Побочное действие. Повышение температуры тела, головная боль, общее недомогание.

Противопоказания. Поражения центральной нервной системы, острая коронарная недостаточность, инфаркт миокарда.

Форма выпуска. Ампулы по 1 мл 0,005% раствора для инъекций, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. В защищенном от света месте при температуре от 4 до 8°С.

Срок годности 3 года.

ПРОЗЕРИН (Prozerinum). N-(м-Диметилкарбамоилоксифенил) триметиламмоний метилсульфат. Синонимы: Neostigmini methylsulfas, Prostigmin methilsulfate.

Фармакологическое действие. Обладает выраженной антихолинэстеразной активностью.

Показания к применению. Миастения, парезы и параличи; восстановительный период после менингита; атрофия зрительного нерва, неврит; глаукома; для профилактики и лечения атонии желудка, кишечника, мочевого пузыря, для стимулирования родов; как антидот миорелаксантов.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,015 г 2—3 раза в день; подкожно по 1 мл 0,05% раствора 1—2 раза в сутки; в офтальмологии по 1—2 капли 0,5% раствора 1—4 раза в сутки. Высшая разовая доза внутрь 0,015 г, суточная 0,05 г; под кожу разовая 0,002 г, суточная 0,006 г.

Детям внутрь в гранулах из расчета до 10 лет по 0,001 г на 1 год жизни в сутки, старше 10 лет — не свыше общей суточной дозы 0,01 г (10 мг). Под кожу 0,05 мг (0,1 мл 0,05% раствора) на 1 год жизни, но не больше 0,75 мл 0,05% раствора.

Побочное действие. Брадикардия, понижение АД, слабость, гиперсаливация, усиление бронхиальной секреции, тошнота, рвота, подергивание мышц языка и скелетной мускулатуры.

Противопоказания. Эпилепсия, гиперкинезы, бронхиальная астма, стенокардия, выраженный атеросклероз.

Форма выпуска. Порошок; таблетки по 0,015 г, в упаковке 20 штук, ампулы по 1 мл 0,05% раствора, в упаковке 10 штук, гранулы 60 г в упаковке.

Условия хранения. Список А. В защищенном от света месте.

Срок годности. Порошок и таблетки 5 лет, ампулы 3 года, гранулы 2 года.

ПРОКТО-ГЛИВЕНОЛ (Procto-Glyvenol).

Фармакологическое действие. Препарат позволяет проводить эффективную терапию геморроя и приводит к быстрому улучшению тягостных геморроидальных симптомов, вызываемых воспалительными изменениями в области заднего прохода.

Показания к применению. Наружные и внутренние геморроидальные узлы.

Способ применения и дозы. До исчезновения острых симптомов — по 1 дозе (1 г) крема или 1 свече утром и вечером; позднее суточную дозу сокращают до одноразового применения крема или 1 свечи. При

Отредактировал: ledi24

внутренних геморроидальных узлах крем можно вводить с помощью прилагаемой к упаковке навинчивающейся насадки.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к активным веществам препарата — трибенозиду и лидокаину.

Форма выпуска. Крем в тюбиках по 30 г, свечи в упаковке по 10 штук.

Срок годности 3 года.

Производитель — фирма «Сиба-Гейги», Швейцария.

ПРОКТОСЕДИЛ (Proctosedyl). Состав: фрамицетин сульфат гидрокортизон ацетат, эскулосид, этил аминобензоат.

Показания к применению. Внутренний и наружный геморрой, анальный зуд, перианальная экзема, проктит, трещины.

Способ применения и дозы. Мазь можно применять отдельно или вместе с ректальными капсулами. Ректальная капсула вставляется утром, вечером и после каждого стула.

Противопоказания. Известная повышенная чувствительность к любому из компонентов.

Форма выпуска. Мазь, ректальные капсулы.

Срок годности 2 года.

Поставляется из Германии.

ПРОЛОТЕСТОН (Prolotestonum). Смесь 2-α-метилдигидротестостерона и его эфиров: пропионового (т. е. медротестрона пропионата), капронатового и энантового (в соотношении 1:2:4:7).

Фармакологическое действие. Обладает андрогенными и анаболическими свойствами. В отличие от медротестрона пропионата, входящего в его состав, пролотестон оказывает пролонгированное действие.

Показания к применению. Распространенные формы первичного рака молочной железы (рецидивы и метастазы опухоли). Назначают женщинам с сохраненным менструальным циклом или при менопаузе до 5 лет. Более эффективен после двусторонней овариэктомии или подавления функции яичников в результате облучения.

Способ применения и дозы. Внутримышечно по 0,35 г (350 мг) или 0,7 г (700 мкг) (1—2 мл 35% раствора) 1 раз в 2 нед в течение длительного времени. Лечение прекращают при прогрессировании заболевания на фоне проводимой терапии или резко выраженных побочных реакциях. Препарат можно применять в сочетании с противоопухолевыми лекарственными средствами.

Побочное действие. Огрубение голоса, избыточный рост волос (чаще на коже лица), увеличение массы тела. При длительном лечении возможны токсический гепатит, гиперкальциемия и гиперкальциурия, при возникновении которых препарат отменяют и назначают соответствующее лечение.

Противопоказания. Тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы (инфаркт миокарда, гипертонический криз и т. д.), печени, почек и других органов; гиперкальциемия и гиперкальциурия.

Форма выпуска. 35% масляный раствор в ампулах по 1 мл.

Условия хранения. Список Б. При комнатной температуре.

Срок годности 2 года.

ПРОМЕДОЛ (Promedolum). 1,2,5-Триметил-4-пропионилокси-4-фенил-пиперидина гидрохлорид.

Фармакологическое действие. Активный анальгетик. По влиянию на центральную нервную систему близок к морфину.

Показания к применению. Травмы, заболевания, сопровождающиеся болевыми ощущениями; пред- и послеоперационный период;

Отредактировал: ledi24

стенокардия, инфаркт миокарда, злокачественные новообразования и др.; для обезболивания родов.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,025—0,05 г, под кожу 1—2 мл 1% или 2% раствора, внутривенно 1 мл 1% раствора; детям (старше 2 лет) по 0,003—0,01 г на прием в зависимости от возраста. Высшая разовая доза для взрослых 0,05 г, суточная 0,16 г.

Побочное действие и противопоказания те же, что и при применении препаратов морфина.

Форма выпуска. Порошок, таблетки по 0,025 г, в упаковке 10 штук; ампулы по 1 мл 1% раствора и 2% раствора, в упаковке 10 штук, шприц-тюбики по 1 мл 2% раствора.

Условия хранения. Список А.

Срок годности. Порошок 10 лет, ампулы и таблетки 5 лет, шприц-тюбики 3 года.

ПРОПАЗИН (Propazinum). 10-(3-Диметиламинопропил)-фенотиазина гидрохлорид Синонимы: Promilene, Protactyl.

Фармакологическое действие. По действию на организм аналогичен аминазину, но менее токсичен и уступает по силе седативного и антипсихотического эффекта.

Применение. При тех же показаниях, что и аминазин, особенно при более легком течении заболевания, а также у ослабленных больных; в детском и пожилом возрасте.

Назначают внутрь после еды по 0,025—0,05 г 2—4 раза в день, внутримышечно по 2—3 мл 2,5% раствора (2—3 раза в день) в 5 мл 0,25—0,5% раствора новокаина или изотонического раствора натрия хлорида; внутривенно по 1—2 мл 2,5% раствора в 10 мл 40% раствора глюкозы или изотонического раствора натрия хлорида. Дозы постепенно увеличивают до 0,4—0,6 г в день. Максимальная суточная доза 1—2 г

Побочное действие и противопоказания те же, что и при применении аминазина.

Форма выпуска. Таблетки, покрытые оболочкой, в упаковках 50 штук по 0,025 г и 0,05 г; ампулы по 2 мл 2,5% раствора, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В сухом, защищенном от света месте.

Срок годности. Таблетки 3 года, ампулы 1 год.

ПРОПЕР-МИЛ (Proper-Myl). Лиофилизированный препарат, представляющий собой комплекс грибов-сахаромицетов (Cryptococcus albicans, Candida tropicalis, Saccharomyces cerevisiae).

Показания к применению. Рассеянный склероз.

Способ применения и дозы. Внутривенно, ежедневно, начиная с 0,1 мл свежеприготовленной суспензии, с постепенным повышением дозы на 0,1 мл, а через неделю на 0,2 мл и доведением до 2,5—3 мл. Курс лечения (30—40 дней) через 3—4 мес может быть повторен.

Форма выпуска. Ампулы емкостью 5 мл, содержащие 10 мг препарата, с растворителем (5% раствор глюкозы) в упаковке по 20 штук.

Срок годности 5 лет.

ПРОПИЛЙОДОН (Propyliodonum). н-Пропиловый эфир 3,5-дийод-4-пиридон-N-уксусной кислоты. Синонимы: Dionosil, Propylix.

Применение. Как рентгеноконтрастное средство для исследования бронхов. Вводят в бронхи (медленно) 20—30 мл 50% водной суспензии.

Побочное действие. Возможно повышение температуры тела (на 0,5—2°)

Противопоказания. Общее тяжелое состояние больного, декомпенсация сердечной деятельности, аневризма грудной части аорты. Острые,

Отредактировал: ledi24

тяжело протекающие воспалительные процессы в легких и диффузная эмфизема.

Форма выпуска. Во флаконах по 10 г в комплекте с водной основой для суспензии 15 мл во флаконе.

Условия хранения. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности $2^1/_2$ года.

«ПРОПОСОЛ» АЭРОЗОЛЬ («Proposolum» aerosolum). Состав: прополиса 6 г, глицерина 14 г, спирта этилового 95% 80 г и пропеллент.

Фармакологическое действие. Противовоспалительное, дезинфицирующее и болеутоляющее средство.

Способ применения и дозы. В стоматологической практике, при катаральных гингивитах и стоматитах, язвенных стоматитах и других воспалительных заболеваниях полости рта. Препаратом орошают воспаленную область 2—3 раза в день.

Форма выпуска. Аэрозольные баллоны по 50 г.

Условия хранения. При температуре от 0 до 35°С вдали от источников огня.

Срок годности 2 года.

«ПРОПОЦЕУМ» («Propoceum»). Мазь экстракта прополиса (пчелиный клей).

Фармакологическое действие. Оказывает противозудное действие, вызывает аналгезию слизистых оболочек и кожи, обладает противовоспалительным свойством.

Показания к применению. В качестве дополнительного средства лечения при хронической экземе, нейродермитах, зудящих дерматозах, длительно не заживающих ранах и трофических язвах.

Способ применения и дозы. При заболеваниях кожи наносят 1—2 раза в сутки, при лечении ран или трофических язв — ежедневно или через день.

Побочное действие. Возможна индивидуальная непереносимость.

Противопоказания. Аллергия к продуктам пчеловодства, острая экзема.

Форма выпуска. Мазь в тюбиках по 30 г.

Условия хранения. В сухом прохладном месте.

Срок годности 2 года.

ПРОСПИДИН (Prospidinum). Проспидин-дихлорид N,N'''-ди-(γ-хлор-β-оксипропил)-N,N''-диспиротрипиперазиния.

Фармакологическое действие. Обладает противоопухолевой активностью, кроме того, дает противовоспалительный эффект и обладает гипотензивным свойством. Имеет большую широту терапевтического действия при суточной дозе 50—500 мг. Способен усиливать противоопухолевое действие ионизирующего излучения.

Показания к применению. Рак гортани, метастазы меланомы кожи, лимфосаркома, саркома Капоши, ретинобластома (в сочетании с лучевой терапией).

Способ применения и дозы. Внутримышечно, внутривенно или местно (в виде мази). Для внутримышечного введения проспидин растворяют в изотоническом растворе натрия хлорида из расчета 100 мг в 2 мл, а для внутривенного — из расчета 100 мг в 5 мл. Растворы готовят непосредственно перед инъекцией. Детям назначают из расчета 3 мг препарата на 1 кг массы тела. Общая доза на курс лечения — 1000—3000 мг проспидина в зависимости от массы тела ребенка, взрослым 2—3,5 г.

После оперативного удаления папиллом, локализующихся в глот-

Отредактировал: ledi24

ке, рекомендуется смазывать раневую поверхность 30% мазью в течение 7—10 дней.

Побочное действие. Парестезии, головокружение, головная боль, рвота; вертебробазилярная сосудистая недостаточность, появление белка и цилиндров в моче, повышение содержания мочевины и креатинина в сыворотке крови.

Противопоказания. Резкое нарушение функции почек, вертебробазилярная сосудистая недостаточность, глубокое угнетение кроветворения (лейкопения ниже $2 \cdot 10^9$/л, тромбоцитопения ниже $100 \cdot 10^9$/л)

Форма выпуска. Флаконы по 0,1 г, 30% мазь по 15 г.

Условия хранения. Список Б. В сухом месте.

Срок годности. Флаконы 3 года, мазь 2 года.

ПРОСТЕНОН (Prostenonum). Простагландин E_2.

Фармакологическое действие. Стимулирует сократительную активность матки, расширяет бронхи и устраняет спазм дыхательных путей при бронхиальной астме, оказывает вазодилатирующее и антиадгезивное действие, не обладает антидиуретическими свойствами.

Показания к применению. Применяют только в стационаре для родовозбуждения и стимуляции родовой деятельности при поздних токсикозах, гипертонической болезни, переношенной беременности, сердечно-сосудистой недостаточности; сахарном диабете, резус-конфликтной беременности, бронхиальной астме и других ситуациях, требующих досрочного родоразрешения; преждевременном излитии околоплодных вод, слабости родовой деятельности, если нет противопоказаний со стороны плода и матери.

Способ применения и дозы. Внутривенно капельно. Содержание ампулы 0,1% спиртового раствора разбавляют в 500 мл изотонического раствора натрия хлорида. Полученный раствор годен в течение 24 ч. Вводят капельно, начиная с 6—10 капель в минуту, постепенно увеличивая до 20 капель в минуту (прибавляя через каждые 10 мин по 4—5 капель в минуту) до установления регулярной родовой деятельности. Максимальная скорость введения 35 капель в минуту. Латентный период колеблется от 20 до 40 мин. Дозирование должно быть индивидуальным в зависимости от активности матки и переносимости. Количество расходуемого препарата колеблется от 0,75 мг до 0,5 мг.

Побочное действие. Тошнота, рвота, понос, а также местные реакции (флебит, экзематозные высыпания). Возможны покраснение лица, возбуждение роженицы, головокружение, головная боль, гипотония.

Противопоказания. Аллергия к препарату, наличие послеоперационных рубцов и опухолей матки с анатомически или функционально узким тазом, при гидроцефалии плода, аномалиях развития женских половых органов.

Форма выпуска. В ампулах по 1 мл 0,1% спиртового раствора в упаковке по 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте при температуре не выше 4°С.

Срок годности 2 года.

ПРОТАМИНА СУЛЬФАТ (Protamini sulfas).

Показания к применению. Применяют протамина сульфат в основном при необходимости нейтрализовать действие избыточного экзогенного гепарина.

Способ применения и дозы. Вводят раствор протамина сульфата внутривенно струйно или капельно под контролем свертываемости

Отредактировал: ledi24

крови. Струйно вводят медленно со скоростью 1 мл 1% раствора за 2 мин. Общая доза обычно составляет 5 мл 1% раствора.

Побочное действие. При введении раствора протамина сульфата возможны аллергические реакции (по типу крапивницы).

Противопоказания. Резко выраженная гипотония, тромбоцитопения, недостаточность коры надпочечников.

Форма выпуска. Ампулы по 2 мл 1% раствора, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 4 года.

ПРОТАРГОЛ (Protargolum). Синоним: Argentum proteinicum.

Применение. В качестве вяжущего, антисептического и противовоспалительного средства наружно при воспалительных заболеваниях слизистых оболочек верхних дыхательных путей (1—5%раствор), мочевыводящих путей, конъюнктивитах, бленнорее (1—3% раствор).

Форма выпуска. Порошок.

Условия хранения. В защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

ПРОТЕИН (Proteinum). Белковый препарат изогенной человеческой плазмы с содержанием 4,3—4,8% белка.

Фармакологическое действие. Повышает АД, способствует удержанию тканевой жидкости в кровяном русле.

Показания к применению. Травматический и операционный шок, гипопротеинемия и гипоальбуминемия различного происхождения. Применяется как специфическое противоанемическое средство.

Способ применения и дозы. Внутривенно, капельно. При хронической гипопротеинемии вводят ежедневно или через день. Разовая доза 250—400 мл раствора, суммарная 1000—3000 мл. При шоке препарат вводят внутривенно или внутриартериально капельно, для быстрого поднятия АД — струйно. Доза зависит от состояния больного и может достигать $1^1/_2$—2 л. При анемии препарат применяют в виде курса трансфузий по 250—500 мл.

Побочное действие. Возможны аллергические реакции (озноб, тошнота, рвота).

Противопоказания. Кровоизлияние в мозг, тромбоэмболия, сердечная недостаточность, гипертоническая болезнь II—III стадии.

Форма выпуска. 1 л.

Условия хранения. В защищенном от прямых солнечных лучей месте.

Срок годности 3 года.

ПРОТИОНАМИД (Protionamidum). 2-Пропил-тиокарбомоил-4-пиридин или тиомид α-пропилизоникотиновой кислоты. Синоним: Treventix.

Фармакологическое действие. Обладает противомикробной активностью в отношении микобактерий туберкулеза. По химическому составу и эффективности близок к этионамиду, но лучше переносится.

Показания к применению. Различные формы туберкулеза, а также устойчивость возбудителя к другим противотуберкулезным препаратам или их непереносимость больным.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,25 г 2—4 раза в день. Детям дозу уменьшают в зависимости от возраста и массы тела. Лечение длительное.

Побочное действие. В отдельных случаях желудочно-кишечные расстройства, головокружение, тахикардия, слабость.

Форма выпуска. Таблетки по 0,25 г, в упаковке 50 штук.

Условия хранения. Список Б. В сухом, защищенном от света месте.

Отредактировал: ledi24

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Венгрии.

ПСОБЕРАН (Psoberanum). Смесь фурокумаринов — псоралена и бергаптена, получают из листьев среднеазиатских сортов плодового растения инжира (Ficus carica L.).

Фармакологическое действие. Обладает фотосенсибилизирующей активностью, усиливает пигментообразование в коже при облучении ультрафиолетовыми лучами.

Показания к применению. Витилиго, гнездная плешивость.

Способ применения и дозы. Внутрь и местно. Внутрь по 0,01 г (1 таблетка) ежедневно 2—3 раза в день за 30 мин до еды. Одновременно смазывают депигментированные или лишенные волос участки кожи 0,1% спиртовым раствором препарата ежедневно или через день (на ночь или за 2—3 ч до облучения кварцевой лампой). До начала лечения определяют биодозу. Рекомендуется проводить облучение по ступенчатой методике Центрального научно-исследовательского кожно-венерологического института МЗ РФ. Курс лечения 3—3$^1/_2$ мес. Повторные курсы можно проводить с интервалами 1—1$^1/_2$ мес Общая продолжительность лечения псобераном может достигать 10—12 мес. Детям от 5 до 10 лет псоберан назначают в суточной дозе 0,01 г (1 таблетка), 11—13 лет —0,015 г (1$^1/_2$ таблетки), 14—16 лет —0,02 г (2 таблетки), взрослым —0,04—0,06 г (4—6 таблеток).

Побочное действие. При длительном применении может наблюдаться тошнота, тяжесть на желудке, понос, головная боль, сердцебиение, повышенная нервная возбудимость (бессонница, раздражительность), сыпь аллергического характера. У особенно чувствительных больных при чрезмерно длительной инсоляции на участках кожи, смазанных раствором псоберана, может развиться острый дерматит (резкая эритема до образования ожога III степени). В этих случаях 0,1% раствор разбавляют 70% спиртом в 2—4 раза.

Противопоказания. Индивидуальная непереносимость, острые желудочно-кишечные заболевания, тяжелые поражения почек (острый и хронический нефрит), сахарный диабет, кахексия, беременность, гипертоническая болезнь, туберкулез, заболевания крови, центральной нервной системы. Не рекомендуется применять детям до 5 лет и больным старше 60 лет.

Форма выпуска. Таблетки по 0,01 г, в упаковке 50 штук; 0,1% спиртовой раствор во флаконах по 50 мл.

Условия хранения. Список Б. В сухом, защищенном от света месте.

Срок годности. Таблетки и раствор 2 года.

ПСОРАЛЕН (Psoralenum). Препарат, содержащий смесь фурокумаринов из псоралеи костянковой (Psoralea drupacea Bge).

Фармакологическое действие. Фотосенсибилизирующее средство.

Показания к применению. Витилиго, гнездная плешивость.

Способ применения и дозы. Внутрь за 30 мин до еды по 0,005—0,02 г 2—3 раза в день; детям до 5 лет назначают в сутки по 0,005 г, от 5 до 10 лет —0,01 г, от 10 до 13 лет —0,015 г, от 13 до 16 лет —0,02 г. Одновременно назначают наружно 0,1% раствор (ежедневно или через день). Курс лечения (3—3$^1/_2$ мес) при необходимости повторяют через 1—1$^1/_2$ мес. Лечение должно проводиться при тщательном наблюдении врача.

Побочное действие и противопоказания те же, что и при применении аммифурина.

Отредактировал: ledi24

Форма выпуска. Таблетки по 0,01 г, в упаковке 50 штук и 0,1% раствор во флаконах по 50 мл.

Условия хранения. Список Б. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

«ПСОРИАЗИН» МАЗЬ (Unguentum «Psoriasinum»). Состав: дихлордиэтилсульфид 1 часть, вазелин 20 000 частей.

Показания к применению, способ применения, противопоказания и условия хранения те же, что для мази **«Антипсориатикум».**

Форма выпуска. В упаковке по 90 г.

Условия хранения. В прохладном месте.

Срок годности 2 года.

ПУВАЛЕН (Puvalen). Состав: в одной таблетке 15 мг метоксалена (-8-метоксипсорален).

Фармакологическое действие. Действующее вещество пувалена относится к фурокумаринам. Оказывает фотосенсибилизирующее действие на кожу.

Показания к применению. Псориаз, красный плоский лишай, нейродермит, грибовидный микоз, витилиго.

Способ применения и дозы. Назначают внутрь по 0,6 мг/кг 1 раз в сутки; препарат запивают молоком или принимают во время еды. Через $2—2^1/_2$ ч после приема препарата больной с плотно закрытыми глазами подвергается УФ-облучению в течение 5—30 мин.

Побочное действие. Возможны тошнота, гиперемия кожи.

Противопоказания. Тяжелые нарушения функции печени, почек, катаракта, беременность. Детям назначают препарат в случаях крайней необходимости.

Форма выпуска. Таблетки по 0,015 г, 50 штук в упаковке.

Срок годности 4 года.

Поставляется из Финляндии.

ПУСТЫРНИКА ТРАВА (Herba Leonuri). Содержит стероидные и флавоноидные гликозиды, стахидрин, алкалоид леонурин, сапонины и дубильные вещества.

Применение. Успокаивающее средство при повышенной нервной возбудимости, сердечно-сосудистых неврозах и ранних стадиях гипертонической болезни. Внутрь: настой (15,0:200,0) по 1 столовой ложке 3 раза в день, настойка по 30—50 капель 3—4 раза в день, жидкий экстракт по 15—20 капель 3—4 раза в день.

Форма выпуска. Резаная трава пустырника в упаковке по 100 г; настойка (Tinctura Leonuri) во флаконах по 25 мл, экстракт жидкий 1:2 (Extractum Leonuri fluidum).

Условия хранения. В сухом прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности. Настойка 4 года, экстракт 2 года, трава 3 года.

ПУФЕМИД (Puphemidum). Пара-изопроксифенилсукцинимид.

Фармакологическое действие. Противосудорожное средство.

Показания к применению. При различных формах эпилепсии типа petit mal, а также при височной эпилепсии.

Способ применения и дозы. Внутрь до еды взрослым, начиная с 0,25 г 3 раза в день, постепенно увеличивая дозу при необходимости до 1,5 г/сут; детям до 7 лет по 0,125 г, старше 7 лет — по 0,25 г 3 раза в день.

Побочное действие. Тошнота, бессонница. При тошноте рекомен-

Отредактировал: ledi24

дуется назначение препарата через 1—1½ ч после еды, при бессоннице за 3—4 ч до сна.

Противопоказания. Острые заболевания печени и почек, нарушения функции кроветворения, резко выраженный атеросклероз, гиперкинезы.

Форма выпуска. Таблетки по 0,25 г, в упаковке 50 штук.

Условия хранения. Список Б. В банках из темного стекла.

Срок годности 4 года.

РАВЕРОН (Raveron). Стандартизированный экстракт из предстательной железы половозрелых животных.

Фармакологическое действие. Стимулирует мышечную деятельность мочевого пузыря, способствует появлению трубчатых эпителиальных клеток в предстательной железе, предупреждает ферментную гиперактивность и пролиферацию периуретральной ткани.

Показания к применению. Аденома предстательной железы, хронический простатит, недержание мочи.

Способ применения и дозы. Внутримышечно ежедневно по 1 мл или через день по 2 мл в течение 4—6 нед.

Побочное действие. При индивидуальной повышенной чувствительности аллергические реакции.

Форма выпуска. Ампулы по 1 мл, в упаковке 30 штук.

Условия хранения. В прохладном месте.

Срок годности 5 лет.

РАМНИЛ (Rhamnilum). Сухой стандартизированный препарат коры крушины.

Применение. Как слабительное средство при хронических запорах по 0,2 г на ночь.

Форма выпуска. Таблетки по 0,05 г, в упаковке 30 штук.

Условия хранения. В защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

РАНТАРИН (Rantarinum). Экстракт пантов (неокостеневших рогов) самцов северного оленя.

Фармакологическое действие. Препарат повышает физическую и умственную работоспособность. По фармакологическим свойствам сходен с пантокрином.

Показания к применению. Применяют как тонизирующее средство.

Способ применения и дозы. Применяют внутрь за 30 мин до еды по 1 таблетке 2—3 раза в день. Курс лечения 3—4 нед. При необходимости через 5—7 дней курс лечения повторяют.

Побочное действие. Возможна тошнота.

Противопоказания. Артериальная гипертония, стенокардия, нарушения сердечного ритма, атеросклероз, острый период инфекционных болезней, тромбоэмболические заболевания, нефрит и другие органические заболевания почек.

Форма выпуска. В таблетках, покрытых оболочкой, по 0,25 г, в упаковке 50 таблеток.

Условия хранения. В защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

РАУНАТИН (Raunatinum). Препарат, содержащий сумму алкалоидов из корней раувольфии змеиной.

Фармакологическое действие. Оказывает гипотензивное, антиаритмическое и умеренное седативное действие.

Показания к применению. Гипертоническая болезнь I и II стадии.

Отредактировал: ledi24

Способ применения и дозы. Внутрь после еды 0,002—0,012 г в день.

Побочное действие. В отдельных случаях набухание слизистых оболочек носа, потливость, слабость, боль в области сердца.

Противопоказания. Гипотония.

Форма выпуска. Таблетки, покрытые оболочкой, по 0,002 г, в упаковке 50 штук.

Аналогичный препарат поставляется из Германии под названием «Рауваза́н» в драже по 0,002 г, в упаковке 100 штук.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности раунатина 2 года, рауваза́на 5 лет.

РЕВЕНЯ КОРЕНЬ (Radix Rhei). Содержит антрагликозиды (глюкокореин, глюкоалоэмодин, хризофанеин, реохризин), свободные антрахиноновые соединения (реин, реоэмодин, хризофанол, фицин), производные антрона (пальмидин А, В, С), дубильные вещества пирокатехиновой группы, таногликозиды, хризофановую кислоту, смолистые, красящие и другие вещества.

Применение. Как слабительное средство при хронических запорах по 0,5—1 г на ночь.

Побочное действие. Оказывает некоторое раздражающее влияние на кишечник. Пот, моча и молоко окрашиваются в желтый цвет.

Форма выпуска. Таблетки по 0,5 г, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности не установлен.

РЕГИДРОН (Rehydron). Дозированный порошок. Состав: натрия хлорид 3,5 г, калия хлорид 2,5 г, натрия цитрат 2,9 г, глюкоза 10 г.

Фармакологическое действие. Раствор солей и сахара предотвращает или уменьшает обезвоживание путем восстановления потерянных воды, натрия и калия и нормализации кислотно-основного баланса.

Показания к применению. Понос у детей, требующий регидратации.

Способ применения и дозы. Регидратация ребенка при поносе проводится через рот в течение 6—10 ч. Вводимое количество раствора рассчитывают по предполагаемой потере массы тела. Без вреда можно дать как минимум 30 мл/кг за указанный срок, при амбулаторных условиях в среднем 60 мл/кг. В регидрон нельзя добавлять сахар. Ребенку можно дать обычную пищу сразу после регидратации. Если понос продолжается в такой степени, что ребенок вновь подвергается обезвоживанию, можно повторить регидратацию.

Содержимое пакета растворяют в 1 л свежекипяченой охлажденной питьевой воды. Раствор годен к употреблению внутрь в течение суток. Хранить раствор в холодильнике.

Форма выпуска. Дозированный порошок 18,9 г, в упаковке по 20 пакетиков.

Условия хранения. Хранить в плотно закрытой таре без доступа воздуха при комнатной температуре.

Срок годности 3 года.

Поставляется из Финляндии.

РЕГИТИН (Regitin).

Фармакологическое действие. Препарат вызывает быстрый и мощный сосудорасширяющий эффект, распространяющийся также на венозную систему. Происходит снижение системного сосудистого сопротивления, уменьшается давление наполнения в левом желудочке сердца. Тем самым уменьшается объем работы сердца и повышается его функциональная производительность. Увеличение ударного и минутного объемов лимитирует снижение кровяного давления. При тяжелой острой сердеч-

Отредактировал: ledi24

ной недостаточности и свежем инфаркте миокарда парентеральное введение регитина приводит к быстрому улучшению клинической картины заболевания. Лечение препаратами наперстянки не влияет на эффект регитина.

Показания к применению. Острая сердечная недостаточность с выраженным застоем в легких или отеком легкого, особенно при свежем инфаркте миокарда. Нарушения периферического кровообращения. Купирование гипертонических кризисов при феохромоцитоме, а также их профилактика до и во время хирургических вмешательств (в сочетании с β-адреноблокатором).

Способ применения и дозы. Внутривенно капельно в стерильном 5% растворе глюкозы (5—60 мг за 10—30 минут). Скорость вливания должна составлять 0,1—2 мг/мин. При необходимости, особенно при повышенном артериальном давлении в большом круге кровообращения, скорость вливания в первую минуту может быть повышена до 5 мг/мин. Как правило, оказывается достаточным начальное введение 10 мг регитина в течение 30 минут (0,3 мг/мин). В зависимости от реакции больного лечение можно продолжать беспрерывно много часов или повторять его с определенными интервалами.

При нарушениях периферического кровообращения доза — по 1—2 таблетки 3 раза в день, желательно после еды; в тяжелых случаях — по 10 мг внутримышечно или внутривенно 1—2 раза в день.

При феохромоцитоме для лечения и для профилактики гипертонического кризиса — за 2 часа до хирургического вмешательства 5—10 мг внутримышечно или внутривенно; при необходимости инъекцию повторяют во время операции.

Систолическое давление на уровне 80 мм рт. ст.— нижняя граница области показаний к применению препарата.

Побочное действие. Редкие случаи гипотонии, тахикардии и головокружения наблюдаются в основном при парентеральном введении. Тошнота, диарея и гиперемия слизистой оболочки носа проявляются лишь при назначении высоких доз препарата.

Противопоказания. Высокая степень гипотензии.

Форма выпуска. Ампулы (1 мл) по 10 мг, в упаковке по 5 штук; ампулы (5 мл) по 50 мг, в упаковке по 5 штук; таблетки по 20 мг, в упаковке по 20 штук.

Срок годности таблеток 5 лет, ампул 3 года.

Производится фирмой «Сиба-Гейги», Швейцария.

РЕЗЕРПИН (Reserpinum). 3,4,5-Триметоксибензоил метилрезерпата. Синонимы: Rausedil, Serpasil.

Фармакологическое действие. Дает гипотензивный и седативный эффект, вызывает гипотермию и несколько замедляет обменные процессы, потенцирует действие снотворных и анальгетиков. В отличие от аминазина не обладает адренолитическими свойствами.

Показания к применению. Гипертоническая болезнь, психические заболевания сосудистой этиологии, психозы, протекающие на фоне повышенного АД.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,1—0,25 мг на прием до 1 мг/сут. Высшая разовая доза 1 мг (0,001 г), суточная 2 мг (0,002 г). Рекомендуется периодически чередовать резерпин с другими гипотензивными средствами.

Побочное действие. Гиперемия слизистых оболочек глаз, кожные высыпания, диспетические явления, брадикардия, слабость, головокружение, одышка. Иногда чувство тревоги, депрессия, бессонница, явления паркинсонизма.

Отредактировал: ledi24

Противопоказания. Тяжелые органические заболевания сердечно-сосудистой системы, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, заболевания почек с нарушением функции.

Форма выпуска. Таблетки в упаковках по 50 штук по 0,1 мг и по 0,25 мг.

Условия хранения. Список Б. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

Поступает из Польши.

РЕЗОРЦИН (Resorcinum). м-Диоксибензол.

Применение. При кожных заболеваниях (экзема, себорея, грибковые заболевания) наружно в виде 2—5% водных и спиртовых растворов, 5%, 10% и 20% мазей.

Форма выпуска. Порошок.

Условия хранения. В защищенном от света месте.

Срок годности. Раствор 2 года, порошок 3 года.

РЕЛАДОРМ (Reladorm). Комплексный препарат, содержащий кальциевую соль циклобарбитала (фанодорм) 0,1 г и диазепама (валиум) 0,01 г.

Фармакологическое действие. Препарат быстро вызывает сон физиологического типа, продолжающийся 6—8 ч без посленаркотических симптомов.

Показания к применению. Бессонница, трудности с засыпанием, короткий сон.

Способ применения и дозы. 1 таблетка за 20—30 мин перед сном

Противопоказания. Сверхчувствительность к отдельным компонентам препарата, беременность, период лактации; нельзя назначать препарат до и во время работы лицам, профессия которых требует быстрой физической и психической реакции (водителям транспорта и др.).

Форма выпуска. Таблетки по 0,11 г, в упаковке 10 штук.

Срок годности 3 года.

Поставляется из Польши

РЕМАНТАДИН (Remantadinum). Гидрохлорид α-метил-1-адамантилметиламина. Синоним: Meradone.

Фармакологическое действие. Обладает противовирусной активностью в отношении всех штаммов вируса гриппа типа А и в меньшей степени типа В.

Показания к применению. Лечение в начальной стадии (1—2 дня) гриппа и профилактика гриппа и острых вирусных респираторных заболеваний в период эпидемии гриппа.

Способ применения и дозы. Внутрь после еды. В 1-й день — по 2 таблетки (100 мг) 3 раза в сутки, на 2-й и 3-й день — по 1—2 таблетки 3 раза в сутки одновременно с симптоматическими средствами. С целью профилактики гриппа ежедневно по 1 таблетке в течение 5—7 дней при постоянном контакте с больными (очаговая профилактика) или в течение 20 дней при эпизодических контактах (плановая профилактика).

Противопоказания. Острые заболевания печени, почек, тиреотоксикоз.

Форма выпуска. Таблетки по 0,05 г (50 мг), в упаковке 20 штук.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности 5 лет

Отредактировал: ledi24

РЕОГЛЮМАН (Rheoglumanum).

Фармакологическое действие. Кровезаменитель полифункционального действия. Уменьшает вязкость крови, способствует восстановлению кровотока в мелких капиллярах, предотвращает, ликвидирует или тормозит агрегацию форменных элементов крови, обладает дезинтоксикационными, диуретическими и гемодинамическими свойствами.

Показания к применению. В качестве средства, улучшающего капиллярный кровоток, с целью профилактики и лечения заболеваний, сопровождающихся нарушением микроциркуляции местного и общего характера, задержкой жидкости в организме. Показан при нарушении капиллярного кровотока (травматический, операционный, кардиогенный, ожоговый шок), нарушении артериального и венозного кровообращения (тромбозы, тромбофлебиты, эндартерииты, болезнь Рейно), в сосудистой и пластической хирургии (для улучшения местной циркуляции и уменьшения тенденции к тромбозам в трансплантате), у больных при почечной и почечно-печеночной недостаточности с сохраненной фильтрационной функцией почек, при посттрансфузионных осложнениях, вызванных влиянием несовместимой крови, для дезинтоксикации при ожогах, перитонитах, панкреатите.

Способ применения и дозы. Препарат вводят внутривенно капельно. Дозы и скорость введения выбирают в соответствии с показаниями, состоянием больного и его почасовым и суточным диурезом. Вместе с реоглюманом целесообразно вводить растворы, содержащие калий и натрий.

Введение начинают с 5—10 капель в минуту в течение 10—15 мин. После введения 5—10 капель, а затем 30 капель делают перерыв на 2—3 мин для биологической пробы. При отсутствии реакции препарат вводят со скоростью 40 капель в минуту Увеличение скорости свыше 40 капель в минуту возможно лишь при динамическом контроле за показателями центрального венозного давления крови и ЭКГ

Побочное действие. Возможны аллергические реакции (уртикарные высыпания, кожный зуд, отек типа Квинке и т. д.), учащение пульса и снижение АД. В этих случаях вливание реоглюмана прекращают Больному следует ввести срочно антигистаминные средства, сердечные, сосудистые и кортикостероидные препараты.

Противопоказания. Чрезмерная гемодилюция (гематокрит ниже 25 единиц), геморрагические диатезы (тромбоцитопении), недостаточность кровообращения с резко выраженной анасаркой, недостаточность почек, сопровождающаяся анурией, значительное обезвоживание больного и тяжелые аллергические состояния неясной этиологии.

Форма выпуска. Флаконы по 400 мл.

Условия хранения. В сухом месте при температуре от 10 до 25° С. Допускается замораживание до —10°С при транспортировании препарата

Срок годности 2 года.

РЕОПОЛИГЛЮКИН (Rheopolyglucinum). 10% коллоидный раствор частично гидролизованного декстрана с молекулярной массой 30 000—40 000 с добавлением изотонического раствора хлорида натрия.

Показания к применению. Патологические состояния, сопровождающиеся нарушением циркуляции крови в периферических сосудах, шок; для дезинтоксикации при ожогах, перитоните и др.

Способ применения и дозы. Внутривенно капельно до 400—1000 мл.

Побочное действие. Аллергические реакции.

Противопоказания. Тромбоцитопения, выраженные нарушения функции почек и сердечная недостаточность

Отредактировал: ledi24

Форма выпуска. Во флаконах по 400 мл, реополиглюкин с глюкозой во флаконах по 400 мл, по 200 мл.

Условия хранения. При температуре от 4 до 40°С.

Срок годности 4 года, реополиглюкина с глюкозой 6 лет.

РЕТАБОЛИЛ (Retabolil). 19-Нор-тестостерон-17β-деканоат. Синоним: Eubolin.

Фармакологическое действие. Активное анаболическое средство пролонгированного действия.

Применение. В случаях, когда показано применение анаболических препаратов (метандростенолон и др.) по 1 мл 5% раствора 1 раз в 1—3 нед; детям по 0,5—1 мл/кг 1 раз в 3—4 нед.

Противопоказания. Беременность, рак предстательной железы, нарушение функции печени и почек.

Форма выпуска. Ампулы по 1 мл 5% раствора.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Венгрии.

РЕТИНОЛА АЦЕТАТ (Retinoli acetas). Транс-9,13-диметил-7-(1,1,5-триметилциклогексен-5ил-6)-нонатетраен-7,9,11,13-ола-15-ацетат. Синонимы: витамин А, Axerophtholum.

Фармакологическое действие. Способствует нормальному обмену веществ, росту и развитию организма. Обеспечивает нормальную деятельность органа зрения, слизистых оболочек, сальных и потовых желез, повышает устойчивость к заболеваниям слизистых оболочек дыхательных путей и кишечника, повышает устойчивость организма к инфекциям.

Показания к применению. Авитаминоз и гиповитаминоз А. Инфекционные заболевания (корь, дизентерия, трахеит, бронхит, пневмония). Заболевания кожи (ранения, ожоги, обморожения, туберкулез кожи, гиперкератозы, ихтиоз, псориаз, пиодермия, некоторые формы экзем). Ряд заболеваний глаз (пигментный ретинит, гемералопия, ксерофтальмия, кератомаляция, конъюнктивиты, другие поражения роговицы). Хронические энтероколиты, гепатиты, панкреатиты.

Способ применения и дозы. Для профилактики внутрь. При лечении внутрь и внутримышечно. Лечебные дозы для взрослых при различных степенях недостаточности витамина А от 33 000 МЕ (0,01 г) до 50 000—100 000 МЕ/сут, для детей от 1000 МЕ до 20 000 МЕ/сут в зависимости от возраста. Местно применяют масляный раствор ретинола ацетата и одновременно назначают внутрь или внутримышечно.

Побочное действие. Гипервитаминоз А (головная боль, тошнота, рвота, повышение температуры тела, сонливость, шелушение кожи).

Противопоказания. Желчнокаменная болезнь, хронический панкреатит.

Форма выпуска. Драже по 1 мг (3300 МЕ), в упаковке 100 штук; таблетки, покрытые оболочкой, по 33 000 МЕ, в упаковке 50 штук; капсулы по 0,05 г (3300 МЕ) раствор в масле, в упаковке 50 штук; капсулы по 0,15 г (33 000 МЕ) раствор в масле, в упаковке 50 штук; капсулы по 0,05 г (5000 МЕ) раствор в масле, в упаковке 50 штук; 3,44 % (100 000 МЕ в 1 мл) раствор в масле по 10 мл во флаконе; 0,86% (25 000 МЕ) раствор в масле по 1 мл для инъекций, в упаковке 10 штук; 1,72% (50 000 МЕ) раствор в масле по 1 мл для инъекций, в упаковке 10 штук; 3,44% (100 000 МЕ) раствор в масле по 1 мл для инъекций, в упаковке 10 штук

Отредактировал: ledi24

Ретинола пальмитат 5,5% (100 000 МЕ в 1 мл) раствор в масле по 10 мл во флаконе.

Срок годности всех форм 2 года.

	«Ревит» драже
Ретинола ацетата	0,00086 г (2500 МЕ)
Тиамина бромида	0,00129 г
Рибофлавина	0,001 г
Кислоты аскорбиновой	0,035 г
	№ 100
Срок годности	1 год

РИБОКСИН (Riboxinum). 9β-D-рибофуранозилгипоксантин. Синоним: Inosie F.

Фармакологическое действие. Стимулирует окислительно-восстановительные процессы на клеточном уровне, повышает энергетический потенциал миокарда, улучшает коронарное кровообращение.

Показания к применению. Ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, хроническая коронарная недостаточность; кардиомиопатии различного генеза. Нарушения ритма, связанные с применением сердечных гликозидов, дистрофические изменения миокарда после тяжелых физических нагрузок или вследствие эндокринных нарушений после перенесенных инфекционных заболеваний; заболевания печени (гепатит).

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,6—2,4 г в день; вначале по 0,6—0,8 г/сут, далее в течение 2—3 дней дозу увеличивают до 1,2 г (по 0,4 г 3 раза в день), 1,6 или 2,4 г/сут. Курс лечения 4—12 нед. При урокопропорфирии применяют по 0,8 г ежедневно в течение 1—3 мес.

Побочное действие. Возможна индивидуальная непереносимость (зуд, гиперемия кожи), обострение подагры.

Форма выпуска. Таблетки, покрытые оболочкой, по 0,2 г, в упаковке 50 штук, ампулы 2% раствора по 10 мл для инъекций, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В сухом, защищенном от света месте при комнатной температуре.

Срок годности 2 года.

РИБОНУКЛЕАЗА (Ribonucleasa). Ферментный препарат, получаемый из поджелудочной железы крупного рогатого скота.

Фармакологическое действие. Способствует разжижению гноя, слизи, вязкой мокроты, а также оказывает противовоспалительное действие.

Показания к применению. Воспалительные заболевания дыхательных путей (трахеит, бронхит, пневмония, бронхоэктатическая болезнь и др.) с целью облегчения удаления вязких экссудатов и мокроты; как противовоспалительное средство при пародонтозе, остеомиелите, тромбофлебите и др.

Способ применения и дозы. Местно в виде аэрозоля и ингаляций в изотоническом растворе натрия хлорида (0,025 г на 3—4 мл), эндобронхиально и внутриплеврально (0,025—0,05 г на 5—10 мл), внутримышечно (0,01 г на 1 мл). Высшая разовая доза при внутримышечном введении 0,01 г, суточная 0,03 г; при местном и внутриполостном применении —0,05 г.

Побочное действие. Аллергические реакции, раздражение слизистых оболочек дыхательных путей при ингаляциях.

Противопоказания. Декомпенсация сердечной деятельности, легочная недостаточность, заболевания печени с нарушением функции, открытая форма туберкулеза, кровоточащие полости.

Форма выпуска. Во флаконах по 10 мг

Отредактировал: ledi24

Условия хранения. В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 15°С.

Срок годности 2 года.

РИБОФЛАВИН (Riboflavinum). 6,7-Диметил-9-(D-1-рибитил) изоаллоксазин. Синонимы: витамин B_2, Lactoflavin.

Фармакологическое действие. Активно участвует в процессах белкового, углеводного и жирового обмена. Участвует в зрительной функции глаз (наряду с ретинолом) и в синтезе гемоглобина. При пониженном содержании рибофлавина в пище у человека развиваются гипорибофлавиноз, а затем арибофлавиноз.

Показания к применению. Гипо- и арибофлавиноз. Гемералопия (назначают с ретинолом). Конъюнктивиты, ириты, кератиты. Длительно не заживающие раны и язвы. Лучевая болезнь. Экземы. Вирусный гепатит А и другие заболевания печени. Нарушения функции желудочно-кишечного тракта. Железодефицитная анемия.

Способ применения и дозы. Внутрь взрослым 0,005—0,01 г в день. При более выраженной недостаточности рибофлавина по 0,01 г 3 раза в день в течение 1—$1^1/_2$ мес; детям от 0,002—0,005 г до 0,01 г в день в зависимости от возраста; 0,01% раствор препарата используют в виде глазных капель.

Форма выпуска. Порошок; таблетки по 0,01 г с риской, в упаковке 50 штук.

Условия хранения. В защищенном от света месте.

Срок годности. Порошок 4 года, таблетки 3 года.

РИБОФЛАВИНА МОНОНУКЛЕОТИД (Riboflavini mononucleotidum). Рибофлавин-5-монофосфат натрия. Синоним: Ribofosfina.

Фармакологическое действие. Кофермент, образуемый из рибофлавина. В соединении с белком входит в состав ферментов, регулирующих окислительно-восстановительные процессы белкового и жирового обмена.

Показания к применению. Гипо- и арибофлавиноз. Зудящие дерматозы. Хронические экземы. Нейродермиты, фотодерматозы и другие кожные заболевания. Кератиты, помутнение роговицы, конъюнктивиты.

Способ применения и дозы. Внутримышечно взрослым по 1 мл 1% раствора (0,01 г) 1 раз в день в течение 10—15 дней. Детям в той же дозе 3—5 дней, затем 2—3 раза в неделю. Всего 15—20 инъекций. При заболеваниях глаз по 0,2—0,5 мл 1% раствора в течение 10—15 дней.

Форма выпуска. Ампулы по 1 мл 1% раствора, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. В защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

РИГЕВИДОН (Rigevidon). Одна таблетка содержит 0,15 мг D-норгестрела и 0,03 мг этинилэстрадиола.

Фармакологическое действие. Противозачаточное пероральное средство.

Показания к применению. Предупреждение беременности.

Способ применения и дозы. Препарат принимают, начиная с 5-го дня менструации в течение 21 дня по 1 таблетке в день в одно и то же время суток (предпочтительнее вечером). После этого курса необходим 7-дневный перерыв, во время которого появляется кровотечение типа менструации. Следующий 21-дневный курс приема препарата начинают сразу после 7-дневного перерыва, желательно в тот же день недели.

Побочное действие. Увеличение массы тела, нагрубание молочных желез.

Противопоказания. Нарушение функции печени, холецистит, склон-

Отредактировал: ledi24

ность к тромбозам, хронический колит, заболевания эндокринных желез, злокачественные опухоли.

Форма выпуска. Таблетки по 0,1 г, в упаковке 63 таблетки.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Венгрии.

РИНГЕРА-ЛОККА ТАБЛЕТКИ (Tabulettae Ringer-Locke). Состав: натрия хлорида 0,6 г, натрия бикарбоната 0,01 г, кальция хлорида 0,02 г, калия хлорида 0,02 г, глюкозы 0,1 г.

Применение. При обезвоживании организма и как дезинтоксикационное средство в виде раствора (1 таблетка на 100 мл воды).

Форма выпуска. Таблетки в упаковке по 10 штук.

Условия хранения. В сухом месте.

Срок годности 1 год.

РИОДОКСОЛ (Riodoxolum). 2,4,6-Трийодрезорцин.

Фармакологическое действие. Обладает противовирусной активностью в отношении вируса герпеса простого, оказывает противогрибковое действие при микроспории, трихофитии и кандидозе, а также бактериостатическое действие на некоторые кислотоупорные бактерии.

Показания к применению. Вирусные заболевания кожи (герпес простой, контагиозный моллюск, плоские вульгарные, подошвенные бородавки) и слизистых оболочек полости рта (острый афтозный стоматит, хронический рецидивирующий афтозный стоматит, многоформная экссудативная эритема, эрозивно-язвенная форма красного плоского лишая; язвенно-некротический гингивостоматит). Грибковые поражения гладкой кожи (микроспория, эпидермофития, рубромикоз, эритразма) и волосистой части головы (микроспория, трихофития). Угревая сыпь кожи.

Способ применения и дозы. Концентрацию мази (0,25%, 0,5%) подбирают в зависимости от заболевания и локализации процесса. Применяют местно, нанося на очаги поражения 0,25% или 0,5% мазь тонким слоем 1—3 раза в день ежедневно в течение 1—4 нед. При угревой сыпи через 30 мин после нанесения снимают остатки мази бумажной салфеткой.

Побочное действие. Возможны легкая гиперемия кожи и ощущение жжения. В этих случаях следует снять препарат с кожи.

Противопоказания. Беременность, гирсутизм и телеангиэктазия.

Форма выпуска. Мазь в упаковке по 25 г в банках 0,25% и 0,5%.

Условия хранения. Список Б. В сухом, защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

РИСТОМИЦИНА СУЛЬФАТ (Ristomycini sulfas). Антибиотик, образуемый при биосинтезе Proactinomyces fructiferi, var. ristomycini. Синонимы: Ristocetin, Spontin.

Фармакологическое действие. Активен в отношении грамположительных кокков (стафилококк, стрептококк, пневмококк, энтерококк), коринебактерий дифтерии, споровых грамположительных бактерий, многих анаэробов и кислотоустойчивых бактерий.

Проникает и обнаруживается в высоких концентрациях в различных органах и тканях: почках, селезенке, легких и др. При менингитах отмечается в ликворе в терапевтических концентрациях. Выводится из организма в основном почками и в незначительном количестве с желчью.

Показания к применению. Тяжелые инфекции, вызванные устойчивыми к другим антибиотикам стафилококками и энтерококками

Отредактировал: ledi24

(сепсис, эндокардит, пневмония, абсцесс легкого, эмпиема плевры, остеомиелит, энтероколит, менингит и др.).

Способ применения и дозы. Внутривенно капельно 1 000 000—1 500 000 ЕД в 2 приема с интервалом 12 ч; детям — из расчета 20 000—30 000 ЕД/(кг·сут). Растворяют в стерильном изотоническом растворе хлорида натрия из расчета 250 000 ЕД в 125 мл.

Побочное действие. Аллергические реакции с эозинофилией. При длительном применении возможны флебиты.

Противопоказания. Тромбоцитопения.

Форма выпуска. Флаконы по 100 000 ЕД.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте при температуре не выше 20°С.

Срок годности 2 года.

РИТМИЛЕН (Rytmilen). Дизопирамида фосфат.

Фармакологическое действие. Относится к группе противоаритмических средств, действующих на аритмии как предсердного, так и желудочкового происхождения.

Показания к применению. Желудочковые и предсердные экстрасистолы, мерцание и трепетание предсердий, а также пароксизмальная наджелудочковая тахикардия, тахикардии, связанные с синдромом Вольфа — Паркинсона — Уайта, аритмии после инфаркта миокарда и аритмии, вызванные препаратами наперстянки, хирургическими вмешательствами.

Способ применения и дозы. Ритмилен быстро и почти полностью всасывается из желудочно-кишечного тракта, при этом не наблюдается существенных гемодинамических изменений, но при внутривенном введении АД может снижаться. Начальная суточная доза внутрь составляет 0,2—0,3 г, далее в зависимости от состояния больного назначают 0,3—0,8 г препарата, разделив это количество на 3—4 равные разовые дозы. Такая схема обеспечивает равномерную концентрацию препарата в крови и поддерживает антиаритмический эффект.

При внутривенном введении (медленно!) назначают по 0,001—0,002 г/кг массы тела.

Побочное действие. Возможны затруднение мочеиспускания, иногда задержка мочи, сухость во рту, диспепсия, головная боль, аллергические реакции. Эти явления быстро исчезают при отмене препарата или уменьшения доз.

Противопоказания. Полная атриовентрикулярная блокада, кардиогенный шок, повышенная чувствительность к препарату.

Не рекомендуется назначать ритмилен детям и беременным.

Форма выпуска. Капсулы по 0,1 г, в упаковке 100 штук; 1% раствор в ампулах по 5 мл, в упаковке 10 штук и таблетки по 0,1 г, в упаковке 100 штук.

Условия хранения. Обычные.

Срок годности 3 года.

Поставляется из Финляндии.

РИФАМПИЦИН (Rifampicinum). 3-(4-Метил-1-пиперазинилиминометил)-рифамицин. Синонимы: Benemycin, Rifadin, Rimactan и др.

Фармакологическое действие. Полусинтетический антибиотик широкого спектра действия.

Показания к применению. Все формы туберкулеза, гнойная инфекция различной локализации, инфекционные заболевания дыхательных путей, отиты, холециститы, гонорея, лепра.

Способ применения и дозы. При туберкулезе назначают внутрь

Отредактировал: ledi24

по 0,45 г ежедневно или по 0,3 г 2 раза в сутки. Принимают препарат за 30 мин —1 ч до еды.

Внутривенно рифампицин вводят при остропрогрессирующих и распространенных формах деструктивного туберкулеза легких, тяжелых гнойно-септических процессах при необходимости быстрого создания высоких концентраций препарата в крови, а также в случаях, когда прием препарата внутрь затруднен или плохо переносится больными.

При внутривенном введении суточная доза для взрослых составляет 0,45 г, при тяжелых быстро прогрессирующих формах —0,6 г, вводят ее в один прием. Длительность внутривенного введения зависит от переносимости препарата и может составлять 1 мес. и более с последующим переходом на прием внутрь. Общая продолжительность применения рифампицина при туберкулезе определяется эффективностью лечения и может достигать 1 года.

У больных с сахарным диабетом при лечении туберкулеза рифампицином (внутривенно) рекомендуется на каждые 4—5 г глюкозы (растворителя) вводить 2 ЕД инсулина.

Монотерапия туберкулеза рифампицином часто сопровождается развитием устойчивости возбудителя к антибиотику, поэтому его следует назначать в сочетании с другими противотуберкулезными средствами (стрептомицином, изониазидом, этамбутолом и др.), к которым сохранена чувствительность микобактерий туберкулеза.

При лечении больных лепрой рифампицин назначают по соответствующим схемам. Применяют его в комплексе с иммуностимулирующими средствами.

При инфекциях нетуберкулезной этиологии в зависимости от локализации процесса суточная доза рифампицина внутрь для взрослых составляет 0,45—0,9 г, для детей —8—10 мг/кг. Суточную дозу распределяют на 2—3 приема.

При внутривенном введении суточная доза рифампицина составляет 0,3—0,9 г (максимальная 1,2 г). Продолжительность лечения составляет 7—10 дней. Внутривенное введение следует прекратить, как только появится возможность для приема рифампицина внутрь.

При острой гонорее рифампицин взрослым назначают внутрь в суточной дозе 0,9 г.

Побочное действие. Возможны снижение аппетита, тошнота, рвота, понос.

Для своевременного выявления и предупреждения гепатотоксического действия лечение рифампицином следует начинать после исследования функции печени (определение уровня билирубина и аминотрансфераз в крови, тимоловая проба), а в процессе лечения проводить это исследование ежемесячно.

Наблюдаются лейкопения, тромбоцитопения, аллергические реакции (кожные высыпания, эозинофилия, бронхоспазм, отек Квинке). Если на предшествующем этапе лечения отмечались признаки сенсибилизации к рифампицину, его применяют под контролем измерения температуры после приема препарата (в течение 3 ч в первые 2—3 дня).

Рифампицин ослабляет действие антикоагулянтов, кортикостероидов, оральных гипогликемических средств, оральных контрацептивов и препаратов наперстянки. У больных, принимающих препарат, моча, слезная жидкость, мокрота имеют оранжево-красный цвет.

При быстром внутривенном введении рифампицина у больных возможно снижение АД.

При длительном внутривенном введении могут развиться флебиты.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к препарату, желтуха (в том числе механическая), заболевания печени и почек, со-

Отредактировал: ledi24

провождающиеся выраженным нарушением их функции, беременность. Препарат не назначают детям грудного возраста.

Внутривенное введение противопоказано также при легочно-сердечной недостаточности II—III степени, флебитах.

Форма выпуска. Капсулы по 0,15 г, в упаковке 20 штук; для детей капсулы по 0,05 г, в упаковке 30 штук, ампулы по 0,15 г № 10.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

РОДИОЛЫ ЭКСТРАКТ ЖИДКИЙ (Extractum Rhodiolae fluidum). Спиртовой (на 40% этиловом спирте) экстракт (1:1) из корневищ и корней родиолы розовой.

Фармакологическое действие. Обладает стимулирующим свойством.

Показания к применению. Астенические состояния, повышенная утомляемость, неврастения, вегетососудистая дистония. Больным, перенесшим соматические или инфекционные болезни, с функциональными заболеваниями нервной системы, а также практически здоровым лицам при астении и пониженной работоспособности.

Способ применения и дозы. Внутрь по 5—10 капель 2—3 раза в день за $^1/_4$—$^1/_2$ ч до еды. Курс лечения 10—20 дней. В психиатрической практике (при астении, акинето-гипотоническом синдроме и др.) начинают с 10 капель 2—3 раза в день, затем дозу увеличивают до 30—40 капель на прием. Длительность лечения 1—2 мес. Препарат не принимают во второй половине дня.

Побочное действие. В отдельных случаях возбуждение, бессонница, головная боль, иногда повышение АД.

Противопоказания. Состояние возбуждения, гипертонический криз, лихорадочное состояние.

Форма выпуска. Во флаконах по 30 мл.

Условия хранения. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 5 лет.

РОЗАНОЛ (Rosanol). Действующее вещество препарата — розовое масло.

Фармакологическое действие. Уменьшает спазм желчевыводящих путей, оказывает бактериостатическое действие.

Показания к применению. Заболевания печени (желчнокаменная болезнь, дискинезии желчевыводящих путей после удаления желчного пузыря), почечнокаменная болезнь.

Способ применения и дозы. Внутрь за 30 мин до еды по 2—3 капсулы 3 раза в день в течение 2—4 нед.

Противопоказания. Тяжелые поражения паренхиматозных органов, острые воспалительные заболевания желчевыводящих путей.

Форма выпуска. Желатиновые капсулы, содержащие 34,4 мг розового масла, в упаковке 30 штук.

Условия хранения. В темном месте.

Срок годности 3 года.

Поступает из Болгарии.

РОЗЕВИН (Rosevinum). Алкалоид, полученный из растения барвинок розовый (Vinca rosea). Синоним: Vinblastin.

Фармакологическое действие. Цитостатик, обладающий противоопухолевой активностью.

Показания к применению. Лимфогранулематоз, гематосаркомы, миеломная болезнь, некоторые солидные опухоли (хорионэпителиома)

Способ применения и дозы. Вводят внутривенно 1 раз в неделю. Первоначальная доза составляет 0,025 мг/кг, затем дозу повышают

Отредактировал: ledi24

до 0,3 мг/кг. Лечение проводят при постоянном контроле числа лейкоцитов и тромбоцитов. Перед употреблением содержимое флакона (5 мг) растворяют в 5 мл изотонического раствора хлорида натрия. Курсовая лечебная доза составляет 100—120 мг. Препарат может применяться в схемах полихимиотерапии.

Побочное действие. Возможно угнетение гемопоэза, в первую очередь лейкопоэза. При резкой лейкопении или тромбоцитопении переливают кровь или ее форменные элементы, при необходимости назначают антибиотики и другие препараты.

Возможны диспептические явления (тошнота, рвота, диарея), развитие алопеции, парестезии пальцев рук и ног. При резкой выраженности побочных явлений лечение следует прекратить.

Противопоказания. Гипоплазия кроветворения, острые желудочно-кишечные заболевания, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Не следует назначать препарат больным в терминальной стадии болезни.

Форма выпуска. Лиофилизированный порошок по 0,005 г для инъекций во флаконе.

Условия хранения. Список А. В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 10°С.

Срок годности 2 года.

РОМАЗУЛАН (Romasulan). Состав: экстракт ромашки 96 мл, эфирное масло ромашки (содержит 6% азулена) 0,3 мл, твин-80—4 г.

Фармакологическое действие. Антисептическое и дезодорирующее средство.

Показания к применению. Внутрь: гастриты, дуодениты, колиты, расстройства пищеварительного тракта, сопровождающиеся метеоризмом. Наружно: воспалительные заболевания слизистых оболочек и кожи; в стоматологической практике (стоматит, гингивиты слизистых оболочек и кожи).

Способ применения и дозы. Внутрь: $^1/_2$ чайной ложки на стакан горячей воды. Наружно: для промываний, клизм, компрессов ($1^1/_2$ чайные ложки на 1 л воды).

Форма выпуска. Флаконы по 100 мл.

Условия хранения. В прохладном месте.

Срок годности 2 года.

Поступает из Румынии.

РОМАШКИ ЦВЕТКИ (Flores Chamomillae). Содержит сесквитерпеновые лактоны (матрицин, матрикореин), эфирное масло (0,1—0,5%), азулен, флавоновый гликозид, кумарины (умбеллиферон, диоксикумарин), органические кислоты.

Применение. В качестве спазмолитического, противовоспалительного, антисептического средства при спазмах кишечника, метеоризме, поносе в виде настоя (10,0:200,0) или отвара (1 столовая ложка цветков на стакан кипящей воды) внутрь по 1—5 столовых ложек 2—3 раза в день. Внутрь применяют так же, как потогонное средство. Наружно используют для полосканий, примочек и клизм.

Форма выпуска. В упаковке по 100 г.

Условия хранения. В сухом, прохладном месте.

Срок годности. 1 год с момента заготовки.

РОНИДАЗА (Ronidasa). Препарат гиалуронидазы, получаемый из семенников крупного рогатого скота.

Фармакологическое действие. По свойствам аналогичен лидазе.

Показания к применению. Рубцы (ожоговые, послеоперационные, келоидные и др.), контрактура Дюпюитрена (начальные стадии), конт-

Отредактировал: ledi24

рактуры и тугоподвижность суставов после воспалительных процессов и травм, тендовагиниты, длительно не заживающие раны.

Способ применения и дозы. Наружно: 0,5 г препарата наносят на влажную стерильную салфетку, смоченную изотоническим раствором хлорида натрия, накладывают на пораженный участок, закрывают вощаной бумагой и фиксируют мягкой повязкой. Длительность лечения 15—60 дней.

Побочное действие. Иногда раздражение кожи.

Противопоказания. Злокачественные новообразования, туберкулез и другие инфекционные заболевания и воспалительные процессы.

Форма выпуска. Во флаконах по 5 г.

Условия хранения. В защищенном от света месте при комнатной температуре.

Срок годности $2^1/_2$ года.

РОТОКАН (Rotokanum). Смесь жидких экстрактов ромашки, календулы и тысячелистника (в соотношении 2:1:1)

Фармакологическое действие. Оказывает противовоспалительное действие, усиливает процессы репаративной регенерации в слизистых оболочках, обладает гемостатическими свойствами.

Показания к применению. Воспалительные заболевания слизистой оболочки полости рта различной этиологии и пародонта (афтозный стоматит, пародонтоз, язвенно-некротический гингивостоматит)

Способ применения и дозы. Перед применением 1 чайную ложку ротокана разводят в стакане теплой воды. Пародонтоз лечат после удаления зубных отложений и выскабливания патологических десневых карманов. В десневые карманы вводят на 20 мин тонкие турунды, обильно смоченные раствором ротокана. Процедуру проводят ежедневно или через день (4—6 раз). При заболеваниях слизистой оболочки полости рта используют аппликации (15—20 мин) или ротовые ванночки (1—2 мин) с раствором ротокана 2—3 раза в день в течение 2—5 дней.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к растениям, содержащимся в препарате.

Форма выпуска. Во флаконах оранжевого стекла по 110 мл.

Условия хранения. В прохладном, защищенном от света месте

Срок годности 2 года.

РОЦЕФИН (Rocefin).

Показания к применению. Инфекции, вызываемые чувствительными к цефтриаксону микроорганизмами: менингит, брюшные инфекции, повреждения и инфекции костей, суставов, соединительно-тканных органов, инфекции у больных с иммунным дефектом, инфекции почек и мочегонных путей, инфекционные заболевания органов дыхания, особенно пневмония, а также оториноларингологические инфекционные заболевания, инфекции половых органов, включая гонорею.

Способ применения и дозы. Взрослым и детям старше 12 лет: средняя суточная доза 1—2 г роцефина каждые 24 часа, доза может повышаться до 4 г. Новорожденным (от 2-недельного возраста): 20—50 мг в день, что не должно превышать 50 мг на кг веса тела. Грудным и маленьким детям (от 3-недельного возраста до 12 лет): суточная доза 20—80 мг на кг веса тела; детям весом 50 кг и более назначается доза для взрослых. Пожилым больным — доза для взрослых.

Форма выпуска. Порошковые ампулы по 1 г и ампулы с растворителем для внутримышечных инъекций — по 3,5 мл раствора лидокаина 1% в картонном пенале с приложенной инструкцией

Отредактировал: ledi24

Условия хранения. При комнатной температуре ниже 30°С.

Срок годности 3 года.

Поставляется из Венгрии.

РТУТИ АМИДОХЛОРИД (Hydrargyri amidochloridum). Синонимы: ртуть амидохлоридная, ртуть осадочная белая.

Применение. В качестве антисептического и противовоспалительного средства при заболеваниях кожи в виде 10% мази.

Форма выпуска. Порошок.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности не ограничен.

РТУТИ ДИХЛОРИД (Hydrargyri dichloridum). Синоним: сулема.

Применение. Как антисептическое средство в растворах (1:1000—2:1000) для дезинфекции кожи, белья, одежды, предметов ухода за больными, для обмывания стен; для лечения дерматологических заболеваний в виде мазей.

Форма выпуска. Порошок.

Условия хранения. Список А.

Срок годности не ограничен.

РТУТИ МОНОХЛОРИД (Hydrargyri monochloridum). Синонимы: ртуть однохлористая, каломель.

Применение. Наружно в качестве антисептического средства при заболеваниях роговицы, бленнорее (в виде мази), для предохранения от заражения венерическими заболеваниями (местно).

Форма выпуска. Порошок.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности не ограничен.

РТУТИ ОКИСЬ ЖЕЛТАЯ (Hydrargyri oxydum flavum). Синонимы: Hydrargyrum praecipitatum flavum.

Применение. В качестве антисептического средства при блефаритах, кератитах, конъюнктивитах, сикозе, себорее в виде 1—2% мази.

Противопоказания. В офтальмологии одновременное применение с дионином, а также прием внутрь солей йода или брома.

Форма выпуска. Порошок.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 5 лет.

РТУТНАЯ СЕРАЯ МАЗЬ (Unguentum Hydrargyri cinereum). Состав: мази ртутной концентрированной 35,7 г, ланолина безводного 4,3 г, жира свиного очищенного 40 г, жира бычьего очищенного 20 г

Фармакологическое действие. Оказывает антипаразитарное действие.

Показания к применению. Кожные паразитарные заболевания.

Способ применения и дозы. Наружно, для втирания в кожу.

Побочное действие. Раздражение кожи, поражение почек, желудочно-кишечного тракта, нарушение нервной деятельности.

Противопоказания. Заболевания кожи (экзема, почесуха), почек, желудочно-кишечного тракта.

Форма выпуска. Мазь в упаковке по 25 г.

Условия хранения. В хорошо укупоренных неметаллических банках, в прохладном месте.

Срок годности 1 год.

РУБОМИЦИНА ГИДРОХЛОРИД (Rubomycini hydrochloridum). Рубомицин — антибиотик, продуцируемый Actinomyces coeruleorubi-

Отредактировал: ledi24

dus. В медицинской практике применяют рубомицина гидрохлорид. Синоним: рубидомицин.

Фармакологическое действие. Обладает антибактериальной активностью и оказывает сильное цитостатическое действие на пролиферирующие ткани, включая опухолевую. Угнетает кроветворение, вызывая гранулоцитопению и тромбоцитопению.

Показания к применению. Хорионэпителиома матки, острый лейкоз, ретикулосаркома.

Способ применения и дозы. Внутривенно. Дозы и интервалы между введением устанавливают индивидуально. Взрослым назначают 0,5—1 мг/кг, детям —1—1,5 мг/кг. Лечение проводят, как правило, циклами.

Возможна комбинация препарата с другими цитостатическими средствами (циклофосфан, 6-меркаптопурин, метотрексат, винкристин и т. д.) и лучевой терапией.

Побочное действие. Угнетение кроветворения (лейкопения, реже тромбоцитопения), потеря аппетита, тошнота, иногда рвота, головная боль, грибковые поражения полости рта. Большие дозы (более 30 мг/кг) могут вызвать нарушение сердечной деятельности.

Противопоказания. Терминальные стадии болезни, резкое истощение, органические поражения сердца, лейкопения и тромбоцитопения (исключение составляют больные лейкозом).

Форма выпуска. Во флаконах по 0,02 г.

Условия хранения. Список Б. В сухом, защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

РУЛИД (Rulid). Состав: в 1 таблетке содержится 150 мг рокситромицина.

Фармакологическое действие. Антибактериальный препарат широкого спектра действия. Чувствительны к нему следующие возбудители:

Streptococcus A
Streptococcus mitis, sanguis, viridans
Streptococcus agalactiae
Pneumococcus
Meningococcus
Gonococcus
Bordetella pertussis
Branhamella catarrhalis
Corynebacterium diphtheriae
Listeria monocylogenes
Clostridium
Mycoplasma pneumoniae
Pasteurella multocida
Chlamydia trachomatis and psitacci
Ureaplasma urealyticum
Legionella pneumophila
Campylobacter
Gardnerella vaginalis

Показания к применению. Инфекции верхних и нижних отделов дыхательных путей, уретриты гонококковой природы, инфекции кожи и мягких тканей, инфекции в гинекологии, профилактика менингококкового менингита у лиц, находившихся в контакте с больным.

Способ применения и дозы. Для взрослых по 150 мг 2 раза в день (утром и вечером) перед приемом пищи. Больным с печеночной недостаточностью следует избегать назначения рулида. Его не рекомендуется применять беременным женщинам и в период лактации.

Побочное действие. Тошнота, рвота, настралгия, понос; аллергические кожные высыпания; возможно транзиторное увеличение аспартатаминотрансферазы/аланинаминотрансферазы и щелочных фосфатаз.

Противопоказания. Аллергические реакции к макролидам. Нельзя назначать препарат одновременно с производными алкалоидов спорыньи.

Отредактировал: ledi24

Срок годности 3 года.

Производится фирмой «Roussel Uclaff», Франция.

РУМАЛОН (Rumalon). Содержит экстракт хрящей и мозговой ткани молодых животных.

Фармакологическое действие. Способствует нормализации питания суставного хряща.

Показания к применению. Заболевания суставов, сопровождающиеся перерождением хрящевой ткани.

Способ применения и дозы. Внутримышечно, начиная с 0,3 мл до 1 мл 3 раза в неделю в течение 5—6 нед.

Форма выпуска. Ампулы по 1 мл, в упаковке 25 штук.

Условия хранения. В прохладном месте.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Югославии.

РЯБИНЫ ПЛОДЫ (Fructus Sorbi). Содержат аскорбиновую кислоту (40—200 мг%), каротиноиды, витамин Р, органические кислоты, сахар, гликозид амигдалин (семена).

Применение. При заболеваниях, сопровождающихся витаминной недостаточностью, в виде настоя или чая (1 чайная ложка на стакан кипящей воды) по $^1/_2$ стакана 1—3 раза в день.

Форма выпуска. В упаковке по 100 г.

Условия хранения. В сухом прохладном месте.

Срок годности не установлен.

САЛАЗОДИМЕТОКСИН (Salazodimethoxinum). 5-[пара-[N-(2,4-Диметоксипиримидинил-6)-сульфамидо]-фенилазо]-салициловая кислота.

Фармакологическое действие. Сульфаниламид пролонгированного действия.

Показания к применению. Неспецифический язвенный колит в активной стадии при легких и среднетяжелых формах заболевания, плохая переносимость или неэффективность салазопиридазина или салазопирина.

Способ применения и дозы. Внутрь по 1 г 2 раза в день; иногда дозу повышают до 4 г/сут.

Побочное действие. Аллергические реакции, лейкопения, диспептические явления.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к сульфаниламидам.

Форма выпуска. Таблетки по 0,5 г, в упаковке 50 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

САЛАЗОПИРИДАЗИН (Salazopyridazinum). 5-(пара-[N-(3-Метоксипиридазинил-6)-сульфамидо]-фенилазо)-салициловая кислота.

Фармакологическое действие. Сульфаниламидный препарат. Оказывает противовоспалительное и иммунодепрессивное действие.

Показания к применению. Неспецифический язвенный колит.

Способ применения и дозы. Внутрь (после еды) по 2 г/сут (в 2—4 приема). Лечение длительное. Детям дозы уменьшают в соответствии с возрастом.

Побочное действие. Возможны аллергические реакции, лейкопения, диспептические явления, снижение уровня гемоглобина.

Противопоказания. Токсико-аллергические реакции на сульфаниламиды или салицилаты.

Отредактировал: ledi24

Форма выпуска. Таблетки по 0,5 г, в упаковке 50 штук. Суппозитории по 0,5 г, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 5 лет.

«САЛИНИМЕНТ» («Salinimentum»). Состав: метилсалицилата 10 г, масла беленного 30 г, хлороформа 10 г.

Применение. Как обезболивающее и противовоспалительное средство для растираний при ревматизме, артритах, радикулитах, невралгиях и др.

Форма выпуска. Во флаконах по 50 г.

Условия хранения. В прохладном месте.

Срок годности 1 год.

САЛИЦИЛАМИД (Salicylamidum). Амид салициловой кислоты. Синонимы: Algamon, Salamide.

Фармакологическое действие. Болеутоляющее, жаропонижающее и противовоспалительное средство. По сравнению с другими салицилатами реже вызывает диспептические явления.

Применение. При невралгиях, мигрени, лихорадочных заболеваниях по 0,25—0,5 г 2—3 раза в день, при ревматизме 0,5—1 г 6—10 раз в сутки.

Побочное действие и противопоказания те же, что и при применении других препаратов салициловой кислоты.

Форма выпуска. Таблетки в упаковках по 10 штук по 0,25 г и 0,5 г

Условия хранения. В защищенном от света месте.

Срок годности 4 года.

САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА (Acidum salicylicum). Орто-окси-бензойная кислота.

Применение. Наружно в качестве антисептического, отвлекающего, раздражающего и кератолитического средства при кожных заболеваниях в составе 2—5% присыпок, 1—10% мазей, паст, спиртовых растворов.

Форма выпуска. Порошок, салицилово-цинковая паста (паста Лассара) (Pasta Zinci-salicylata) в упаковке по 25 г, 100 г.

Условия хранения. В защищенном от света месте.

Срок годности 10 лет, паста 4 года.

САЛЬБУТАМОЛ (Salbutamolum). 2-Бутиламино-1-(гидрокси-3 гидроксиметил)-фенилэтанол. Синоним: Ventolin.

Фармакологическое действие. Влияет на β_2-адренорецепторы бронхов и оказывает сильное и длительное (до 5—8 ч) бронхорасширяющее действие. В терапевтических дозах существенных изменений со стороны сердечно-сосудистой системы не вызывает.

Показания к применению. Для предупреждения и купирования приступов бронхиальной астмы.

Способ применения и дозы. По 1—2 ингаляции 4—6 раз в сутки

Побочное действие. При передозировке возможны расширение периферических сосудов, умеренная тахикардия, тремор мышц.

Противопоказания. Абсолютные противопоказания не установлены Необходима осторожность при тиреотоксикозе, артериальной гипертонии, пароксизмальной тахикардии, беременности.

Форма выпуска. Аэрозольные ингаляторы, содержащие 10 мл (200 доз) препарата.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности $1^1/_2$ года.

Поставляется из Польши.

Отредактировал: ledi24

САЛЬВИН (Salvinum). Комплексный препарат, полученный из травы шалфея лекарственного.

Фармакологическое действие. Оказывает антимикробное действие на грамположительную микрофлору, в том числе устойчивую к антибиотикам, обладает противовоспалительными и дубящими свойствами.

Показания к применению. Хроническое воспаление слизистой оболочки полости рта, гингивиты, афтозные стоматиты, механические и термические язвы, абсцессы (после вскрытия); различные формы пародонтоза, хронические и обострившиеся пародонтиты и т. д.

Способ применения и дозы. Местно в виде 0,1—0,25% спиртоводных растворов. Для приготовления указанных растворов 1% спиртовой раствор сальвина разводят ex temporе 4—10-кратным объемом дистиллированной воды или изотонического раствора хлорида натрия. Применяют в виде смазывания, орошений, промываний, аппликаций, а также в виде турунд, вводимых в каналы и в патологические зубодесневые карманы (на 10 мин). Курс лечения 2—10 сеансов с интервалом 1—2 дня.

Побочное действие. При использовании концентраций более высоких, чем указано в инструкции, или при повышенной индивидуальной чувствительности больного к сальвину возможны неприятные ощущения во рту — чувство горечи, сухости, жжения, а также явления раздражения, выражающиеся в виде легкой и скоропроходящей гиперемии.

Форма выпуска. 1% спиртовой раствор по 10 мл.

Условия хранения. При комнатной температуре. Приготовленные ex temporе спиртоводные растворы сальвина хранению не подлежат.

Срок годности 3 года.

САЛЮЗИД РАСТВОРИМЫЙ (Saluzidum solubile). Диэтиламмониевая соль 2-карбокси-3,4-диметокси-бензаль-изоникотиноилгидразона, моногидрат.

Фармакологическое действие. Обладает высокой бактериостатической активностью в отношении микобактерий туберкулеза.

Показания к применению. Туберкулез (различные формы и локализации).

Способ применения и дозы. В виде 5% раствора подкожно, внутримышечно, внутривенно, в спинномозговой канал, в полости. Подкожно и внутримышечно по 0,5—1 г (суточная доза может быть доведена до 2 г), внутривенно по 0,5 г, в спинномозговой канал по 0,09—0,12 г; 5% раствор вводят также в виде аэрозоля интратрахеально и интрабронхиально по 2—3 мл на ингаляцию.

Побочное действие и противопоказания те же, что и для салюзида.

Форма выпуска. Порошок, 5% раствор в ампулах в упаковках по 10 штук по 1 мл, по 2 мл.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 7 лет.

«САНАСОЛ» («Sanasolum»). Состав: калия хлорида 60%, калия цитрата, кальция глюконата и аммония хлорида по 10%, магния аспарагината и кислоты глутаминовой по 5%.

Фармакологическое действие и показания к применению. Имеет вкус поваренной соли и применяется для улучшения вкуса пищи при противопоказаниях к приему натрия хлорида. Используется для уменьшения гипокалиемии при лечении больных гипертонической болезнью и сердечной недостаточностью, при плохой переносимости сердечных гликозидов и салуретиков; при хронических и острых нефритах с синдромом почечной недостаточности (без явлений гиперкалиемии).

Способ применения и дозы. Суточная доза 1,5—2,5 г; при лечении

Отредактировал: ledi24

гипокалиемии до 5 г. Добавляют санасол к пище, обычно во вторые блюда, непосредственно перед употреблением.

Противопоказания. Тяжелая почечная недостаточность и гиперкалиемия. Осторожность нужна при язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки и гастритах.

Форма выпуска. Порошок в упаковке по 100 г.

Условия хранения. В плотно закрытой упаковке в сухом месте.

Срок годности 2 года.

САНГВИРИТРИН (Sanguiritrinum). Сумма бисульфатов алкалоидов сангвиритрина и хелеритрина. Получают из травы маклейи сердцевидной (Macleaya cordata Will.) и маклейи мелкоплодной (Macleaya microcarpa Papaveraceae).

Фармакологическое действие. Обладает широким спектром антимикробной активности, действуя на грамположительные и грамотрицательные бактерии, дрожжеподобные и мицелиальные грибы; обладает также антихолинэстеразной активностью.

Показания к применению. Поражения кожи и слизистых оболочек, вызванные дрожжеподобными грибами, дерматофитами и смешанной флорой, в том числе антибиотико-резистентными штаммами (пиодермии, экземы, нейродермиты, кандидоз, дермофитии и др.), заболевания среднего уха и наружного слухового прохода, афтозный стоматит, пародонтозы, язвенно-некротические гингивостоматиты и другие поражения слизистой оболочки полости рта, длительно не заживающие раны, инфицированные ожоговые раны, язвы.

В качестве антихолинэстеразного средства назначают при миопатии у детей и взрослых, при различных чувствительных и двигательных нарушениях (полиомиелит, детские церебральные параличи и др.)

Способ применения и дозы. Наружно в виде 1% линимента, наносимого 1—2 раза в день на очаги поражения или через 1—2 дня (при перевязках). При отитах, пародонтозе и др. применяют 0,2% спиртовой раствор для промываний, смачивания тампонов.

При миопатии, последствиях полиомиелита и т. д. назначают внутрь таблетки (после еды) взрослым по 1—2 таблетки 2 раза в день (до 3 таблеток в день), детям в зависимости от возраста, но не более 0,001 г на 1 год жизни в сутки в 2 приема.

При наружном применении предельная доза линимента 3 г, водно-спиртового раствора 15 мл, водных растворов 30 мл.

Побочное действие. При местном применении возможно жжение, при приеме внутрь — тошнота, рвота, боль в животе.

Противопоказания. Эпилепсия, гиперкинезы, бронхиальная астма, стенокардия и заболевания печени и почек.

Форма выпуска. 1% линимент в банках из оранжевого стекла по 20 г, 0,2% раствор во флаконах по 10 мл и таблетки по 0,05 г для приема внутрь и приготовления водных растворов ex tempore, в упаковке 50 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте, линимент при температуре не выше 10°С.

Срок годности. Линимент 1 год, раствор 2 года, таблетки $2^1/_2$ года.

САПАРАЛ (Saparalum). Сумма аммонийных солей тритерпеновых гликозидов аралозидов А, В и С, получаемых из корней аралии маньчжурской (Aralia manshurica Rupr. et maxim).

Фармакологическое действие. Тонизирующее средство. Оказывает стимулирующее действие на центры блуждающего нерва.

Показания к применению. Неврастения, астенические, астено-депрес-

Отредактировал: ledi24

сивные и астено-ипохондрические состояния, гипотония, импотенция, умственное и физическое перенапряжение.

Способ применения и дозы. Внутрь после еды по 0,05 г 2—3 раза в день. Курс лечения (15—30 дней) при необходимости через 1—2 нед повторяют.

Противопоказания. Гипертония, эпилепсия, гиперкинезы, повышенная возбудимость.

Формы выпуска. Таблетки по 0,05 г, в упаковке 50 штук.

Условия хранения. В сухом прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

САРКОЛИЗИН (Sarcolysinum). DL-α-Амино-β-(пара-бис(2-хлорэтил) аминофенил) пропионовой кислоты гидрохлорид. Синонимы: Alkeran, Merphalan, Sarcoclorin.

Фармакологическое действие. Обладает значительной противоопухолевой активностью и, подобно другим производным β-хлорэтиламина, подавляет пролиферативные процессы в тканях, в частности кроветворение.

Показания к применению. Семинома яичка (особенно при метастазах), ретикулосаркома, злокачественная ангиоэндотелиома, костная опухоль Юинга, миеломная болезнь.

Способ применения и дозы. Внутривенно вводят в полости, назначают внутрь (после еды) 1 раз в неделю. Разовая доза для взрослых с массой тела более 50 кг от 0,03 до 0,05 г, для больных с массой тела 50 кг и менее и для детей из расчета 0,5—0,7 мг/кг. На курс лечения (4—7 нед) применяют 0,15—0,25 г. Лечение прекращают при уменьшении числа лейкоцитов до $3{,}5 \cdot 10^9$/л —$3 \cdot 10^9$/л, нейтрофилов до 1% и выраженной тромбоцитопении (менее $100 \cdot 10^9$/л). Высшая доза для взрослых внутрь 0,05 г 1 раз в 7 дней.

Побочное действие. Угнетение кроветворения, особенно костномозгового (лейкопения, тромбоцитопения), диспептические явления (тошнота, рвота через несколько часов после приема); при передозировке возможны повышение температуры тела, стоматиты, петехии и нарушение кровообращения.

Противопоказания. Терминальные стадии болезни, кахексия, выраженная анемия, лейкопения, тромбоцитопения, тяжелые поражения печени, почек и сердечно-сосудистой системы.

Форма выпуска. Таблетки по 0,01 г, в упаковке 25 штук, порошок во флаконах по 0,02 г.

Условия хранения. Список А. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 1 год.

САХАРИН РАСТВОРИМЫЙ (Saccharinum solubile). Кристаллоза. Натрий-имид О-сульфобензойной кислоты дигидрат.

Применение. В качестве заменителя сахара больным диабетом внутрь.

Форма выпуска. Порошок, таблетки по 0,04 г, в упаковке 100 штук.

Срок годности 5 лет.

СБОР ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ АППЕТИТА (Species amarae). Состав: травы полыни горькой 8 частей, травы тысячелистника 2 части.

Применение. Как горечь для возбуждения аппетита, в виде настоя (1 столовая ложка на стакан кипятка) по 1 столовой ложке 3—4 раза в день за 30 мин до еды.

Форма выпуска. В упаковке по 100 г.

Условия хранения. В сухом прохладном месте.

Срок годности 2 года.

Отредактировал: ledi24

СБОР ВЕТРОГОННЫЙ (Species carminativae). Состав: листьев мяты перечной 2 части, плодов укропа 1 часть, корневища с корнями валерианы 2 части.

Применение. При метеоризме в виде настоя (1 столовая ложка на стакан кипятка) по $^1/_4$—$^1/_2$ стакана утром и вечером.

Форма выпуска. В упаковке по 100 г.

Условия хранения. В сухом прохладном месте.

Срок годности 4 года.

СБОРЫ ВИТАМИННЫЕ (Species vitaminosae). Состав сбора витаминного № 1: плодов шиповника 1 часть, плодов смородины черной 1 часть. Состав сбора витаминного № 2: плодов шиповника 1 часть, плодов рябины 1 часть.

Применение. В тех же случаях, что и плоды шиповника, в виде настоя (2 чайные ложки сбора на 2 стакана кипятка) по $^1/_2$ стакана 3—4 раза в день.

Форма выпуска. В упаковке по 100 г, сбор № 1 и сбор № 2.

Условия хранения. В сухом прохладном месте.

Срок годности не установлен.

СБОРЫ ГРУДНЫЕ (Species pectorales). Состав сбора грудного № 1: корня алтея 4 части, листьев мать-и-мачехи 4 части, травы душицы 2 части. Состав сбора грудного № 2: листьев мать-и-мачехи 4 части, листьев подорожника большого 3 части, корней солодки 3 части.

Применение. Как отхаркивающее средство при заболеваниях верхних дыхательных путей в виде настоя (1 столовая ложка на стакан кипятка) по 2—3 столовые ложки 2—3 раза в день.

Форма выпуска. В упаковках по 100 г, сбор грудной № 1 и сбор грудной № 2.

Условия хранения. В сухом прохладном месте.

Срок годности. Сбора № 1—2 года, сбора № 2—3 года.

СБОР ЖЕЛУДОЧНЫЙ (Species stomachicae). Состав: коры крушины и листьев крапивы по 3 части, листьев мяты перечной 2 части, корневищ аира 1 часть, корневищ с корнями валерианы 1 часть.

Применение. Как средство, регулирующее деятельность желудочно-кишечного тракта, в виде настоя (1 столовая ложка на стакан кипятка) по $^1/_2$ стакана утром и вечером.

Форма выпуска. В упаковке по 100 г.

Условия хранения. В сухом прохладном месте.

Срок годности 1 год.

СБОР ЖЕЛЧЕГОННЫЙ (Species cholagogae). Состав сбора желчегонного № 1: цветков бессмертника песчаного 4 части, листьев трилистника водяного 3 части, листьев мяты перечной 2 части, плодов кориандра 2 части. Состав сбора желчегонного № 2: цветков бессмертника песчаного 4 части, травы или листьев тысячелистника 2 части, листьев мяты перечной 2 части, плодов кориандра 2 части.

Применение. Как желчегонное средство при холециститах, гепатитах, холангитах, гепатохолециститах в виде настоя (2 столовые ложки на 2 стакана воды) по $^1/_2$ стакана 3 раза в день за 15—30 мин до еды.

Форма выпуска. В упаковке по 100 г.

Условия хранения. В сухом прохладном месте.

Срок годности 2 года.

СБОР МОЧЕГОННЫЙ № 2 (Species diureticae № 2). Состав: листьев толокнянки и плодов можжевельника по 2 части, корней солодки 1 часть.

Отредактировал: ledi24

Фармакологическое действие. Мочегонное.

Применение. При воспалительных заболеваниях мочевыводящих путей в виде настоя (1 столовая ложка на стакан кипятка) по 1 столовой ложке 3—5 раз в день.

Форма выпуска. В упаковке по 100 г.

Условия хранения. В сухом прохладном месте.

Срок годности 3 года.

СБОРЫ ПОТОГОННЫЕ (Species diaphoreticae). Состав сбора потогонного № 1: цветков липы 1 часть, плодов малины 1 часть. Состав сбора потогонного № 2: листьев мать-и-мачехи 4 части, травы душицы 2 части, плодов малины 4 части.

Применение. При простудных заболеваниях в виде настоя (2 столовые ложки на 2 стакана воды) как чай в горячем виде по $^1/_2$ стакана 3—4 раза в день.

Форма выпуска. В упаковках по 100 г, сбор потогонный № 1 и сбор потогонный № 2.

Условия хранения. В сухом прохладном месте.

Срок годности 2 года.

СБОР ПРОТИВОГЕМОРРОИДАЛЬНЫЙ (Species antihaemorrhoidas). Состав: листьев сенны 20 частей, травы тысячелистника 20 частей, коры крушины 20 частей, плодов кориандра 20 частей, корней солодки 20 частей.

Фармакологическое действие. Улучшает перистальтику кишечника.

Применение. При запорах, геморрое в виде настоя (1 столовая ложка на стакан воды) на ночь по $^1/_2$—1 стакану.

Форма выпуска. В упаковке по 100 г.

Условия хранения. В сухом прохладном месте.

Срок годности 2 года.

СБОРЫ СЛАБИТЕЛЬНЫЕ (Species laxantes). Состав слабительного сбора № 1: коры крушины 3 части, листьев крапивы 2 части, травы тысячелистника 1 часть. Состав слабительного сбора № 2: листьев сенны 6 частей, коры крушины 5 частей, плодов жостера 5 частей, плодов аниса 2 части, корней солодки 2 части.

Применение. При хронических запорах, колите, энтероколите в виде настоя (1 столовая ложка на стакан воды) по $^1/_4$—$^1/_2$ стакана на ночь.

Форма выпуска. В упаковках по 100 г, сбор слабительный № 1

Условия хранения. В сухом прохладном месте.

Срок годности 2 года.

СБОР УСПОКОИТЕЛЬНЫЙ (Species sedativae). Состав: листьев мяты перечной 2 части, листьев трилистника водяного 2 части, корневищ с корнями валерианы 1 часть, соплодий хмеля 1 часть.

Применение. При повышенной нервной возбудимости, бессоннице в виде настоя (2 столовые ложки на стакан кипятка) 2 раза в день по $^1/_2$ стакана.

Форма выпуска. В упаковке по 100 г.

Условия хранения. В сухом прохладном месте.

Срок годности 2 года.

СВИНЦА ОСНОВНОГО АЦЕТАТ РАСТВОР (0,5% водный раствор) **(Plumbi subacetas solutio).**

Применение. Как вяжущее средство при воспалительных заболеваниях кожи и слизистых оболочек. Наружно для примочек, компрессов и спринцевания.

Форма выпуска. В стеклянных банках 100 г.

Отредактировал: ledi24

Условия хранения. Список Б. В хорошо укупоренной посуде.
Срок годности 5 лет.

СВИНЦОВЫЙ ПЛАСТЫРЬ ПРОСТОЙ (Emplastrum plumbi simplex). Состав: окиси свинца 10 г, свиного жира 10 г, масла подсолнечного 10 г, воды достаточное количество.

Применение. В качестве антисептического средства при гнойно-воспалительных заболеваниях кожи.

Форма выпуска. Пластырь в стеклянных банках.

Условия хранения. В сухом прохладном месте.

Срок годности 3 года.

СВИНЦОВЫЙ ПЛАСТЫРЬ СЛОЖНЫЙ (Emplastrum plumbi compositum). Состав: пластыря свинцового простого 85 частей, канифоли 10 частей, терпентина 5 частей.

Применение. В качестве антисептического средства при гнойно-воспалительных заболеваниях кожи.

Форма выпуска. Пластырь в стеклянных банках.

Условия хранения. В сухом прохладном месте.

Срок годности 3 года.

«СЕДАЛЬГИН» («Sedalgin»). Состав: кодеина фосфата 0,01 г, кофеина 0,05 г, фенацетина 0,2 г, ацетилсалициловой кислоты 0,2 г, фенобарбитала 0,025 г.

Фармакологическое действие. Оказывает жаропонижающее, болеутоляющее и противовоспалительное действие.

Показания к применению. Мигрень, невралгии, неврит, артрит, радикулит и др.

Способ применения и дозы. Внутрь по 1 таблетке 2—3 раза в день.

Форма выпуска. Таблетки в упаковке по 10 штук.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности 2 года.

Поставляется из Болгарии.

СЕКУРИНИНА НИТРАТ (Securinini nitras). Алкалоид, выделенный из травы Securinega Suffruticosa Pall.

Фармакологическое действие. Возбуждает центральную нервную систему, повышает возбудимость спинного мозга.

Показания к применению. Астенические состояния, неврастения, с быстрой утомляемостью, ослабление сердечной деятельности, вялые парезы и параличи, импотенция на почве функциональных нервных нарушений.

Способ применения и дозы. Внутрь 2—3 раза в день по 0,002 г или по 10—20 капель 0,4% раствора, подкожно по 1 мл 0,2% раствора 1 раз в день.

Противопоказания. Гипертония, бронхиальная астма, стенокардия, выраженный атеросклероз, нефрит, склонность к судорожным реакциям, гипертиреоз.

Форма выпуска. Таблетки по 0,002 г, в упаковке 100 штук, 0,4% раствор во флаконах по 20 мл, 0,2% раствор в ампулах по 1 мл, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список А. В сухом, защищенном от света месте.

Срок годности. Таблетки и ампулы 2 года, 0,4% раствор во флаконах 1 год.

СЕМАП (Semap). Синонимы: Penfluridolum, Longoperidol. Состав: 1 таблетка содержит 20 мг пенфлуридола.

Фармакологическое действие. Оказывает пролонгированное ней

Отредактировал: ledi24

ролептическое действие, что связано с медленным метаболизмом препарата.

Показания к применению. Наиболее показан как средство для поддерживающей терапии у больных малопрогредиентной и вялотекущей шизофренией.

Способ применения и дозы. Назначают внутрь по 20—60 мг (иногда до 100 мг) 1 раз в 5—7 дней (средняя доза 40—60 мг в неделю). Определение дозы строго индивидуально. Лечение проводят месяцами, иногда в течение 1—2 лет. Отменять его следует только постепенно.

Противопоказания. Не следует назначать женщинам в первые 3 мес беременности.

Форма выпуска. Таблетки по 20 мг, в упаковке 12 штук.

Условия хранения. При комнатной температуре (15—20°С)

Срок годности 5 лет.

Поступает из Венгрии.

СЕНАДЕКСИН (Senadexinum). Препарат содержит сумму действующих веществ александрийского листа, в состав которой входит 20% сенозидов А и Б в форме солей кальция. Близок к препаратам сенаде и глаксена.

Фармакологическое действие. Оказывает слабительное действие.

Показания к применению. Взрослым при запорах различной этиологии.

Способ применения и дозы. Внутрь, обычно на ночь по 1 таблетке. При отсутствии эффекта через несколько дней разовую дозу можно увеличить до 2—3 таблеток. При приеме препарата моча становится желто-коричневого или красновато-лилового цвета.

Побочное действие. Слабительное действие может сопровождаться коликообразной болью в животе. Большие дозы могут вызвать понос или метеоризм.

Противопоказания. Спастический колит, аппендицит, кишечная непроходимость, беременность, а также период лактации.

Форма выпуска. Таблетки, в упаковке 10 штук, 25 штук.

Отечественной промышленностью выпускается также антрасенин в таблетках по 0,07 г, в упаковке 10 штук и 25 штук.

Из Индии поступает препарат под названием «Сенаде», в упаковке 50 таблеток.

Условия хранения. В сухом месте при температуре не выше 15°С.

Срок годности сенадексина и сенаде 3 года, антрасенина 2 года.

СЕНЗИТ (Sensit). Синонимы: Fedilin hydrochlorid, Phenoxan. Состав: 1 драже содержит 50 мг фендилина гидрохлорида.

Фармакологическое действие. Увеличивает коронарный кровоток и снабжение сердца кислородом, повышает устойчивость миокарда к гипоксии.

Показания к применению. Коронарная недостаточность, стенокардия, коронарный склероз, профилактика повторного инфаркта миокарда, постинфарктных состояний.

Способ применения и дозы. По 1 драже 3 раза в день.

Побочное действие. Головная боль, беспокойство.

Противопоказания. Острая фаза инфаркта миокарда. При беременности применять только в исключительных случаях.

Форма выпуска. Драже 50 мг, в упаковке 50 штук.

Условия хранения. При комнатной температуре (15—20°С).

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Венгрии.

Отредактировал: ledi24

СЕНКАТАЛИН (Sencatalin). Состав: 1 таблетка содержит натриевую соль 1-гидроокси-5-оксо-5-Н-пиридо [3,2-а] феноксазин-3 карбоновой кислоты.

Фармакологическое действие. Средство, затормаживающее развитие катаракты.

Показания к применению. Старческая катаракта и диабетическая катаракта.

Способ применения и дозы. Растворяют таблетку в 15 мл растворителя при этом получается ярко-желтый глазной раствор. Полученный раствор закапывают в глаза по 1—2 капли 5 раз в день.

Форма выпуска. Таблетка с 15 мл растворителя.

Условия хранения. Флакон после растворения таблетки следует хранить в темном прохладном месте. Содержимое флакона нужно использовать в течение 1 мес.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Индии.

СЕННЫ ЛИСТ (Folium Sennae). Синонимы: лист кассии, александрийский лист. Содержит антрагликозиды, хризофановую кислоту, смолистые вещества.

Применение. В качестве слабительного средства при хронических запорах в виде настоя (10,0:200,0—20,0:200,0) по 1 столовой или чайной ложке 1—3 раза в день.

Форма выпуска. Цельные и резаные листья в упаковке по 50 г, экстракт сухой в таблетках по 0,03 г в упаковке по 25 штук, брикеты по 75 г.

Условия хранения. В сухом прохладном месте.

Срок годности. Лист 3 года, таблетки 2 года.

СЕРА ОСАЖДЕННАЯ (Sulfur praecipitatum).

Применение. При кожных заболеваниях (себорея, сикоз, псориаз и др.) наружно в виде 5%, 10%, 20% мазей и присыпок.

Форма выпуска. В стеклянных банках.

Условия хранения. В сухом месте.

Срок годности 10 лет.

СЕРА ОЧИЩЕННАЯ (Sulfup depuratum).

Применение. В качестве противоглистного средства при энтеробиозе, а также в психиатрии для пирогенной терапии (шизофрения, прогрессивный паралич и др.), при кожных заболеваниях (псориаз, себорея, сикоз, чесотка). Назначают внутрь взрослым по 0,8—1 г на прием 3 раза в день в течение 5 дней. Наружно в дерматологии в виде 5%, 10% и 20% присыпок и мазей.

Форма выпуска. Порошок, мазь серная (Unguentum sulfuratum) в упаковке по 25 г, мазь серно-нафталанная (Unguentum Naphthalani sulfuratum) ангро, паста серно-цинко-нафталанная в упаковке по 40 г.

Условия хранения. В сухом (мази в прохладном) месте.

Срок годности не ограничен.

СЕРЕБРА НИТРАТ (Argenti nitras). Синоним: ляпис.

Фармакологическое действие. Антисептическое и противовоспалительное средство.

Показания к применению. Эрозии, язвы, избыточные грануляции, трещины, острый конъюнктивит, хронический гиперпластический ларингит, хронический гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.

Способ применения и дозы. Наружно в виде 2%, 5% и 10% раство-

Отредактировал: ledi24

ров, 1—2% мазей, ляписных карандашей; внутрь в виде 0,05—0,06% раствора или в пилюлях.

Высшая разовая доза для взрослых внутрь 0,03 г, суточная 0,1 г.

Форма выпуска. Кристаллический порошок. Ляписные карандаши.

Условия хранения. Список А. В защищенном от света месте в хорошо укупоренных банках с притертой пробкой.

Срок годности 10 лет.

СЕРМИОН (Sermion). 1,6 Диметил-8β-5 бромникотинат-10α-метосиэрголин. Синоним: ницерголин.

Фармакологическое действие. Снижает тонус мозговых и периферических сосудов. Уменьшает цереброваскулярное сопротивление и увеличивает мозговой кровоток. Активизирует обмен веществ в головном мозге.

Показания к применению. Острые и хронические церебральные и периферические сосудисто-метаболические нарушения (церебральный артериосклероз, инсульт; неустановившаяся церебральная ишемия, профилактика мигрени и сосудистой головной боли; поддерживающее лечение при повышенном АД).

Способ применения и дозы. Внутримышечно 4 мг распределяют на 1—2 введения в день. Внутривенно 4—8 мг в 100 мл изотонического раствора натрия хлорида. Способы введения, дозы и время терапии зависят от индивидуальных показателей больного. Раствор, готовый для инъекции, может храниться при комнатной температуре до 48 ч.

Побочное действие. Головокружение, сонливость и бессонница.

Противопоказания. Чрезмерная чувствительность к ницерголину.

Форма выпуска. Упаковка из 4 флаконов по 4 мг и 4 ампул с растворителем по 4 мл. Таблетки по 0,01 № 30.

Условия хранения. В темном месте.

Срок годности 4 года.

Поставляется из Индии.

СЕРОТОНИНА АДИПИНАТ (Serotonini adipinas). 5-Окситрипта-минадипинат, или 3-(β-аминоэтил)-5-оксиндол-адипинат.

Фармакологическое действие. Гемостатическое средство.

Показания к применению. Патологические состояния, сопровождающиеся геморрагическим синдромом (болезнь Верльгофа, гипо- и апластическая анемия, тромбастения, геморрагический васкулит).

Способ применения и дозы. Внутривенно капельно (в 100—150 мл изотонического раствора хлорида натрия) или внутримышечно (в 5 мл 0,5% раствора новокаина), начиная с 0,005 г с постепенным повышением дозы (при отсутствии побочных явлений) до 0,01 г; внутримышечно вводят 2 раза в сутки с интервалами не менее 4 ч. Суточная доза для взрослых 0,015—0,02 г. Курс лечения в среднем 10 дней.

Побочное действие. При быстром введении в вену возможны боль по ходу вены и в животе, неприятные ощущения в области сердца, повышение АД, тяжесть в голове, затруднение дыхания, тошнота, диарея, уменьшение диуреза, боль в месте инъекции при внутримышечном введении.

Противопоказания. Гломерулонефрит, хронические нефрозы, заболевания почек, сопровождающиеся анурией, гипертоническая болезнь II—III стадии, острые тромбозы, отек Квинке, бронхиальная астма, заболевания, сопровождающиеся повышением свертываемости крови.

Форма выпуска. Ампулы по 1 мл 1% раствора, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

СИБАЗОН (Subazonum). 7-Хлор-2,3-дигидро-1 метил-5-фенил-

Отредактировал: ledi24

1Н-1,4-бензодиазепина-2-ОН. Синонимы: Seduxen, Relanium, Valium и др.

Фармакологическое действие. Транквилизирующее средство. Оказывает успокаивающее влияние на центральную нервную систему, понижает мышечный тонус, обладает выраженными противосудорожными свойствами. Потенцирует эффекты снотворных и нейролептических препаратов, алкоголя.

Показания к применению. Неврозы, психопатии, неврозоподобные и психопатоподобные состояния при шизофрении, органических заболеваниях головного мозга (в том числе при цереброваскулярных заболеваниях), соматические болезни, сопровождающиеся признаками эмоционального напряжения, тревоги, страха, повышенной раздражительностью, сенесто-ипохондрическими, навязчивыми и фобическими расстройствами, нарушениями сна. Сибазон применяется также для купирования психомоторного возбуждения и тревожной ажитации при указанных выше заболеваниях.

В детской психоневрологической практике рекомендуется при невротических и неврозоподобных состояниях, сопровождающихся указанными выше симптомами, а также головной болью, энурезом, нарушениями настроения и поведения.

При эпилепсии назначают для лечения судорожных пароксизмов, психических эквивалентов, для купирования эпилептического статуса.

Применяют препарат также для снятия спастических состояний, связанных с поражениями головного и спинного мозга, а также при других заболеваниях опорно-двигательного аппарата, сопровождающихся напряжением мышц.

В комплексе с другими препаратами используют для лечения синдрома абстиненции при алкоголизме, при предоперационной подготовке больных и в послеоперационном периоде, в дерматологической практике при экземе и других заболеваниях, сопровождающихся зудом, раздражительностью.

Способ применения и дозы. Назначают внутрь, внутривенно или внутримышечно.

При назначении сибазона следует соблюдать принцип постепенного повышения дозы до получения лечебного эффекта и постепенного снижения дозы при отмене препарата.

При введении внутрь средняя разовая доза для взрослых составляет 0,005—0,015 г (5—15 мг). В отдельных случаях при выраженном возбуждении, страхе, тревоге ее можно увеличить до 0,02 мг (20 мг) Суточная доза обычно составляет 0,015—0,045 г (15—45 мг), максимальная суточная —0,06 г (60 мг).

Дозу для детей и продолжительность курса лечения подбирают индивидуально в зависимости от возраста и характера заболевания. Средняя разовая доза при приеме внутрь для детей от 1 года до 3 лет составляет 0,001 г (1 мг), от 3 до 7 лет —0,002 г (2 мг), от 7 лет и старше —0,003—0,005 г (3—5 мг). Средние суточные дозы сибазона соответственно возрастным группам составляют 0,002 г (2 мг), 0,006 г (6 мг) и 0,008—0,01 г (8—10 мг). У детей старшей возрастной группы при необходимости суточную дозу можно увеличить до 0,014—0,016 г (14—16 мг).

Суточную дозу препарата делят на 2—3 приема. Сибазон можно комбинировать с антидепрессантами и нейролептиками.

Длительность непрерывного курса лечения не должна превышать 2 мес. Перед повторным курсом лечения перерыв должен быть не менее 3 нед.

Внутривенно (капельно или струйно) и внутримышечно сибазон

Отредактировал: ledi24

применяют у взрослых в основном при заболеваниях, сопровождающихся психомоторным возбуждением, судорогами, при купировании эпилептического статуса, при лечении острых тревожно-фобических, тревожно-депрессивных состояний, в том числе при алкогольных психозах и абстиненции. Средняя разовая доза 10 мг (2 мл 0,5% раствора), средняя суточная доза 30 мг. Максимальная разовая доза 30 мг, максимальная суточная —70 мг.

Положительный седативный эффект наблюдается уже через несколько минут после внутривенного и через 30—40 мин после внутримышечного введения, терапевтическое действие — через 3—10 дней. После снятия острых проявлений болезни лечение сибазоном продолжают, назначая его внутрь.

При эпилептическом статусе сибазон вводят медленно внутривенно в дозе 10—40 мг. При необходимости повторяют внутривенное или внутримышечное введение каждые 3—4 ч (3—4 раза).

Применяют препарат внутривенно также в хирургической практике в составе премедикации и в послеоперационном периоде (10—40 мг), а также для усиления нейролептаналгезии (30—40 мг).

Сибазон не следует вводить в одном шприце с другими препаратами во избежание выпадения осадка.

Побочное действие. Мышечная слабость, сонливость, вялость, атаксия, сухость во рту, головокружение. В редких случаях наблюдаются кожно-аллергические высыпания. При внутривенном введении возможны локальные воспалительные процессы. Чтобы избежать этого, рекомендуется чередовать места введения препарата.

Противопоказания. Тяжелые формы печеночной и почечной патологии, миастения, беременность. При лечении сибазоном категорически запрещается употребление алкоголя. Из-за седативного действия и возможного нарушения координации движений нельзя принимать препарат во время работы водителям транспорта и другим лицам, профессия которых требует быстрой психической и двигательной реакции.

Форма выпуска. Таблетки, в упаковке 20 штук по 0,005 г (5 мг), таблетки, покрытые оболочкой, для детей по 0,001 г и 0,002 г. Ампулы по 2 мл 0,5% раствора, в упаковке 10 ампул.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности. Таблетки по 0,005 г 3 года, по 0,001 и 0,002 г 2 года.

Этот препарат под названием «Реланиум» в виде драже по 0,005 г в упаковке по 20 штук и в ампулах по 2 мл 0,5% раствора в упаковке по 5 штук поступает из Венгрии.

Срок годности. Ампулы 2 года, драже 5 лет.

СИГЕТИН (Sygethinum). мезо-3,4-ди-(пара-Сульфофенил)-гексана дикалиевая соль.

Фармакологическое действие. Усиливает сокращение матки, тормозит гонадотропную функцию гипофиза, улучшает плацентарное кровообращение.

Показания к применению. Как лечебное и профилактическое средство при внутриутробной асфиксии плода и климактерических расстройствах у женщин.

Способ применения и дозы. Вводят внутривенно 2—4 мл 1% раствора в 20—40 мл 40% раствора глюкозы; при необходимости инъекции повторяют через 30 мин —1 ч; для профилактики угрожающей асфиксии плода вводят внутримышечно или внутривенно по 1—2 мл 1% раствора ежедневно в течение 10 дней; при климактерических расстройствах у женщин назначают внутрь по 0,01—0,05 г 2 раза в день или внутримышечно 1—2 мл 1% раствора 1 раз в день. Курс лечения 30—40 дней.

Отредактировал: ledi24

Форма выпуска. Таблетки по 0,1 г, в упаковке 10 штук и ампулы по 2 мл 1% раствора.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности. Ампулы 2 года, таблетки 5 лет.

СИГНОПАМ (Sygnopam).

Фармакологическое действие. Производное бензодиазепина, обладающее сильным болеутоляющим и противофобийным свойством. Облегчает засыпание, действует расслабляюще на скелетную мускулатуру. Быстро всасывается из пищеварительного тракта и также быстро удаляется с мочой.

Показания к применению. Состояния напряжения и страха, неврозы, протекающие с пониженным настроением, вегетососудистая дистония, судорожные состояния, бессонница. До и после хирургических вмешательств. В ходе лечения сосудистых заболеваний мозга и нерезко выраженной мигрени.

Способ применения и дозы. В легких случаях по 5 мг 2—3 раза в день. В тяжелых случаях по 10 мг 2—3 раза в день. Во время применения препарата запрещается управлять автотранспортом.

Побочное действие. Иногда сонливость, утомление, головокружение, тошнота.

Противопоказания. Беременность, глаукома, преклонный возраст.

Форма выпуска. Таблетки по 10 мг, в упаковке 20 штук.

Условия хранения. Обычные.

Срок годности 3 года.

Поставляется из Польши.

СИДНОКАРБ (Sydnocarbum). 3-(βФенилизопропил)-N-фенилкарбамоилсиднонимин.

Фармакологическое действие. Оказывает выраженное стимулирующее влияние на центральную нервную систему, в отличие от фенамина не имеет отчетливой периферической симпатомиметической активности, не вызывает привыкания.

Показания к применению. Астенические состояния в результате физического и психического переутомления, после тяжелых заболеваний и черепно-мозговых травм, невротические расстройства с заторможенностью, вялотекущая шизофрения с апатоабулическими расстройствами. Имеются данные о применении препарата при ночном недержании мочи.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,005 г 2 раза в день; при необходимости дозу повышают до 0,05 г/сут. Высшая разовая доза 0,075 г, суточная 0,15 г.

Побочное действие. При передозировке головная боль, бессонница, потеря аппетита, повышение АД.

Противопоказания. Повышенное возбуждение, выраженный атеросклероз, гипертоническая болезнь III стадии.

Форма выпуска. Таблетки в упаковках по 50 штук по 0,005 г и 0,01 г.

Условия хранения. Список А. В защищенном от света месте.

Срок годности 4 года.

СИДНОФАРМ (Sydnopharm). Синонимы: Corvaton, Molsidomin.

Фармакологическое действие. Длительно действующее средство для лечения больных с коронарной недостаточностью, содержащее молсидомин — вещество, относящееся к новому классу кардиотропных соединений (сиднонимины), способные устранять или предотвращать кислородное голодание сердечной мышцы путем воздействия на периферическую систему кровообращения без влияния на миокард.

Отредактировал: ledi24

Показания к применению. Приступы стенокардии, возникающие на фоне хронической коронарной недостаточности, в том числе после перенесенного инфаркта миокарда.

Способ применения и дозы. Внутрь по $^1/_2$—1 таблетке 2—3 раза в день после еды; для получения быстрого эффекта препарат можно назначать сублингвально. При приеме внутрь действие наступает в течение первых 20 мин, сублингвально — в течение 5—10 мин, продолжительность 6—8 ч.

Побочное действие. В начале лечения возможны головная боль, незначительное снижение АД, проходящее после уменьшения дозы препарата.

Противопоказания. Кардиогенный шок и тяжелая гипотония. При остром инфаркте миокарда препарат назначают под строгим контролем гемодинамики. В первые 3 мес беременности сиднофарм применяют только по жизненно необходимым показаниям.

Форма выпуска. Таблетки по 0,002 г, в упаковке 30 штук.

Условия хранения. В темном месте.

Срок годности 2 года.

Поставляется из Болгарии.

СИДНОФЕН (Sydnophenum). 3-(β-Фенилизопропил)-сидноиимина гидрохлорид.

Фармакологическое действие. Оказывает стимулирующее действие на центральную нервную систему.

Показания к применению. Астенические состояния, вызванные переутомлением и соматическими заболеваниями; невротические состояния, психопатии, апатоабулические расстройства при вялотекущей шизофрении, нерезко выраженные адинамические депрессии в рамках циклотимии и реактивных состояний.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,005 г 1—2 раза в день, при необходимости дозу постепенно повышают до 0,06—0,08 г.

Побочное действие. При передозировке и плохой переносимости головная боль, головокружение, повышение АД, боль в области сердца.

Противопоказания. Заболевания печени и почек, стойкое повышение АД, выраженный атеросклероз.

Форма выпуска. Таблетки по 0,005 г, в упаковке 50 штук.

Условия хранения. Список А. В защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

СИЗОМИЦИНА СУЛЬФАТ (Sisomycini sulfas). Синонимы: сизомин, патомицин и др. Антибиотик, продуцируемый Micromonospora fusca var. sisomycini var. nov. Относится к группе аминогликозидов.

Фармакологическое действие. Обладает широким спектром антимикробного действия Активен в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе стафилококков, включая пенициллин- и метициллинустойчивые штаммы. По спектру действия близок к гентамицину, но более активен.

Показания к применению. Тяжелые гнойно-септические заболевания, тяжелые инфекционно-воспалительные заболевания органов дыхания, инфекции почек и мочевыводящих путей, инфицированные ожоги и другие заболевания, вызванные преимущественно грамотрицательными микроорганизмами [Proteus, Klebsiella, Enterobacter, E. coli, Ps. aeruginosa и др.], устойчивыми к другим антибиотикам, или ассоциациями грамположительных и грамотрицательных возбудителей.

Способ применения и дозы. Внутримышечно или внутривенно (капельно). Сизомицин применяют для лечения взрослых и детей. В за-

Отредактировал: ledi24

висимости от заболевания и его тяжести лечение проводят по схеме (см. инструкцию по применению сизомицина).

Растворы сизомицина сульфата готовят непосредственно перед введением. Для внутривенного капельного введения добавляют к разовой дозе для взрослых 50—100 мл 5% раствора глюкозы или изотонического раствора натрия хлорида, для детей 30—50 мл 5% раствора глюкозы. Скорость введения у взрослых 60 капель в 1 мин, у детей —8—10 капель в 1 мин.

Внутривенное вливание проводят обычно в течение 2—3 дней, затем переходят на внутримышечные инъекции.

Побочное действие. Может оказывать нефро- и ототоксическое действие, в редких случаях нарушение нервно-мышечной проводимости и угнетение дыхания. При внутривенном введении возможно развитие перифлебитов и флебитов. В редких случаях наблюдаются аллергические реакции (кожные сыпи, зуд, отек).

Противопоказания. Аллергия к препарату, азотемия (остаточный азот в крови выше 70,4 ммоль/л, или 100 мг %), заболевания слухового и вестибулярного аппаратов, связанные с невритом VIII пары черепных нервов, миастения. Не следует применять сизомицин (совместно или последовательно) с препаратами, обладающими ото- и нефротоксическими свойствами (стрептомицин, канамицин, гентамицин, флоримицин, мономицин, ристомицин, полимиксин В), а также одновременно с диуретиками и курареподобными средствами.

Форма выпуска. В виде 5% (50 мг/мл) раствора в ампулах по 1,5 мл для взрослых, в упаковке 10 штук и 1% (10 мг/мл) раствора в ампулах по 2 мл, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте, при комнатной температуре.

Срок годности 2 года.

СИКОРТЕН (Sicorten).

Фармакологическое действие. Препарат относится к категории высокоактивных кортикоидов для местного применения. Обладает быстрым и выраженным противовоспалительным, антиаллергическим, противозудным, антиэкссудативным и антипролиферативным действием. *Крем,* наделенный гидрофильными свойствами, не препятствует отделению секрета и выделению тепла, вызывает охлаждающий эффект; предназначается для лечения экзематозных заболеваний кожи. *Мазь* оказывает гидратизирующее воздействие на кожу, повышая ее эластичность, а также в значительной мере насыщает жирами эпидермис и глубоко проникает в кожу.

Показания к применению. Крем и мазь назначают при заболеваниях кожи, хорошо реагирующих на действие кортикоидов для местного применения: острой контактной экземе (остром контактном дерматите), обострении эндогенной экземы (конституциональной экземе, атопическом дерматите, нейродерматите), себорейной экземе (нуммулярном дерматите).

Способ применения и дозы. Как правило, 2 раза в день накладывают на пораженный участок кожи и слегка втирают. Защитная повязка обычно не требуется. При отсутствии адекватного ответа на препарат его терапевтический эффект может быть усилен с помощью временного наложения окклюзионной повязки.

Длительное использование препарата может сопровождаться нежелательными побочными явлениями, типичными для сильнодействующих кортикоидов местного применения, такими, как атрофия кожи, образование на ней полос, телеангиэктазия, пурпура, нарушения пигмента-

Отредактировал: ledi24

ции, гипертрихоз и вторичные инфекции. При появлении кожных реакций или вторичной инфекции препарат следует отменить и провести подходящее лечение.

Противопоказания. Туберкулез кожи, сифилитические поражения кожи, свежие вирусные инфекции кожи, кожные реакции на действие вакцин, пиодермии и грибковые поражения кожи. Повышенная чувствительность к одному из компонентов, входящих в состав препарата.

Форма выпуска. Крем в упаковке по 10 г, мазь в упаковке по 10 г.

Условия хранения. В прохладном месте.

Срок годности 3 года.

Производится фирмой «Сиба-Гейги», Швейцария.

СИЛАБОЛИН (Silabolinum). Триметилсилиловый эфир-эстрен-4-ол-17β-она-3.

Фармакологическое действие. Оказывает пролонгированное анаболическое действие. Усиливает синтез белка и приводит к положительному балансу азота, калия, натрия, кальция, фосфора, серы в организме.

Показания к применению. С лечебной целью при состояниях, сопровождающихся усилением распада белка и отрицательным балансом азота; при астении, кахексии различного происхождения, травмах и ожогах, длительной терапии глюкокортикоидами, при остеопорозе, длительно не заживающих переломах, атеросклеротическом кардиосклерозе и ишемической болезни сердца, хронических заболеваниях почек (без склонности к отекам), печени и желчных путей, для стимуляции роста.

Способ применения и дозы. Внутримышечно в масляном растворе. Разовая доза 25—50 мг (1 или 2 мл 2,5% раствора). Общую дозу препарата рассчитывают с учетом массы больного и она должна составлять для взрослых 1—1,5 мг/кг в месяц, для детей — не более 1 мг/кг в месяц. Месячную дозу вводят равными частями в 2—4 приема, 1 раз в 7—14 дней. Лечение проводят в течение 1—2 мес с последующим перерывом 1 мес. При наличии показаний курсы лечения повторяют.

Побочное действие. При передозировке у женщин возможно появление симптомов вирилизации.

Противопоказания. Рак предстательной железы, острые заболевания печени, беременность, период лактации.

Форма выпуска. Ампулы по 1 мл 2,5% масляного раствора, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б. При комнатной температуре, в защищенном от света месте.

При выпадении кристаллического осадка без вскрытия ампулы препарат подогревают до полного растворения осадка.

Срок годности 2 года.

СИЛИБОР (Siliborum). Представляет собой сумму флаволигнанов, получаемых из плодов расторопши пятнистой (Silybum marianum).

Фармакологическое действие. Оказывает гепатозащитное действие.

Показания к применению. Различные формы гепатита и цирроза печени.

Способ применения и дозы. Внутрь до еды по 0,04—0,08 г 3 раза в день ежедневно. Курс лечения 1—2 мес, при необходимости можно продлить до 3—6 мес или повторить через 1—2 мес.

Побочное действие. Аллергическая реакция (кожные высыпания, зуд и т. д.).

Форма выпуска. Таблетки, покрытые оболочкой, по 0,04 г, в упаковке 25 штук.

Отредактировал: ledi24

Условия хранения. Список Б. В сухом, защищенном от света месте. **Срок годности** 2 года.

СИНАКТЕН-ДЕПО (Synacten-Depo). Синтетический полипептид тетракозактид, состоящий из аминокислотных остатков.

Фармакологическое действие. Пролонгированный кортикотропный препарат, обладающий всеми фармакологическими свойствами эндогенного АКТГ. Синактен-депо в отличие от последнего имеет постоянный состав, не содержит чужеродных для организма белков. Терапевтическое действие препарата основывается преимущественно на стимуляции коры надпочечников.

Показания к применению. Коллагенозы (ревматоидный артрит и др.), аллергические заболевания (бронхиальная астма, ангионевротический отек), дерматозы различной этиологии, заболевания желудочно-кишечного тракта (язвенный колит).

Способ применения и дозы. Препарат назначают внутримышечно вначале по 1 мг в день, а в острых случаях (астматический статус и в онкологической практике) по 1 мг каждые 12 ч. После исчезновения острых явлений препарат вводят по 1 мг каждые 1—2 дня с последующим снижением дозы до 0,5 мг каждые 2—3 дня или 1 мг 1 раз в неделю.

Детям препарат назначают внутримышечно через 1—7 дней; грудного возраста по 0,25 мг, детям младшего возраста 0,25—0,5 мг, детям школьного возраста по 0,25—1 мг. Ампулы перед употреблением рекомендуется энергично встряхивать.

Побочное действие. Понижение сопротивляемости к инфекциям, психические нарушения, остеопороз, пептическая язва, пигментация кожи и др. При длительном назначении препарата необходимо дополнительное введение калия в организм.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к препарату, острые психозы, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, беременность, сердечная недостаточность. При необходимости одновременного применения противодиабетических и гипотензивных средств дозировка этих препаратов пересматривается.

Форма выпуска. Ампулы по 1 мл, содержащие по 1 мг тетракозактида в 1 мл суспензии, по 10 штук в упаковке.

Условия хранения. Список Б. При температуре ниже 15°С.

Срок годности 3 года.

Поставляется из Югославии.

СИНАФЛАН (Synaflanum). Синонимы: Synandone, Flucort, Fluocinolone acetonidum.

Фармакологическое действие. Обладает противовоспалительными, антиаллергическими и противозудными свойствами.

Показания к применению. Взрослым в комплексной терапии при воспалительных и аллергических заболеваниях кожи немикробной этиологии (экзема, нейродермиты, кожный зуд, псориаз и другие хронические сухие формы воспалительных и аллергических заболеваний кожи); линимент синафлана применяют больным с островоспалительными экссудативными заболеваниями кожи (себорейная экзема, аллергические дерматиты, зуд заднего прохода и половых органов, экссудативная форма псориаза).

Способ применения и дозы. Мазь или линимент наносят тонким слоем на пораженные участки кожи 1—3 раза в день. Продолжительность лечения зависит от характера заболевания и эффективности терапии, составляет обычно 5—10 дней. Курс лечения может быть продлен до 25 дней и более.

Побочное действие. При длительном лечении возможны вторич-

Отредактировал: ledi24

ные инфекционные поражения кожи и атрофические изменения в ней, в этих случаях рекомендуется назначать синафлан в сочетании с антимикробными средствами.

Противопоказания. Инфекционные заболевания кожи, наличие язвенных поражений и ран на участках аппликаций, беременность. Не рекомендуется длительное применение на обширных участках кожи.

Форма выпуска. 0,025% мазь в упаковке по 15 г и линимент 0,025% в упаковке по 15 г.

Из Польши эта мазь поступает под названием «Флуцинар» по 15 г в тубах. В Югославии выпускается под названием «Синалар».

Условия хранения. Список Б. В сухом прохладном месте.

Срок годности синафлана 2 года, флуцинара и синалара 3 года.

СИНКУМАР (Syncumar). 3-[α-(4′-Нитрофенил)-βацетил-этил]-4-оксикумарин. Синонимы: Acenocumarol, Trombostop.

Фармакологическое действие. Антикоагулянт непрямого действия.

Показания к применению, побочное действие и противопоказания те же, что для дикумарина и других аналогичных препаратов. Дозы устанавливают индивидуально. Обычно в 1-й день назначают 0,016—0,012 г, затем постепенно дозы уменьшают до 0,004—0,002—0,001 г.

Форма выпуска. Таблетки по 0,002 г, в упаковке 50 штук.

Условия хранения. Список А.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Венгрии.

СИНТОМИЦИНА ЛИНИМЕНТ (Linimentum synthomycini). D, L-трео-1-пара-Нитрофенил-2-дихлорацетиламино-1, 3-пропандиол. Синоним: эмульсия синтомицина.

Показания к применению. Гнойно-воспалительные заболевания кожи и слизистых оболочек, инфицированные ожоги, сикоз, трахома.

Способ применения и дозы. Только местно в виде 1%, 5% и 10% эмульсии и в суппозиториях по 0,25 г 1—2 раза в день.

Форма выпуска. В виде линимента (эмульсии) 1% ангро в банках по 25 г; 5% ангро и по 25 г; 10% ангро и по 25 г. Суппозитории вагинальные по 0,25 г, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. В сухом прохладном месте при температуре 4°С.

Срок годности. Линимент 1%, 5%, 10% и суппозитории 2 года.

СИНЭСТРОЛ (Synoestrolum). Мезо-3, 4-Ди-(пара-оксифенил)-гексан. Синонимы: Dihydrostilböstrol, Novostrol.

Фармакологическое действие. Эстрогенный гормон.

Показания к применению. Рак молочной железы у женщин в возрасте старше 60 лет, гипертрофия и рак предстательной железы и другие заболевания, при которых показано применение эстрогенных препаратов.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,002 г (2 мг) 1—2 раза в день, подкожно и внутримышечно по 1—2 мл 0,1% или 2% раствора. Способ введения и дозы определяются врачом в зависимости от заболевания. Высшая разовая доза взрослых внутрь 0,002 г, суточная 0,004 г; внутримышечно разовая 0,002 г, суточная 0,003 г; при злокачественных новообразованиях разовая 0,06 г, суточная 0,1 г (внутримышечно).

Побочное действие. Возможны тошнота, рвота, головокружение; при применении больших доз токсическое повреждение печени, выраженная пролиферация, эндометрия и кровотечения у женщин, феминизация у мужчин.

Противопоказания. Беременность, заболевания печени и почек.

Отредактировал: ledi24

Форма выпуска. Таблетки по 0,001 г, в упаковке 10 штук, ампулы в упаковках по 10 штук по 1 мл масляного 0,1% и 2% раствора.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности. Таблетки 2 года, раствор в масле 0,1% 4 года, 2% 5 лет, в оливковом масле 6 лет

СИНЮХИ ЛАЗУРНОЙ КОРНЕВИЩЕ С КОРНЯМИ (Rhizoma cum radicibus Polemonii coerulei). Содержит тритерпеновые сапонины (20—30%), основная часть которых кислые сапонины (96%) и нейтральные сапонины (4%), смолы (1,25%), органические кислоты; жирные и эфирные масла.

Применение. Внутрь в виде настоев (6,0:200,0—8,0:200,0) или отваров (3,0:200,0—6,0:200,0) по 1 столовой ложке 3—5 раз в день после еды как отхаркивающее при бронхитах, как успокаивающее и болеутоляющее при язвенной болезни желудка в виде отвара по 1 столовой ложке 3 раза в день после еды совместно с настоем сушеницы болотной (10,0:200,0) по 3 столовые ложки 3 раза в день до еды.

Форма выпуска. Корневище с корнями резаные.

Условия хранения. В сухом месте.

Срок годности 2 года.

СИРЕПАР (Syrepar). Гидролизат печени крупного рогатого скота, содержащий в 1 мл 10 мкг цианокобаламина.

Применение. При хроническом и подостром гепатите, циррозе и ожирении печени, токсических поражениях печени, токсикозе беременных внутримышечно или внутривенно (медленно) 2—3 мл 1 раз в сутки в течение 50—60 дней.

Форма выпуска. В герметически закрытых флаконах по 10 мл (в упаковке 5 флаконов).

Условия хранения. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

Поступает из Венгрии.

СКИПИДАРНАЯ МАЗЬ (Unguentum terebinthinae). Состав: масла терпентинного очищенного 20 г, эмульсии консистентной (вода/вазелин) 80 г.

Применение. При артритах, миозитах, невралгиях для растираний

Форма выпуска. В упаковке по 50 г.

Условия хранения. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

СКОПОЛАМИНА ГИДРОБРОМИД (Scopolamini hydrobromidum). Бромистоводородная соль скополамина — алкалоида, содержащегося в красавке, белене, дурмане и скополии. Синоним: Hyoscini hydrobromidum.

Фармакологическое действие. Активное периферическое м-холинолитическое средство; оказывает также центральное холинолитическое и седативное действие.

Показания к применению. В психиатрии как успокаивающее средство; при паркинсонизме; для подготовки к наркозу; при морской болезни; в офтальмологии при иритах, иридоциклитах и для расширения зрачка.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,00025—0,0005 г 2—3 раза в день до еды; в офтальмологии назначают по 1—2 капли 0,25% раствора 1—2 раза в день.

Высшая разовая доза 0,0005 г, суточная 0,0015 г.

Побочное действие и противопоказания те же, что и при применении атропина сульфата.

Отредактировал: ledi24

Форма выпуска. Порошок.

Условия хранения. Список А. В защищенном от света месте

Срок годности 5 лет.

СМОРОДИНЫ ЧЕРНОЙ ПЛОДЫ (Fructus Ribis nigri). Содержат аскорбиновую кислоту, витамин B_1, антоцианы, катехины, пектиновые и дубильные вещества, органические кислоты, сахар.

Применение. Как поливитаминное средство для профилактики и лечения авитаминозов и гиповитаминозов в виде настоя (3 столовые ложки плодов на стакан кипящей воды) по $^1/_2$ стакана 1—3 раза в день

Форма выпуска. В картонных коробках по 50 г

Условия хранения. В сухом проветриваемом помещении.

Срок годности не установлен.

СОЛИДОЛОВАЯ МАЗЬ (ПО ПРОПИСИ РЫБАКОВА) (Unguentum Solidoli Ribacovi). Состав: эмульсионного солидола 75 г вазелина 20 г, ментола 0,5 г, кислоты борной 5 г

Применение. При псориазе втирают в очаги поражения (по направлению роста волос) 1—2 раза в день.

Форма выпуска. В упаковке по 40 г

Условия хранения. В прохладном месте.

Срок годности 4 года.

СОЛИЗИМ (Solizymum). Липолитический ферментный препарат, получаемый из культуры Penicillium solitum.

Фармакологическое действие. Гидролизует растительные и животные жиры; способствует перевариванию и усвоению жиров.

Показания к применению. Хронический панкреатит с понижением липолитической активности, хронические заболевания желудочно-кишечного тракта (гастриты, гепатиты, холециститы, энтериты, энтероколиты), после операций на поджелудочной железе, кишечнике, желчном пузыре.

Способ применения и дозы. Внутрь во время или сразу после еды по 40 000 ЛЕ (липолитическая единица) 3 раза в день. Суточная доза 120 000 ЛЕ. Курс лечения 2—4 нед.

Форма выпуска. Таблетки по 20 000 ЛЕ, растворимые в кишечнике, в упаковке 50 штук.

Условия хранения. В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 4°С.

Срок годности 2 года

«СОЛИМОК» («Solimokum»). Синонимы: Blemaren, Soluran, Uralit-U. Цитратная смесь, содержащая в 100 г калия цитрата 46,3 г, натрия цитрата 39 г, кислоты лимонной 14,5 г, вспомогательные и корригирующие вещества.

Фармакологическое действие. Оказывает ощелачивающее мочу действие при уратном литиазе, способствуя растворению мочевых камней, уменьшению их размеров и самопроизвольному их отхождению.

Показания к применению. Для лечения и профилактики мочекислого литиаза. Наличие уратных камней в почке, мочеточнике или мочевом пузыре, периодическое отхождение мочекислых камней с мочой; состояние после оперативного удаления мочекислых камней; при мочекислом диатезе (уратурии)

Способ применения и дозы. Препарат применяют внутрь в точном соответствии с инструкцией по его применению, приложенной к препарату.

Побочное действие. При избыточном применении солимока наблюдается повышение pH мочи. Если моча остается инфицированной

Отредактировал: ledi24

длительное время, мочекислые камни покрываются известковой оболочкой и дальнейший их литолиз становится затруднительным. При pH мочи выше 7,0 резко снижается растворимость фосфатов, которые могут выпадать в осадок. При применении солимока возможны боль в эпигастральной области и диспептические явления.

Противопоказания. Наличие значительных примесей солей кальция в конкрементах; нарушение уродинамики, тяжелые формы сердечной недостаточности и гипертоническая болезнь.

Форма выпуска. Гранулы в индивидуальной упаковке, содержащей 2 банки по 150 г препарата, полиэтиленовый пакет, в котором находятся листок-вкладыш, индикаторные бумажки (100 штук), прищепка и контрольный календарь для учета принятого препарата и реакции мочи.

Условия хранения. В сухом, защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

СОЛОДКИ (ЛАКРИЦЫ) КОРЕНЬ (Radix Glycyrrhizae, Radix liquiritiae). Содержит глицирризин (6%), флавононды (ликвиритин, ликвиритозид), β-ситостерин, пектины, сахар, крахмал.

Применение. В качестве отхаркивающего средства при заболеваниях легких, сопровождающихся кашлем, как противовоспалительное и спазмолитическое средство при гиперацидном гастрите, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки в виде настоя (15,0:200,0) по 1 столовой ложке 4—5 раз в день.

Форма выпуска. Ангро, солодкового корня экстракт густой и сухой.

Условия хранения. В сухом прохладном месте.

Срок годности корня 10 лет, экстракта густого 5 лет, сухого 15 лет

СОЛУТАН (Solutan). Состав: радобелина (алкалоид корня красавки) 0,1 мг, сапонина gipsophillae 1 мг, фенхелевого масла 0,4 мг, новокаина 4 мг, эфедрина гидрохлорида 17,5 мг, экстракта толутанского бальзама 25 мг, натрия йодида 100 мг, воды горькоминдальной 30 мг, спирта, воды до 1 мл.

Фармакологическое действие. Оказывает бронхолитическое и отхаркивающее действие.

Показания к применению. Бронхиальная астма, бронхиты.

Способ применения и дозы. Внутрь по 10—30 капель 3 раза в день после еды; при астматических приступах до 60 капель на прием; детям в зависимости от возраста 5—10 капель на прием; солутан можно применять и для ингаляций.

Побочное действие. Расширение зрачков, сухость во рту.

Противопоказания. Глаукома.

Форма выпуска. Во флаконах по 50 мл.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности 3 года.

Поставляется из Чехо-Словакии.

СОЛЮСУЛЬФОН (Solusulfonum). Тетранатриевая соль 4,4-ди-(3-фенил-1,3-дисульфопропиламина)-дифенилсульфона. Синонимы: Novotrone, Solaspone, Sulphonazine.

Фармакологическое действие. Обладает антибактериальной активностью в отношении микобактерий лепры.

Показания к применению. Лепра.

Способ применения и дозы. Внутримышечно в виде 50% водного раствора по специальной схеме.

Побочное действие. Общая слабость, понижение аппетита, диспептические явления, головокружение, головная боль, сердцебиение,

Отредактировал: ledi24

боль в области сердца; реже — цианоз, анемия, токсический гепатит Для предупреждения и уменьшения побочного действия рекомендуется назначать витамины и препараты железа.

Противопоказания. Болезни печени, почек, анемия. При назначении солюсульфона противопоказаны амидопирин и барбитураты.

Форма выпуска. Порошок 10 г.

Условия хранения. Список Б. В сухом, защищенном от света месте. Раствор хранят в герметически укупоренных сосудах в защищенном от света месте.

Срок годности. $1^1/_2$ года. Растворы годны к применению в течение нескольких дней после изготовления.

СОЛЮСУРЬМИН (Solusurminum). Натриевая соль комплексного соединения пятивалентной сурьмы и глюконовой кислоты. Синонимы: Solustibosan, Pentostam, Stibatin.

Фармакологическое действие. Оказывает антипротозойное действие на лейшмании.

Показания к применению. Висцеральный и кожный лейшманиоз.

Способ применения и дозы. Внутривенно, внутримышечно и подкожно. При висцеральном лейшманиозе ежедневно в течение 10—15 дней в виде 10—20% раствора на дважды дистиллированной воде. Дозы (взрослым и детям) устанавливают из расчета 0,04 г/кг (первая инъекция) и 0,07 г/кг (вторая инъекция); затем по 0,1—0,12 г/кг.

Форма выпуска. Порошок, в ампулах по 10 мл 20% раствора, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

СОЛЮТИЗОН (Soluthizonum). Бензальтиосемикарбазон парааминометиленсульфоната натрия моногидрат. Синоним: Tibon.

Фармакологическое действие. Обладает бактериостатической активностью в отношении микобактерий туберкулеза, в том числе штаммов, устойчивых к основным противотуберкулезным препаратам.

Показания к применению. Туберкулез верхних дыхательных путей, бронхов и легких; хронический фиброзно-кавернозный туберкулез; для подготовки к хирургическому лечению больных с хроническим фиброзно-кавернозным туберкулезом.

Способ применения и дозы. Ингаляции (в виде аэрозоля), интратрахеально, интрагортанно, интрабронхиально. На одно введение 2—5 мл 1—2% раствора 1—2 раза в день в течение 1—2 мес.

Побочное действие. Раздражение дыхательных путей, кашель.

Противопоказания. Тяжелые и декомпенсированные формы фиброзно-кавернозного процесса, сердечно-легочная недостаточность, кандидоз слизистых оболочек верхних дыхательных путей и полости рта.

Форма выпуска. Порошок.

Условия хранения. Список Б. В сухом, защищенном от света месте.

Срок годности 4 года.

СОМАТОТРОПИН ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ (Somatotropinum humanum pro injectionibus). Гормон передней доли гипофиза человека.

Фармакологическое действие. Оказывает анаболическое действие, положительно влияет на минеральный обмен, вызывает увеличение роста и массы тела при карликовости, связанной с недостаточностью гормона роста.

Показания к применению. Нарушения развития организма, связанные с недостаточностью гормона роста (гипофизарный нанизм).

Отредактировал: ledi24

Способ применения и дозы. Внутримышечно по 2—4 ЕД 3 раза в неделю. Непосредственно перед введением порошок соматотропина растворяют в 2 мл воды для инъекций или 0,25—0,5% раствора новокаина (раствор опалесцирует). Лечение продолжают от 3 мес до $1^1/_2$—2 лет и более.

Побочное действие. Аллергические реакции (кожная сыпь, зуд и др.).

Противопоказания. Злокачественные новообразования.

Форма выпуска. Лиофилизированный порошок во флаконах с содержанием 4 ЕД во флаконе в комплекте с 0,25% раствором новокаина по 2 мл.

Условия хранения. В сухом месте при температуре не выше 10°С.

Срок годности 2 года. Раствор препарата может храниться при температуре 5°С не более 48 ч.

СОМБРЕВИН (Sombrevin). Пропиловый эфир [3-метокси-4-(N, N-диэтилкарбамоилметокси]-фенилуксусной кислоты. Синонимы: Epontol, Propanidid.

Фармакологическое действие. Анестетик с ультракоротким наркотическим эффектом.

Показания к применению. Для кратковременного и вводного наркоза.

Способ применения и дозы. Внутривенно быстро 5% раствор (5—10 мг/кг); истощенным больным пожилого возраста и детям 2,5% раствор. Хирургическая стадия наркоза продолжается 5—7 мин с последующим быстрым пробуждением.

Побочное действие. Гиперемия и болезненность по ходу вены в месте инъекции; иногда тошнота и рвота.

Противопоказания. Шок, гемолитическая желтуха, выраженные нарушения функции почек. Необходима осторожность при нарушении коронарного кровообращения, гипертонии и декомпенсации сердечной деятельности.

Форма выпуска. Ампулы по 10 мл 5% раствора, в упаковке 5 штук.

Условия хранения. Список Б. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Венгрии.

СОМИЛАЗА (Somilasum). Комбинированный препарат, в состав которого входят солизим (липолитический фермент, получаемый из культуральной жидкости Penicilium solutum) и α-амилаза, получаемая из аминосубтилина. Одна таблетка содержит 0,0286 г солизима (20 000 ЛЕ) и 0,1363 г α-амилазы (300 ЕД).

Фармакологическое действие. Гидролизует растительные и животные жиры и расщепляет полисахариды, в результате происходит компенсация ферментативной недостаточности пищеварения.

Показания к применению. Недостаточность функции поджелудочной железы, приводящая к уменьшению липолитической и амилалитической активности дуоденального содержимого (при хронических панкреатитах); недостаточность пищеварения (гастриты, энтериты, энтероколиты, гепатиты, холециститы); после операций на поджелудочной железе, кишечнике, печени, желудке; при функциональных нарушениях, связанных с режимом питания.

Способ применения и дозы. Внутрь во время еды или непосредственно после еды по 1—2 таблетки 3 раза в день (таблетку проглатывают целиком, не разжевывая) ежедневно.

Форма выпуска. Таблетки, растворимые в кишечнике, содер-

Отредактировал: ledi24

жащие 20 000 ЛЕ солизима и 300 ЕД α-амилазы, в упаковке 50 штук.

Условия хранения. В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 5°С, не ниже 0°С.

Срок годности 2 года.

СОНАПАКС (Sonapax). Синоним: Melleril.

Фармакологическое действие. Мягкодействующий нейролептик. Избирательно влияет на психическую сферу, тормозит повышенную возбудимость центральной нервной системы.

Показания к применению. Острая и подострая шизофрения, органические психозы, тревожно-депрессивные и астенические состояния, неврозы, неврастения, повышенная раздражительность.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,01—0,025 г 2—3 раза в день.

Побочное действие. Сухость во рту, экстрапирамидные расстройства, при длительном лечении лейкопения, агранулоцитоз.

Противопоказания. Коматозное состояние, аллергические реакции, глаукома.

Форма выпуска. Драже, в упаковке 60 штук по 0,01 г и 0,025 г

Условия хранения. Список Б.

Срок годности 4 года.

Поставляется из Польши.

СОСНОВЫЕ ПОЧКИ (Turiones Pini). Содержат эфирное масло, основной компонент которого пинен, смолу, дубильные вещества, горькое вещество пиницикрин, аскорбиновую кислоту.

Применение. В качестве отхаркивающего и дезинфицирующего средства при хронических бронхитах в виде отвара (10,0:200,0) внутрь по 1 столовой ложке 3—4 раза в день, наружно для ингаляций.

Форма выпуска. В упаковке по 100 г.

Условия хранения. В сухом прохладном месте.

Срок годности 2 года.

СОФОРЫ ЯПОНСКОЙ НАСТОЙКА (Tinctura Sophorae japonicae). Применяется при гнойных воспалительных процессах (раны, ожоги, трофические язвы) в виде орошения, промывания, для влажных повязок.

Форма выпуска. Ангро.

Условия хранения. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

СОФРАДЕКС (Sofradex). Состав: сефамицин 5 мг, грамицидин 0,05 мг, дексаметазон 0,5 мг, фенилэтанол 5 мг, наполнитель до 1 мл.

Фармакологическое действие. Комплексный препарат, обладающий противовоспалительным, антибактериальным и противоаллергическим свойствами.

Показания к применению. Заболевания глаз, ушей, сопровождающиеся зудом (раздражением), воспалением и инфекцией; блефарит и инфекционная экзема век; аллергический конъюнктивит; острый и хронический наружный отит.

Способ применения и дозы. При заболевании глаз по 1—2 капли через 1—2 ч в течение 2—3 дней, затем дозу уменьшают до 1—2 капель 3—4 раза в день. При заболевании уха по 2—3 капли 3—4 раза в день. Введение капель чередуют с применением марлевых турунд, пропитанных этими каплями.

Побочное действие. Длительное местное применение может вызвать повышение внутриглазного давления и развитие катаракты; при заболеваниях, сопровождающихся истончением роговицы, возможно ее прободение.

Отредактировал: ledi24

Противопоказания. Вирусные заболевания роговицы, конъюнктивы, туберкулез и грибковые заболевания глаз, трахома.

Форма выпуска. Капли во флаконе по 5 мл.

Условия хранения. Список Б. В прохладном, недоступном для детей месте.

Срок годности 2 года.

СПАЗМОЛГОН (Spasmolgon). Синоним: Baralgin.

Фармакологическое действие. Оказывает выраженное спазмолитическое и болеутоляющее действие.

Показания к применению. Спазмы гладкой мускулатуры, особенно почечная колика, спазмы мочеточников, тенезмы мочевого пузыря, печеночная колика, спазмы желудка и кишечника.

Способ применения и дозы. Внутрь по 1—2 таблетки 3 раза в день, в тяжелых случаях — внутривенно медленно 5 мл.

Побочное действие. Возможны аллергические реакции, при длительном применении гранулоцитопения (требует отмены препарата).

Форма выпуска. Таблетки, в упаковке по 20 штук, ампулы по 5 мл, в упаковке 5 штук.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности 3 года.

Поставляется из Болгарии.

СПАЗМОЛИТИН (Spasmolytinum). β-Диэтиламиноэтилового эфира 1,1-дифенилуксусной кислоты гидрохлорид. Синонимы: дифацил, Vagospasmyl.

Фармакологическое действие. Обладает м-холинолитической активностью, подавляет н-холинореактивные системы организма и оказывает спазмолитическое действие.

Показания к применению. Эндартериит, пилороспазм, спастические колики, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.

Способ применения и дозы. Внутрь после еды по 0,05—0,1 г 2—4 раза в день, внутримышечно 5—10 мл 1% раствора.

Побочное действие. При передозировке сухость во рту, головокружение, головная боль, чувство опьянения, боль в подложечной области, местная анестезия.

Противопоказания. Глаукома, работа, требующая быстрой психической и физической реакции.

Форма выпуска. Порошок.

Условия хранения. Список Б. В сухом, защищенном от света месте

Срок годности 5 лет.

СПИРОБРОМИН (Spirobrominum). N, N″-ди(β-бромпропионил)-N′, N″-диспиротрипиперазиния дихлорид.

Фармакологическое действие. Обладает противоопухолевой активностью; способен тормозить развитие лейкоза.

Показания к применению. Острые лейкозы (преимущественно в комбинированной терапии), злокачественные лимфомы, рак гортани и кожные ретикулезы. Препарат можно использовать также и в комбинированной терапии, включая лучевое воздействие и оперативное вмешательство.

Способ применения и дозы. Внутривенно или внутримышечно. Раствор готовят непосредственно перед введением на изотоническом растворе натрия хлорида. При острых лейкозах применяют в сочетании с циклофосфаном, карминомицином (рубомицином), винкристином, L-аспарагиназой и другими препаратами. Назначают 200—800 мг/сут (в

Отредактировал: ledi24

зависимости от числа лейкоцитов в периферической крови). Средняя суточная доза 500 мг. Если суточная доза не превышает 500 мг, вводят однократно; при больших дозах вводят дважды равными частями. Курс лечения спиробромином в комбинации с другими препаратами 7—14 дней. Перерыв между курсами 10—14 дней. Рекомендуется проводить не менее 2 курсов.

При других злокачественных опухолях спиробромин рекомендуется применять по 500 мг ежедневно в течение 10—30 дней. Курсовая доза зависит от числа лейкоцитов в периферической крови и может достигать 10—15 г. Курсы лечения могут быть повторены через $1^1/_2$—2 мес.

Побочное действие. Возможны парестезии (в области лица, чаще носогубного треугольника). У отдельных больных наблюдаются лейкопения и тромбоцитопения, сердцебиение и боль в области сердца.

Противопоказания. Терминальная стадия болезни, декомпенсированные заболевания печени, почек и сердечно-сосудистой системы, лейкопения и тромбоцитопения (лейкоциты менее $3 \cdot 10^9$/л, тромбоциты ниже $75 \cdot 10^9$/л).

Форма выпуска. Лиофилизированная форма, в ампулах, содержащих 0,1 г (100 мг), в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список А. В защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

СПИРТ МЫЛЬНЫЙ (Spiritus saponatus). Состав: кали едкого плавленого 23 части, воды 75 частей, масла подсолнечного или хлопкового рафинированного 100 частей, спирта этилового 95 частей.

Применение. Наружно при заболеваниях кожи.

Форма выпуска. Во флаконах по 50 мл.

Условия хранения. В прохладном месте.

Срок годности $2^1/_2$ года.

СПИРТ МЫЛЬНЫЙ СЛОЖНЫЙ (Spiritus saponatus compositus). Состав: мыла жидкого (специального калийного) 639,53 г, спирта этилового 90% 212,32 г, спирта лавандового 84,20, воды дистиллированной 63,95 г.

Применение. Наружно при заболеваниях кожи.

Форма выпуска. Ангро, весовой.

Условия хранения. В прохладном месте.

Срок годности 3 года.

СПЛЕНИН (Spleninum). Препарат из селезенки крупного рогатого скота.

Фармакологическое действие. Нормализует азотистый обмен и повышает обезвреживающую функцию печени.

Показания к применению. Токсикоз в первые месяцы беременности (лечение и профилактика), гипопаратиреоз.

Способ применения и дозы. При токсикозе в первые месяцы беременности внутримышечно или подкожно по 2 мл ежедневно в течение 10 дней, в тяжелых случаях по 2 мл 2 раза в день с последующим уменьшением дозы до 1 мл 2 раза в день. Курс лечения 10—15 дней. При гипопаратиреозе по 1—3 мл 1—2 раза в день.

Форма выпуска. В ампулах по 1 мл, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. В защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

СТАЛЬНИКА НАСТОЙКА (Tinctura Ononidis). Спиртовое извлечение (1:5) на 70° спирте.

Отредактировал: ledi24

Применение. При геморрое как кровоостанавливающее и нормализующее стул средство по 1 чайной ложке 2—3 раза в день.

Форма выпуска. Во флаконах по 100 мл.

Условия хранения. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

СТАТИЗОЛЬ (Statisolum). Комбинированный препарат, в состав которого входят: сополимер — бутил-метакрилат с метакриловой кислотой (10,8 г), облепиховое масло (3,6 г), фурацилин (0,014 г), ацетон (57,586 г), хладон-12 (108 г) Используется в аэрозольных баллонах.

Фармакологическое действие. Оказывает местное гемостатическое действие благодаря образованию эластичной полимерной пленки, закрывающей кровоточащий участок. При нанесении препарата на дефект слизистой оболочки при язве желудка и двенадцатиперстной кишки образующаяся пленка защищает пораженное место от пептического воздействия. Статизоль обладает также анестезирующими свойствами. Содержащееся в пленке облепиховое масло стимулирует процесс заживления.

Показания к применению. Применяют для местного гемостаза при желудочно-кишечных кровотечениях в комплексе с другими гемостатическими и симптоматическими средствами, для профилактики отторжения коагуляционных струпов и рецидива кровотечения в сочетании с электро- и фотокоагуляцией. Используют в условиях стационара у больных язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, а также после эндоскопической электроэксцизии полипов.

Способ применения и дозы. Препарат наносят через катетер, введенный в биопсийный канал эндоскопа, дистальный конец которого под контролем зрения направляют к источнику кровотечения. Проксимальный конец катетера соединяют с распылительной головкой аэрозольного баллона. Нажатием на головку баллона препарат вводят в катетер, по которому он легко достигает дефекта слизистой оболочки желудка или двенадцатиперстной кишки. Сформировавшаяся эластичная пленка имеет хорошую адгезию к слизистой оболочке, не смывается и не отторгается в течение 2—3 дней.

Препарат наносят с расстояния 3—4 см от патологического очага с последующим визуальным контролем сохранения пленки и эффективности гемостаза в течение 2—3 мин. Пленку наносят однократно. Количество препарата зависит от интенсивности кровотечения и площади язвенного дефекта. Перед нанесением препарата патологический очаг и окружающую слизистую оболочку следует обработать 3—4 мл 96% этилового спирта или смесью спирта с эфиром (1:1). При этом удаляется слизь, поверхность подсушивается, улучшаются условия фиксации пленки. При необходимости на 2—3-и сутки проводят повторные аппликации.

Отсутствие дозирующего устройства в баллоне создает определенную опасность недопустимого повышения давления в просвете желудка и кишечника, поэтому продолжительность нажатия на головку баллона не должна однократно превышать 1 с.

Побочное действие. Возможны быстроисчезающая отрыжка с запахом ацетона и ощущение повышенного давления в желудочно-кишечном тракте.

Противопоказания. Индивидуальная непереносимость препарата.

Форма выпуска. Аэрозольные баллоны по 180 г

Условия хранения. При температуре не выше 35°С.

Срок годности 2 года.

Отредактировал: ledi24

СТЕКЛОВИДНОЕ ТЕЛО (Corpus vitreum). Препарат из стекловидного тела глаз крупного рогатого скота.

Фармакологическое действие. Обладает свойствами биогенных стимуляторов. Оказывает стимулирующее влияние на образование костной ткани.

Применение. Для размягчения и рассасывания рубцовой ткани (после ожогов, операции и др.), при контрактурах суставов, как обезболивающее средство при невралгиях, фантомной боли, радикулите под кожу ежедневно по 2 мл в течение 8—10 дней, при контрактурах и рубцах до 25 дней.

Противопоказания. Инфекционные заболевания, воспалительные процессы, общее истощение, нефрит, цирроз печени, сердечная недостаточность с отеками, злокачественные опухоли.

Форма выпуска. В ампулах по 2 мл, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. В сухом прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

СТЕРКУЛИИ НАСТОЙКА (Tinctura Sterculiae). Настойка (1:5) на 70° спирте Sterculia plantanifolia.

Применение. Как стимулирующее и тонизирующее средство при астении, переутомлении по 10—40 капель 2—3 раза в день в течение 3—4 нед.

Побочное действие. Возможны сухость во рту, сердцебиение, раздраженность, ухудшение сна.

Форма выпуска. Во флаконах по 25 мл.

Условия хранения. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

СТЕФАГЛАБРИНА СУЛЬФАТ (Stephaglabrini sulfas). Алкалоид, выделенный из клубней с корнями стефании гладкой (Stephania glabra).

Фармакологическое действие. Обладает антихолинэстеразной активностью; ингибирует истинную и ложную холинэстеразу.

Показания к применению. Заболевания периферической нервной системы: миопатия (у взрослых), боковой амиотрофический склероз, парез лицевого нерва, сирингомиелия и др.

Способ применения и дозы. Внутримышечно по 1—2 мл 0,25% раствора 2 раза в день. Курс лечения 20—30 дней.

Противопоказания. Эпилепсия, гиперкинезы, бронхиальная астма, стенокардия, брадикардия.

Форма выпуска. Ампулы 0,25% раствор по 1 мл, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

СТРЕПТАЗА (Streptaza). Стрептокиназа, полученная из фильтрата культуры β-гемолизирующих стрептококков.

Фармакологическое действие. Проникает в тромб, лизирует фибрин и приводит к распаду тромба.

Показания к применению. Тромбоз глубоких вен, острые эмболии периферических артерий, острая эмболия легких, свежий инфаркт миокарда, непроходимость центральной артерии сетчатки глаза.

Способ применения и дозы. Внутривенно капельно, начиная с 100 000—250 000 МЕ в 50 мл изотонического раствора натрия хлорида в течение 30 мин (30 капель в 1 мин), затем 750 000 МЕ в 500 мл раствора (100 000 МЕ в 1 ч) и переходят на поддерживающие дозы

Отредактировал: ledi24

100 000 МЕ на 3—4 ч. Лечение продолжают 16—18 ч под контролем содержания в крови фибриногена и тромбинового времени.

Побочное действие. Возможны головная боль, люмбаго, повышение температуры до субфебрильных цифр, кровотечения (гематомы, гематурия), аллергические реакции.

Противопоказания. Кровотечения, в анамнезе недавно перенесенный инфаркт, выраженная гипертония, острый панкреатит, эндокардит.

Форма выпуска. Комплекты, содержащие ампулу со шприцем для одноразового использования: 250 000 МЕ.

Условия хранения. В сухом прохладном месте.

Срок годности 2 года.

СТРЕПТОДЕКАЗА ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ (Streptodecasum pro injectionibus). Относится к группе «иммобилизованных» ферментов и является активатором фибринолитической системы человека, модифицированной водорастворимой полимерной матрицей полисахаридной природы.

Фармакологическое действие. Обладает тромболитической активностью, превращает плазминоген крови в плазмин и инактивирует его ингибиторы, оказывает пролонгированное фибринолитическое действие.

Показания к применению. Острый периферический артериальный тромбоз или тромбоэмболия, за исключением случаев, когда показано экстренное хирургическое вмешательство; периферический флеботромбоз; острая тромбоэмболия в системе легочной артерии или в случаях рецидивирующего тромбоза ее мелких ветвей; тромбоз центральной вены и артерии сетчатки глаза; острый инфаркт миокарда в 1—2-е сутки заболевания или рецидивирующее его течение; при ретромбозе после тромбэктомии.

Способ применения и дозы. Внутривенно. Лечение стрептодеказой проводят только в стационаре по утвержденной схеме (см. инструкцию по ее применению).

Побочное действие. Возможны аллергические реакции (озноб, повышение температуры, головная боль, гиперемия, крапивница, боль в пояснице и т. д.), а при сочетании с гепарином — геморрагические осложнения (кровотечения, образование гематом, гематурия и т. д.)

Противопоказания. Геморрагический диатез, кровотечения, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, в течение 4 сут. после операции и родов, острая стрептококковая инфекция, сепсис, эндокардит, острые воспалительные заболевания органов брюшной полости (панкреатит, холецистит, аппендицит и др.), беременность до 18 нед, высокая артериальная гипертензия; активный туберкулезный процесс, злокачественные новообразования, аллергии на фибринолитические препараты в прошлом; сахарный диабет, бронхоэктатическая болезнь с выраженным деструктивным процессом; цирроз печени, почечнокаменная болезнь в стадии обострения, выраженный атеросклероз.

Форма выпуска. Лиофилизированный порошок по 1 500 000 ФЕ (фибринолитических единиц) во флаконах емкостью 10 мл в упаковке по 2 флакона.

Условия хранения. Список Б. При температуре не выше 10°С.

Срок годности 2 года.

СТРЕПТОМИЦИНА СУЛЬФАТ (Streptomycini sulfas). Синонимы: Diplostrep, Endoctrep, Strycin. Соль органического основания, продуцируемого Streptomyces globisporus streptomycini.

Фармакологическое действие. Обладает широким спектром антибактериального действия. Активен в отношении большинства грам-

Отредактировал: ledi24

отрицательных кислотоустойчивых и некоторых грамположительных бактерий, включая пенициллиноустойчивые штаммы.

Препарат высоко активен в отношении микобактерий туберкулеза.

При парентеральном введении быстро всасывается через капилляры кровеносной системы и обнаруживается в большинстве жидкостей организма. Не кумулирует. Выделяется из организма преимущественно с мочой.

При длительном применении бактерии приобретают устойчивость к препарату.

Показания к применению. Туберкулез различной локализации, менингит, перитонит, плеврит, заболевания мочевыводящих путей, эндокардит, гонорея, коклюш, туляремия, бруцеллез, чума и другие заболевания, вызванные чувствительными к стрептомицину микробами.

Способ применения и дозы. Внутримышечно препарат вводят по 0,5—1 г (500 000—1 000 000 ЕД)/сут в 2—5 мл дистиллированной воды, изотонического раствора хлорида натрия или 0,25—0,5% раствора новокаина. Дозы для детей уменьшают соответственно возрасту. При туберкулезе суточную дозу можно вводить однократно. Интратрахеально (интрабронхиально) по 0,25—0,5 г (250 000—500 00 ЕД) в 5—10 мл 0,5% раствора новокаина 2—3 раза и более в неделю. В виде аэрозолей применяют в тех же дозах в 3—5 мл (при тепловлажной ингаляции в 25—100 мл) изотонического раствора хлорида натрия или дистиллированной воды. В полости препарат вводят по 0,25—0,5 г (250 000—500 000 ЕД). Внутрь назначают из расчета 0,03 г (30 000 ЕД)/кг.

Побочное действие. Токсические и аллергические реакции: повышение температуры тела, дерматиты, кожные высыпания, зуд, головокружение, головная боль, сердцебиение, альбуминурия, гематурия. При длительном введении больших доз антибиотика — поражение VIII пары черепных нервов и связанные с этим нарушения вестибулярного и слухового аппарата.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к стрептомицину, органические поражения VIII пары черепных нервов, а также применение совместно с флоримицином (вибромицином), неомицином, канамицином, гентамицином, мономицином. С осторожностью применять при поражениях печени, почек, тяжелых формах гипертонической болезни и после недавно перенесенного инфаркта миокарда.

Форма выпуска. Во флаконах по 0,25 г активного вещества (250 000 ЕД), по 0,5 г активного вещества (500 000 ЕД), 1 г (1 000 000 ЕД).

Условия хранения. Список Б. В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°С.

Срок годности 3 года.

СТРЕПТОМИЦИНА ХЛОРКАЛЬЦИЕВЫЙ КОМПЛЕКС (Streptomycini et Calcii chloridum). Двойная соль кальция хлорида и стрептомицина гидрохлорида.

Фармакологическое действие, побочное действие и противопоказания те же, что и при применении стрептомицина сульфата.

Показания к применению. Менингит туберкулезной этиологии, а также менингит, вызванный другими чувствительными к стрептомицину микроорганизмами.

Способ применения и дозы. Внутримышечно в тех же дозах, что и стрептомицин.

Эндолюмбально назначают 1 раз в сутки детям до 3 лет 10—15 мг (10 000—15 000 ЕД), от 3 до 7 лет 15—25 мг (15 000—25 000 ЕД),

Отредактировал: ledi24

от 7 до 14 лет 30—50 мг (30 000—50 000 ЕД), подросткам и взрослым 50—100 мг (50 000—100 000 ЕД) Растворы готовят ex temporе на стерильной воде для инъекций или изотоническом растворе хлорида натрия в объеме 1—2 мл.

Форма выпуска. Во флаконах по 0,2 г (200 000 ЕД).

Условия хранения. Список Б. При комнатной температуре.

Срок годности 1 год.

СТРЕПТОСАЛЮЗИД (Streptosaluzidum). Моносульфат стрептомициновой соли изоникотиноил-(2-карбокси-3,4-диметоксибензаль)-гидразона.

Фармакологическое действие. Обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, микобактерий туберкулеза.

Показания к применению. Туберкулез (различные формы и локализации). Наиболее показан больным, страдающим одновременно заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Способ применения и дозы. Внутримышечно по 0,5—2 г/сут; интратрахеально и ингаляции по 0,5 г (в 2—5 мл изотонического раствора натрия хлорида).

Побочное действие и противопоказания те же, что для стрептомицина и изониазида.

Форма выпуска. Во флаконах по 0,5 г.

Условия хранения. Список Б. В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 20°С.

Срок годности 3 года.

СТРЕПТОЦИД (Streptocidum). Пара-Аминобензолсульфамид. Синонимы: Ambesid, Deseptyl, Sulfanilamid.

Фармакологическое действие. Сульфаниламидный препарат.

Показания к применению. Рожистое воспаление, ангина, цистит, пиелит, колит, раневая инфекция.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,5—1 г 5—6 раз в день. Детям дозы уменьшают соответственно возрасту. Высшие дозы для взрослых внутрь: разовая 2 г, суточная 7 г.

Местно вводят в рану 5—15 г стерильного порошка; наружно в виде 5% линимента или 10% мази.

Побочное действие. Головная боль, головокружение, тошнота, рвота, цианоз, аллергические реакции, лейкопения, агранулоцитоз, парестезии, тахикардия.

Противопоказания. Заболевания кровотворной системы, почек, тиреотоксикоз, повышенная чувствительность к сульфаниламидам.

Форма выпуска. Порошок, таблетки в упаковке по 10 штук по 0,3 г и по 0,5 г 5% линимент ангро и по 30 г в банке; мазь 10% ангро и в упаковке по 25 г.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности. Порошок и таблетки 10 лет, мазь 4 года, линимент $1^1/_2$ года.

СТРЕПТОЦИД РАСТВОРИМЫЙ (Streptocidum solubile). Парасульфамидо-бензоламинометансульфат натрия.

Фармакологическое действие. Сульфаниламидный препарат.

Показания к применению. Такие же, как для стрептоцида. Препарат особенно показан при рвоте или бессознательном состоянии больного.

Способ применения и дозы. Под кожу, внутримышечно до 100 мл

Отредактировал: ledi24

1—1,5% раствора 2—3 раза в сутки; внутривенно до 20—30 мл 2—5—10% раствора.

Побочное действие и противопоказания те же, что и для стрептоцида.

Форма выпуска. Порошок, 5% линимент в упаковке по 30 г.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности. Порошок 10 лет, линимент $2^1/_2$ года.

СТРИХНИНА НИТРАТ (Strychnini nitras). Алкалоид семян чилибухи (Strychnos nux-vomica).

Фармакологическое действие. Стимулятор центральной нервной системы.

Показания к применению. Гипотония, быстрая утомляемость, парезы и параличи, функциональные расстройства зрительного аппарата, атония желудочно-кишечного тракта и др.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,5—1 мг 2—3 раза в день, подкожно по 1 мл 0,1% раствора.

Побочное действие. При передозировке напряжение мышц (в тяжелых случаях судороги), затруднение дыхания.

Противопоказания. Гипертоническая болезнь, стенокардия, выраженный атеросклероз, бронхиальная астма, острый и хронический нефрит, гепатиты, тиреотоксикоз, склонность к судорогам.

Форма выпуска. Порошок, 0,1% раствор в ампулах по 1 мл, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список А.

Срок годности 10 лет.

СТРОФАНТИН К (Strophantinum K). Смесь сердечных гликозидов, выделяемых из семян строфанта Комбе (Strophantus Kombe), содержит в основном К-строфантин и К-строфантозид.

Фармакологическое действие. Оказывает систолическое действие, мало влияет на частоту сердечных сокращений и проводимость по предсердно-желудочковому пучку.

Показания к применению. Острая сердечно-сосудистая недостаточность, пароксизмальная тахикардия.

Способ применения и дозы. Внутривенно 0,5—1 мл 0,025% или 0,05% раствора в 10—20 мл 40% раствора глюкозы. Высшая разовая доза 1 мл 0,05% раствора, суточная 2 мл 0,05% раствора.

Побочное действие. При передозировке экстрасистолия, бигеминия, диссоциация ритма, тошнота, рвота.

Противопоказания. Органические изменения сердца и сосудов, острый миокардит, эндокардит, выраженный кардиосклероз.

Форма выпуска. Ампулы по 1 мл 0,025% раствора и 0,05% раствора, в упаковках 10 штук.

Условия хранения. Список А.

Срок годности 2 года, после чего препарат подлежит ежегодному переконтролю.

СУКСИЛЕП (Suxilep). 3-Этил-3-метилпирролидин-2,5-дион. Синонимы: Asamid, Pyknolepsin, Zarontin.

Фармакологическое действие. Противосудорожное средство.

Показания к применению. Малые формы эпилепсии, миоклонические припадки.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,25 г 4—6 раз в день.

Побочное действие. Диспептические явления; в отдельных случаях головная боль, головокружение, кожные высыпания, лейкопения и агранулоцитоз.

Отредактировал: ledi24

Форма выпуска. Капсулы по 0,25 г, в упаковке 100 штук.
Условия хранения. Список Б.
Срок годности 5 лет.
Поставляется из Германии.

СУЛЬГИН (Sulginum). Пара-аминобензол-сульфогуанидин. Синонимы: Guamid, Sulfaguanidum.

Фармакологическое действие. Сульфаниламидный препарат.

Показания к применению. Бактериальная дизентерия, колит и энтероколит с поносом, носительство шигелл и палочек брюшного тифа, подготовка к операции на кишечнике.

Способ применения и дозы. Внутрь по 1—2 г 6—5—4—3 раза в сутки; для профилактики послеоперационных осложнений со стороны кишечника по 0,05 г/кг каждые 8 ч в течение 5 дней до операции и 7 дней после операции.

Высшие дозы для взрослых внутрь: разовая 2 г, суточная 7 г

Побочное действие. Возможно тошнота, рвота, кристаллурия.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к сульфаниламидам, нарушение функции почек.

Форма выпуска. Порошок таблетки по 0,5 г в упаковке 10 штук.
Условия хранения. Список Б.
Срок годности 5 лет.

СУЛЬФАДИМЕЗИН (Sulfadimezinum). 2-(пара-Аминобензолсульфамидо)-4,6-диметилпиримидин. Синоним: Sulfadimerazine.

Фармакологическое действие. Сульфаниламидный препарат.

Показания к применению. Пневмония, менингококковый менингит, гонорея, сепсис, дизентерия, токсоплазмоз (в сочетании с хлоридином).

Способ применения и дозы. Внутрь по 1 г 4—6 раз в сутки. При пневмонии и менингите на первый прием назначают 2 г; детям из расчета 0,1 г/кг на первый прием, затем по 0,25 г/кг каждые 4, 6, 8 ч. Высшие дозы для взрослых внутрь: разовая 2 г, суточная 7 г.

Побочное действие. Возможны тошнота, рвота, аллергические реакции, лейкопения, агранулоцитоз, кристаллурия.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к сульфаниламидам, заболевания кроветворной системы, нарушение функции почек.

Форма выпуска. Порошок, таблетки по 0,5 г, в упаковке 10 штук.
Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.
Срок годности 10 лет.

СУЛЬФАДИМЕТОКСИН (Sulfadimethoxinum). 6-(пара-Аминобензолсульфамидо)-2,4-диметоксипиримидин. Синонимы: Depo-Sulfamid, Madribon.

Фармакологическое действие. Сульфаниламидный препарат длительного действия.

Показания к применению. Пневмония, острые респираторные заболевания, бронхит, ангина, гайморит, отит, воспалительные поражения центральной нервной системы, дизентерия, воспалительные заболевания мочевыводящих и желчевыводящих путей, рожистое воспаление, пиодермия, раневая инфекция, трахома, лекарственно-устойчивые формы малярии (в сочетании с противомалярийными препаратами).

Способ применения и дозы. Внутрь однократно. В 1-й день 2 г, затем по 1 г/сут. Детям дозу уменьшают соответственно возрасту.

Побочное действие. Возможны головная боль, диспептические явления, кожные высыпания, лекарственная лихорадка, лейкопения.

Отредактировал: ledi24

Противопоказания. Повышенная чувствительность к сульфаниламидным препаратам. Необходима осторожность при заболеваниях кроветворной системы и декомпенсация сердечной деятельности.

Форма выпуска. Таблетки по 0,5 г, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 5 лет.

СУЛЬФАЗИН (Sulfazinum). 2-(пара-Аминобензолсульфамидо)-пиримидин. Синонимы: Adiazin, Sulfadiazin, Sulfapyrimidin.

Фармакологическое действие. Эффективен при инфекциях, вызванных гемолитическим стрептококком, пневмококком, гонококком, стафилококком, а также эшерихиями.

Показания к применению. Пневмония, менингококковый менингит, стафилококковый и стрептококковый сепсис и другие инфекционные заболевания.

Препарат применяют совместно с другими сульфаниламидными препаратами, в сочетании с противомалярийными средствами (хинин, хлоридин и др.), при этом взаимно усиливается противомалярийный эффект.

Способ применения и дозы. Внутрь. Взрослым на первый прием дают 2 г (при тяжелых инфекциях до 4 г), затем в течение 1—2 дней по 1 г каждые 4 ч, а в дальнейшем по 1 г каждые 6—8 ч. Лечение проводят до нормализации температуры и в последующие 3 сут.

Детям дают из расчета 0,1 г/кг на первый прием, затем по 0,025 г/кг каждые 4—6 ч. При дизентерии назначают так же, как сульфадимезин.

Побочное действие. Редко вызывает тошноту и рвоту, а также осложнения со стороны кроветворной системы; иногда наблюдаются гематурия, олигурия, анурия. Во время приема препарата рекомендуется обильное щелочное питье.

Форма выпуска. Таблетки по 0,5 г, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

СУЛЬФАЛЕН (Sulfalenum). 2-(пара-Аминобензолсульфамидо)-3-метоксипиразин. Синонимы: келфизин, Sulfametopyrazine.

Фармакологическое действие. Сульфаниламидный препарат, обладающий противомикробной активностью в отношении многих бактерий. Отличается пролонгированным действием.

Показания к применению. Инфекционные заболевания, вызванные чувствительными к сульфаниламидным препаратам микроорганизмами (бронхит, пневмония, холецистит, холангит, пиелит, цистит, гнойная инфекция различной локализации, остеомиелит, отит, синуит и др.). При дизентерии неэффективен, так как быстро всасывается из тонкого кишечника.

Способ применения и дозы. При острых и быстропротекающих инфекциях назначают внутрь в 1-й день 1 г, затем по 0,2 г в день за 30 мин до еды. При хронических инфекциях и для длительной профилактики (ревматоидные заболевания, хронический бронхит и др.) применяют 1 раз в неделю по 2 г в течение 1—$1^1/_2$ мес.

Побочное действие. Тошнота, аллергические реакции, головная боль, лейкопения.

Противопоказания. Наличие в анамнезе токсико-аллергических реакций на сульфаниламидные препараты, азотемия, беременность.

Форма выпуска. Таблетки по 0,2 г, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 4 года.

Отредактировал: ledi24

СУЛЬФАЛЕН-МЕГЛЮМИН (Sulfalenum-megluminum). N-Метилглюкаминовая соль 2-(парааминобензолсульфамидо)-3 метоксипиразина; растворимая соль сульфалена. Препарат сверхдлительного действия.

Фармакологическое действие. Обладает высокой антимикробной активностью подобно сульфалену.

Показания к применению. Взрослым при разных формах гнойных инфекций в хирургической, нейрохирургической, гинекологической, урологической практике; при тяжелых септических состояниях, пневмониях, гнойных менингитах и в других случаях, когда требуется быстро создать необходимую концентрацию сульфалена в крови и тканях, а также для профилактики осложнений бактериальной инфекции в послеоперационном периоде. Особенно показан в тех случаях, когда неэффективны другие химиотерапевтические препараты несульфаниламидного ряда или их применение невозможно из-за непереносимости.

Способ применения и дозы. Внутривенно (струйно или капельно) или внутримышечно. При легких и среднетяжелых формах заболеваний назначают в 1-й день 5 мл раствора, в последующие дни по 2 мл 1 раз в сутки. Курс лечения 7—10 дней.

При тяжелых формах в 1-й день вводят 10 мл, в последующие дни по 2 мл 1 раз в сутки. Курс лечения до 10 дней.

При лечении гнойных менингитов применяют по 1 мл 1 раз в сутки в течение всего курса лечения. При необходимости продолжать лечение принимают в последующем сульфален внутрь в виде таблеток.

Побочное действие. Возможны диспептические явления, аллергические сыпи, лейкопения. Во избежание кумуляции и появления токсических реакций не следует превышать дозы и сроки применения препарата.

Противопоказания. Наличие в анамнезе токсико-аллергических реакций на сульфаниламиды (агранулоцитоз, гемолитическая анемия, дерматиты, лекарственная лихорадка, гепатит), гиперазотемия и беременность.

Форма выпуска. В ампулах по 5 мл 18,5% раствор (что соответствует 0,5 г сульфалена в ампуле), в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

СУЛЬФАМОНОМЕТОКСИН (Sulfamonomethoxinum). 4-(пара-Аминобензолсульфамидо)-6-метоксипиримидин. Синонимы: Daimeton, Duphadin.

Фармакологическое действие. Сульфаниламидный препарат длительного действия.

Показания к применению. Инфекции дыхательных путей, гнойные инфекции уха, горла, носа, дизентерия, энтероколиты, инфекции желчевыводящих и мочевыводящих путей, гнойничковые заболевания кожи, раневая инфекция, генерализованная менингококковая инфекция, гнойные менингиты, гонорея; для профилактики гнойной бактериальной инфекции в послеоперационном периоде.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,5—1 г 2 раза в 1-й день лечения, затем по 0,5—1 г 1 раз в сутки; детям по 25 мг/кг в 1-й день лечения и по 12,5 мг/кг в последующие дни. Курс лечения 7—14 дней.

При менингите в 1-й день 2 г 2 раза в сутки, затем по 2 г 1 раз в день При гонорее первые 2 дня по 1,5 г 3 раза в день и по 1 г в последующие дни. Курс лечения 5 дней.

Отредактировал: ledi24

Побочное действие. В отдельных случаях тошнота, головная боль, лейкопения, аллергические реакции.

Противопоказания. Токсико-аллергические реакции на сульфаниламиды.

Форма выпуска. Таблетки по 0,5 г, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

СУЛЬФАПИРИДАЗИН (Sulfapyridazinum). 6-(пара-Аминобензолсульфамидо)-3 метоксипиридазин. Синонимы: спофадазин, кинекс, Altezol, Deposulfal, Kynex, Lederkyn, Spofadazin.

Фармакологическое действие. Сульфаниламидный препарат длительного действия.

Показания к применению. Острые респираторные заболевания, пневмония, бронхит, менингококковый менингит, воспалительные заболевания центральной нервной системы, дизентерия, воспалительные заболевания мочевыводящих путей, разные формы гнойной инфекции, гонорея, трахома, лекарственноустойчивые формы малярии (в сочетании с хлоридином).

Способ применения и дозы. Внутрь, однократно, в 1-й день 1 г, затем по 0,5 г. При тяжело протекающих инфекциях в 1-й день 2 г (в 1—2 приема), затем по 1—0,5 г однократно. Детям дозы уменьшают в соответствии с возрастом. Курс лечения 5—7 дней.

Побочное действие. Возможны головная боль, тошнота, рвота, кожные высыпания, лекарственная лихорадка, кристаллурия, лейкопения.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к сульфаниламидным препаратам.

Форма выпуска. Порошок, таблетки по 0,5 г, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 5 лет.

СУЛЬФАПИРИДАЗИН-НАТРИЙ (Sulfapyridazinum-natrium) 6-(пара-Аминобензолсульфамидо)-3-метоксипиридазин-натрий. По антимикробному действию соответствует сульфапиридазину.

Показания к применению. Трахома, конъюнктивит, кератит, хронические гнойные заболевания бронхов, легких и плевры; гнойные раны и пролежни.

Способ применения и дозы. Местно (глазные капли, ингаляции, введение в полость, орошение ран и т. д.) в виде 3—5—10% растворов на дистиллированной воде, изотоническом растворе хлорида натрия или поливиниловом спирте. Для лечения трахомы используют 10—20% растворы на поливиниловом спирте. Для ингаляции при хронических процессах в легких и бронхах по 5 мл 10% раствора 2 раза в день в течение 7—10 дней.

Побочное действие и противопоказания те же, что и для сульфапиридазина.

Форма выпуска. Порошок, пленки глазные по 0,0052 г, в упаковке 30 штук.

Условия хранения. Список Б. В сухом, защищенном от света месте.

Срок годности. Порошок 5 лет, пленки 2 года.

СУЛЬФАСАЛАЗИН (Sulfasalazin). 4-[Пиридил-(2)-амидосульфанил-3′-карбокси-4′-оксиазобензол. Синонимы: Salazopyrin, Salazosulfapyridine.

Фармакологическое действие. В организме распадается на 5-аминосалициловую кислоту и сульфапиридин, которые обладают противо-

Отредактировал: ledi24

воспалительными и антибактериальными свойствами. Оказывает избирательное действие на слизистую и подслизистую оболочку кишечника.

Показания к применению. Неспецифический язвенный колит.

Способ применения и дозы. Внутрь по 1 г 4—6 раз в сутки в течение 2—3 нед с последующим постепенным уменьшением дозы на 1—0,5 г каждые 5—7 дней (под контролем ректороманоскопии). При необходимости курс лечения продолжают в течение 4—6 мес.

Побочное действие. Диспептические явления, аллергические реакции, изменения в крови (лейкопения, агранулоцитоз, гемолитическая анемия).

Противопоказания. Индивидуальная непереносимость, нарушение функции печени и почек.

Форма выпуска. Таблетки по 0,5 г, в упаковке 50 штук.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Словении фирмой «КРКА».

«СУЛЬФАТОН» («Sulfatonum»). Комбинированный препарат, содержащий два действующих вещества: сульфаниламидный препарат — сульфамонометоксин и производное диаминопиримидина — триметоприм в соотношении 2,5:1. По своему действию близок к бактриму.

Фармакологическое действие. Антимикробный препарат широкого спектра действия, активный в отношении гноеродных кокков и грамотрицательных бактерий, возбудителей гнойных процессов и кишечных инфекций. Активен в отношении хламидий (возбудители трахомы, орнитоза, пситтакоза), некоторых простейших (плазмодии малярия, токсоплазмы, лейшмании) и возбудителей глубоких микозов.

Активен в отношении штаммов бактерий с приобретенной устойчивостью к сульфаниламидным препаратам.

Показания к применению. Острые бактериальные инфекции в случаях, когда неэффективны антибиотики широкого спектра действия или их применение невозможно из-за непереносимости. Инфекции дыхательных путей, гнойная хирургическая инфекция, инфекции мочевыводящих и желчевыводящих путей, дизентерия, рожистое воспаление, гонорея, гнойно-резорбтивная лихорадка, сепсис, менингит и др.

Способ применения и дозы. Внутрь (независимо от приема пищи) В 1-й день назначают ударную дозу, в последующие дни — в 2 раза меньшую (поддерживающую) дозу. Величина лечебной дозы определяется локализацией и тяжестью инфекционного процесса. Минимальная разовая доза 1 таблетка (0,35 г), суточная 2 таблетки; максимальная разовая доза 4 таблетки, суточная 8 таблеток. Суточную дозу назначают в 2 приема — утром и вечером с интервалом 12 ч. Курс лечения 7—14 дней. При лечении острой гонореи назначают в течение только одного дня по 5 таблеток 3 раза. Применение сульфатона в этой дозе более одного дня противопоказано.

Побочное действие. Возможны диспептические явления (тошнота, рвота), аллергические сыпи, головная боль, анемия, лейкопения, в редких случаях агранулоцитоз.

Противопоказания. Наличия в анамнезе токсико-аллергических реакций на сульфаниламиды, триметоприм, бисептол (бактрим, септрин); беременность, заболевания кроветворной системы. У больных с тяжелыми нарушениями функции печени и почек используют минимальные дозы под контролем функционального состояния органа.

Форма выпуска. Таблетки по 0,35 г, в упаковке 20 штук.

Условия хранения. Список Б. В сухом, защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

СУЛЬФАЦИЛ-НАТРИЙ (Sulfacylum-natrium). пара-Амино-

Отредактировал: ledi24

бензол-сульфацетамид-натрий. Синонимы: Albucid-natricum, Pront amide.

Фармакологическое действие. Сульфаниламидный препарат.

Показания к применению. Гнойные язвы роговицы, конъюнктивиты, блефариты, гонорейные заболевания глаз, инфицированные раны, инфекции, вызванные эшерихиями.

Способ применения и дозы. Наружно в виде глазных капель (10—20—30% водные растворы), мазей (10—20—30%) и присыпок; внутрь взрослым 0,5—1 г 3—5 раз в день, детям по 0,1—0,5 г 3—5 раз в день. Высшие дозы для взрослых внутрь: разовая 2 г, суточная 7 г.

Побочное действие. Возможно раздражение тканей; при приеме внутрь аллергические реакции, диспептические нарушения.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к сульфаниламидным препаратам.

Форма выпуска. Порошок, 20% раствор в тюбик-капельнице по 1,5 мл в упаковке по 2 штуки и 30% раствор, 30% раствор во флаконах по 5 мл; 30% раствор по 5 мл в ампулах в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В сухом, защищенном от света месте.

Срок годности. Порошок 5 лет, ампулы и тюбик-капельница 2 года, раствор во флаконах $1^1/_2$ года.

«СУЛЬФОДЕКОРТЭМ» («Sulfodecortemum»). Мазь, содержащая 10 г серы осажденной и 0,4 г гидрокортизона ацетата, приготовленная на эмульсионной основе состава: вазелин медицинский 45 г, ланолин 10 г, стеариновая кислота 3 г, пентол 5 г, нипагин 0,08 г, нипазол 0,02 г и воды до 100 г.

Фармакологическое действие. Оказывает кератолическое (отшелушивающее), антипаразитарное, противовоспалительное, антиаллергическое действие.

Показания к применению. Взрослым для лечения себореи, розацеа и розовых угрей; в регрессивной и стационарной стадиях псориаза волосистой части головы, для лечения чесотки, осложненной дерматитом.

Способ применения и дозы. Мазь наносят тонким слоем, слегка втирая в пораженный участок кожи, 2 раза в день в течение 5—14 дней. Курс лечения можно повторить через 5—7 дней. При псориазе волосистой части головы препарат применяют после снятия чешуек путем мытья головы с мылом, при розовых угрях — после обтирания кожи антисептическими растворами.

Побочное действие. Возможны эритема и зуд. В этих случаях препарат отменяют.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к сере и гидрокортизону; беременность.

Форма выпуска. Мазь в упаковке по 25 г.

Условия хранения. Список Б. В сухом прохладном месте.

Срок годности 2 года.

СУЛЬФОКАМФОКАИН (Sulfocamphocainum). Комплексное соединение сульфокамфорной кислоты и новокаина.

Фармакологическое действие обусловлено содержанием в препарате камфоры и новокаина. Быстро всасывается при подкожном введении (практически не дает осложнений), возможно внутривенное введение.

Показания к применению. В тех же случаях, что и медицинская камфора, особенно при острых состояниях (кардиогенный и анафилактический шок, острая легочная недостаточность).

Способ применения и дозы. Подкожно и внутримышечно, в острых случаях внутривенно (струйно или капельно) по 2 мл 10% раствора 2—3 раза в день.

Отредактировал: ledi24

Высшая суточная доза 12 мл 10% раствора.

Побочное действие. Возможна индивидуальная непереносимость.

Форма выпуска. Ампулы по 2 мл 10% раствора, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. В обычных условиях.

Срок годности 3 года.

«СУНОРЕФ» МАЗЬ («Sunoreph»). Состав: стрептоцида 5 г, норсульфазола 5 г, сульфадимезина 5 г, эфедрина гидрохлорида 1 г, камфоры 3 г, эвкалиптового масла 5 капель, мазевой основы до 100 г

Показания к применению. Острые и хронические ринниты.

Способ применения. Местно (смазывают слизистые оболочки носа)

Побочное действие. Возможны аллергические реакции.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к сульфаниламидным препаратам.

Форма выпуска. Мазь по 15 г.

Условия хранения. В прохладном месте.

Срок годности 2 года.

СУПРАСТИН (Suprastin). N-Диметиламиноэтил-N-(пара-хлорбензил)-аминопиридина гидрохлорид. Синонимы: Allergan S, Chloropyramine, Sinopen.

Фармакологическое действие. Антигистаминный препарат.

Показания к применению. Аллергические заболевания (дерматозы, ринит, конъюнктивит, отек Квинке, крапивница, начальные стадии бронхиальной астмы и др.).

Способ применения и дозы. Внутрь во время еды по 0,025 г 2—3 раза в день; в тяжелых случаях заболевания — внутримышечно и внутривенно 1—2 мл 2% раствора.

Побочное действие. Сонливость, общая слабость.

Противопоказания те же, что и при применении димедрола.

Форма выпуска. Таблетки по 0,025 г, в упаковке 20 штук, ампулы по 1 мл 2% раствора, в упаковке 5 штук.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности 5 лет.

СУРГАМ (Surgam). Состав: 1 таблетка содержит 300 мг тиопрофеновой кислоты.

Фармакологическое действие. Противовоспалительное и обезболивающее.

Показания к применению. Ревматические заболевания (артрозы, ревматоидный артрит, периартрит), переломы и повреждения мягких тканей, хирургические вмешательства, поверхностный флебит и флебосклероз.

Способ применения и дозы. По 1 таблетке 2 раза в день (утром и вечером) во время еды. Следует с осторожностью назначать сургам беременным женщинам, а также больным, имеющим в анамнезе язву желудка или двенадцатиперстной кишки.

Побочное действие. Могут возникнуть нарушение пищеварения, понос и изжога.

Противопоказания. Язва желудка или двенадцатиперстной кишки.

Форма выпуска. В коробках по 30 таблеток.

Срок годности 5 лет.

Производится фирмой «Roussel Uclaf», Франция.

СУСТАК (Sustac). Лекарственная форма нитроглицерина пролонгированного действия.

Показания к применению. Только для предупреждения приступов стенокардии.

Отредактировал: ledi24

Способ применения и дозы. Внутрь по 2,6 мг (сустак-мите) 2 раза в день; при необходимости 6,4 мг (сустак-форте) на прием.

Побочное действие. Головная боль, головокружение, чувство жара.

Противопоказания. Острый инфаркт миокарда, коронарный тромбоз, кровоизлияние в мозг, глаукома.

Форма выпуска. В упаковках по 25 штук таблетки сустак-мите по 2,6 мг и сустак-форте по 6,4 мг.

Условия хранения. Список Б.

Поставляется из Югославии.

Из этой же страны поступают таблетки «Нитро-мак ретард» (Nitro-Mac retard) по 2,5 мг, в упаковке 50 штук, аналогичный препарату сустак-мите. Из Польши поступает сустанит-мите по 2,6 мг и сустанит-форте по 6,4 мг, в упаковке 25 таблеток.

Срок годности 5 лет.

СУШЕНИЦЫ ТОПЯНОЙ ТРАВА (Herba Gnaphalii uliginosi). Содержит витамин К, смолы, эфирное масло (следы), каротин, дубильные вещества, фитостерины.

Применение. В качестве противовоспалительного и гипотензивного средства при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гипертонической болезни (начальные стадии) в виде настоя (10,0:200,0) по 1 столовой ложке 2—3 раза в день.

Форма выпуска. В упаковке по 100 г.

Условия хранения. В сухом прохладном месте.

Срок годности 3 года.

ТАВЕГИЛ (Tavegil). 1-Метил-2-(2-(α-метил-пара-хлорбензгидрилокси)-этил)-пирролидин. Синоним: фенистил.

Фармакологическое действие. Антигистаминный препарат пролонгированного действия. Не дает седативного эффекта.

Показания к применению. Аллергические заболевания (вазомоторный ринит, крапивница, аллергические дерматозы и др.).

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,001 г 2 раза в день, при необходимости суточную дозу увеличивают до 0,004 г. Детям в возрасте от 6 до 12 лет дают по 0,0005—0,001 г 2 раза в день.

Противопоказания. Повышенная индивидуальная чувствительность у водителей транспорта.

Форма выпуска. Таблетки по 0,001 г, в упаковке 20 штук, по 2,5 мг 20 таблеток ретард; ампулы по 2 мл 0,1% раствора (2 мг), в упаковке 5 штук.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Венгрии.

ТАКТИВИН (Tactivinum). Препарат полипептидной природы, получаемый из вилочковой железы (тимуса) крупного рогатого скота.

Фармакологическое действие. Иммуномодулирующее средство. При иммунодефицитных состояниях препарат нормализует количественные и функциональные показатели Т-системы иммунитета, стимулирует продукцию лимфокинов, в том числе α- и γ-интерферона, восстанавливает активность Т-киллеров, функциональную активность стволовых гемопоэтических клеток и нормализует ряд других показателей, характеризующих напряженность Т-клеточного иммунитета.

Показания к применению. Применяют у взрослых при иммунодефицитных состояниях с преимущественным поражением Т-системы иммунитета, возникающих при инфекционных, гнойных и септических процессах, лимфопролиферативных заболеваниях (лимфогранулематоз,

Отредактировал: ledi24

лимфолейкоз), рассеянном склерозе, туберкулезе, рецидивирующем офтальмогерпесе, псориазе и др.

Способ применения и дозы. Применяют подкожно. Обычно 1 мл препарата (что составляет 40 мкг/м^2 или 1—2 мкг/кг) вводят перед сном 1 раз в сутки ежедневно в течение 5—14 дней. При необходимости курс лечения повторяют.

При стойких нарушениях иммунитета тактивин назначают с заместительной целью в течение 5—6 дней с последующим введением препарата 1 раз в 7—10 дней.

При рассеянном склерозе препарат применяют ежедневно в течение 5 дней, затем 1 раз в 5—14 дней. Курс лечения от 1 до 3 лет В тяжелых случаях рассеянного склероза тактивин назначают в комплексной терапии с кортикостероидами.

Для лечения хирургических больных тактивин вводят перед операцией в течение 2 дней и после нее в течение 3 дней.

При злокачественных новообразованиях и аутоиммунных заболеваниях тактивин назначают 5—6-дневными курсами в перерывах специфической терапии.

Для лечения больных рецидивирующим офтальмогерпесом вводят 0,1 мл препарата (что составляет 10 мкг/м^2 или 0,1—0,2 мкг/кг) в сутки с интервалом в 1 день в течение 14 сут. Курс лечения повторяют через 4—6 мес.

Противопоказания. Атопическая форма бронхиальной астмы, беременность.

Форма выпуска. Во флаконах 0,01% раствор по 1 мл (100 мкг)

Условия хранения. В сухом, защищенном от света месте при температуре от +2 до +7° С.

Срок годности 3 года.

ТАНИН (Tanninum). Галлодубильная кислота.

Фармакологическое действие. Вяжущее, противовоспалительное средство.

Применение. При стоматитах, гингивитах, фарингитах, воспалительных заболеваниях полости рта, зева 1—2% водный раствор для полосканий 3—5 раз в день; наружно при ожогах, язвах, трещинах, пролежнях (3—10% растворы и мази); при отравлении алкалоидами, солями тяжелых металлов 0,5% водный раствор для промывания желудка

Форма выпуска. Порошок.

Условия хранения. В плотно укупоренной таре.

Срок годности 5 лет.

«ТАНСАЛ» («Tansalum»). Состав: танальбина 0,3 г, фенилсалицилата 0,3 г.

Фармакологическое действие. Вяжущее и дезинфицирующее средство.

Применение. При острых и подострых энтеритах и колитах по 1 таблетке 3—4 раза в день.

Форма выпуска. Таблетки, в упаковке 6 штук.

Условия хранения. В сухом прохладном месте.

Срок годности 5 лет.

ТАРИВИД (Tarivid). 9-Фтор-2, 3-дигидро-3-метил-10-(4-метил-1-пиперазинил)-7-оксо-7Н-пиридо[1,2,3-де]-1,4-бензоксазин-6-карбоновая кислота. Синоним: Ofloxacin.

Фармакологическое действие. Антибиотик широкого спектра действия из группы производных оксихинолинкарбоновой кислоты, обладающих бактерицидным свойством, основанном на способности препа-

Отредактировал: ledi24

рата угнетать активность хромосомной и плазмидной бактериальной ДНКазы и вызывать функциональное прекращение репликации ДНК у бактерий. Благодаря иному механизму действия на возбудителя, чем у других антибиотиков группы аминогликозидов, тетрациклинов и бета-лактамов, а также сульфонамидов и триметоприма, таривид угнетает возбудителей, устойчивых к этим препаратам.

Таривид достигает высоких концентраций в слюне, мокроте, желчи, коже, тканях, экссудате и секрете предстательной железы. Период полувыведения его составляет около 6 ч, свыше 95% препарата поступает в кровеносное русло из желудочно-кишечного тракта и 90% выводится в неизменном виде через почки. Нефротоксический эффект отсутствует.

Показания к применению. Инфекции дыхательных путей, уха, горла, носа, мягких тканей и кожи. Инфекции брюшной полости (включая малый таз), заболевания почек и мочевыводящих путей, гонорея.

Способ применения и дозы. Препарат принимают внутрь независимо от приема пищи обычно по 1 таблетке 2 раза в день (в отдельных случаях по 2 таблетки 2 раза в день), не разжевывая, запивая небольшим количеством воды. Курс лечения 7—10 дней. При инфекциях, вызванных β-гемолитическим стрептококком, курс лечения не менее 10 дней. Не рекомендуется принимать таривид более чем 4 нед.

При снижении почечной функции дозу таривида рассчитывают, исходя из тяжести заболевания почек. При клиренсе креатинина менее 30—10 мл/мин, что соответствует уровню креатинина в сыворотке крови 221—442 мкмоль/л (2,5—5 мг/дл), следует назначать обычную суточную дозу. При значении креатининового клиренса менее 10 мл/мин, что соответствует уровню креатинина в сыворотке 442 мкмоль/л (5 мг/дл) и более, лечение следует начинать с обычной дозы, а затем каждые 24 ч принимать дозу в 2 раза меньшую, чем начальная.

Побочное действие. Редко наблюдаются аллергические реакции в виде кожной сыпи, отека лица, голосовых связок, при непереносимости возможен шок. В отдельных случаях наблюдаются боль в животе, тошнота, рвота, понос, головная боль, головокружение, нарушение сна, повышение уровня билирубина в сыворотке крови.

Не рекомендуется применять таривид одновременно со средствами, снижающими кислотность желудочного сока (антациды), так как эффективность его при этом снижается.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к производным хинолинкарбоновой кислоты; эпилепсия; детям и подросткам с незавершенным ростом скелета, беременным и кормящим женщинам.

Форма выпуска. В таблетках, содержащих 200 мг офлоксацина, в упаковке 10 таблеток.

Условия хранения. В обычных условиях, в местах недоступных для детей.

Срок годности 3 года. По истечении срока годности, указанного на упаковке, применять препарат нельзя.

ТАУФОН (Taufonum). 2-Аминоэтансульфоновая кислота. Синоним: таурин.

Фармакологическое действие. Стимулирует репаративные и регенерационные процессы при заболеваниях дистрофического характера и заболеваниях, сопровождающихся резким нарушением метаболизма глазных тканей. Препарат способствует нормализации функций клеточных мембран, активизации энергетических и обменных процессов, сохранению электролитного состава цитоплазмы за счет накопления ионов калия и кальция, улучшению условий проведения нервного импульса.

Отредактировал: ledi24

Показания к применению. У взрослых в качестве стимулятора репаративных и регенераторных процессов при дистрофических поражениях сетчатой оболочки глаза, в том числе наследственных тапеторетинальных абиотрофий, при дистрофиях роговицы, старческих, диабетических, травматических и лучевых катарактах, а также как средство стимуляции восстановительных процессов при травмах роговицы.

Способ применения и дозы. При катарактах тауфон применяют в виде инстилляций по 2—3 капли 2—4 раза в день ежедневно в течение 3 мес. Курсы повторяют с месячным интервалом. При травмах применяют в тех же дозах в течение месяца. Для лечения тапеторетинальных абиотрофий и других дистрофических заболеваний сетчатки, а также при проникающих ранениях роговицы тауфон вводят под конъюнктиву по 0,3 мл 4% раствора 1 раз в день в течение 10 дней. Курс лечения через 6—8 мес повторяют.

Форма выпуска. Раствор 4% во флаконах по 5 мл и в ампулах по 1 мл, в упаковке 10 ампул.

Условия хранения. В защищенном от света месте. Флаконы с глазными каплями хранят в прохладном месте. Раствор для введения под конъюнктиву применяют в стационарных условиях.

Срок годности раствора в ампулах и флаконах 2 года.

ТАХИСТИН (Tachistin). Дигидротахистерол. Синоним: АТ-10.

Фармакологическое действие. Влияет на обмен кальция и способствует повышению его содержания в организме.

Показания к применению. Гипокальциемические судороги (паратиреогенные, энтерогенные, нефрогенные и др.), гипокальциемические судороги (идиопатические, инфекционные, в результате органических поражений мозга).

Способ применения и дозы. Внутрь по 20 капель масляного раствора (в 1 мл 1 мг) в течение 2—3 нед. после еды; при необходимости дозу увеличивают до 100 капель в день; на 7—10-й день переходят на поддерживающую терапию.

Противопоказания. Повышенное содержание кальция в крови.

Форма выпуска. Во флаконах по 15 мл.

Условия хранения. Список Б. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

Поставляется из Германии.

ТЕБРОФЕНОВАЯ МАЗЬ (Unguentum Tebrofeni). 3,5,3′,5′—Тетрабром —2,4,2′,4′-тетраоксидифенил.

Фармакологическое действие. Противовирусное средство.

Показания к применению. Вирусные заболевания глаз и кожи, а также плоские вульгарные бородавки.

Способ применения и дозы. При аденовирусном кератоконъюнктивите закладывают за края век 0,5% мазь 3—4 раза в день. При поражении кожи простым, пузырьковым герпесом, опоясывающим лишаем смазывают пораженные участки 2—3% мазью 3—4 раза в день в течение недели. При чешуйчатом и красном плоском лишае смазывают пораженные участки 2% мазью 2 раза в день в течение 3—4 нед. Для удаления плоских вульгарных бородавок и контагиозных моллюсков втирают вначале 3—5% салициловую мазь, а затем 3% теброфеновую мазь. Применяют в течение 2 нед и более.

Побочное действие. Жжение на участке нанесения мази.

Форма выпуска. 0,5% мазь по 10 г (для глазной практики); 2% мазь по 30 г; 5% мазь по 30 г

Отредактировал: ledi24

Условия хранения. В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 20°С.

Срок годности 2 года.

ТЕГРЕТОЛ (Tegretol). Синонимы: стацепин, финлепсин.

Фармакологическое действие. Противоэпилептическое средство, вызывающее противосудорожный и одновременно психотропный эффект. При невралгии тройничного нерва предупреждает появление пароксизмальных болей. При синдроме абстиненции повышает сниженный судорожный порог ЦНС и уменьшает риск припадка. При несахарном диабете приводит к рекомпенсации водного баланса.

Период полувыведения из плазмы составляет примерно 36 часов, после повторного приема —16—24 часа, в сочетании с другими препаратами —9—10 часов.

Показания к применению. Эпилепсии со сложной и простой симптоматикой, смешанные и генерализованные формы припадков с тонико-клоническим компонентом. Невралгия тройничного нерва при рассеянном склерозе. Эссенциальная глоссофарингеальная невралгия. Синдром абстиненции. Несахарный диабет, диабетическая невропатия.

Способ применения и дозы. При эпилепсии лечение следует начинать с малых доз препарата, индивидуально повышая их до достижения желаемого терапевтического эффекта. Средняя доза *для взрослых* в начале лечения — по 200 мг 1—2 раза в день, в дальнейшем она медленно повышается до оптимальной эффективной дозы — по 400 мг 2—3 раза в день. Средняя доза *для детей* 10—20 мг на кг массы тела, то есть в возрасте до 1 года — по 100—200 мг в день, от 1 до 5 лет — 200—400 мг, от 6 до 10 лет —400—600 мг, от 11 до 15 лет —600—1000 мг в день (в несколько приемов).

При невралгии тройничного нерва начальную дозу 200—400 мг в день постепенно повышают вплоть до прекращения болей (в среднем до 200 мг 3—4 раза в день), а затем постепенно уменьшают до минимальной эффективной дозы.

При синдроме абстиненции средняя доза — по 200 мг 3 раза в день. В тяжелых случаях ее можно повысить (например, по 400 мг 3 раза в день). В начале лечения при тяжелых явлениях абстиненции тегретол рекомендуется назначать в сочетании с седативно-гипнотическими препаратами.

При несахарном диабете средняя доза для взрослых — по 200 мг 2—3 раза в день, для детей соответственно ниже в зависимости от возраста и массы тела; при диабетической невропатии средняя доза — по 200 мг 2—4 раза в день.

Подбирая дозы тегретола, надо проявлять особую осторожность в отношении больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, нарушениями функции печени и почек (контроль должен осуществляться периодически), а также в отношении больных старческого возраста. Не рекомендуется принимать препарат в первые три месяца беременности и в период лактации.

При назначении или отмене тегретола необходимо изменять дозы пероральных антикоагулянтов в зависимости от клинических требований. В течение лечебного курса может снизиться надежность действия гормональных контрацептивов; ухудшается реактивная способность при вождении автотранспортных средств в условиях уличного движения; предпочтительно воздерживаться от употребления алкоголя.

Побочное действие. В начале лечения могут наблюдаться потеря аппетита, сухость во рту, тошнота, диарея, запор, головная боль, головокружение, сонливость, атаксия, нарушения аккомодации, диплопия,

Отредактировал: ledi24

у больных старческого возраста — спутанность сознания и возбуждение Эти побочные явления, как правило, исчезают через 8—14 дней.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к тегретолу, атриовентрикулярная блокада сердца.

Форма выпуска. Таблетки по 200 мг (круглые), в упаковке по 50 штук; таблетки по 400 мг (цилиндрической формы), в упаковке по 30 штук.

Срок годности 5 лет.

Поставляется фирмой «Сиба-Гейги», Швейцария.

ТЕЗАНА ЛИНИМЕНТ (Linimentum Thesani). Состав: тезана 0,2 г, масла касторового 10 г, эмульгатора 10 г, воды дистиллированной 79,8 г.

Фармакологическое действие. Стимулирует процессы регенерации тканей.

Показания к применению. Для предупреждения повреждений кожи при лучевой терапии. Эритема; сухой и влажный эпидермит после рентгено- и радиотерапии; длительно не заживающие трофические язвы, пролежни, термические и химические ожоги.

Способ применения и дозы. После каждого сеанса облучения линимент тезана наносят на облучаемую поверхность кожи; при кожных реакциях после лучевой терапии препарат наносят тонким слоем на поврежденную поверхность и накрывают марлевой салфеткой. Процедуры повторяют 2—3 раза в день, не снимая марлевой салфетки. Лечение продолжают в течение 7—10 дней.

Форма выпуска. Линимент 0,2% в упаковке по 25 г

Условия хранения. В сухом прохладном месте.

Срок годности 2 года.

ТЕЙМУРОВА ПАСТА (Pasta Teimurovi). Состав: кислоты борной 7 г, натрия тетрабората 7 г, кислоты салициловой 1,4 г, цинка окиси 30 г, талька 28 г, гексаметилентетрамина 3,5 г, формалина 3,5 г, свинца ацетата 0,3 г, глицерина 12 г, масла мятного 0,3 г, воды дистиллированной 7 г.

Применение. В качестве дезинфицирующего, подсушивающего и дезодорирующего средства при потливости, опрелости и некоторых грибковых заболеваниях кожи.

Форма выпуска. В упаковке по 50 г.

Условия хранения. В прохладном месте.

Срок годности $1^1/_2$ года.

ТЕМЕХИН (Temechinum). 2,2,6,6-Тетраметилхинуклидина гидробромид.

Фармакологическое действие. Активное ганглиоблокирующее средство; оказывает также гипотензивное действие.

Показания к применению. Гипертоническая болезнь и кризы, спазм периферических сосудов, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.

Способ применения и дозы. Внутрь (после еды) по 0,001 г 2—4 раза в день.

Побочное действие и противопоказания те же, что и для других ганглиоблокирующих средств.

Форма выпуска. Таблетки по 0,001 г, в упаковке 50 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 5 лет.

ТЕМПАЛГИН (Tempalgin). Состав: 2,2,6,6-тетраметилпиперидон-4-р-толуолсульфон (темпидон) — 20 мг; Натрий-1-фенил-1-2-3-диме-

Отредактировал: ledi24

тил-4-метиламинопиразолон-(5)-N-метиленсулфон (анальгин) — 500 мг в одной таблетке.

Фармакологическое действие. Обладает мягким транквилизирующим свойством. Болеутоляющее средство. Успокоение боли выражено сильнее, чем при использовании анальгина, и более продолжительно.

Показания к применению. Невриты, головная боль, зубная боль, люмбаго, ревматизм, желчная и почечная колики.

Способ применения и дозы. Внутрь — для взрослых по 1 таблетке 1—4 раза в день.

Противопоказания. Заболевания печени и декомпенсированный порок сердца.

Форма выпуска. Таблетки, покрытые оболочкой, в упаковке 10 штук.

Срок годности 2 года.

Поставляется из Болгарии.

ТЕОБРОМИН (Theobrominum). 3,7-Диметилксантин.

Фармакологическое действие. Оказывает гипотензивное действие, расширяет коронарные сосуды и бронхи, увеличивает диурез.

Показания к применению. Спазм сосудов мозга и сердца, отеки сердечной и почечной этиологии.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,25—0,5 г 1—2 раза в день

Форма выпуска. Порошок.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности 4 года.

«ТЕОДИБАВЕРИН» («Theodibaverinum»). Состав: теобромина 0,15 г, дибазола 0,02 г, папаверина гидрохлорида 0,02 г.

Применение. Как сосудорасширяющее и спазмолитическое средство при гипертонической болезни и стенокардии по 1 таблетке 2—3 раза в день.

Форма выпуска. Таблетки в упаковке по 10 штук.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности 4 года.

ТЕОПЭК (Teopek).

Показания к применению. Теопэк — пролонгированная форма теофиллина, назначается при бронхиальной астме, хроническом обструктивном бронхите и других заболеваниях органов дыхания с проявлением бронхоспазма.

Способ применения и дозы. Принимают внутрь после еды, запивая водой. Таблетку можно делить, но нельзя измельчать (разжевывать) и растворять в воде. В первые 1—2 дня препарат назначают по 0,15 г ($^1/_2$ таблетки по 0,3 г) 1—2 раза в день с интервалом 12—24 часа; в последующем разовую дозу увеличивают до 0,3 г 2 раза в сутки. Индивидуальные дозы и продолжительность лечения устанавливается врачом.

Побочное действие. Возможны головная боль, головокружение, тахикардия, состояние беспокойства, нарушение сна, боли в области живота. В этих случаях следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу. Развитие побочных явлений более вероятно при коронарной недостаточности, наклонности к тахикардии, эпилепсии, хроническом гастрите и колите.

Противопоказания. Индивидуальная непереносимость теофиллина, гиперфункция щитовидной железы, экстрасистолия, острый инфаркт миокарда, беременность.

Форма выпуска. Таблетки по 0,3 г

Условия хранения. В сухом, защищенном от света месте.

Препарат отечественного производства.

Отредактировал: ledi24

ТЕОТАРД 200, ТЕОТАРД 350, ТЕОТАРД 500 (Teotard).

Фармакологическое действие. Теотард представляет собой чистый безводный теофиллин (производное ксантина) в виде гранул; обладает сильным бронхоспазмолитическим действием, что позволяет купировать бронхиальную обструкцию, оказывая расширяющее воздействие на дыхательные пути.

Показания к применению. Хроническая бронхиальная астма, хронический бронхит, бронхоспазм и эмфизема легких у взрослых и детей. Употребляется для длительного лечения или профилактики приступов бронхиальной астмы.

Способ применения и дозы. Дозировка препарата индивидуальна, но при этом недопустимо превышать ежесуточную дозировку более чем 15 мг/кг (20 мг/кг — для детей). Лучше всего подбирать дозировку исходя из концентрации теофиллина в сыворотке крови. Если концентрация больше 20 мг/мл, дозировку надо уменьшить. Прием ретард-капсул теотарда обеспечивает поддержание равномерного уровня теофиллина в сыворотке крови в течение 12 часов. Первые три дня следует принимать по 1 ретард-капсуле каждые 12 часов. На третий день — произвести оценку эффективности терапии и переносимости препарата. Теотард 200 назначается детям, масса тела которых превышает 20 кг, а также взрослым с низкой массой тела; теотард 350— взрослым и детям с массой тела более 40 кг; теотард 500— больным, для лечения которых необходимы высокие дозировки препарата.

Капсулы нельзя открывать или жевать. Противопоказано назначать больному другие препараты ксантинового ряда. Одновременный прием теотарда усиливает действие фуросемида и резерпина, уменьшает действие карбоната лития и пропранолола. Активность теофиллина повышается в случае предварительной вакцинации против гриппа и в случае одновременного приема циметидина, алопуринола, эритромицина и линкомицина; снижена эта активность у курильщиков.

Побочное действие. Передозировка препарата может вызвать у больных боли в области желудка, нарушение частоты сердечных сокращений (усилить аритмию сердца), бессонницу, тремор и повышенную раздражимость.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к теофиллину, беременность, кормление ребенка грудью, эпилепсия, инфаркт. Осторожность и уменьшение дозировки необходимы при нарушениях функции печени и почек, при сердечной декомпенсации.

Форма выпуска. Капсулы по 200, 350 и 500 мг, в упаковке по 40 штук.

Срок годности 5 лет.

Производится фирмой «KPKA», Словения в сотрудничестве с фирмой «Klinge Pharma GmbH», Германия.

«ТЕОФЕДРИН» («Theophedrinum»). Состав: теофиллина 0,05 г, теобромина 0,05 г, кофеина 0,05 г, амидопирина 0,2 г, фенацетина 0,2 г эфедрина гидрохлорида 0,02 г, фенобарбитала 0,02 г, экстракта красавки 0,004 г, цитизина 0,0001 г.

Применение. Как лечебное и профилактическое средство при бронхиальной астме по $^1/_2$—1 таблетке 1 раз в день.

Форма выпуска. Таблетки в упаковке по 10 штук.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности 3 года.

ТЕОФИЛЛИН (Theophyllinum). 1,3-Диметилксантин. Синоним Theocin

Отредактировал: ledi24

Фармакологическое действие. Сосудорасширяющее, бронхолитическое и диуретическое средство.

Показания к применению. Хроническая коронарная недостаточность, спазм бронхов, застойные явления сердечного и почечного происхождения

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,1—0,2 г 2—4 раза в день. Эффективен в суппозиториях.

Побочное действие. Изжога, тошнота, рвота, понос; при передозировке эпилептиформные припадки.

Форма выпуска. Порошок.

Срок хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности. Порошок 5 лет, суппозитории 4 года.

«ТЕПАФИЛЛИН» («Thepaphyllinum»). Состав: платифиллина гидротартрата 0,003 г, папаверина гидрохлорида 0,03 г, фенобарбитала 0,03 г, теобромина 0,25 г

Фармакологическое действие. Холинолитическое спазмолитическое и сосудорасширяющее средство.

Применение. При спазмах желудочно-кишечного тракта, спазмах сосудов, бронхиальной астме по 1 таблетке 2—3 раза в день.

Форма выпуска. Таблетки в упаковке по 10 штук.

Условия хранения. Список А.

Срок годности 4 года.

ТЕРМОПСИСА ТРАВА (Herba Thermopsidis) (трава мышатника). Содержит алкалоиды (1—2,5%), из которых главный термопсин, гликозид, термопсилацин, дубильные вещества, аскорбиновую кислоту.

Применение. Как отхаркивающее средство при хронических бронхитах. Настой (0,6—1,0:180,0—200,0) 2—4 раза в день по 1 столовой ложке, сухой экстракт по 0,01—0,05 г, таблетки от кашля (по 1 таблетке на прием). Детям дозы уменьшают соответственно возрасту.

Форма выпуска. Резаная трава, термопсиса экстракт сухой (Extractum Thermopsidis siccum) в стеклянных банках, таблетки от кашля (Tabulettae contra tussim), содержащие 0,01 г порошка травы термопсиса и 0,25 г натрия гидрокарбоната, в упаковке по 10 штук.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности. Трава 2 года; сухой экстракт 3 года; таблетки от кашля 4 года.

ТЕРПИНГИДРАТ (Terpinum hydratum). Пара-Ментандиол-1,8

Применение. В качестве отхаркивающего средства при хроническом бронхите по 0,25—0,5 г 2—3 раза в день.

Побочное действие. Большие дозы могут вызвать рвоту.

Противопоказания. Гастриты, язвенная болезнь желудка.

Форма выпуска. Порошок; таблетки по 0,25 г, в упаковке 6 штук; таблетки, содержащие терпингидрат и натрия гидрокарбонат по 0,25 г, в упаковке 6 штук.

Условия хранения. В хорошо укупоренной таре.

Срок годности. Порошок 10 лет; таблетки по 0,25 г 15 лет, таблетки, содержащие натрия гидрокарбонат, 5 лет.

ТЕРРИЛИТИН (Terrilytinum).

Фармакологическое действие. Оказывает протеолитическое действие.

Показания к применению. Гнойные раны, ожоги, трофические язвы, пролежни, воспалительные заболевания верхних дыхательных путей.

Способ применения и дозы. При гнойных ранах, ожогах, пролеж

Отредактировал: ledi24

ниях наружно в виде раствора, содержащего в 1 мл 40—50 ПЕ (протеолитических единиц) террилитина. Содержимое флакона (200 ПЕ) растворяют в 4—5 мл воды для инъекций, изотонического раствора хлорида натрия или 0,25% раствора новокаина, смачивают салфетку и наносят на рану. При глубоких поражениях с большим количеством некротических тканей препарат применяют в виде присыпки; затем накладывают повязку, смоченную раствором натрия хлорида или 0,25% раствора новокаина, и сверху — влагонепроницаемую повязку. Аппликацию повторяют каждые 1—2 дня и удаляют некротизированные ткани. Для ингаляций содержимое флакона растворяют в 5—8 мл воды или изотонического раствора натрия хлорида и применяют в виде аэрозоля по 2 мл на ингаляцию (не более 5 мл) Ингаляции проводят 1—2 раза в сутки. Курс лечения 3—5 дней.

Побочное действие. Возможны аллергические реакции, связанные со всасыванием продуктов протеолиза, поэтому перед применением препарата вводят антигистаминные средства. При ингаляции возможна осиплость голоса, исчезающая самостоятельно. Может отмечаться быстропроходящая субфебрильная температура.

Противопоказания. Сердечная недостаточность, эмфизема легких с дыхательной недостаточностью, декомпенсированные формы туберкулеза легких, дистрофия и цирроз печени, вирусный гепатит, панкреатит, поражения почек, геморрагические диатезы. Не следует вводить препарат в очаги воспаления и в кровоточащие полости, а также наносить на изъязвленные поверхности злокачественных опухолей.

Форма выпуска. Герметически укупоренные флаконы с содержанием 200 ПЕ во флаконе.

Условия хранения. Список Б. В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 4°С.

Срок годности 2 года.

«ТЕСТОБРОМЛЕЦИТ» («Testobromlecitum»). Состав: метилтестостерона 0,005 г, бромизовала 0,1 г, лецитина 0,05 г.

Фармакологическое действие. Оказывает андрогенное и незначительное анаболическое действие (метилтестостерон), а также успокаивающее влияние на центральную нервную систему и улучшает обменные процессы (бромизовал и лецитин).

Показания к применению. Вегетативные нервные расстройства у мужчин, связанные с недостаточностью функции половых желез; климактерий, неврастения, переутомление, невротические формы стенокардии и т. д.

Способ применения и дозы. Сублингвально по 1—2 таблетки 3 раза в день; затем по 1 таблетке 2—3 раза в день. Курс лечения 1—2 мес; при необходимости через 3—4 мес лечение повторяют.

Форма выпуска. Таблетки, покрытые оболочкой, по 0,5 г, в упаковке 25 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 5 лет.

ТЕСТОСТЕРОНА ПРОПИОНАТ (Testosteroni propionas). Андростен-4-ол-17β-она-3-пропионат. Синонимы: Androfort, Testolutin.

Фармакологическое действие. Обладает значительной андрогенной и анаболической активностью.

Показания к применению. У мужчин — половое недоразвитие, функциональные нарушения в половой системе, климактерий и связанные с ним сосудистые и нервные расстройства, акромегалия, гипертрофия предстательной железы; у женщин — климактерические сосудистые и нервные расстройства (когда противопоказаны эстроген-

Отредактировал: ledi24

ные препараты); рак молочной железы и яичников (в возрасте до 60 лет); дисфункциональные маточные кровотечения (у женщин пожилого возраста).

Способ применения и дозы. Внутримышечно или подкожно по 1 мл 1% или 5% раствора в масле ежедневно, через 1—2 дня от 2 нед до нескольких месяцев. Высшая разовая доза 0,05 г, суточная 0,1 г.

Побочное действие. Большие дозы могут вызвать повышенное половое возбуждение, задержку воды и солей в организме, у женщин могут наблюдаться явления маскулинизации (вирилизма); огрубение голоса, появление избыточного роста волос на лице и теле, пастозность лица, атрофия молочных желез. Передозировка препарата при дисменореях может привести к прекращению менструации.

Противопоказания те же, что и при применении метилтестостерона.

Форма выпуска. Ампулы по 1 мл в упаковках по 10 штук 1% и 5% раствора в масле.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 5 лет.

ТЕСТЭНАТ (Testoenatum). Комбинированный препарат, содержащий 80% тестостерона энантата и 20% тестостерона пропионата

Фармакологическое действие. Андрогенный препарат, оказывающий быстрое и продолжительное действие.

Показания к применению. У мужчин в случаях, когда показано применение андрогенных и анаболических стероидных препаратов; у женщин при климактерических расстройствах (в случае, когда противопоказаны эстрогенные препараты), при раке молочной железы и половых органов.

Способ применения и дозы. Внутримышечно 1—2 мл 1 раз в 7—15 дней (в зависимости от показаний).

Форма выпуска. Ампулы по 1 мл 10% раствора в масле, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 5 лет.

ТЕТАЦИН-КАЛЬЦИЙ (Tetacinum-calcium). Кальций-динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты. Синонимы: Chelaton, Mosatil.

Фармакологическое действие. Комплексообразующее соединение.

Показания к применению. Отравления тяжелыми металлами и редкоземельными элементами (свинец, кадмий, кобальт, ртуть, уран, иттрий, цезий и др.) и их солями.

Способ применения и дозы. Внутривенно (капельно) в изотоническом растворе натрия хлорида или в 5% растворе глюкозы по 20 мл 10% раствора 1—2 раза в день в течение 3—4 дней с последующим перерывом 3—4 дня. Курс лечения 1 мес.

Побочное действие. Нарушение функции желудочно-кишечного тракта и почек; уменьшение содержания в организме гемоглобина, железа и витамина B_{12}.

Противопоказания. Нефриты и нефрозы, заболевания печени с нарушением функции.

Форма выпуска. Раствор 10% в ампулах по 20 мл и по 10 мл, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. В защищенном от света месте.

Срок годности 10 лет.

ТЕТРАВИТ (Tetravitum). Состав: тиамина бромида 0,0039 г, рибо

Отредактировал: ledi24

флавина 0.003 г, кислоты аскорбиновой 0,15 г, кислоты никотиновой 0,02 г.

Применение. По 1 таблетке 2—3 раза в день с профилактической целью для работников горячих цехов.

Форма выпуска. Таблетки, покрытые оболочкой, в упаковке по 400 таблеток.

Условия хранения. В хорошо укупоренной таре оранжевого стекла в прохладном сухом, защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

«ТЕТРАФОЛЕВИТ» (Tabulettae «Tetrafolevitum» obductae). Комбинированный поливитаминный препарат следующего состава: тиамина хлорида (витамин B_1), 0,002 г (или тиамина бромида 0,00258 г), рибофлавина (витамин B_2) 0,002 г, кислоты фолиевой 0,0001 г и никотинамида 0,015 г.

Фармакологическое действие. Входящие в состав витамины, превращаясь в организме в коферменты и ферменты, участвуют в различных процессах метаболизма, регулируют отдельные стадии углеводного, белкового и липидного обменов; предупреждают появление анемии.

Показания к применению. Для профилактики гиповитаминоза у здоровых людей при различных перегрузках, больным в процессе лучевой терапии и после нее, при лечении препаратами мышьяка и солей тяжелых металлов, сульфаниламидами и антибиотиками, в период ремиссии при анемии и нарушении лейкопоэза различной этиологии (при интоксикациях, лучевых поражениях, циррозе печени), а также в комплексной терапии при истинной и себорейной экземе, псориазе и вульгарных угрях.

Способ применения и дозы. Внутрь после еды по 1—2 таблетки 2—3 раза в день. Детям старше года по 1 таблетке 1—2 раза в день. Курс лечения (20—30 дней) можно повторить через 1—3 мес в зависимости от тяжести заболевания.

Форма выпуска. Таблетки, покрытые оболочкой, в упаковке 50 штук.

Условия хранения. В сухом, защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

ТЕТРАЦИКЛИНА ГИДРОХЛОРИД (Tetracyclini hydrochloridum). Синонимы: Ambramycin, Polfamycine.

Фармакологическое действие. Обладает широким спектром антимикробного действия. Высокоактивен в отношении грамположительных и грамотрицательных микробов, риккетсий, возбудителей орнитоза, трахомы и простейших. Хорошо всасывается. Быстро проникает во многие органы и биологические жидкости. Выделяется из организма почками, не обладает кумулятивным свойством.

Показания к применению. Заболевания, вызываемые чувствительными к препарату возбудителями (ангина, бронхит, гнойный плеврит, перитонит, остеомиелит, бактериальная и амебная дизентерия, коклюш, скарлатина, менингит); инфекции мочевыводящих путей.

Способ применения и дозы. Применяют внутрь и наружно. Внутрь в таблетках во время или сразу после еды. Доза для взрослых 0,2—0,25 г 3—4 раза в день. Назначать препарат в дозе менее 0,8 г/сут не следует, так как, помимо недостаточного терапевтического эффекта, возможно развитие устойчивых форм микроорганизмов. Курс лечения 5—7 дней. После исчезновения симптомов заболевания продолжают давать препарат в течение 1—3 дней.

Местно в дерматологии, оториноларингологии препарат применяют в виде мази. Мазь наносят на очаги поражения 1—2 раза в сутки или

Отредактировал: ledi24

используют в виде повязки, сменяемой через 12—24 ч. Продолжительность лечения от нескольких дней до 2—3 нед.

Побочное действие. Тошнота, рвота, понижение аппетита, расстройства функции кишечника, при длительном применении кандидоз (поражение кожи и слизистых оболочек полости рта и желудочно-кишечного тракта).

Противопоказания. Заболевания печени и почек, беременность, повышенная индивидуальная чувствительность к препаратам тетрациклина.

Форма выпуска. Таблетки, покрытые оболочкой, по 0,1 г, в упаковке 20 штук. Мазь, содержащая 10 000 ЕД в 1 г (1%), в упаковке по 3 г и по 10 г. Мазь, содержащая 30 000 ЕД в 1 г (3%), в упаковке по 15 г Таблетки тетрациклина гидрохлорида с нистатином по 100 000 ЕД, покрытые оболочкой, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В сухом, защищенном от света месте при комнатной температуре.

Срок годности. Таблетки 3 года, с нистатином 2 года, мазь 1% — 3 года, 3% — 1 год.

ТЕТУРАМ (Teturamum). Тетраэтилтиурамидисульфид. Синоним: антабус.

Фармакологическое действие. Специфически влияет на обмен алкоголя в организме, увеличивая концентрацию ацетальдегида в крови, что вызывает комплекс отрицательных вегетативных реакций в организме при употреблении алкоголя.

Показания к применению. Лечение алкоголизма.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,5 г ежедневно с постепенным уменьшением дозы до 0,15—0,1 г/сут.

Побочное действие. Головная боль, слабость, сонливость, аллергические реакции, тошнота, рвота; возможны тяжелые реакции (коллаптоидные состояния, выраженная коронарная недостаточность, эпилептиформные припадки, острые психозы, рефлекторная анурия, желтуха).

Противопоказания. Эндокринные, тяжелые соматические и психические заболевания, туберкулез, полиневриты, невриты слухового нерва и глазного нерва, глаукома, идиосинкразия к препарату.

Форма выпуска. Таблетки по 0,15 г, в упаковке 50 штук и по 0,25 г, в упаковке 50 штук. Порошок.

Условия хранения. Список Б. В сухом месте.

Срок годности. Порошок 5 лет, таблетки 4 года.

ТИАМИНА БРОМИД (Thiamini bromidum). 4-Метил-5β-окси этил-N-(2-метил-4-амино-5-метилпиримидил) тиазолий бромида гидробромид. Синонимы: витамин B_1, аневрин.

Фармакологическое действие. Положительно влияет на проведение нервного возбуждения в синапсах. Обладает умеренными ганглиоблокирующими свойствами. При пониженном содержании тиамина в пище у человека развивается гиповитаминоз B_1, а затем авитаминоз B_1 (бери-бери).

Показания к применению. Гиповитаминоз и авитаминоз B_1. Различные формы неврита. Радикулиты, невралгии. Периферические парезы и параличи различного происхождения. Болезнь Меньера. Психоз Корсакова. Полиомиелит и энцефаломиелит. Болезнь Вернике. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Атония кишечника. Дистрофия миокарда. Нарушения коронарного кровообращения у больных стенокардией. Тиреотоксикоз. Эндартериит. Неврогенные дерматозы. Опоясывающий лишай. Псориаз. Экземы. Отравле-

Отредактировал: ledi24

ния (сероуглеродом, тетраэтилсвинцом, ртутью, метиловым спиртом, мышьяком и др.).

Способ применения и дозы. Внутрь с профилактической целью взрослым по 0,00258—0,00645 г в день. Внутрь детям по 0,00129—0,00258 г в день.

С лечебной целью взрослым 0,00645—0,0129 г 1—3 раза в день. Внутримышечно взрослым по 0,5—1 мл 3% или 6% раствора 1 раз в день. Курс лечения 15—30 инъекций.

Побочное действие. В отдельных случаях (особенно при парентеральном введении) возможны аллергические реакции и анафилактический шок.

Противопоказания. Аллергические заболевания в анамнезе.

Форма выпуска. Порошок 1 г, таблетки по 0,0026 г, в упаковке 200 и 50 штук, таблетки с риской по 0,0129 г, в упаковке 50 штук, ампулы по 1 мл, в упаковке 10 штук 3% раствора и 6% раствора, сложные таблетки, покрытые оболочкой, следующего состава:

Тиамина бромида	0,00645 г	0,00258 г
Рибофлавина	0,005 г	0,002 г
Кислоты аскорбиновой	0,1 г	0,07 г
Никотинамида	—	0,015 г
Рутина	—	0,035 г
В упаковке	№ 30	№ 50

Условия хранения. В защищенном от света месте.

Срок годности. Порошок и ампулы 3 года, таблетки 4 года. Комплексные таблетки 3 года.

ТИАМИНА ХЛОРИД (Thiamini chloridum). 4-Метил-5-β-оксиэтил-N-(2-метил-4-амино-5-метилпиримидил)-тиазолий хлорида гидрохлорид.

Применяют в тех же случаях, что и тиамина бромид.

Форма выпуска. Ампулы по 1 мл, в упаковках 50 штук 2,5% и 5% раствора.

Условия хранения. В защищенном от света месте.

Срок годности. Ампулы 3 года.

ТИЗАМИД (Tisamid). Амид пиразинкарбоновой кислоты. Синонимы: Eprazin, Diazinamid, Pyrazinamid.

Фармакологическое действие. Активный туберкулостатический препарат.

Показания к применению. Туберкулез.

Способ применения и дозы. Назначают из расчета 20—30 мг/кг в 1—3 приема после еды. Возможны варианты назначения препарата взрослым: 1,5—2 г 1 раз в день, по 1 г 2 раза или по 0,5 г 3 раза в день. Обычно лечение проводится в сочетании с другими противотуберкулезными препаратами.

Побочное действие. Возможны аллергические реакции (дерматиты, эозинофилия, лихорадочные реакции и др.), диспептические явления, ухудшение аппетита, головная боль, при длительном применении — токсическое действие на печень. Под влиянием задержки в организме мочевой кислоты отмечается боль в суставах подагрического характера.

Противопоказания. Нарушение функции печени, подагра.

Форма выпуска. Таблетки по 500 мг, в упаковке 100 штук.

Условия хранения. При комнатной температуре.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Финляндии.

Отредактировал: ledi24

ТИЗЕРЦИН (Tisercin). 2-Метокси-10 (2-метил-3-диаминопропил)-фенотиазина гидрохлорид. Синонимы: Methotrimeprazine, Nozinan.

Фармакологическое действие. Активное нейролептическое средство с разносторонней фармакологической активностью; оказывает быстрое седативное действие.

Показания к применению. Психомоторное возбуждение, психозы, маниакальные и депрессивно-параноидные состояния при шизофрении; реактивные депрессии и невротические реакции с чувством страха, тревоги и двигательным беспокойством, бессонница.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,025—0,4 г/сут; внутримышечно 2—4 мл 2,5% раствора; при необходимости дозу увеличивают до 0,5—0,75 г.

Побочное действие. Экстрапирамидные нарушения, сосудистая гипотония, головокружение, сухость во рту, склонность к запорам аллергические реакции.

Противопоказания. Заболевания печени и кроветворной системы, относительные противопоказания — стойкая гипотония у лиц пожилого возраста и декомпенсация сердечно-сосудистой системы.

Форма выпуска. Драже по 0,025 г, в упаковке 50 штук, ампулы по 1 мл 2,5% раствора, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности. Ампулы 2 года, драже 5 лет

ТИМАЛИН (Thymalinum). Препарат полипептидной природы, получаемый путем экстракции из вилочковой железы (тимуса) крупного рогатого скота. Синоним: тимарин.

Фармакологическое действие. Восстанавливает иммунологическую реактивность (регулирует количество и соотношение Т- и В-лимфоцитов и их субпопуляций, стимулирует реакции клеточного иммунитета, усиливает фагоцитоз), стимулирует процессы регенерации и кроветворения в случае их угнетения, а также улучшает процессы клеточного метаболизма.

Показания к применению. Применяют у взрослых и детей в качестве иммуномодулятора и биостимулятора при состояниях и заболеваниях, сопровождающихся понижением иммунитета, в том числе при острых и хронических гнойно-воспалительных заболеваниях костей и мягких тканей, острых и хронических вирусных и бактериальных инфекциях, нарушении регенераторных процессов (переломы костей, ожоговая болезнь и отморожения, трофические язвы, лучевые некрозы тканей, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки), бронхиальной астме, рассеянном склерозе, облитерирующем атеросклерозе, ревматоидном артрите; состояниях, связанных с гипофункцией вилочковой железы, с угнетением иммунитета и кроветворения после проведения лучевой терапии или химиотерапии у онкологических больных и при других состояниях.

Используют также с целью профилактики инфекционных и других осложнений, в посттравматическом и послеоперационном периодах, в процессе проведения лучевой или химиотерапии, при назначении больших доз антибиотиков.

Способ применения и дозы. Содержимое флакона перед инъекцией растворяют в 1—2 мл изотонического раствора хлорида натрия. Препарат вводят внутримышечно ежедневно в следующих дозах: взрослым по 5—20 мг (30—100 мг на курс лечения), детям до 1 года 1 мг; 1—3 лет 1—2 мг; 4—6 лет 2—3 мг; 7—14 лет 3—5 мг в течение 3—10 дней в зависимости от выраженности нарушений иммунитета

Отредактировал: ledi24

При необходимости проводят повторный курс лечения (через 1—6 мес)

С профилактической целью препарат применяют внутримышечно ежедневно взрослым по 5 -10 мг, детям 1—5 мг в течение 3—5 дней.

Форма выпуска. Стерильный лиофилизированный порошок во флаконах по 10 мг.

Условия хранения. В сухом, защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

ТИМОЛ (Thymolum). 2-Изопропил 5-метилфенол.

Фармакологическое действие. Антигельминтное средство. Оказывает также антисептическое действие.

Показания к применению. Глистная инвазия (анкилостомидоз, трихоцефалез, некатороз); в качестве антисептического средства — при поносах и метеоризме; для дезинфекции полости рта, зева, носоглотки.

Способ применения и дозы. Внутрь при глистных инвазиях по 0,75—4 г/сут, при поносах и метеоризме по 0,1 г 2—3 раза в день. Детям дозы уменьшают в соответствии с возрастом. Высшие дозы для взрослых внутрь: разовая 1 г, суточная 4 г. Наружно в виде 0,05—0,1% растворов.

Противопоказания. Декомпенсация сердечной деятельности, болезни печени и почек, язвенная болезнь желудка и кишечника, беременность. Тимол не назначают детям в возрасте до 2 лет.

Форма выпуска. Порошок.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 10 лет.

ТИНИДАЗОЛ (Tinidazolum). Производное нитроимидазола. Синоним: Fasigin

Фармакологическое действие. Препарат подавляет развитие Trichomonas vaginalis, Entamoeba histolitica и лямблий. При приеме внутрь быстро всасывается и из-за высокой липофильности легко проникает в трихомонады. Препарат накапливается в крови и медленно выводится из организма почками за счет обратного всасывания в почечных канальцах.

Показания к применению. Острый и хронический трихомоноз у женщин и мужчин.

Способ применения и дозы. Препарат назначают внутрь однократно 2 г (4 таблетки по 0,5 г) во время или после еды.

Побочное действие. В отдельных случаях возможны умеренная лейкопения, головокружение, нарушение координации движений, в единичных случаях аллергические реакции.

Противопоказания. Нарушение кроветворения, заболевания центральной нервной системы в активной фазе, первые 3 мес беременности; препарат назначают с осторожностью в последующие месяцы беременности и в период лактации. Во время лечения запрещается употребление алкогольных напитков во избежание спазма органов брюшной полости, тошноты, рвоты, не рекомендуется назначать с этионамидом.

Форма выпуска. Таблетки, покрытые оболочкой, по 0,5 г, в упаковке 4 штуки.

Условия хранения. Список Б. В сухом, защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

Поставляется из Польши.

ТИОАЦЕТАЗОН (Thioacetazonum). Тиосемикарбазон пара-ацетаминобензальдегида. Синонимы: Tibon, Amithiozon.

Фармакологическое действие. Обладает противомикробной актив-

Отредактировал: ledi24

постью в отношении микобактерий туберкулеза и возбудителя лепры. Эффективен при устойчивости микобактерий туберкулеза к основным противотуберкулезным препаратам.

Показания к применению. Туберкулез слизистых и серозных оболочек, лимфадениты, специфические свищи, скрофулодерма, лепра.

Способ применения и дозы. Внутрь после еды по 0,05 г 2 раза в день. Детям 0,0005—0,001 г/(кг·сут) (не более 0,05 г/сут).

Побочное действие. Головная боль, тошнота, дерматиты, ухудшение аппетита. В редких случаях возможны анемия, агранулоцитоз, лейкопения, альбуминурия, гепатит.

Противопоказания. Нарушения функции печени и почек, заболевания кроветворной системы.

Форма выпуска. Таблетки в упаковках по 100 штук по 0,025 г и по 0,05 г.

Условия хранения. Список Б. В сухом, защищенном от света месте.

Срок годности 4 года.

ТИОДИН (Tiodinum). Смесь 0,1 г йодида натрия и 0,12 г тиамина гидробромида (витамин B_1), растворенных в 10 мл дистиллированной воды.

Фармакологическое действие. Свойства тиодина обусловлены входящими в него ингредиентами. Тиамин (витамин B_1) способствует нормальному течению углеводного обмена и тем самым препятствует накоплению в тканях молочной и пировиноградной кислот и развитию невритов и других поражений нервной системы. Йодид натрия способствует стабилизации витамина B_1 в организме.

Показания к применению. Острый и хронический пояснично-крестцовый радикулит в стадии обострения (в том числе дискогенный), плечевой плексит; воспалительные заболевания центральной нервной системы (арахноэнцефаломиелиты).

Способ применения и дозы. Вводят внутримышечно медленно по 5—10 мл в день в течение 6—20 дней. Тиодин используют как самостоятельно, так и в комплексе с физиотерапевтическими методами лечения.

Побочное действие. Возможны общая слабость, ощущение разбитости, явления йодизма (насморк, отек Квинке, крапивница, слюно- и слезотечение, угревая сыпь на коже). В этом случае следует уменьшить дозу или отменить препарат.

Противопоказания. Гипертоническая болезнь, аллергические состояния, повышенная чувствительность к препаратам йода, туберкулез легких, нефриты, нефрозы, фурункулез, хроническая пиодермия, геморрагические диатезы, крапивница, беременность.

Форма выпуска. Ампулы по 10 мл для инъекций, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б. При комнатной температуре в защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

ТИОПЕНТАЛ-НАТРИЙ (Thiopentalum-natrium). Смесь 5-этил-5-(2-амил)-2-тиобарбитурата натрия с безводным карбонатом натрия. Синонимы: Penthiobarbital, Tiopan.

Фармакологическое действие. Оказывает снотворное, а в больших дозах наркотическое действие.

Применение. Для вводного наркоза, реже для длительного наркоза при эндоскопических исследованиях, болезненных перевязках, небольших по объему хирургических процедурах.

Способ применения и дозы. Внутривенно в виде 2—2,5% раствора

Отредактировал: ledi24

(детям, ослабленным больным и лицам пожилого возраста 1% раствор). Иногда (детям) вводят per rectum 5% раствор или в суппозиториях. Высшая разовая доза 1 г.

Побочное действие. Ларингоспазм, повышенная саливация, при быстром введении препарата —коллапс.

Противопоказания. Органические заболевания печени и почек, бронхиальная астма, гипотония, гиповолемия, лихорадочные состояния, воспалительные заболевания носоглотки.

Форма выпуска. Во флаконах по 1 г, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В прохладном сухом, защищенном от света месте.

Срок годности 1 год.

ТИОФОСФАМИД (Thiophosphamidum). N′, N″, N‴-три (этилен)-триамид тиофосфорной кислоты. Синонимы: тиоТЭФ, Tespamin, Thiotepum.

Фармакологическое действие. Оказывает сильное цитостатическое действие на пролиферирующие ткани, включая и опухолевые; угнетает кроветворение.

Показания к применению. Опухоли яичника (после нерадикальных операций) с метастазами, рак молочной железы, мезотелиома брюшины с асцитом, хронический лимфолейкоз и миелолейкоз, лимфогранулематоз, лимфосаркоматоз.

Способ применения и дозы. Внутримышечно, внутривенно, внутриартериально, внутриплеврально, внутрибрюшинно, а также непосредственно в опухоль. Способ введения и дозы устанавливают индивидуально. Обычно назначают 0,01—0,015—0,02 г в виде 0,5% раствора через 2, 4, 5 дней, в некоторых случаях 1 раз в неделю. На курс лечения от 0,15 до 0,3 г препарата. Курс лечения может быть повторен через $1^1/_2$—2 мес. В брюшную и плевральную полости препарат вводят по 0,02 г 1—2 раза в неделю или реже после предварительной эвакуации экссудата. Во всех случаях применения препарата систематически исследуют кровь. При применении лучевой терапии таким больным тиофосфамид может быть назначен лишь через месяц при условии восстановления картины крови.

Побочное действие. Угнетение костномозгового кроветворения, сопровождающееся лейкопенией (иногда с агранулоцитозом) и тромбоцитопенией с явлениями геморрагического диатеза; у некоторых больных понос.

Противопоказания. Общее тяжелое состояние больных, кахексия, лейкопения, тромбоцитопения, тяжелые заболевания печени, почек и сердечно-сосудистой системы.

Форма выпуска. Лиофилизированный порошок во флаконах, в упаковке по 10 штук, содержащих 0,01 г.

Условия хранения. Список А. В сухом прохладном (не выше 10°С) месте.

Срок годности 2 года.

ТИРЕОИДИН (Thyreoidinum). Гормональный препарат, получаемый измельчением обезжиренных и высушенных щитовидных желез убойного скота. Синонимы: Thyrapon, Thyroid.

Фармакологическое действие. В малых дозах дает анаболический эффект, в больших приводит к усилению распада белка, тормозит тиреотропную активность гипофиза и понижает функцию щитовидной железы.

Показания к применению. Первичный гипотиреоз и микседема, кретинизм; церебрально-гипофизарные заболевания и ожирение, про-

Отредактировал: ledi24

текающее с гипотиреозом; эндемический и спорадический зоб; рак щитовидной железы.

Способ применения и дозы. Внутрь при микседеме и гипотиреозе по 0,05—0,2 г/сут. При раке щитовидной железы до 1 г в день, высшая разовая доза для взрослых 0,3 г, суточная 1 г. Детям дозы устанавливают в зависимости от возраста от 0,05 г до 0,45 г/сут. При микседеме и гипотиреозе назначают детям дозы, близкие к высшим, уточняя их в зависимости от клинического течения болезни и эффективности терапии.

Побочное действие. При передозировке возможны явления тиреотоксикоза, стенокардия, ухудшение течения сахарного диабета, аллергические реакции

Противопоказания. Тиреотоксикоз, сахарный диабет, болезнь Аддисона, общее истощение, тяжелые формы коронарной недостаточности.

Форма выпуска. Порошок, таблетки, покрытые оболочкой, в упаковке 50 штук по 0,05 г и по 0,1 г; гранулы 0,01 г, в упаковке 2 пакета по 15 г (№ 30) для детей.

Условия хранения. Список Б. В сухом прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности. Порошок и таблетки 3 года, гранулы 2 года.

ТИРЕОКОМБ (Thyreocomb). В одной таблетке содержит лиотиронина (трийодтиронина) 0,01 мг, левотироксина (тироксина) 0,07 мг, йодида калия 0,15 мг.

Фармакологическое действие. Комбинированный препарат гормонов щитовидной железы и йодида калия.

Показания к применению. Гипотиреоидизм, тиреоидит, эндокринный экзофтальм, профилактика рецидивирующего зоба.

Способ применения и дозы. Взрослым при гипотиреозе по 1 таблетке 1 раз в день, постепенно повышая дозу до 2 таблеток 3 раза в день; при тиреоидите и для профилактики рецидивирующего зоба после операции на щитовидной железе по 1 таблетке ежедневно.

Побочное действие. Беспокойство, бессонница, уменьшение массы тела, учащение пульса, повышение АД.

Форма выпуска. Таблетки в упаковке по 40 штук.

Условия хранения. В защищенном от света месте.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Германии.

ТИРЕОТОМ (Thyreotom). В одной таблетке содержит лиотиронина (трийодтиронина) 0,01 мг, левотироксина (тироксина) 0,04 мг

Фармакологическое действие. Препарат влияет на обмен веществ и метаболизм.

Показания к применению. Гипотиреоз, эутиреоидный зоб, профилактика и терапия рецидива после резекции зоба.

Способ применения и дозы. Дозы необходимо индивидуализировать в зависимости от возраста больного, характера и течения заболевания; взрослым назначают обычно 1—3 таблетки в день.

Форма выпуска. Таблетки по 0,05 мг, в упаковке 60 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Германии.

ТМИНА ПЛОДЫ (Fructus Carvi). Содержат эфирное масло (3—6%), в состав которого входит до 50% карвона, жирное масло, белковые вещества.

Применение. В качестве ветрогонного средства при ослаблении

Отредактировал: ledi24

деятельности желудочно-кишечного тракта, метеоризме в виде настоя (20 г плодов на стакан кипятка) по 1—2 столовые ложки 3—4 раза в день.

Форма выпуска. В упаковке по 50 г

Условия хранения. В сухом прохладном месте.

Срок годности 3 года.

ТОКОФЕРОЛА АЦЕТАТ (Tocopheroli acetas). 6-Ацетокси-2-метил-2-(4,8,12-триметилтридецил) хроман. Синонимы: витамин Е, Erevit.

Фармакологическое действие. Активное противоокислительное средство, защищающее различные вещества от окисления, в частности полиненасыщенные жирные кислоты, ретинол и др.

Показания к применению. Мышечные дистрофии. Амиотрофический боковой склероз. Нарушения менструального цикла. При угрозе прерывания беременности. Нарушения сперматогенеза и потенции. Некоторые дерматозы. Псориаз. Миокардиопатии. Спазмы периферических сосудов. Заболевания печени. В педиатрии при склеродерме, гипотрофии, гипервитаминозе D.

Способ применения и дозы. Внутрь при заболеваниях нервно-мышечной системы 15—100 мг в день. При нарушениях сперматогенеза и потенции 100—300 мг/сут. При привычном аборте 10—15 мг/сут в первые 2—3 мес беременности. При угрожающем аборте 100—150 мг/сут в течение 5—7 дней (вместе с прогестероном). При атеросклерозе и заболеваниях периферических сосудов 100 мг/сут в сочетании с ретинолом.

Побочное действие. Большие дозы вызывают креатинурию и снижение работоспособности.

Форма выпуска. Во флаконах по 20 мл 5%, 10% и 30% раствора в масле; в капсулах по 0,2 г 50% раствора, в упаковке 15 штук; в ампулах по 1 мл 5%, 10% и 30% раствора, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. В прохладном сухом, защищенном от света месте.

Срок годности. Ампулы 3 года, капсулы и капли 2 года.

ТОЛОКНЯНКИ ЛИСТ (МЕДВЕЖЬЕ УШКО) (Folium Uvae ursi). Содержит гликозид арбутин (6%), метиларбутин, гиперозид, дубильные вещества (30—35%) пирогалловой группы, гликозид гиперозид, урсоловую кислоту.

Применение. В качестве диуретического и дезинфицирующего средства при воспалительных заболеваниях мочевыводящих путей в виде отвара (10,0:180,0) по 1 столовой ложке 5—6 раз в день; детям (3,0:100,0) по 1 десертной ложке 4 раза в день.

Форма выпуска. В упаковке по 100 г.

Условия хранения. В сухом прохладном месте.

Срок годности 5 лет.

ТОРЕКАН (Torecan).

Фармакологическое действие. Противорвотное средство и средство против головокружения, успокаивающе влияет на рвотный центр.

Показания к применению. Тошнота и рвота (в период беременности, после операции, вследствие черепно-мозговой травмы, расстройства желудочно-кишечного тракта, нарушений деятельности печени и желчных протоков, медикаментозной непереносимости, после рентгенотерапии, при морской и воздушной болезни); головокружение (после сотрясения мозга, при атеросклерозе, вестибулярных нарушениях и болезни Меньера)

Способ применения и дозы. Взрослым и детям старше 15 лет 1 драже или 1 суппозиторий 1—3 раза в день; в более тяжелых случаях по 1 ам-

Отредактировал: ledi24

пуле подкожно, внутривенно или внутримышечно. Детям до 15 лет назначать препарат не рекомендуется. Осторожность нужна и в отношении больных с тяжелой недостаточностью печени и почек, и в отношении тех, кто находится на работе, требующей быстрой психофизической реакции.

Побочное действие. Иногда наблюдаются сухость во рту, сонливость; редко — гипотензия и тахикардия. Эти явления исчезают при понижении дозировки или отмене препарата.

Противопоказания. Депрессия, коматозные состояния, острая глаукома.

Форма выпуска. 50 ампул по 6,5 мг/мл, 50 драже по 6,5 мг, 6 суппозиториев по 6,5 мг.

Срок годности таблеток 5 лет, ампул 2 года.

Производится фирмой «КРКА», Словения в сотрудничестве с фирмой «Sandoz A. G.», Швейцария.

ТОРФОТ (Torfotum). Отгон торфа.

Фармакологическое действие. Биогенный стимулятор.

Показания к применению. Блефарит, конъюнктивит, кератит, помутнение стекловидного тела, миопический хориоретинит и др., а также артриты, радикулиты, миалгии.

Способ применения и дозы. Подкожно по 1 мл ежедневно в течение 30—45 дней; под конъюнктиву по 0,2 мл через день (всего 15—20 инъекций). Курс лечения повторяют через $1^1/_2$—2 мес 3—4 раза в год.

Противопоказания. Тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, гипертоническая болезнь, беременность после 7 мес, острые желудочно-кишечные расстройства, далеко зашедшие формы нефрозонефрита.

Форма выпуска. Ампулы по 1 мл, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. В защищенном от света месте.

Срок годности 4 года.

ТРАЗИКОР (Trasicor). 1-(Орто-Аллилоксифенокси)-3-изопропиламино-2-пропанола гидрохлорид.

Фармакологическое действие. Специфический блокатор симпатических β-адренорецепторов; обладает антиаритмическим свойством.

Показания к применению. Нарушения сердечного ритма (тахикардия различной этиологии, в том числе при тиреотоксикозе, предсердная и желудочковая экстрасистолия, расстройства сердечного ритма при передозировке препаратов наперстянки), стенокардия.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,02 г 2—3 раза в день; при необходимости дозу повышают до 0,08—0,12 г/сут.

Побочное действие. Возможны диспептические явления, слабость, головокружение, явления сердечной недостаточности.

Противопоказания. Бронхиальная астма, атриовентрикулярная блокада, выраженная сердечная недостаточность и брадикардия.

Форма выпуска. Таблетки, в упаковке 40 штук по 0,02 г, по 0,08 г

Условия хранения. Список Б.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Венгрии.

«ТРАЦЕПТИН» («Traceptinum»).

Фармакологическое действие. Вагинальное противозачаточное средство.

Показания к применению. Для предотвращения беременности.

Способ применения и дозы. Вводят во влагалище по 1 таблетке за 10 мин до полового сношения.

Побочное действие. Аллергическая реакция, выражающаяся в чувстве жжения во влагалище.

Отредактировал: ledi24

Противопоказания. Кольпиты различной этиологии и эрозия шейки матки.

Форма выпуска. Таблетки, в упаковке 50 штук.

Условия хранения. В сухом месте.

Срок годности 2 года.

ТРЕМБЛЕКС (Tremblex). Одна ампула содержит 0,25 мг дексбензетимида.

Показания к применению. Эффективен при лечении экстрапирамидных нарушений, вызванных нейролептическими действиями.

Способ применения и дозы. Вводят внутримышечно в дозе 0,125—0,25 мг. Можно вводить в одном шприце вместе с флушпириленом (ИМАП) каждые 2—4 дня.

Побочное действие. Требуется особая осторожность при введении препарата больным глаукомой, аденомой предстательной железы, при беременности, болезни Паркинсона.

Форма выпуска. Ампулы по 2 мл, в упаковке 3 ампулы.

Срок годности 3 года.

Поставляется из Венгрии.

ТРЕНТАЛ (Trental). 3,7-Диметил-1-(5-оксогексил)-ксантин. Синонимы: Pentoxifyllin, Agapurin, Pentilin.

Фармакологическое действие. Вазоактивное средство с ангиопротекторным действием. Увеличивает кровоток путем влияния на микроциркуляцию в области микрокапилляров (способствует улучшению пластичности эритроцитов, облегчая их проходимость через узкую капиллярную систему, угнетает агрегацию эритроцитов и тромбоцитов, уменьшает вязкость крови).

Показания к применению. Микроангиопатии различного генеза, периферические нарушения артериовенозного кровообращения на фоне атеросклеротических и диабетических процессов (диабетическая ангиопатия, облитерирующий эндартериит и др.), расстройства трофики (постинсультный синдром, язвы ног, гангрена отморожения), ангионевропатии (парестезии, акроцианоз, болезнь Рейно). Нарушения мозгового кровообращения, острая и хроническая недостаточность кровоснабжения сетчатой оболочки глаза, острые нарушения слуха вследствие расстройства кровообращения.

Способ применения и дозы. При пероральном введении вначале назначают по 2 драже 3 раза в день, затем по 1 драже 3 раза в день. При внутривенном введении назначают 5 мл (100 мг) препарата в 250—500 мл инфузионного раствора. Вводят капельно в течение $1^1/_2$—3 ч. Затем дозу можно увеличить до 15 мл (300 мг) препарата в день.

Побочное действие. При быстром парентеральном введении препарата в высоких дозах возможны тошнота, рвота, головокружение, боль в области сердца, коллапс и другие реакции, встречающиеся при назначении теофиллина. Частота побочных реакций снижается до минимума при перфузии препарата в дозах, рекомендуемых выше.

Противопоказания. Острый инфаркт миокарда, обильное кровотечение. Геморрагии; тяжелый коронарный и церебральный склероз с гипертонией. Не рекомендуется назначать беременным.

Форма выпуска. Драже по 100 мг, в упаковке 60 штук, по 400 мг, в упаковке 20 штук; ампулы по 5 мл (100 мг), в упаковке 5 штук.

Условия хранения. В темном месте.

Срок годности. Драже и ампул 5 лет

Поставляется из Югославии и Германии. Из Чехо-Словакии поступает агапурин.

Отредактировал: ledi24

ТРИАМПУР-КОМПОЗИТУМ (Triampur-compositum). Комбинированный препарат, имеющий следующий состав: триамтерена 0,025 г, гидрохлортиазида (дихлотиазида) 0,0125 г.

Фармакологическое действие. Триамтерен усиливает выделение с мочой натрия, не повышая выведение калия; способен уменьшать гипокалиемию, вызываемую производным бензотиадиазина. Дихлотиазид (активный салуретик) уменьшает реабсорбцию ионов натрия и хлора в проксимальной (а частично и в дистальной) части извитых канальцев почек; реабсорбция калия и бикарбонатов также угнетается, однако в меньшей степени.

Показания к применению. Отеки сердечного и почечного происхождения, а также отеки при поздних сроках беременности и асцит при циррозе печени.

Способ применения и дозы. Назначают внутрь ежедневно по 2—4 таблетки. При длительном лечении — по 1 таблетке ежедневно.

Побочное действие. Возможны тошнота, рвота, головная боль, понижение АД, однако при снижении дозы эти явления уменьшаются.

Противопоказания. Тяжелая почечная недостаточность, подагра, гиперкалиемия, выраженные поражения печени, первые месяцы беременности.

Форма выпуска. Таблетки, в упаковке 50 штук.

Условия хранения. Список Б. В сухом месте.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Германии.

ТРИБУСПОНИН (Tribusponinum). Содержит сумму стероидных сапонинов из травы якорцев стелющихся (Tribulus terresteris).

Фармакологическое действие. Оказывает умеренное гипохолестеринемическое действие.

Показания к применению. Комплексная терапия больных атеросклерозом (общего, церебрального, коронарных сосудов).

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,1—0,2 г 2—3 раза в день после еды. Лечение проводят циклами по 20—30 дней с 7—10-дневными перерывами. Курс лечения 3—4 мес. При необходимости такой же курс лечения повторяют после 3—4-месячного перерыва.

Побочное действие. Потеря аппетита, потливость, иногда кожный зуд.

Форма выпуска. Таблетки по 0,1 г, в упаковке 50 штук.

Условия хранения. Список Б. В сухом месте.

Срок годности 2 года.

ТРИЙОДТИРОНИНА ГИДРОХЛОРИД (Triiodthyronini hydrochloridum). Синтетический препарат, соответствующий естественному гормону щитовидной железы. Синонимы: Liothyroninum, Trionine.

Фармакологическое действие и показания к применению те же, что и для тиреоидина.

Способ применения и дозы. Внутрь по 5—20 мкг/сут, при необходимости дозу постепенно увеличивают до 60—100 мгк/сут. Иногда препарат эффективен при резистентности к тиреоидину. Аллергических явлений не вызывает.

Побочное действие. Необходима осторожность при коронарном кардиосклерозе и вторичном гипотиреозе при наличии недостаточности коры надпочечников (во избежание обострения дозы не должны превышать 10—20 мкг/сут).

Противопоказания те же, что и при применении тиреоидина.

Форма выпуска. Таблетки в упаковках по 50 штук по 20 мкг и по 50 мкг

Отредактировал: ledi24

Условия хранения. Список Б. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Германии.

ТРИЛИСТНИКА ВОДЯНОГО ЛИСТ (Folium Menyanthidis). Лист вахты трехлистной, лист трифолии (Folium Trifolii fibrini). Содержит горькие, флавоновые гликозиды (рутин, гиперозид) и дубильные вещества.

Применение. В качестве средства, возбуждающего аппетит, при понижении функции желудочно-кишечного тракта в виде настоя (2 чайные ложки на стакан кипятка) по $^1/_4$ стакана 2—3 раза в день за 30 мин до еды.

Форма выпуска. В упаковке по 100 г.

Условия хранения. В сухом прохладном месте.

Срок годности 2 года.

ТРИМЕКАИН (Trimecainum). 2,4,6-Триметил — N,N-диэтиламиноацетанилида гидрохлорид. Синоним: Mesocain.

Фармакологическое действие. Местноанестезирующее средство; действует сильнее и продолжительнее, чем новокаин.

Показания к применению. Проводниковая или инфильтрационная анестезия.

Способ применения и дозы. Для инфильтрационной анестезии вводят до 800 мл 0,25% раствора; до 400 мл 0,5% раствора или до 100 мл 1% раствора; для проводниковой анестезии — до 100 мл 1% или до 20 мл 2% раствора.

Побочное действие. Побледнение лица, головная боль, тошнота.

Противопоказания. Повышенная индивидуальная чувствительность к препарату.

Форма выпуска. Порошок; в ампулах по 2 мл 2% и 5% раствора в упаковке по 10 штук; 2% раствора с 0,004% раствором норадреналина по 2 мл в ампуле, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В хорошо укупоренных стеклянных банках.

Срок годности. Порошок 4 года, ампулы 1 год, с норадреналином 2 года.

ТРИМЕТИН (Trimethinum). 3,5,5-Триметилоксазолидиндион-2,4. Синонимы: Ptimal, Trimethadionum.

Фармакологическое действие. Оказывает противосудорожное действие.

Показания к применению. Эпилепсия, преимущественно petit mal, психические и сосудистые эквиваленты.

Способ применения и дозы. Внутрь во время или после еды по 0,25 г 2—3 раза в день, детям 0,05—0,2 г/сут.

Побочное действие. Светобоязнь, кожные высыпания, нейтропения, агранулоцитоз, анемия, эозинофилия, моноцитоз.

Противопоказания. Нарушения функции печени и почек, заболевания зрительного нерва и кроветворных органов.

Форма выпуска. Порошок.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности 5 лет.

ТРИНИТРОЛОНГ (Trinitrolong). Полимерные пленки овальной формы, содержащие 1 или 2 мг нитроглицерина.

Показания к применению. В качестве пролонгированного препарата

Отредактировал: ledi24

нитроглицерина как для купирования, так и для профилактики приступов стенокардии.

Нитроглицерин в составе биорастворимого полимера обеспечивает быстрый эффект и пролонгированное его действие (3—4 ч и более).

Способ применения и дозы. Пластинку тринитролонга прижимают пальцами к слизистой оболочке полости рта (обычно в области верхней десны над клыками или малыми коренными зубами). Наступление эффекта и продолжительность действия у разных больных неодинаковы и зависят от индивидуальной скорости рассасывания пластинки и правильного подбора дозы. Если необходимо прекратить действие препарата — пластинку удаляют. Пластинку рекомендуют наносить на слизистую оболочку десны после еды.

Форма выпуска. Пластинки полимерные, в упаковке 50 штук по 0,001 г (зеленого цвета) и по 0,002 г (с одной стороны белого цвета, с другой — светло-зеленого цвета)

Условия хранения. Список Б. В сухом, защищенном от света месте, вдали от огня.

Срок годности 2 года.

ТРИОКСАЗИН (Trioxazin). N-(3,4,5-Триметоксибензоил)-тетрагидро-1,4-оксазин. Синонимы: Sedoxazin, Trimetozinum.

Фармакологическое действие. Транквилизирующее средство, лишенное миорелаксирующего эффекта. Успокаивает центральную нервную систему.

Показания к применению. Невротические состояния с явлениями возбуждения, страха, бессонницы, повышенной раздражительности, вялости, апатии, утомляемости; ангионеврозы.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,3 г 2—3 раза в день, при необходимости дозу увеличивают до 1,8 г/сут.

Побочное действие. Сухость во рту, при применении в больших дозах сонливость, вялость, слабость, тошнота.

Форма выпуска. Таблетки по 0,3 г, в упаковке 20 штук.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Венгрии.

ТРИОМБРАСТ (Triombrastum). Смесь N-метилглутаминовой и натриевой солей 3,5-ди-(ацетиламино)-2,4,6-трийодбензойной кислоты в отношении 86,85:13,15. Синонимы: верографин, урографин, уротраст.

Фармакологическое действие. Триомбраст — трийодированное рентгеноконтрастное вещество.

Показания к применению. В качестве диагностического рентгеноконтрастного средства при заболеваниях сосудов, сердца, почек, мочевыводящих путей и других органов (опухоли внутренних органов, мягких тканей и костей, облитерирующий эндартериит, эмболии, варикозное расширение вен, тромбозы, гемангиомы, травмы конечностей с подозрением на повреждение магистральных сосудов и др.).

Способ применения и дозы. При ангиокардиографии, артериографии, аортографии, селективной ангиографии, флебографии путем внутрисосудистого введения 30—60 мл препарата со скоростью 3—35 мл/с в зависимости от вида диагностической процедуры. При урографии, ретроградной пиелографии и цистографии применяют внутривенное или внутриполостное введение (в мочевой пузырь и в почечные лоханки вводят триомбраст, разбавленный изотоническим раствором хлорида натрия или 5% раствором глюкозы до концентрации 30%). При всех видах введения раствор подогревают до температуры тела человека.

Побочное действие. Ощущение жара, иногда головокружение,

Отредактировал: ledi24

тошнота, рвота, учащение пульса, цианоз; реже усиление слюноотделения, слезотечение, эритематозные высыпания, крапивница, анафилактоидная реакция и анафилактический шок, зудящие экзантемы и крайне редко астматический приступ, отек Квинке, артериальная гипотония, коллапс, аритмии, фибрилляция желудочков сердца, остановка сердца, отек легких, неврологические нарушения, синдром медикаментозной красной волчанки, гипертиреоз, тромбофлебит.

Противопоказания. Идиосинкразия к йодистым препаратам, гипертиреоз, активный туберкулез, поражение миокарда, гипертоническая болезнь, шок, коллапс, значительное повышение индекса протромбина и свертываемости крови, общее тяжелое состояние больного.

Форма выпуска. В светозащитной упаковке в ампулах по 20 мл 60% и 76% раствора.

Этот препарат под названием «Верографин» («Verografin») 60% раствор по 20 мл и 76% раствор по 20 мл поступает из Чехо-Словакии.

Условия хранения. В защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

ТРИПСИН КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ (Trypsinum crystallisatum). Протеолитический фермент, получаемый из поджелудочной железы крупного рогатого скота.

Фармакологическое действие. При местном применении расщепляет некротизированные ткани и фибринозные образования, разжижает вязкие секреты, экссудаты, сгустки крови; оказывает противовоспалительное действие.

Показания к применению. Тромбофлебиты, воспалительно-дистрофические формы пародонтоза, остеомиелит, гайморит, отит, ирит, иридоциклит, кровоизлияния в переднюю камеру глаза; как вспомогательное средство для облегчения удаления вязких секретов и экссудатов при воспалительных заболеваниях дыхательных путей (трахеиты, бронхиты и др.).

Способ применения и дозы. Внутримышечно по 0,005 г в 1—2 мл изотонического раствора хлорида натрия 1—2 раза в день; ингаляции (5—10 мг трипсина в 2—3 мл изотонического раствора хлорида натрия); интраплеврально (10—20 мг в 20—50 мг изотонического раствора хлорида натрия); глазные капли (0,2—0,25% раствор).

Побочное действие и противопоказания те же, что и для лидазы.

Форма выпуска. Во флаконах по 0,01 г.

Условия хранения. В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 10°С.

Срок годности 3 года.

ТРИРЕЗИД-К (Trirezid-K). Синонимы: Adelphan-Esidrex-K, Triniton.

Фармакологическое действие. Гипотензивное средство, предназначенное для длительного лечения тяжелых видов артериальной гипертензии. АД понижается постепенно.

Показания к применению. Среднетяжелая и тяжелая эссенциальная, нефрогенная и другие виды гипертонии.

Способ применения и дозы. По 1 драже 1—2 раза в день, при отсутствии достаточного гипотензивного эффекта суточную дозу постепенно увеличивают на 1 драже в интервалах 7—14 дней, но не более чем до 6 драже в день (3 раза по 2 драже). Поддерживающая доза составляет 1—2 драже в день. Препарат принимают после еды.

Побочное действие. Могут отмечаться головная боль, слабость, изжога, тошнота, рвота и др.

Форма выпуска. Драже, в упаковке 40 штук.

Отредактировал: ledi24

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Югославии.

ТРИСАМИН (Trisaminum). Триоксиметиламинометан. Синонимы: триоламин, Trisbuffer и др.

Фармакологическое действие. Буферное вещество, повышающее при внутривенном введении щелочной резерв крови.

Показания к применению. Хирургические вмешательства, ожоги и другие состояния, сопровождающиеся ацидозом, воспалительные процессы, интоксикация, диабетические ацидозы, отравления салицилатами, барбитуратами и др.

Способ применения и дозы. Внутривенно в виде 3,66% раствора. Вводить следует медленно, так как при быстром введении возможны угнетение дыхания, снижение в крови содержания ионов натрия, калия и сахара, средняя скорость введения раствора 500 мл/ч (120 капель в минуту). Максимальная доза не должна превышать 50 мл/кг массы тела больного в сутки. Повторно трисамин можно вводить не ранее чем через 48 ч после предыдущего введения. При использовании больших доз трисамина следует добавлять натрия хлорид из расчета 1,75 г и калия хлорид из расчета 1,75 г и калия хлорид из расчета 0,372 г на 1 л 3,66% раствора трисамина. При опасности развития гипогликемии рекомендуется одновременно с трисамином вводить 5—10% раствор глюкозы с инсулином из расчета 1 ЕД на 4 г глюкозы.

Побочное действие. Возможно угнетение дыхания. При передозировке возникают явления алкалоза, гипогликемия, гипотония, рвота.

Противопоказания. Нарушения выделительной функции почек.

Форма выпуска. Герметически укупоренные флаконы, содержащие по 250 мл 3,66% раствора трисамина.

Условия хранения. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

ТРИСЕДИЛ (Trisedyl). 4-(мета-Трифторметилфенил)-1-[3'-(пара-фторбензоил)-пропил]-пиперидинол-4. Синонимы: Trifluperidolum, Triperidol.

Фармакологическое действие. Активный нейролептик, усиливает действие аналгезирующих и снотворных средств; оказывает противосудорожное действие.

Показания к применению. В психиатрии (острое возбуждение, галлюцинация и бред, острые ажитированные депрессии, маниакальные состояния, эпилептиформный психоз и др.).

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,25-0,5 мг с последующим повышением дозы до 1—2 мг/сут; внутримышечно 1,25—5 мг.

Побочное действие. Экстрапирамидные расстройства.

Противопоказания. Органические заболевания центральной нервной системы, истерия.

Форма выпуска. Таблетки по 0,5 мг, в упаковке 50 штук, ампулы, в упаковке 5 штук, 0,1% раствор во флаконах по 10 мл.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности. Таблетки 5 лет, ампулы, капли 2 года.

Поставляется из Венгрии.

«ТРИСОЛЬ». Солевой раствор для инъекций (Solutio «Trisolum» pro injectionibus). Состав: натрия хлорида 5 г, калия хлорида 1 г, натрия гидрокарбоната 4 г, воды для инъекций до 1 л.

Фармакологическое действие. Уменьшает сгущение крови и метаболический ацидоз, улучшает капиллярное кровообращение, функцио-

Отредактировал: ledi24

нальную способность сердца и почек, оказывает дезинтоксикационное действие.

Показания к применению. При холере Эль-Тор (Инаба), острой дизентерии и пищевой токсикоинфекции в качестве средства, устраняющего или уменьшающего явления обезвоживания и интоксикации организма.

Способ применения и дозы. Внутривенно (струйно или капельно). При тяжелых формах заболевания (гиповолемический инфекционно-токсический шок, неадекватная капиллярная перфузия, декомпенсированный метаболический ацитоз, анурия) начинают со струйного введения препарата с последующим переходом к капельному.

При более легких формах заболевания (интоксикация и обезвоживание организма, метаболический ацидоз, олигурия) можно ограничиться капельным введением препарата.

Неотложная регидратационная терапия для выведения больных из гиповолемического шока заключается в 1—3-часовом струйном введении раствора, подогретого до 38—40°С. В течение 1-го часа вводят раствор в количестве, соответствующем 7—10% массы тела больного. В дальнейшем струйное введение раствора заменяют капельным в течение 24—48 ч со скоростью 40—120 капель в минуту. Препарат применяют под контролем лабораторных исследований.

Общее количество вводимого раствора должно соответствовать объему жидкости, потерянной с рвотными массами, калом, мочой и по́том.

Баланс введенной и потерянной жидкости определяется каждые 6 ч. При развитии гиперкалиемии и ее последствиях раствор «Трисоль» заменяют временно раствором «Дисоль» до нормализации электролитного баланса.

Форма выпуска. Флаконы по 400 мл.

Условия хранения. При комнатной температуре.

Срок годности 2 года.

ТРИФЕРМЕНТ (Triferment).

Фармакологическое действие. Ферментный препарат, участвующий в переваривании углеводов, липидов и белков.

Показания к применению. Хроническая недостаточность поджелудочной железы, фиброкистозная болезнь поджелудочной железы, хронический колит, подготовка больных к рентгенологическим исследованиям, а также к операциям на брюшной полости (для устранения газов).

Способ применения и дозы. Взрослым назначают по 3—6 драже в день; детям старше 1 года по 1—2 драже в день; детям грудного возраста по 1 драже в день, предварительно размельчая таблетку. При подготовке больных к рентгенологическому исследованию или к операции препарат назначают в течение 2—3 дней.

Форма выпуска. Драже, в упаковке 30 штук.

Условия хранения. В сухом прохладном месте.

Срок годности 3 года.

Поставляется из Чехо-Словакии.

ТРИФТАЗИН (Triphthazinum). 10-3-(1-Метил-4-пиперазинил)-пропил-2-трифлуорометилфенотиазина дигидрохлорид. Синонимы: Stelazine, Terfluzin.

Фармакологическое действие. Активное нейролептическое средство.

Показания к применению. Шизофрения (различные формы), другие психические заболевания, протекающие с бредом и галлюцинациями (инволюционные и алкогольные психозы).

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,005 г с последующим

Отредактировал: ledi24

повышением дозы в среднем на 0,005 г в день (средняя терапевтическая доза 0,03—0,05 г/сут); внутримышечно 1—2 мл 0,2% раствора.

Побочное действие. Экстрапирамидные расстройства, вегетативные нарушения, в отдельных случаях токсический гепатит, агранулоцитоз и аллергические реакции.

Противопоказания. Острые воспалительные заболевания печени, заболевания сердца с нарушением проводимости и в стадии декомпенсации, тяжелые заболевания почек, беременность.

Форма выпуска. Таблетки, покрытые оболочкой, в упаковках 100 штук по 0,005 г и 50 штук по 0,01 г; ампулы по 1 мл 0,2% раствора, в упаковке 10 штук, 0,5% раствора, в упаковке 12 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности. Ампулы 2 года; таблетки 5 лет.

ТРИХЛОРЭТИЛЕН (Trichloraethylenum). Синонимы: Trilen, Narcogen, Trichloren.

Фармакологическое действие. Мощное наркотическое средство.

Применение. Для наркоза (в основном для кратковременного) с помощью наркозных аппаратов. Хирургическая стадия наркоза наступает при дозе 2—3 об.%; при небольших операциях и для обезболивания родов —0,4—0,8 об.%.

Побочное действие. При передозировке учащение дыхания с нарушением сердечного ритма.

Противопоказания. Заболевания печени и почек, аритмия, заболевания легких, анемия.

Форма выпуска. Во флаконах по 100 мл.

Условия хранения. Список Б. В сухом, прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности проверяется через каждые 6 мес.

ТРИХОМОНАЦИД (Trichomonacidum). Трифосфат 6-метокси-2-(4′-нитростирил)-4-(4-диэтил-амино-1-метил) бутил-амино-хинолина.

Фармакологическое действие. Оказывает антипротозойное действие на трихомонады.

Показания к применению. Урогенитальные заболевания женщин и мужчин, вызываемые трихомонадами.

Способ применения и дозы. Внутрь и местно. Внутрь после еды взрослым по 0,3 г в день (в 2—3 приема) в течение 3—5 дней. Женщинам одновременно назначают вагинальные суппозитории по 0,05 г ежедневно в течение 10 дней на ночь. Лечение проводят на протяжении трех половых циклов (после окончания менструаций).

Мужчинам одновременно с приемом внутрь назначают местно для промывания уретры по 10 мл 1% раствора ежедневно в течение 5—6 дней. Через 10—20 дней курс лечения повторяют.

Побочное действие. Возможны раздражающее действие на слизистые оболочки и появление обильных выделений.

Форма выпуска. Порошок 1 г, таблетки по 0,05 г, в упаковке 20 штук, вагинальные суппозитории по 0,05 г, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности. Порошок и таблетки 4 года, суппозитории 2 года.

ТРИХОПОЛ (Trichopol). 1-(β-Оксиэтил)-2-метил-нитроимидазол. Синонимы: Flagil, Metronidazole.

Фармакологическое действие. Противотрихомонадное средство.

Показания к применению. Острый и хронический трихомониаз у женщин и мужчин.

Отредактировал: ledi24

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,25 г 2 раза в день в течение 7—10 дней. Иногда первые 3—4 дня назначают по 0,25 г 3 раза в день. Общая доза на курс лечения 5 г.

Побочное действие. Диспептические явления, сухость во рту, потеря аппетита; иногда лейкопения. В отдельных случаях избыточное развитие грибковой флоры влагалища, что требует одновременного назначения нистатина.

Форма выпуска. Таблетки по 0,25 г, в упаковке 20 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Польши.

ТРОКСЕВАЗИН (Troxevazin). Синоним: Venoruton.

Фармакологическое действие. Действующее вещество из класса флавоноидов относится к производному рутина, обладающего Р-витаминной активностью. Уменьшает проницаемость и ломкость капилляров Нетоксичен, имеет большую широту терапевтического действия.

Показания к применению. Варикозное расширение вен, поверхностный тромбофлебит, венозные язвы и дерматиты, при геморроидальных узлах.

Способ применения и дозы. Вначале препарат назначают внутримышечно или внутривенно (медленное введение) по 1 ампуле через день (не менее 5 инъекций), затем переходят на пероральную терапию с применением 2—3 капсул в день во время еды в течение 2—3 нед и более. Гель наносят утром и вечером на кожу болезненного участка и слегка массируют до полного всасывания препарата.

Побочное действие. Нет.

Противопоказания. Нет.

Форма выпуска. Капсулы по 0,3 г, в упаковке 50 капсул; таблетки форте 500 мг по 30 штук в упаковке; ампулы по 5 мл 10% раствора — 5 штук в упаковке; 2% гидрофильный гель по 40 г в упаковке.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Болгарии и Швейцарии.

ТРОПАФЕН (Tropaphenum). Тропинового эфира-α-фенил-β (пара-ацетоксифенил)-пропионовой кислоты гидрохлорид.

Фармакологическое действие. Расширяет периферические сосуды и снижает АД.

Показания к применению. Заболевания, связанные с нарушением периферического кровообращения (эндартериит, болезнь Рейно, акроцианоз и др.), трофические язвы конечностей, вяло заживающие раны, гипертонические кризы, диагностика и лечение феохромоцитомы.

Способ применения и дозы. При нарушениях периферического кровообращения вводят подкожно или внутримышечно по 1—2 мл 1—2% раствора 1—3 раза в день. Курс лечения —10—20 дней. Для купирования и предупреждения гипертонических кризов вводят подкожно или внутримышечно 1 мл 1—2% раствора. Для фармакологической диагностики феохромоцитомы вводят в вену 1 мл 1% раствора взрослым и 0,5 мл 1% раствора детям.

Побочное действие. Тахикардия, головокружение, ортостатический коллапс. Для предупреждения ортостатической гипотензии во время инъекции и в течение $1^1/_2$—2 ч после нее больные должны находиться в положении лежа.

Противопоказания. Выраженные органические заболевания сердца и сосудов.

Форма выпуска. Ампулы, содержащие по 0,02 г (20 мг) лиофилизированного тропафена, в упаковке 10 штук. Содержимое ампулы

Отредактировал: ledi24

перед употреблением растворяют в воде для инъекций. Для приготовления 1% раствора вводят в ампулу 2 мл воды для инъекций, для приготовления 2% раствора —1 мл.

Условия хранения. Список Б. Хранится в обычных условиях.

Срок годности 2 года.

ТРОПАЦИН (Tropacinum). Тропинового эфира дифенилуксусной кислоты гидрохлорид.

Фармакологическое действие. Оказывает выраженное центральное и периферическое антихолинергическое действие, блокируя в основном м-холинореактивные системы, а также обладает ганглиоблокирующим и спазмолитическим свойством.

Показания к применению. Паркинсонизм, гиперкинезы, спастические пареазы и параличи.

Способы применения и дозы. Внутрь после еды по 0,01—0,0125 г 1—2 раза в день; детям дозы устанавливают соответственно возрасту (от 0,001 до 0,005 г).

Высшая доза для взрослых 0,03 г, суточная 0,1 г.

Побочное действие. Сухость во рту, расширение зрачков, диспептические явления, тахикардия, головная боль, головокружение.

Противопоказания. Глаукома.

Форма выпуска. Порошок, таблетки по 0,01 г, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список А. В защищенном от света месте.

Срок годности. Порошок 5 лет, таблетки 4 года.

ТУБОКУРАРИН-ХЛОРИД (Tubocurarini-chloridum). d-Тубокурарина хлорид.

Фармакологическое действие. Курареподобный препарат с антидеполяризующим действием.

Показания к применению. В анестезиологии как миорелаксант, в травматологии при репозиции отломков и вправлении сложных вывихов, в психиатрии для предупреждения травм при судорожной терапии у больных шизофренией и др.

Способ применения и дозы. Внутривенно из расчета 0,4—0,5 мг/кг. При операции, продолжающейся 2—$2^1/_2$ ч, вводят до 45 мг препарата.

Побочное действие. Введение препарата требует осторожности, так как он может вызвать остановку дыхания. При необходимости для ослабления действия тубокурарина вводят прозерин.

Противопоказания. Миастения, выраженное нарушение функции печени и почек, преклонный возраст.

Форма выпуска. В ампулах по 1,5 мл, содержащих 15 мг препарата, в упаковке 25 штук.

Условия хранения. Список А.

Срок годности 5 лет.

ТУРИНАЛ (Turinal). 17-α-Аллил-17-β-гидрокси-4-эстрен. Синонимы: Gestanin, Orageston.

Фармакологическое действие. Оказывает выраженное прогестативное действие и играет гормонозаместительную роль при беременности. Препарат улучшает секреторную деятельность трофобластов и снижает выработку окситоциназы, увеличивает выделение метаболитов плацентарных стероидов, что нормализует функцию плаценты, а также стимулирует секрецию эндогенного прогестерона, способствуя сохранению беременности.

Показания к применению. Привычный и угрожающий аборт, угрожающие преждевременные роды.

Способ применения и дозы. При угрожающем аборте назначают

Отредактировал: ledi24

по 1 таблетке 3 раза в день в течение 5—7 дней, при привычном аборте — по 1—2 таблетки в день в течение месяца (обычно до V месяца беременности). При угрожающих преждевременных родах дозы и длительность применения туринала устанавливают индивидуально в каждом конкретном случае.

Форма выпуска. Таблетки по 0,005 г, в упаковке 20 штук.

Условия хранения. Список Б. В сухом прохладном месте.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Венгрии.

ТУСУПРЕКС (Tusuprex). Диэтиламино-этоксиэтил-диэтилфенилацетат. Синоним: Oxeladin.

Фармакологическое действие. Оказывает противокашлевое и слабое отхаркивающее действие. В отличие от кодеина не угнетает дыхание, не вызывает пристрастия и привыкания.

Показания к применению. Сухой кашель, катары верхних дыхательных путей, заболевания легких.

Способ применения и дозы. Внутрь: взрослым по 20 мг 3—4 раза; детям до 1 года — по 5 мг 3—4 раза в день; детям старше 1 года — по 5—10 мг 3—4 раза в день.

Побочное действие. Возможны диспептические явления.

Противопоказания. Бронхоспастические состояния, бронхоэктазии, бронхиальная астма, бронхиты с затрудненным отхаркиванием мокроты.

Форма выпуска. Таблетки, покрытые оболочкой, по 0,01 г, в упаковке 30 штук; таблетки по 0,02 г, в упаковке 30 штук.

Условия хранения. В сухом месте.

Срок годности 3 года.

Поставляется из Польши.

ТЫКВЫ СЕМЯ (Semen Cucurbitae). Содержит жирное масло (40—50%), фитостерин, смолистые вещества, аскорбиновую кислоту, витамин B_1.

Применение. В качестве противоглистного средства при тениидозах внутрь натощак по 300 г семян (можно растереть в ступке и смешать с 50—100 г меда) небольшими порциями (через 3 ч слабительное); детям в возрасте 3—4 лет 75 г, 5—7 лет 100 г, 8—10 лет 150 г, 10—15 лет 200—250 г.

Форма выпуска. В упаковке по 130 г.

Условия хранения. В сухом прохладном месте.

Срок годности 2 года.

ТЫСЯЧЕЛИСТНИКА ОБЫКНОВЕННОГО ТРАВА И ЦВЕТКИ (Herba et Flores Achilleae Millefolii L.). Содержат витамин К, сесквитерпены, эфирное масло (до 1%), ахиллеин, дубильные вещества.

Применение. В качестве кровоостанавливающего средства при маточных кровотечениях на почве воспалительных процессов, фибромиом, при геморроидальных кровотечениях в виде настоя (15,0:200,0) по 1 столовой ложке 3 раза в день.

Форма выпуска. В упаковках по 100 г трава и цветки.

Условия хранения. В сухом прохладном месте.

Срок годности 5 лет.

УЛЬТРАКАИН (Ultracain).

Фармакологическое действие. Быстрое и сильное анестезирующее действие, хорошая общая и местная переносимость.

Отредактировал: ledi24

Показания к применению. Местная и инфильтрационная анестезия при хирургических вмешательствах, обезболивание при родах и лечении болевых синдромов, люмбальная анестезия, проводниковая анестезия в стоматологии.

Способ применения и дозы.

Ультракаин-2%

Для местной анестезии применяется 2% раствор ультракаина в количестве 2—5 мл (например, при удалении атеромы) и до 100 мл (например, при удалении грыжи). Местная проводниковая анестезия для блокады периферических нервных окончаний или нервных сплетений производится с помощью 15—30 мл, действие длится около 2—3 часов. Для парацервикальной блокады, как правило, достаточно 6—8 мл. Для внутривенной местной анестезии берется 0,5% раствор —50—60 мл для верхних и 80—120 мл для нижних конечностей. Для эпидуральной (перидуральной) анестезии нужно 15—20 мл. Для купирования болевых синдромов применяется от 1—2 мл (например, при внутрисуставном введении) до 20—30 мл (при введении в большее количество мест)

Ультракаин-2% А

Дозы и способ употребления такие же, как ультракаина-2%. Для парацервикальной блокады (шейная, ваго-симпатическая блокада) в основном используется 6—8 мл; для эпидуральной и перидуральной анестезии —15—20 мл.

Ультракаин-5%.

Полное наступление аналгезии при люмбальном введении 1,5—2 мл гипертонического раствора ультракаина-5% наступает через 2—10 минут и продолжается обычно 2—3 часа.

Ультракаин-ДС

При удалении зубов верхней челюсти (без признаков воспаления) достаточно ввести в качестве вестибулярного депо 2 мл на каждый зуб. При необходимости разреза или наложения швов на нёбо достаточно ввести на каждый шов 0,1 мл.

Местную анестезию вблизи спинного мозга не следует применять у вегетативно нестабильных больных, больных с заболеваниями центральной нервной системы, с хронической гипоксией, с тяжелыми патологическими изменениями сердца и кровеносных сосудов. Парацервикальная блокада не показана при эклампсии беременных, кровотечениях в первые три месяца беременности и признаках амнионита.

Водный раствор ультраканна можно стерилизовать и рестерилизовать, а также разводить стерильным физиологическим раствором до нужной концентрации.

Внутривенное введение ультракаина ДС противопоказано.

Побочное действие. Обморочное состояние, коллапс, нарушения дыхания, тошнота, рвота, непроизвольные мышечные движения, сокращения и спазмы. Побочные явления зависят от применяемой дозы, как и других местных анестетиков. Они могут быть вызваны действием адреналина, который содержится в ультракаине.

Противопоказания. Обычные противопоказания к применению адреналина (сосудосуживающее действие) — пароксизмальная тахикардия, мерцательная аритмия и глаукома. Консервирующее вещество ультракаина (метиловый эфир пара-гидроксибензойной кислоты) в своем составе в параположении имеет гидроксильную группу. Больным, обладающим так называемой аллергией на пара-группу, введение ультракаина противопоказано.

Форма выпуска. Ультракаин-2% —5 ампул по 10 мл, ультракаин-2% А — 5 ампул по 10 мл, ультракаин-5% — 5 ампул по 2 мл, ультракаин ДС — 50 ампул по 2 мл.

Отредактировал: ledi24

Срок годности. Ультракаин-2% А —4 года, ультракаин ДС — 2,5 года.

Производится фирмой «Hoechcst», Германия.

УЛЬФАМИД (Ulfamid). Противоязвенное средство из группы блокаторов H_2-рецепторов.

Фармакологическое действие. Ингибирует базальную и стимулированную секрецию желудочной кислоты и пепсина.

Показания к применению. Язва двенадцатиперстной кишки и желудка, синдром Золлингер-Эллисона, рефлюксный эзофагит, профилактика рецидива язвы двенадцатиперстной кишки.

Способ применения и дозы. *Язва двенадцатиперстной кишки и желудка:* 1 таблетка 40 мг 1 раз в день перед сном в течение 8 недель, терапия прекращается после доказанного рубцевания язвы; *профилактика рецидивов дуоденальной язвы:* 1 таблетка 20 мг 1 раз в день перед сном; *синдром Золлингер-Эллисона:* начальная доза —1 таблетка 20 мг каждые 6 часов, дозировка должна соответствовать тяжести клинической картины. Употребление препарата не рекомендуется при беременности и в период кормления грудью.

Побочное действие. Понос, головная боль, чувство усталости, запоры, сухость во рту, тошнота, рвота, метеоризм, уменьшение аппетита, сыпь.

Форма выпуска. Таблетки по 40 и 20 мг, в упаковке по 10 и 20 штук.

Срок годности 5 лет.

Производится фирмой «КРКА», Словения.

«УНДЕВИТ» («Undevitum»). Состав: ретинола ацетата 0,001 (3300 МГ), тиамина бромида 0,00258 г, рибофлавина 0,002 г, пиридоксина 0,003 г, цианокобаламина 2 мкг, никотинамида 0,02 г, рутина 0,01 г, токоферола ацетата 0,01 г, кислоты фолиевой 0,0005 г, кальция пантотената 0,003 г, кислоты аскорбиновой 0,075 г.

Применение. Для улучшения обменных процессов и общего состояния у лиц среднего и пожилого возраста с целью предупреждения и лечения преждевременного старения. Назначают внутрь после еды для профилактических целей по 1 драже 1—2 раза в день, для лечебных целей по 2 драже 3 раза в день в течение 20—30 дней. Курс лечения повторяют через 1—3 мес.

Форма выпуска. Таблетки, покрытые оболочкой, в упаковке 50 штук.

Условия хранения. В сухом прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

«УНДЕЦИН» («Undecinum»). Состав: ундециленовой кислоты 8 г, ундециленовой меди 8 г, пара-хлорфенилового эфира глицерина 4 г, мазевой основы 80 г.

Фармакологическое действие. Обладает противогрибковой активностью.

Показания к применению. Различные формы эпидермофитии, дрожжевые дерматозы.

Способ применения и дозы. Наружно. Втирают в пораженные участки кожи 2 раза в день. Курс лечения 15—20 дней.

Форма выпуска. Мазь в упаковке по 25 г.

Условия хранения. В прохладном месте.

Срок годности 2 года.

УНИТИОЛ (Unithiolum). 2,3-Демеркаптопропансульфонат натрия.

Фармакологическое действие. Оказывает противотоксическое

Отредактировал: ledi24

действие при отравлении веществами, способными реагировать с сульфгидрильными группами.

Показания к применению. Острые и хронические отравления соединениями мышьяка, ртути, хрома, висмута и других металлов (но не свинца!), гепатолентикулярная дегенерация.

Способ применения и дозы. Внутримышечно или подкожно по 5—10 мл 5% раствора 3—4 раза в день в течение 6—7 дней; детям дозы уменьшают в соответствии с возрастом. При гепатолентикулярной дегенерации вводят внутримышечно по 5—10 мл ежедневно или через день; на курс 25—30 инъекций.

Побочное действие. В отдельных случаях тошнота, тахикардия, побледнение лица, головокружение.

Форма выпуска. Ампулы по 5 мл 5% раствора, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. В сухом, защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

УРЕГИТ (Uregit). Этакриновая кислота Синоним: Hydromedin.

Фармакологическое действие. Активное диуретическое действие. Способствует выведению из организма ионов натрия и хлора, а также воды.

Показания к применению. Отеки, вызванные недостаточностью кровообращения, нарушением функции почек; отек мозга и легких.

Способ применения и дозы. Внутрь 0,05—0,2 г однократно после еды (лучше утром).

Побочное действие. Гипокалиемия, гипохлоремический алкалоз, головокружение, слабость, диарея (показана диета, богатая солями калия).

Противопоказания. Выраженные нарушения функции почек.

Форма выпуска. Таблетки по 0,05 г, в упаковке 20 штук.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Венгрии.

«УРОБЕСАЛ» («Urobesalum»). Состав: экстракта красавки 0,015 г, фенилсалицилата 0,25 г, гексаметилентетрамина 0,25 г.

Применение. При заболеваниях кишечника (колиты, энтероколиты) и мочевыводящих путей (циститы, пиелиты, пиелонефриты) по 1 таблетке 3—4 раза в день внутрь (часто в сочетании с другими препаратами).

Форма выпуска. Таблетки, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. В сухом месте.

Срок годности 2 года.

«УРОДАН» («Urodanum»). Состав: пиперазина 2,5 г, гексаметилентетрамина 8 г, натрия бензоата 2,5 г, лития бензоата 2 г, динатрия фосфата (безводного) 10 г, натрия гидрокарбоната 37,5 г, кислоты виннокаменной 35,6 г, сахара 1,9 г.

Фармакологическое действие. Входящие в состав препарата соли лития и пиперазин в сочетании с мочевой кислотой образуют легкорастворимые соединения и способствуют ее выведению из организма.

Показания к применению. Подагра, мочекаменная болезнь, хронические полиартриты.

Способ применения и дозы. Внутрь перед едой по 1 чайной ложке в $^1/_2$ стакана воды 3—4 раза в день. Применяют длительно (30—40 дней). При необходимости курс лечения повторяют.

Форма выпуска. Гранулы по 100 г.

Условия хранения. Обычные.

Срок годности 1 год.

Отредактировал: ledi24

УРОЛЕСАН (Urolesanum). Комбинированный препарат Состав из расчета на 100 г: масла пихтового 8 г, масла мяты перечной 2 г, масла касторового 11 г, спиртового экстракта семян дикой моркови 23 г, спиртового экстракта шишек хмеля 32,995 г, спиртового экстракта травы душицы 23 г, трилона Б 0,005 г.

Фармакологическое действие. Обладает антисептическими свойствами, повышает диурез, подкисляет мочу, увеличивает выделение мочевины и хлоридов, усиливает желчеобразование и желчеотделение, улучшает печеночный кровоток.

Показания к применению. Различные формы мочекаменной и желчнокаменной болезни, солевые диатезы, острые и хронические пиелонефрит и холецистит, холангиогепатит и дискинезия желчных путей.

Способ применения и дозы. По 8—10 капель на кусок сахара под язык 3 раза в день до еды. Курс лечения зависит от тяжести заболевания и продолжается от 5 дней до 1 мес. При почечных и печеночных коликах разовый прием можно увеличить до 15—20 капель.

Побочное действие. Возможны легкое головокружение, тошнота. В этом случае назначают обильное горячее питье и покой.

Форма выпуска. Флаконы-капельницы оранжевого стекла по 15 мл.

Условия хранения. В защищенном от света месте, где температура не выше 20°С.

Срок годности 2 года.

УРОСУЛЬФАН (Urosulfanum). пара-Аминобензолсульфонилмочевина. Синонимы: Sulfacarbamidum, Uramid.

Фармакологическое действие. Сульфаниламидный препарат. Наиболее активен в отношении стафилококков и эшерихий.

Показания к применению. Гнойные инфекции мочевыводящих путей.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,5—1 г 3—5 раз в день. Курс лечения 6—14 дней. Суточная доза для детей 1—2,5 г (в 4—5 приемов). Высшие дозы для взрослых внутрь: разовая 2 г, суточная 7 г.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к сульфаниламидам.

Форма выпуска. Порошок, таблетки по 0,5 г, в упаковке 12 штук.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности 5 лет.

ФАЛИГНОСТ (Falignost). N-Метил-N-(2,4,6-трийод-3-аминофенил)-глутарамидовой кислоты.

Фармакологическое действие. Диагностическое средство.

Показания к применению. Клинически обоснованное подозрение на заболевания желчного пузыря и внепеченочных желчных путей.

Противопоказания. Тяжелые заболевания печеночной паренхимы, заболевания пищеварительного тракта.

Форма выпуска. Таблетки, в упаковке 8 штук.

Условия хранения. Хранить в защищенном от света месте.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Германии.

ФАЛИ-ЛЕПСИН (Fali-Lepsin). Псевдо-1-фенил-2-амино-пропанол-(1)-фенилэтилбарбитурат. Синоним: Falepsin.

Фармакологическое действие. Противосудорожное средство.

Показания к применению. Разнообразные судорожные пароксизмы, в том числе типа petit mal.

Способ применения и дозы. Взрослым и детям с 12-летнего возраста препарат назначают по 0,05 г в день, при необходимости постепенно

Отредактировал: ledi24

повышают дозу до 0,1—0,15 г 3 раза в день (максимально до 0,5 г/сут)

Побочное действие. Головная боль, вялость, заторможенность, утомляемость.

Противопоказания. Нарушения функции печени и почек.

Форма выпуска. Таблетки по 0,1 г, в упаковке 100 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 5 лет

Поставляется из Германии.

ФАЛИМИНТ (Falimint). 1-Пиропокси-2-ацетамино-4-нитробензол.

Фармакологическое действие. При нанесении на слизистые оболочки раздражает нервные окончания, оказывает незначительное болеутоляющее действие. Препарат обладает антисептическими и противорвотными свойствами.

Показания к применению. Воспалительные заболевания дыхательных путей. Способность фалимина подавлять рвоту позволяет применять его при исследовании полости рта и зева, а также в стоматологической практике при протезировании зубов. Препарат можно использовать для подавления кашля и чиханья у спортсменов, артистов, лекторов и др.

Способ применения и дозы. По 1—2 драже 3—5 раз в день. Драже держат во рту до рассасывания, не разжевывая.

Форма выпуска. Драже по 0,025 г, в упаковке 40 штук.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Германии.

ФАРИНГОСЕПТ (Fagingosept). 1,4-Бензохинон-гуанилгидразон-тиосемикарбазон. Синоним: Ambazon.

Фармакологическое действие. Оказывает сильное бактериостатическое действие.

Показания к применению. Для профилактики и лечения острых инфекций (ангины, тонзиллиты, стоматиты).

Способ применения и дозы. Детям 3—7 лет назначают ежедневно по 3 таблетки; взрослым 3—5 таблеток в сутки в течение 3—4 дней. Таблетки принимают через 15—30 мин после еды и держат до полного рассасывания в полости рта. После приема препарата рекомендуется воздержаться от приема пищи и питья в течение 3 ч.

Форма выпуска. Таблетки, в упаковке 20 штук.

Условия хранения. В сухом месте.

Срок годности 3 года.

Поставляется из Румынии.

«ФАСТИН», МАЗЬ (Unguentum «Fastinum»). Содержит фурацилин (2%), синтомицин (1,6%), анестезин (3%), ланолин, вазелин, стеарин («Фастин»-1) и воду (в общей сложности до 100%).

Фармакологическое действие. Оказывает антибактериальное и обезболивающее действие.

Показания к применению. Ожоги I степени, свежие ожоги II и III степени, гнойные раны, пиодермия.

Способ применения. Мазь наносят на стерильные марлевые салфетки, накладывают на пораженную поверхность и меняют через 7—10 дней.

Форма выпуска. Мазь по 50 г в банках оранжевого стекла, «Фастин»-1.

Условия хранения. В защищенном от света, прохладном месте.

Срок годности 2 года.

Отредактировал: ledi24

ФЕНАЗЕПАМ (Phenazepamum). 7-Бром-5 (орто-хлорфенил)-2-3-дигидро-1Н-1,4-бензодиазепин-2-он.

Фармакологическое действие. Обладает транквилизирующей, гипнотической, противосудорожной и миорелаксирующей активностью.

Показания к применению. Различные невротические, неврозоподобные, психопатические и психопатоподобные состояния, сопровождающиеся тревогой, страхом, повышенной раздражительностью и напряженностью, эмоциональной лабильностью. Различные вегетативные дисфункции и расстройства ночного сна. Для купирования алкогольной абстиненции и серийных припадков различной этиологии; для лечения ригидности мышц, атетозов, различных гиперкинезов, тиков, височной и миоклонической эпилепсии.

Способ применения и дозы. Внутрь, начиная с 0,0005—0,001 г 2—3 раза в сутки (основная доза перед сном), постепенно увеличивая дозу до 0,002—0,005 г; в стационаре дозу можно осторожно повышать до 0,01 г. Больным пожилого возраста увеличивать дозу следует особенно осторожно.

Побочное действие. Сонливость, мышечная слабость, головокружение, тошнота: при передозировке возможна выраженная атаксия.

Противопоказания. Тяжелая миастения, выраженные нарушения печени и почек; беременность, отравление другими транквилизаторами, нейролептиками, снотворными и наркотическими средствами, алкоголем; работа, требующая быстрой физической и психической реакции.

Форма выпуска. Таблетки по 0,0005 г, в упаковке 50 штук; таблетки по 0,001 г, в упаковке по 50 штук; ампулы по 1 мл 3% раствора, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В сухом прохладном и защищенном от света месте.

Срок годности. Таблетки 2 года, ампулы 3 года.

ФЕНАСАЛ (Phenasalum). Синонимы: Copharten, Vermitin.

Фармакологическое действие. Антигельминтное средство.

Показания к применению. Тениаринхоз, дифиллоботриоз, гименолепидоз.

Способ применения и дозы. Внутрь по 2 г 1 раз в день. Детям дозы уменьшают в соответствии с возрастом.

Форма выпуска. Порошок.

Условия хранения. Список Б. В сухом месте.

Срок годности 4 года.

ФЕНАЦЕТИН (Phenacetinum). 1-Этокси-4-ацетаминобензол. Синонимы: Acetophenetidin, Phenin.

Фармакологическое действие. Жаропонижающее, болеутоляющее и противовоспалительное средство.

Применение. При головной боли, мигрени, миалгиях, артритах, лихорадочных состояниях по 0,25—0,5 г 2—3 раза в день.

Высшая разовая доза 0,5 г, суточная 1,5 г.

Побочное действие. Возможны аллергические реакции; большие дозы могут вызвать метгемоглобинемию.

Противопоказания. Индивидуальная непереносимость препарата, нарушение функции почек.

Форма выпуска. Порошок.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности не ограничен.

ФЕНИБУТ (Phenibutum). γ-Амино-β-фенил-масляной кислоты гидрохлорид.

Отредактировал: ledi24

Фармакологическое действие. Обладает транквилизирующей активностью без противосудорожного и миорелаксирующего компонента.

Показания к применению. Невротические и психопатические состояния, сопровождающиеся тревогой, страхом, напряжением, повышенной раздражительностью, нарушением сна; может назначаться в качестве успокаивающего средства перед хирургическими вмешательствами.

Способ применения и дозы. Внутрь взрослым 2—3 раза в день, начиная с 0,25—0,5 г с постепенным повышением разовой дозы до 0,75 г; детям и больным пожилого возраста препарат назначают в меньших дозах.

Побочное действие. Сонливость.

Форма выпуска. Таблетки по 0,25 г, в упаковке 50 штук.

Условия хранения. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

ФЕНИГИДИН (Phenihidinum). 2,6-Диметил-4-(2′-нитрофенил)-1,4 дигидропиридин-3,5-дикарбоновой кислоты диметиловый эфир. Синонимы: Corinfar, Adalat, Nifedipin.

Фармакологическое действие. Коронарорасширяющее средство, вызывающее длительное увеличение коронарного кровотока; обладает гипотензивным спазмолитическим свойством.

Показания к применению. Ишемическая болезнь сердца с приступами стенокардии, особенно в сочетании с гипертонической болезнью.

Способ применения и дозы. Применяют сублингвально по 0,02 г (20 мг) 2—3 раза в день. После достижения терапевтического эффекта больного переводят на поддерживающую дозу — по 0,01 г (10 мг) 3 раза в день. Курс лечения обычно 1—2 мес. После приема препарата рекомендуется находиться в лежачем положении 30—60 мин.

При гипотонии применяют в меньших дозах — по 0,01 г (10 мг) 3 раза в день под контролем АД.

Побочное действие. Возможны головная боль, сердцебиение, тошнота. В этих случаях следует уменьшить дозу или отменить препарат.

Противопоказания. Беременность.

Форма выпуска. Таблетки по 0,01 г, в упаковке 40 штук. Этот препарат под названием «Коринфар» (Corinfar) драже по 0,01 г в упаковке по 100 штук поступает из Германии, под названием «Кордипин ретард» — из Словении, от фирмы «КРКА».

Условия хранения. Список Б. В сухом, защищенном от света месте.

Срок годности фенигидина 2 года, коринфара 5 лет.

ФЕНИКАБЕРАН (Phenicaberanum). 2-Фенил-3-карбэтокси-4-диметиламино-метил-5-оксибензофурана гидрохлорид.

Фармакологическое действие. Спазмолитическое средство.

Показания к применению. В качестве одного из средств комплексной терапии при заболеваниях пищеварительного аппарата, сопровождающихся спастическим состоянием гладкомышечных органов (холециститы, желчнокаменная болезнь, колиты, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки), а также при хронической коронарной недостаточности, протекающей с приступами стенокардии.

Способ применения и дозы. Внутрь при болезнях пищеварительного тракта по 0,02 г 3—6 раз в день в течение недели, в последующие 2 нед. число приемов препарата сокращают до 3 раз в сутки. Курс лечения 3 нед. При хронической коронарной недостаточности по 0,02 г 3—4

Отредактировал: ledi24

раза в день в течение 3—4 нед. при приступе стенокардии внутримышечно по 2 мл 0,25% раствора.

Побочное действие. Головокружение, головная боль, общая слабость, снижение аппетита.

Противопоказания. Хронический нефрит с отеками и нарушением азотовыделительной функции, кровоточащая язва желудка и двенадцатиперстной кишки, сахарный диабет и беременность. При остром инфаркте миокарда феникаберан назначают с осторожностью, контролируя АД. При повышении АД препарат отменяют.

Форма выпуска. Таблетки, покрытые оболочкой по 0,02 г, в упаковке 20 штук; ампулы по 2 мл 0,25% раствора, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности. Таблетки 2 года, ампулы 2 года.

ФЕНИЛИН (Phenylinum). 2-Фенилиндандион-1,3. Синонимы: Hedulin, Trombosol и др.

Фармакологическое действие. Антикоагулянт непрямого действия.

Применение. В тех же случаях, что и дикумарин. Назначают внутрь: в 1-й день 0,12—0,2 г (в 3—4 приема), во 2-й день в суточной дозе 0,09—0,15 г, затем по 0,03—0,06 г в день в зависимости от содержания в крови протромбина. Для профилактических целей назначают по 0,03 г 1—2 раза в день.

Высшая разовая доза для взрослых 0,05 г, суточная 0,2 г.

Побочное действие и противопоказания те же, что и для неодикумарина. Кроме того, фенилин может вызвать аллергические реакции и угнетение кроветворения; иногда отмечается окрашивание ладоней в оранжевый цвет и мочи — в розовый.

Форма выпуска. Таблетки по 0,03 г, в упаковке 20 штук.

Условия хранения. Список А. В защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

ФЕНИЛСАЛИЦИЛАТ (Phenylii salicylas). Фениловый эфир салициловой кислоты. Синоним: салол.

Применение. В качестве антисептического средства при заболеваниях кишечника (колиты, энтероколиты) и мочевыводящих путей (циститы, пиелиты, пиелонефриты) внутрь по 0,25—0,5 г на прием 3—4 раза в день (часто в сочетании с другими препаратами).

Форма выпуска. Порошок; таблетки, содержащие фенилсалицилата и висмута нитрата основного по 0,25 г, экстракта красавки 0,015 г, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. В сухом месте.

Срок годности. Порошок не ограничен, таблетки желудочные 4 года.

ФЕНКАРОЛ (Phencarolum). Хинуклидил-3-дифенилкарбинола гидрохлорид.

Фармакологическое действие. Противогистаминное средство.

Показания к применению. Поллинозы, острая и хроническая крапивница, отек Квинке, сенная лихорадка, аллергические риниты, дерматозы, аллергические осложнения, связанные с приемом лекарств и т. д.

Способ применения и дозы. Взрослым внутрь по 0,025—0,05 г 3—4 раза в день после еды. Курс лечения в среднем 10—20 дней. Детям в возрасте до 3 лет —0,005 г 2— 3 раза в день, от 3 до 7 лет — по 0,01 г 2 раза в день, от 7 до 12 лет — по 0,01—0,015 г 2—3 раза в день, старше 12 лет — по 0,025 г 2—3 раза в день.

Побочное действие. Сухость во рту, диспептические явления, проходящие при уменьшении дозы.

Отредактировал: ledi24

Противопоказания. Первые 3 мес. беременности; фенкарол назначают с осторожностью больным с тяжелыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта (возможность раздражающего действия на слизистую оболочку), печени, сердечно-сосудистой системы.

Форма выпуска. Таблетки по 0,025 г, в упаковке 50 штук, по 0,01 № 50 (для детей).

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

«ФЕНКОРТОЗОЛЬ» («Phencortosolum»). Пенный аэрозольный препарат, представляющий собой эмульсию в аэрозольном баллоне. Состав препарата в одной упаковке: фенилсалицилата 5 г, гидрокортизона ацетата 0,125 г, масла оливкового 10 г, эмульгатора Т-2 3 г, ОС-20 2 г, глицерина 2,5 г, этилцеллозольва 3 г, нипагина 0,1 г, воды дистиллированной 24,275 г, дихлордифторметана (хлодон-12) 5 г. При выходе из баллона образуется пена белого цвета со слабым запахом этилцеллозольва.

Фармакологическое действие. Обладает фотозащитным и противовоспалительным свойством. Фотозащитное действие сохраняется в течение 6 ч.

Показания к применению. Фотодерматозы и дискоидная красная волчанка.

Способ применения и дозы. Фенкортозоль наносят на подвергающиеся действию солнечных лучей участки кожи при выходе больных на улицу в солнечную погоду. На шток клапана баллона надевают насадку, которую подводят к соответствующему участку кожи. При легком нажатии на насадку препарат поступает из баллона в виде пены, которую равномерно слегка втирают в кожу массирующим движением. При одном нажатии на клапан баллона в течение 1—2 с выходит 7—14 $см^3$ пены (0,7—1,4 г препарата), достаточных для покрытия 300—500 $см^2$ поверхности кожи. Одномоментно на кожу может быть нанесено до 30 $см^2$ пены (3 г).

Противопоказания. Нежелательно применение в холодное время года.

Форма выпуска. Аэрозольный баллон (под давлением) емкостью 80 мл, содержащий 55 г препарата.

Условия хранения. При температуре не выше 40°С. Следует предохранять от ударов.

Срок годности 2 года.

ФЕНОБАРБИТАЛ (Phenobarbitalum). 5-Этил-5-фенил-барбитуровая кислота. Синонимы: Luminal, Barbinal, Dorminal.

Фармакологическое действие. Оказывает успокаивающее, снотворное и выраженное противосудорожное действие.

Показания к применению. Бессонница, повышенная возбудимость нервной системы, эпилепсия, хорея, спастические параличи начальной стадии гипертонической болезни (в сочетании со спазмолитическими средствами).

Способ применения и дозы. Внутрь как снотворное и седативное средство по 0,01—0,05 г 2—3 раза в день; при эпилепсии по 0,05 г 1 раз в сутки с постепенным повышением дозы на 0,025 г в день. Высшая разовая доза 0,3 г, суточная 0,6 г.

Побочное действие. Головная боль, атаксия, при длительном применении привыкание.

Противопоказания. Заболевания печени и почек с нарушением функции.

Отредактировал: ledi24

Форма выпуска. Порошок, таблетки, в упаковке 6 штук по 0,05 г, по 0,1 г, по 0,005 г для детей.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности. Порошок 10 лет; таблетки 0,05 и 0,1 г 10 лет; 0,005 г для детей 5 лет.

ФЕНОБОЛИН (Phenobolinum). 17-β-Окси-19-нор-4-андростен-3-он-17β-фенилпропионат, или фенилпропиона-19-нортестостерона. Синонимы: Nerobolil, Durabolin.

Фармакологическое действие. Активный анаболический стероид пролонгированного действия.

Показания к применению. Нарушения белкового обмена при астении, кахексии, заболевания, сопровождающиеся потерей белка, межуточно-гипофизарная недостаточность, хроническая недостаточность надпочечников, токсический зоб, диабетические ангиопатии (ретинопатия и нефропатия), стероидный диабет, гипофизарная карликовость, хроническая коронарная недостаточность, инфаркт миокарда, миокардит, ревматические поражения сердца, атеросклеротический кардиосклероз, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, хронические заболевания почек, сопровождающиеся потерей белка и азотемией, хронические заболевания легких, остеопороз, замедленное образование костной мозоли при больших переломах и пластических операциях на костях, миопатии, прогрессирующие мышечные дистрофии, боковой амиотрофический склероз, прогрессирующая миопатия, старческая дегенерация сетчатой оболочки глаза, экзема, псориаз, а также в качестве средства, улучшающего компенсаторные и адаптационные процессы у лиц старческого возраста и т. д.

Способ применения и дозы. Внутримышечно по 0,025—0,05 г в виде масляного раствора 1 раз в 7—10 дней. Детям из расчета 1—1,5 мг/кг в месяц, причем $^1/_3$—$^1/_4$ этой дозы вводят соответственно через каждые 7—10 дней. Курс лечения $1^1/_2$—2 мес. При необходимости лечение повторяют через месяц. Детям с церебрально-гипофизарным нанизмом препарат назначают в течение 1—2 лет.

Противопоказания. Рак предстательной железы.

Форма выпуска. Ампулы по 1 мл 1% раствора в масле, в упаковке 10 штук.

Этот препарат под названием «Нероболил» («Nerobolil») в ампулах по 1 мл 2,5% раствора в масле в упаковке по 3 штуки, поступает из Венгрии.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности феноболина 3 года, нероболила 5 лет.

ФЕНОКСИМЕТИЛПЕНИЦИЛЛИН (Phenoxymethylpenicillinum). Феноксиметилпенициллиновая кислота, продуцируемая Penicillinum notatum или другими родственными микроорганизмами и оказывающая антимикробное действие. Синонимы: Fenoxypen, V-Penicillin и др.

Фармакологическое действие. По антимикробному действию аналогичен другим препаратам бензилпенициллина. Хорошо всасывается при приеме внутрь и не разрушается в желудке. Кумулятивными свойствами не обладает. Малотоксичен.

Показания к применению. Заболевания, вызванные чувствительными к препарату микроорганизмами (пневмония, бронхит, ангина, инфекции мягких тканей, скарлатина, рожистое воспаление, гонорея и др.).

Способ применения и дозы. Внутрь (таблетки или суспензия) по

Отредактировал: ledi24

0,1—0,2 г за $^1/_2$—1 ч до еды 4—6 раз в сутки; для детей в возрасте до 1 года суточная доза составляет 25—30 мг/кг, от 1 года до 6 лет — 15—30 мг/кг, от 6 до 12 лет —10—20 мг/кг, старше 12 лет —0,5—1 г.

Побочное действие. Раздражение слизистой оболочки полости рта (стоматиты, фарингиты) и желудочно-кишечного тракта.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к препаратам пенициллина и заболевания, сопровождающиеся нарушением всасывания из желудочно-кишечного тракта.

Форма выпуска. Таблетки по 0,1 г, в упаковке 10 штук, по 0,25 г, в упаковке 10 штук. Порошок для приготовления суспензии 1,2 г (1 чайная ложка суспензии содержит 60 мг препарата).

Условия хранения. Список Б. В сухом помещении при комнатной температуре.

Срок годности. Таблетки 4 года; порошок для суспензии 2 года.

ФЕНОЛФТАЛЕИН (Phenolphtaleinum). α, α-Ди-(4-оксифенил) фталид. Синонимы: пурген, Purgyl.

Применение. Как слабительное при хронических запорах по 0,1—0,2 г на прием, детям по 0,05—0,2 г в зависимости от возраста.

Побочное действие. При длительном применении раздражение почечной ткани.

Форма выпуска. Таблетки по 0,1 г, в упаковке 24 штуки, для детей по 0,05 г, в упаковке 10 штук, порошок.

Условия хранения. В хорошо укупоренной таре.

Срок годности. Порошок не ограничен; таблетки 10 лет.

ФЕНТАНИЛ (Phentanylum). 1-(2-Фенилэтил)-4-(N-пропионилфениламино)-пиперидин. Синонимы: Fentanylcitrat, Sentonyl.

Фармакологическое действие. Синтетический анальгетик с быстрым и кратковременным действием.

Показания к применению. Для нейролептаналгезии при хирургических исследованиях, шоке, болевом синдроме различной этиологии.

Способ применения и дозы. Внутримышечно для премедикации 0,05—0,1 мг вместе с дроперидолом; при вводном наркозе внутривенно 1 мл 0,005% раствора на 5 кг массы тела; для поддержания аналгезии вводят 0,05—0,1 мг через 20—30 мин. При небольших операциях при местной инфильтрационной анестезии и купировании различных болевых синдромов (печеночная и почечная колика, послеоперационная боль и т. д.) вводят 1—3 мл.

Побочное действие. Угнетение дыхания, брадикардия, кратковременная ригидность мышц, умеренная бронхоконстрикция; возможно привыкание.

Противопоказания. Акушерские операции, угнетение дыхательного центра, бронхиальная астма, наркомания.

Форма выпуска. Ампулы по 2 мл 0,005% раствора, в упаковке 5 штук.

Условия хранения. Список А.

Срок годности 2 года.

ФЕНТОЛАМИН (Phentolaminum). 2-[N-пара-Толил-N-(метаоксифенил)-аминометил]-имидазолин. В медицинской практике применяется фентоламина гидрохлорид. Синонимы: Dibasin, Regitine.

Фармакологическое действие. α-Адреноблокатор. Расширяет периферические сосуды; несколько снижает АД; оказывает выраженное гипотензивное действие при феохромоцитоме.

Показания к применению. Нарушение периферического кровообращения (эндартериит, болезнь Рейно и др.), для предупреждения и

Отредактировал: ledi24

лечения гипертонических кризов, для диагностики феохромоцитомы и в период операции по поводу ее удаления.

Способ применения и дозы. При нарушении периферического кровообращения внутрь после еды по 0,05 г 3—4 раза в день (при необходимости дозу увеличивают до 0,1 г (взрослым) 3—5 раз в день. Курс лечения продолжается 3—4 нед.

Побочное действие. Тахикардия, головокружение, тошнота, рвота, понос, набухание слизистой оболочки носа, гиперемия и зуд кожи. Возможен ортостатический коллапс.

Противопоказания. Тяжелые органические поражения сердечно-сосудистой системы.

Форма выпуска. Таблетки, содержащие 0,025 г фентоламина гидрохлорида, в упаковке 30 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

ФЕНХЕЛЯ ПЛОДЫ (Fructus Foeniculi). Укроп аптечный. Содержит 3—6% эфирного масла, в котором до 60% анетола, жирное масло, белковые вещества. Наравне с укропом аптечным используют плоды укропа огородного (Fructus Anethi graveolentis).

Применение. В качестве ветрогонного средства при метеоризме в виде укропной воды (1 часть укропного масла на 1000 частей воды) по 1 столовой ложке 3—6 раз в день и как отхаркивающее при бронхите в виде настоя (10,0:200,0) по 1 столовой ложке 3—4 раза в день.

Форма выпуска. Плоды в упаковке по 50 г, масло во флаконах.

Условия хранения. В сухом прохладном месте.

Срок годности. Плоды 3 года, масло контролируется ежегодно.

ФЕПРАНОН (Phepranonum). 1-Фенил-2-диэтиламино-пропанола-1-гидрохлорид. Синонимы: Amfepramonum, Parabolin.

Фармакологическое действие. Анорексигенное средство.

Показания к применению. Различные формы ожирения (в том числе экзогенное); адипозогенитальная дистрофия и гипотиреоз (в комплексе с другими препаратами).

Способ применения и дозы. Внутрь за 30 мин до еды по 0,025 г 2—3 раза в день (при необходимости дозу увеличивают до 0,1 г/сут) в течение $1^1/_2$—$2^1/_2$ мес.

Побочное действие. Возможны сухость во рту, тошнота, диарея, запор, бессонница, раздражительность.

Противопоказания. Во избежание нарушения сна не следует назначать препарат во второй половине дня.

Форма выпуска. Драже по 0,025 г, в упаковке 50 штук.

Условия хранения. Список А. В защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

ФЕПРОМАРОН (Phepromaronum). 3-(α-Фенил-β-пропионил-этил)-4-оксикумарин.

Фармакологическое действие. Антикоагулянт непрямого действия.

Применение. В тех же случаях, что и неодикумарин. Назначают внутрь в первые дни по 0,03—0,05 г/сут, затем 0,01—0,005 г 1 раз в день или через день.

Побочное действие и противопоказания те же, что и для неодикумарина.

Форма выпуска. Таблетки по 0,01 г, в упаковке 20 штук.

Условия хранения. Список А. В защищенном от света месте.

Срок годности 4 года.

Отредактировал: ledi24

ФЕРАКРИЛ (Feracrylum). Неполная железная соль полиакриловой кислоты.

Фармакологическое действие. Гемостатик местного значения. Обладает бактерицидной и бактериостатической активностью в отношении ряда грамположительных и грамотрицательных микробов, дает местный обезболивающий эффект.

Показания к применению. В качестве наружного гемостатического средства у взрослых и детей, включая больных с нарушением свертывающей системы крови.

Способ применения и дозы. Не нарушая стерильность, 1% раствором смачивают марлевые или ватные тампоны и, слегка отжав, прикладывают их к предварительно осушенной поверхности. Для остановки кровотечения после экстракции зуба тампон, смоченный раствором, прижимают к кровоточащему месту в течение 5—10 мин.

Противопоказания. Нельзя применять одновременно с эпсилон-аминокапроновой кислотой.

Форма выпуска. Ампулы по 10 мл 1% раствора, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В сухом, защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

ФЕРАМИД (Ferramidum). Комплексное соединение железа хлорида с никотинамидом.

Фармакологическое действие. Стимулятор функции кроветворных органов.

Показания к применению. Постгеморрагические анемии, железодефицитные анемии различного происхождения.

Способ применения и дозы. Назначают внутрь (после еды), взрослым по 0,1 г 3 раза в день; детям до 1 года — по 0,01 г 2 раза в день, от 1 года до 3 лет — по 0,02 г 2—3 раза в день; от 3 до 7 лет — по 0,02 г 3—4 раза в день. Курс лечения 3—4 нед.

Побочное действие. Запоры.

Противопоказания не установлены.

Форма выпуска. Таблетки по 0,1 г, в упаковке 100 штук.

Условия хранения. В сухом месте.

Срок годности 2 года.

ФЕРБИТОЛ (Ferbitolum). Водный раствор железо-сорбитолового комплекса, содержащий 4,5—5% железа.

Фармакологическое действие. Оказывает противоанемическое действие.

Показания к применению. Гипохромная железодефицитная анемия различной этиологии (постгеморрагическая, гастрогенная, агастральная, анентеральная, хлороз и др.), особенно при плохой переносимости препаратов железа, применяемых внутрь. Детям при железодефицитной анемии, связанной с дефектами вскармливания, алиментарно-инфекционными заболеваниями, а также при анемии у недоношенных.

Способ применения и дозы. Внутримышечно взрослым ежедневно по 2 мл. Курс лечения 15—25 инъекций в зависимости от тяжести анемии. Детям до 2 лет — по 0,5—1 мл, старше 2 лет —1—2 мл. При болезненности в месте инъекции препарат вводят с раствором новокаина.

Побочное действие. Возможна тошнота, однако это не требует отмены препарата.

Противопоказания. Острые и хронические заболевания печени, гемохроматоз.

Форма выпуска. Ампулы по 2 мл, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. При температуре не выше 20°С.

Срок годности 2 года.

Отредактировал: ledi24

ФЕРЕЗОЛ (Pheresolum). Гомогенная смесь, состоящая из 60% фенола и 40% трикрезола.

Фармакологическое действие. Обладает прижигающими и бактерицидными свойствами. При контакте с тканями организма препарат вызывает химический ожог.

Показания к применению. Папилломы, остроконечные кондиломы кожи, кератомы, бородавки, сухие мозоли.

Способ применения и дозы. Предназначен лишь для наружного применения и используется только в лечебных учреждениях. Препарат наносят точно на обрабатываемый участок, не допуская попадания его на соседние участки и особенно на слизистые оболочки.

Папилломы, бородавки, кондиломы смазывают препаратом непрерывно 10—60 мин (в зависимости от их размеров). У папиллом, имеющих тонкую ножку, смазывают только ножку. Повторную обработку проводят через 6—8 дней после отпадения струпа.

Бородавки на кистях, кератомы, сухие мозоли с ороговением предварительно размягчают распариванием, а затем смазывают ферезолом непрерывно в течение часа. При необходимости через 2 нед указанную процедуру можно повторить. Допускается проведение 4—5 процедур.

Меры предосторожности. Нельзя допускать попадания препарата на слизистые оболочки, особенно на слизистую оболочку глаза.

Недопустимо бинтование участков, обработанных препаратом, и удаление струпа; нельзя повторно наносить препарат раньше сроков, указанных выше. Одежда из синтетических тканей не должна прикасаться к участку кожи, обработанному препаратом.

Обработанный участок кожи должен высохнуть на воздухе во избежание явлений дерматита. Участок, на который наносили ферезол, нельзя смазывать какими-либо мазями, мытье водой допустимо.

При правильном применении препарат не оставляет рубцов.

Побочное действие. Обработка очагов вблизи глаза может вызвать отек клетчатки, который проходит самостоятельно.

Противопоказания. Невусы. Нельзя наносить препарат на поверхность кожи площадью свыше 20 $см^2$.

Форма выпуска. Стеклянные флаконы по 10 г.

Условия хранения. Список Б. В закрытом виде при обычных условиях.

Срок годности 5 лет.

«ФЕРРОКАЛЬ» («Ferrocalum»). Состав: железа закисного сульфата 0,2 г, кальция фруктозодифосфата 0,1 г, лецитина 0,02 г.

Применение. При различных формах вторичного малокровия (гипохромных анемиях), астении после инфекционных заболеваний и др. внутрь по 2—6 таблеток 3 раза в день.

Форма выпуска. Таблетки, покрытые оболочкой, в упаковке 40 штук.

Условия хранения. В хорошо укупоренной таре.

Срок годности 2 года.

«ФЕРРОПЛЕКС» («Ferroplexum»). Состав одного драже: аскорбиновой кислоты 30 мг, сульфата железа 50 мг.

Фармакологическое действие. Стимулирует гемопоэз.

Показания к применению. Различные формы железодефицитной анемии.

Способ применения и дозы. Внутрь взрослым по 1—2 драже 3 раза в день, детям — по 1 драже 3 раза в день.

Форма выпуска. Драже, в упаковке 100 штук.

Отредактировал: ledi24

Условия хранения. Обычные.
Срок годности 5 лет.
Поставляется из Венгрии.

«ФЕРРОЦЕРОН» («Ferroceronum»). Натриевая соль ортокарбоксибензоилферроцена. Синоним: эритростимулин.

Фармакологическое действие. Стимулирует процессы кроветворения.

Показания к применению. В комплексе с другими стимуляторами кроветворения для профилактики и лечения гипохромной железодефицитной анемии, при озене.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,3 г 3 раза в день через 15—20 мин после еды в течение 30 дней.

Побочное действие. Окрашивание мочи в красноватый цвет; в первые дни лечения возможна тошнота.

Форма выпуска. Таблетки по 0,3 г, в упаковке 50 штук, таблетки, покрытые оболочкой, по 0,1 г, в упаковке 100 штук для детей.

Условия хранения. В защищенном от света месте.

Срок годности. Таблетки 4 года; покрытые оболочкой, 3 года.

ФЕРРУМ ЛЕК (Ferrum Lek). Одна ампула для внутримышечного введения (2 мл) содержит 100 мг железа в виде ферри-поли-изомальтозата; одна ампула для внутривенного введения (5 мл) содержит 100 мг железа в виде ферри-сахарата.

Фармакологическое действие. Способствует быстрому восстановлению железа при недостатке его в организме.

Показания к применению. Железодефицитные анемии различной этиологии.

Способ применения и дозы. Глубоко внутримышечно через день по 2 мл. Максимальная суточная доза при внутримышечном введении для взрослых —4 мл, для детей с массой тела до 5 кг —0,5 мл, детям с массой тела 5—10 кг —1 мл. Внутривенно взрослым — в 1-й день 2,5 мл (1/2 ампулы), на 2-й день —5 мл (1 ампула) и 3-й —10 мл (2 ампулы), далее 2 раза в неделю по 10 мл.

Побочное действие. После первой инъекции рекомендуется наблюдать за больными с целью выявления реакции на препарат.

Противопоказания. Гемохроматоз и гемосидероз, а также анемии, не связанные с дефицитом железа.

Форма выпуска. Ампулы по 2 мл раствора для внутримышечного введения, в упаковке 50 штук; ампулы по 5 мл раствора для внутривенного введения, в упаковке 50 штук.

Условия хранения. При температуре до 25°С.

Срок годности. Ампульные растворы для внутривенного введения 3 года, для внутримышечного введения 5 лет.

Поставляется из Югославии.

ФЕСТАЛ (Festal).

Фармакологическое действие. Препарат стандартизованных панкреатических ферментов (липаза, амилаза, протеаза), гемицеллюлазы и высушенной бычьей желчи. Способствует расщеплению и усвоению продуктов, содержащих жиры, белки, углеводы и растительные балластные вещества (гемицеллюлозу).

Показания к применению. Относительная или абсолютная секреторная недостаточность поджелудочной железы различной этиологии, метеоризм вследствие холецистита, аэрации кишечника перед рентгенограммой, гастроинтестинальные расстройства в результате лечения

Отредактировал: ledi24

парааминосалициловой кислотой и антибиотиками с широким спектром действия, повреждения жевательного аппарата, недостаточность пищеварения в преклонном возрасте.

Способ применения и дозы. Внутрь по 1—2 драже во время или после еды 3 раза в день.

Противопоказания не установлены.

Форма выпуска. Драже, в упаковке 100 штук.

Условия хранения. Обычные.

Срок годности 3 года.

Поставляется из Германии, Индии.

Аналогичный препарат под названием **«Дигестал»** (Digestal) в драже по 30 штук в упаковке поступает из Югославии.

Срок годности 3 года.

ФЕТАНОЛ (Phethanolum). 1-(мета-Оксифенил)-2-(этиламино)-этанола гидрохлорид. Синонимы: этиладрионол, эффортил и др.

Фармакологическое действие. По химическому строению и действию на организм близок к мезотону, повышает АД в меньшей степени, но на более длительный срок.

Показания к применению. Гипотония различного происхождения, шок, коллапс.

Способ применения и дозы. Внутрь по 5 мг 2—3 раза в день при необходимости в течение нескольких недель. Парентерально: по 1 мл 1% раствора под кожу, внутримышечно или медленно в вену. Можно вводить в вену капельно в 5% растворе глюкозы или в изотоническом растворе хлорида натрия (из расчета 1 мл 1% раствора фетанола на 100 мл раствора; всего вводят до 300 мл, т. е. 30 мг препарата).

Побочное действие. При быстром внутривенном введении головная боль.

Противопоказания. Выраженный атеросклероз, гипертоническая болезнь (за исключением случаев коллапса). Необходима особая осторожность при склонности к ангиоспазмам.

Форма выпуска. Порошок, таблетки, покрытые оболочкой, по 0,005 г, в упаковке 20 штук, в ампулах по 1 мл 1% раствора, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности. Порошок 3 года; ампулы и таблетки 2 года.

ФЕТИМИН (Fetimin). Синоним: нафтифин.

Фармакологическое действие. Препарат обладает фунгицидным действием в отношении дерматофитов и фунгистатическим действием в отношении условно-патогенных грибов. Всасывание через кожу минимально, и поэтому фетимин не оказывает системного воздействия. Имеет и противовоспалительные свойства.

Показания к применению. Поверхностные и более глубокие грибковые поражения кожи, волосистой части головы и ногтей, вызванные дерматофитами или грибками молочницы.

Способ применения и дозы. Крем наносится тонким слоем, а затем осторожно втирается в пораженный участок кожи и в здоровые пограничные участки. При лечении онихомикоза рекомендуется наносить препарат дважды в день, закрывая пораженный ноготь глухой повязкой. Терапия длится две недели после исчезновения симптомов заболевания. Лечение дерматофитоза обычно длится 2—4 недели, а в тяжелых случаях до 8 недель. При кожных инфекциях, вызванных Candida spp., терапия проводится 4 недели, при питириазе—2 недели, при онихомикозе — до 6 месяцев.

Отредактировал: ledi24

Побочное действие. Незначительное жжение, а также сухость обрабатываемых участков кожи.

Противопоказания. Гиперчувствительность к препарату.

Форма выпуска. Тубы 15 г 1% крема.

Производится фирмой «КРКА», Словения в сотрудничестве с фирмой «Biochemie Ges. m. b. H.», Австрия.

ФИАЛКИ ТРАВА (Herba Violae). Трава фиалки трехцветной (анютины глазки, Иван-да-Марья) (Viola tricolor L.). Содержит гликозид, отщепляющий метиловый эфир салициловой кислоты; флавоноиды (рутин, виолокверцитин); антоциановый гликозид виоланин; аскорбиновую кислоту; сапонины.

Применение. В качестве отхаркивающего средства при бронхите в виде настоя (10,0:100,0) по 1 столовой ложке 3 раза в день.

Форма выпуска. Трава резаная в картонных коробках по 100 г

Условия хранения. В сухом, проветриваемом помещении.

Срок годности $1^1/_2$ года.

ФИБРИНОЛИЗИН (Fibrinolysinum). Сухой белковый препарат естественного фермента, выделенного из плазмы донорской крови. Аналогичные препараты выпускают за рубежом (Actase, Thrombolysin).

Фармакологическое действие. Фармакологический компонент естественной противосвертывающей системы организма, в основе действия которого лежит способность растворять нити фибрина.

Показания к применению. Тромбоэмболия легочной и периферических артерий, тромбоэмболия сосудов мозга, свежий инфаркт миокарда, острый тромбофлебит, обострение хронического тромбофлебита.

Способ применения и дозы. Внутривенно (капельно) в изотоническом растворе хлорида натрия (100—160 ЕД препарата в 1 мл раствора) с добавлением гепарина (до 20 000—40 000 ЕД).

Побочное действие. Неспецифические реакции на белок (гиперемия лица, боль по ходу вены, боль за грудиной и в животе, озноб, повышение температуры тела, крапивница и др.).

Противопоказания. Геморрагические диатезы, кровотечения, открытые раны, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, нефрит, фибриногенопения, туберкулез (острая форма), лучевая болезнь.

Форма выпуска. Во флаконах по 20 000 ЕД, в ампулах по 300 ЕД.

Условия хранения. При температуре от 2 до 10°С.

Срок годности 2 года.

ФИБС (Fibs). Препарат, получаемый из отгона лиманной грязи; содержит коричную кислоту и кумарины.

Фармакологическое действие. Биогенный стимулятор.

Показания к применению. Блефарит, конъюнктивит, кератит, помутнение стекловидного тела, миопический хориоретинит, артриты, радикулиты, миалгии и др.

Способ применения и дозы. Подкожно по 1 мл ежедневно в течение 30—35 дней.

Противопоказания те же, что и для применения торфота.

Форма выпуска. Ампулы по 1 мл, в упаковке 5 штук.

Условия хранения. В защищенном от света месте.

Срок годности 4 года.

Отредактировал: ledi24

ФИНОПТИН (Finoptin). 5-[(3,4-Диметоксифенэтил)-метиламино]-2-(3,4-диметоксифенил)-2-изопропилвалеронитрила гидрохлорид. Синонимы: Isoptin, Verpamil.

Фармакологическое действие. Расширяет коронарные сосуды и увеличивает коронарный кровоток. Оказывает также антиаритмическое, натрийуретическое и диуретическое действие.

Показания к применению. Коронарная недостаточность, пароксизмальная тахикардия, тахиаритмия, предсердная, суправентрикулярная экстрасистолия, постинфарктный период; для профилактики инфаркта миокарда.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,04—0,08 г 3 раза в день, внутривенно (медленно) по 2—4 мл 0,25% раствора 1—3 раза в день.

Побочное действие. Тошнота, головокружение.

Противопоказания. Кардиогенный шок, нарушения атриовентрикулярной проводимости. Не следует комбинировать финоптин с β-адреноблокаторами, особенно у больных с синдромом слабости синусового узла.

Форма выпуска. Таблетки по 0,04 г, в упаковке 100 штук; 0,25% раствор в ампулах по 2 мл, содержащих 5 мг препарата, в упаковке по 25 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Финляндии.

ФИТИН (Phytinum). Смесь кальциевых и магниевых солей различных инозитфосфорных кислот, в основном инозитгексафосфорной кислоты.

Фармакологическое действие. Стимулирует кроветворение, усиливает рост и развитие костной ткани, улучшает деятельность нервной системы при заболеваниях, связанных с недостатком фосфора в организме.

Показания к применению. Заболевания нервной системы, гипотония, истерия, неврастения, упадок питания, рахит, остеомаляция, диатезы и др.

Способ применения и дозы. Назначают внутрь по 0,25—0,5 г 3 раза в день в течение 6—8 нед.; детям в зависимости от возраста по 0,05—0,5 г на прием.

Форма выпуска. Порошок, таблетки по 0,25 г, в упаковке 40 штук.

Условия хранения. В сухом месте.

Срок годности. Порошок и таблетки 10 лет.

ФИТОЛИЗИН (травяная паста) (Phytolysinum). Смесь водных травяных экстрактов и эфирного масла, содержащая производные флавона, инозит, силикаты, сапонины, цинеол, борнеол, терпинеол, камфен и др.

Фармакологическое действие. Оказывает мочегонное, противовоспалительное, болеутоляющее и бактериостатическое действие, а также облегчает разрыхление и удаление мочевых конкрементов.

Показания к применению. Воспаление мочевыводящих путей, почек, почечных лоханок и мочевого пузыря.

Способ применения и дозы. Чайную ложку пасты растворяют в $^1/_2$ стакана теплой сладкой воды. Принимают 3—4 раза в день после еды.

Форма выпуска. Травянистая паста по 100 г

Отредактировал: ledi24

Условия хранения. В прохладном месте.
Срок годности 3 года.
Поставляется из Польши.

ФИТОМЕНАДИОН (Phytomenadionum). (Витамин K_1)-2-метил-3-фитил-1,4-нафтохинон.

Фармакологическое действие. Обладает коагуляционной и антигеморрагической активностью. Эффективен при алиментарной К-витаминной недостаточности.

Показания к применению. С лечебной целью при геморрагическом синдроме с гипопротромбинемией, вызванном нарушением функции печени (гепатиты, циррозы печени) и некоторыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, колит и др.). При геморрагиях, связанных с применением (передозировкой, индивидуальной повышенной чувствительностью) антикоагулянтов непрямого действия (кумаринового и индандионового ряда), антибиотиков, салицилатов, сульфаниламидов, транквилизаторов. С профилактической целью назначают перед тяжелыми операциями для уменьшения кровоточивости.

Способ применения и дозы. Внутрь через 30 мин после еды по 0,01—0,02 г 3—4 раза в день (в отдельных случаях до 6 раз в день). Дозы и длительность курса лечения индивидуальны и зависят от показателей гемокоагуляции.

При передозировке препаратов, перечисленных выше, курс лечения от 2 до 5 дней (реже до 10 дней), при заболеваниях печени и желудочно-кишечного тракта — от 7 до 25 дней.

При профилактическом применении назначают по 0,03 г/сут в течение 3—4 дней перед операцией.

Форма выпуска. В капсулах по 0,01 г (10% масляного раствора), в упаковке 10 штук.

Условия хранения. В сухом, защищенном от света месте при комнатной температуре.

Срок годности 2 года.

«ФИТОФЕРРОЛАКТОЛ» («Phytoferrolactolum»). Состав: фитина 0,2 г, железа лактата 0,2 г.

Применение. При заболеваниях, связанных с истощением нервной системы, анемии, общем упадке питания по 1 таблетке 3 раза в день.

Форма выпуска. Таблетки в упаковке по 30 штук.

Условия хранения. В защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

ФЛАВИНАТ (Flavinatum). Динатриевая соль флавинадениндинуклеотида.

Фармакологическое действие. Уменьшает или устраняет гипо- и авитаминоз B_2.

Показания к применению. Гипо- и авитаминоз B_2, абиотрофические и дистрофические процессы в сетчатой оболочке глаза, глаукома, кожная печеночная форма порфирии, псориаз, себорея, стрептодермии, хронические заболевания печени, поджелудочной железы и кишечника, длительная лекарственная терапия.

Способ применения и дозы. При офтальмологических заболе-

Отредактировал: ledi24

ваниях под конъюнктиву глаза по 0,0006 г флавината (0,3 мл 0,2% раствора) через день; на курс назначают 10—15 инъекций. При глаукоме вводят внутримышечно по 0,002 г ежедневно в течение 10 дней. При порфирии внутримышечно по 0,002 г 3 раза в день в течение месяца. При кожных заболеваниях, заболеваниях печени, поджелудочной железы и кишечника по 0,002 г 1—2 раза в сутки, при циррозах печени — по 0,001 г ежедневно или через день. Детям — по 0,001—0,002 г/сут. Курс лечения —5—40 дней. При длительной лекарственной терапии флавинат вводят внутримышечно по 0,001—0,002 г 1 раз в день ежедневно в течение всего курса лечения.

Побочное действие. При введении раствора флавината под конъюнктиву глаза возможны головная боль, головокружение, слезотечение.

Форма выпуска. Лиофилизированный порошок в ампулах по 0,002 г в комплекте с 0,09% изотоническим раствором натрия хлорида по 2 мл, в упаковке по 5 комплектов.

Условия хранения. В защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

«ФЛАКАРБИН» ГРАНУЛЫ («Flacarbinum» granulae). Комбинированный препарат, каждые 100 г которого содержат ликуразида и кверцетина по 2 г, натрия карбоксиметилцеллюлозы и пектина по 10 г, глюкозы 76 г.

Фармакологическое действие. Оказывает противовоспалительное и спазмолитическое действие, обладает капилляроукрепляющей и послабляющей активностью.

Показания к применению. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.

Способ применения и дозы. Внутрь по $^1/_2$ чайной ложки 3 раза в день перед едой. Запивают теплой водой ($^1/_3$—$^1/_2$ стакана). Курс лечения 3—4 нед.

Побочное действие не установлено.

Форма выпуска. В стеклянных банках по 35 г

Условия хранения. В сухом, защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

ФЛАКУМИН (Flacuminum). Сумма флавоноловых агликонов, получаемая из листьев скумпии (Cotinus coggygria scop.).

Фармакологическое действие. Обладает желчегонным свойством, оказывая спазмолитическое действие на желчные пути и способствуя выделению желчи из желчного пузыря.

Показания к применению. В качестве желчегонного средства при заболеваниях печени и желчевыводящих путей, особенно при их дискинезии.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,02—0,04 г (1—2 таблетки) за 30 мин до еды 2—3 раза в день. Курс лечения 3—4 нед.

Противопоказания. Острый гепатит, острая и подострая дистрофия печени, обтурационная желтуха.

Форма выпуска. Таблетки, покрытые оболочкой, по 0,02 г, в упаковке 30 штук.

Условия хранения. Список Б. В сухом, защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

Отредактировал: ledi24

ФЛАМИН (Flaminum). Сумма флавонов бессмертника песчаного (Helichrysum arenarium, DS)

Применение. Внутрь как желчегонное средство при хронических гепатохолециститах и холециститах по 0,05 г 3 раза в день за 30 мин до еды с небольшим количеством воды в течение 10—40 дней.

Форма выпуска. Таблетки по 0,05 г, в упаковке 20 штук.

Условия хранения. В сухом, защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

ФЛОВЕРИН (Phloverinum). Природная смесь дигидросамидина и виснадина, полученная из корней вздутоплодника сибирского (Phlogodicarpus sibiricus).

Фармакологическое действие. Обладает спазмолитическими свойствами.

Показания к применению. Взрослым как спазмолитическое средство при спазмах периферических сосудов, спастических формах эндартериита, болезни Рейно и при легких формах хронической коронарной недостаточности.

Способ применения и дозы. Внутрь после еды по 2 таблетки 2—3 раза в день. Курс лечения 3—4 нед. При необходимости через 1—2 мес курс лечения можно повторить.

Побочное действие. Возможно кратковременное головокружение, проходящее после отмены препарата.

Противопоказания. Гипотония, метеоризм и наклонность к атоническим запорам.

Форма выпуска. Таблетки по 0,05 г, в упаковке 100 штук.

Условия хранения. В защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

ФЛОРЕНАЛЕВАЯ МАЗЬ (Unguentum Florenali). Бисульфитное соединение 2-флуоренонилглиоксаля.

Фармакологическое действие. Оказывает нейтрализующее действие в отношении вируса Herpes simplex, Herpes zoster.

Показания к применению. Вирусные заболевания глаз.

Способ применения и дозы. При вирусном кератоконъюнктивите и кератите, вызванном вирусом простого герпеса и Herpes zoster, закладывают за веки 0,5% мазь вначале 3 раза в день, а затем 1—2 раза в день. Длительность лечения при поверхностных конъюнктивитах 10—14 дней, при глубоких —1—1½ мес. При отсутствии эффекта в течение 10 дней рекомендуются другие методы лечения.

Побочное действие. Чувство жжения, быстро исчезающее. При развитии дерматоза мазь отменяют.

Противопоказания не установлены.

Форма выпуска. Мазь 0,5% в алюминиевых тубах по 10 г.

Условия хранения. Список Б. При температуре не выше 20°С.

Срок годности 2 года.

ФЛОРИМИЦИНА СУЛЬФАТ (Florimycini sulfas). Антибиотик, продуцируемый Streptomyces floridae, Streptomyces puniceus, Streptomyces vinaceus. Синонимы: Viomycinum sulfuricum, Geliomycin, Viocin.

Фармакологическое действие. Обладает антибактериальной активностью в отношении микобактерий туберкулеза.

Показания к применению. Различные формы и локализации тубер-

Отредактировал: ledi24

кулеза, преимущественно в случаях устойчивости возбудителя к противотуберкулезным препаратам I ряда.

Способ применения и дозы. Внутримышечно по 500 000 ЕД (0,5 г) 2 раза в день в течение 6 дней, на 7-й день перерыв. Лечение длительное. Суточная доза для взрослых 1 г, детям 0,015—0,02 г/кг (но не более 0,75 г).

Побочное действие. Нейро- и нефротоксичность и нарушение электролитного баланса.

Противопоказания. Поражения VIII пары черепных нервов, нарушение функции почек, а также сочетание с канамицином, мономицином и неомицином.

Форма выпуска. Стерильный порошок во флаконах по 0,5 г и по 1 г.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте при температуре не выше 20°С.

Срок годности 3 года.

«ФОГЕМ» («Fogemum»). Линимент состава: гемин — 0,1 г, диметилсульфоксид (ДМСО) — 60 г, кальция стеарат — 20 г, вода дистиллированная —20 г.

Фармакологическое действие. Обладает фотозащитной активностью, способен полностью блокировать развитие фотодинамического воспаления кожи, обеспечивая защиту кожных покровов от лучей, воздействующих на молекулы порфиринов.

Показания к применению. В качестве лечебного и профилактического средства при фотодерматозах (дискоидная красная волчанка, солнечная экзема, солнечная почесуха), связанных с нарушением порфиринового обмена.

Способ применения и дозы. Наносят на предварительно вымытую кожу, равномерно и быстро втирая. При поражении лица наносят на всю его поверхность, при других локализациях — только на пораженные участки кожи. В течение 1-й недели следует втирать в кожу в количестве 0,1—0,2 г 3 раза в день; в течение 2-й недели применяют в тех же дозах 1—2 раза в день, далее — в поддерживающей дозе —0,1 г 1 раз в 2—3 дня. Контролем служит степень пигментации кожи лица. При необходимости можно применять в указанных выше дозах 2—3 раза в день в течение 3—4 нед. Для профилактики обострений болезни фогем применяют 2—3 раза в неделю в течение всего весенне-летнего периода.

Побочное действие. Иногда местно ощущается жжение и слабый металлический привкус во рту, исчезающий через несколько минут после применения. При передозировке интенсивность и длительность ощущения жжения возрастают в зависимости от степени передозировки. При недостаточно тщательном втирании линимента после его всасывания на поверхности кожи могут появиться белесые пятна, которые легко удаляются с поверхности кожи ватным тампоном.

Форма выпуска. Линимент 0,1% в упаковке по 30 г.

Условия хранения. При температуре не ниже 20°С.

Срок годности 2 года.

ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТА (Acidum folicum). N-[4'-[(2-Амино-4-окси-6-птеридил)-метил]-амино]-бензоил-L (+)-глутаминовая кислота. Синонимы: фолацин, витамин B_c. Недостаток фолиевой кислоты нарушает нормальное кроветворение, задерживает превращение мегалобластических форм эритроцитов в нормобластические.

Фармакологическое действие. Вместе с цианокобаламином стиму-

Отредактировал: ledi24

лирует эритропоэз. Участвует в синтезе аминокислот, нукленновых кислот, пуриновых и пиримидиновых оснований.

Показания к применению. Мегалобластическая анемия у беременных. Алиментарная макроцитарная анемия у взрослых и у детей. Спру Макроцитарная анемия после резекции желудка. Анемия при хроническом алкоголизме. Лейкопении при ионизирующем облучении, рентгенотерапии, приеме сульфанниламидов.

Способ применения и дозы. Внутрь взрослым по 0,0005—0,001 г (0,5—1 мг) 1—2 раза в день. Детям соответственно меньшие дозы. Курс лечения 20 дней.

Побочное действие. Аллергические реакции, крапивница.

Форма выпуска. Порошок, таблетки по 0,001 г, в упаковке 50 штук.

Условия хранения. В хорошо укупоренной таре в защищенном от света месте.

Срок годности. Порошок 3 года, таблетки 3 года.

ФОЛЛИКУЛИН (Folliculinum). Естественный фолликулярный гормон. Синонимы: Estrone, Folestrin.

Фармакологическое действие. Оказывает специфическое эстрогенное действие.

Показания к применению. Заболевания, сопровождающиеся недостаточной функцией яичников, кожные болезни (угри, вирильный гипертрихоз и др.).

Способ применения и дозы. Внутримышечно 5000—20 000 ЕД; при кожных заболеваниях наружно.

Побочное действие. При длительном применении маточные кровотечения.

Противопоказания. Новообразования половых органов, молочных желез и других органов (у женщин в возрасте до 60 лет), мастопатия, эндометрит, склонность к маточным кровотечениям, гиперэстрогенная фаза климакса.

Форма выпуска. Масляный раствор в ампулах по 1 мл 0,05% (5000 ЕД), в упаковке 6 штук и 0,1% (10 000 ЕД), в упаковке 10 штук.

Условия хранения. В сухом прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 5 лет.

ФОПУРИН (Phopurinum). 6-Диэтиленимидофосфамидо-2-диметиламино-7-метилпурин.

Фармакологическое действие. Обладает противоопухолевой активностью и, в частности, способен подавлять лейкозный процесс. В организме метаболизируется с образованием вещества, обладающего свойствами антиметаболита (аналог аденина) и способного тормозить развитие опухолевого процесса. Достоинством фопурина при лечении острых процессов является парентеральный путь введения, обеспечивающий более быстрое наступление терапевтического эффекта.

Показания к применению. Острый лейкоз, хронический миелолейкоз, кожные «ретикулезы» (кожные проявления гемобластозов) и ретинобластома.

Способ применения и дозы. Препарат вводят внутривенно или внутримышечно. Непосредственно перед применением содержимое ампулы (40 мг препарата) растворяют в изотоническом растворе хлорида натрия, воде для инъекций или 0,5% растворе новокаина (при внутримышечном введении). Фопурин растворяется медленно. В момент внутривенного введения препарата и в течение 1—1½ ч после него больной должен находиться в горизонтальном положении (возможность ортостатической гипотонии).

При остром лейкозе вводят ежедневно по 40—120 мг в зависимости

Отредактировал: ledi24

от переносимости. Начинают лечение с 40 мг и при хорошей переносимости дозу увеличивают до 60, 80, 100 или 120 мг (обычно 1,2—1,5 мг/кг) Курсовая доза составляет 1—3 г. Детям с острым лейкозом препарат назначают по 5—30 мг 1 раз в сутки. В течение курса лечения производят 20—40 инъекций (500—700 мг препарата).

При кожных «ретикулезах» фопурин назначают ежедневно в нарастающих дозах —20, 40, 60, 80, 100 и 120 мг (внутримышечное введение допустимо только до 60 мг, введение препарата в более высоких дозах сопровождается болезненностью в месте инъекции). Курсовая доза составляет 1,5—3 г.

При ретинобластоме фопурин вводят внутримышечно 1 раз в день в первоначальной суточной дозе 5 мг/кг в течение 5 дней. В дальнейшем при хорошей переносимости дозу увеличивают каждые 5 дней на 5 мг, но не более чем до 40 мг на инъекцию. В течение курса лечения производят 10—60 инъекций.

В случае необходимости при всех упомянутых заболеваниях проводят повторные курсы лечения.

Побочное действие. Возможны головная боль, головокружение, умеренные диспептические явления, сонливость, ощущение жжения, тяжести и тепла в конечностях, чувство опьянения, онемения кожи в области спины, аллергические явления, ортостатическая гипотония. При повышенной чувствительности больных или при передозировке фопурина возможно угнетение кроветворения (лейкопения, тромбоцитопения). В этом случае проводят соответствующие мероприятия, направленные на стимуляцию гемопоэза.

Противопоказания. Заболевания печени и почек с нарушением их функции, резко выраженные лейкопения и тромбоцитопения, терминальное состояние у больных.

Форма выпуска. В лиофилизированной форме в ампулах по 0,04 г, в упаковке 10 ампул.

Условия хранения. Список А. В защищенном от света месте при температуре не выше 10°С.

Срок годности 2 года.

ФОРМАЛИН (Formalinum). 40% раствор формальдегида.

Фармакологическое действие. Дезинфицирующее и дезодорирующее средство.

Применение. Для мытья рук и обмывания кожи при повышенной потливости (0,5—1% растворы), спринцеваний (1:2000—1:3000), дезинфекции инструментов (0,5% раствор).

Форма выпуска. Во флаконах по 100 г 10% раствора.

Условия хранения. В защищенном от света месте.

ФОРМИДРОН (Formidronum). Состав: формалина 10 частей, спирта этилового 96% 40 частей, воды 50 частей, одеколона 0,5 части.

Применение. Наружно при повышенной потливости.

Форма выпуска. Во флаконах по 50 мл.

Срок годности 4 года.

ФОСФАДЕН (Phsphadenum). Аденозин-5′-монофосфат, или монофосфорный эфир 9-β-Д-рибофуранозида аденина. Синоним: Adenyl.

Фармакологическое действие. Обладает антиагрегационными свойствами, вследствие чего улучшает макро- и микроциркуляцию. Усиливает трофику тканей и процессы регенерации, оказывает сосудорасширяющее действие.

Показания к применению. Острая перемежающаяся порфирия и свинцовое отравление с выраженным полиневритическим синдромом;

Отредактировал: ledi24

различные сосудистые заболевания конечностей; острая артериальная непроходимость, пред- и послеоперационные периоды венэктомии; хронические облитерирующие заболевания артерий конечностей, тромбофлебит, хроническая венозная недостаточность, вторичные сосудистые синдромы; послеожоговые осложнения, гепато-церебральные дистрофии и другие наследственные заболевания центральной нервной системы; комплексная терапия некоторых заболеваний печени, сердца, острый радикулит; астенический синдром.

Способ применения и дозы. Фосфаден применяют внутрь, его динатриевую соль — внутримышечно. При порфирии и сосудистых заболеваниях конечностей лечение начинают с введения динатриевой соли фосфадена внутримышечно по 0,04—0,06 г 2—5 раз в день, далее курс инъекций сокращают и переходят к приему фосфадена внутрь по 0,05 г 2—3 раза в день. При других заболеваниях фосфаден назначают внутрь по 0,025—0,05 г 2 раза в день.

Побочное действие. Головокружение, тошнота, тахикардия, аллергические реакции.

Форма выпуска. Таблетки по 0,05 г, в упаковке 50 штук; динатриевая соль фосфадена в виде 2% раствора в ампулах по 1 мл, в упаковке 10 штук.

Этот препарат под названием **«Аденил»** (Adenyl) в ампулах по 2,5 мл 2% раствора, в упаковке 10 ампул, поступает из-за рубежа.

Условия хранения. В сухом, защищенном от света месте.

Срок годности. Фосфадена в ампулах и таблетках 3 года, аденила в ампулах 5 лет.

ФОСФАКОЛ (Phosphacolum). Диэтил-(пара-нитрофенил)-фосфат. Синонимы: Mintacol, Soluglaucit.

Фармакологическое действие. Обладает выраженной антихолинэстеразной активностью.

Показания к применению. Глаукома; в качестве миотического средства.

Способ применения и дозы. В виде глазных капель 0,013% раствора по 2 капли 2 раза в день.

Побочное действие. Боль в глазу, подергивание век, гиперемия слизистой оболочки глаз, головная боль.

Форма выпуска. Во флаконах по 10 мл 0,013% раствора.

Условия хранения. Список А. В прохладном месте.

Срок годности 3 года.

ФОСФАЛЮГЕЛЬ (Phosphalugel). Состав: гель фосфата алюминия в форме гидрофильных коллоидных мицелл 8,8 г, гель пептина и агар-агара с корригирующим веществом до 16 г, консерванты — сорбиновая кислота, метил- и пропил-пара-оксибензоат, отдушка — натуральная апельсиновая эссенция до 16 г.

Фармакологическое действие. Обладает буферно-антацидным, обволакивающим, адсорбирующим, антипептическим свойством. Наличие фосфата алюминия в препарате поддерживает pH содержимого желудка в физиологических пределах и не вызывает дополнительной секреции хлористоводородной кислоты. Антацидное действие препарата проявляется также в толстой кишке. Благодаря большой адсорбционной способности геля фосфата алюминия происходит связывание бактерий, вирусов, токсинов, газов и выведение их из пищеварительного тракта, а также создается защитная пленка на слизистой оболочке на всем протяжении кишечника.

Показания к применению. Язвенная болезнь желудка и двенадцати-

Отредактировал: ledi24

перстной кишки, колит, дивертикулиты кишечника, сигмоидит, отравление кислотами, щелочами, ядами и др.

Способ применения и дозы. Назначают внутрь за 30 мин до еды по 1—2 пакета 2—3 раза в день. При язвенной болезни, сопровождающейся сильной болью или кровотечением, назначают по 1 пакету через каждые 2 ч, после ослабления острых симптомов —1—2 пакета 3 раза в день.

Курс лечения (15—30 дней) при необходимости повторяют.

Форма выпуска. Выпускается в полиэтиленовых пакетах по 16 г, 20 штук в упаковке.

Условия хранения. В прохладном месте.

Срок годности 3 года.

Поставляется из Югославии.

ФОСФОТИАМИН (Phosphothiaminum). Монофосфорный эфир тиамина фосфата. Относится к витамину B_1 и применяется в тех же случаях и дозах, что и тиамина бромид.

Форма выпуска. Таблетки по 0,01 г, в упаковке 50 штук.

Условия хранения. В сухом, защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

ФОСФЭСТРОЛ (Phosphoestrolum). Тетранатриевая соль дифосфорного эфира диэтилстильбэстрола. Синонимы: Cytonal, Fosfostilben, Honvan.

Фармакологическое действие. Оказывает противоопухолевое действие при раке предстательной железы. Под влиянием фермента фосфатазы активизируется в опухолевой ткани предстательной железы, превращаясь в диэтилстильбэстрол.

Показания к применению. Рак предстательной железы.

Способ применения и дозы. Лечение начинают с внутривенного введения (медленно, иногда капельно) 0,15 г препарата (2,5 мл 6% раствора фосфэстрола); при хорошей переносимости дозу увеличивают до 0,3 г (5 мл 6% раствора) в течение 20—25 дней. Затем 2—3 мес. проводят поддерживающую терапию; внутрь по 0,1 г препарата 2—3 раза в день или внутривенно по 0,3 г (2,5 мл 6% раствора) 1—2 раза в неделю. Длительность лечения зависит от течения заболевания; по получении стойкого эффекта рекомендуется длительная поддерживающая терапия (внутрь по 0,3—0,6 г 1—2 раза в неделю). Одним из биохимических показателей действия препарата является понижение фосфатазной активности сыворотки крови.

Побочное действие. В начале лечения иногда отмечаются тошнота, рвота, ухудшение общего состояния; эти явления исчезают в процессе дальнейшего лечения. Возможны также неприятные ощущения (чаще зуд или боль) в анальной и генитальной областях, реже в области лица и шеи. Иногда при быстром введении препарата возникает боль в области метастатических узлов, возможны понижение свертываемости крови и геморрагический диатез; незначительная феминизация.

Противопоказания. Пониженная свертываемость крови на наклонность к геморрагиям.

Форма выпуска. Таблетки по 0,1 г, в упаковке 30 штук; ампулы по 5 мл 6% раствора, в упаковке 10 штук.

Этот препарат под названием **«Хонван»** (Honvan) в ампулах по 5 мл 5% раствора, в упаковке 5 штук, поступает из Югославии.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности фосфэстрола в ампулах 1 год, в таблетках 3 года, хонвана 3 года.

Отредактировал: ledi24

ФОТРИН (Photrinum). 2,2,4,4,6-Пентаэтиленимино-6-морфолиноциклотрифосфазатриен.

Фармакологическое действие. Обладает противоопухолевой (противолейкозной) активностью, вызывает ремиссии при хроническом лимфолейкозе, эритремии, гемодермиях, раке яичника и некоторых других опухолях.

Показания к применению. Хронический лимфолейкоз (умеренная анемия и тромбоцитопения не являются противопоказаниями к назначению препарата); эритремия, включая ее радиорефрактерные формы, грибовидный микоз, первичный «ретикулез» кожи, ретикулосаркоматоз, саркома идиопатическая множественная геморрагическая (ангиоретикулез Капоши), рак яичников.

Способ применения и дозы. Применяют внутривенно, внутримышечно и внутрибрюшинно. Перед введением содержимое ампулы растворяют в изотоническом растворе натрия хлорида.

Препарат вводят по 5—40 мг ежедневно или через 1—2 дня. В зависимости от характера заболевания, эффективности лечения и переносимости препарата на курс лечения требуется 80—310 мг фотрина.

Побочное действие. Возможно угнетение кроветворения. У некоторых больных ухудшается аппетит, наблюдаются легкая тошнота, головная боль.

Противопоказания. Тяжелые заболевания печени и почек неопухолевой природы, терминальное состояние у больных, а также резко выраженные лейкопения и тромбоцитопения.

Форма выпуска. В лиофилизированной форме в ампулах по 10 штук в упаковке по 0,02 г.

Условия хранения. Список Б. При температуре не выше 10° С.

Срок годности 2 года.

ФРЕНОЛОН (Phrenolon). 3,4,5-Триметоксибензоат 2-хлор-10-{3-[1-β-оксиэтил)-пиперазинил-4] пропил}-фенотиазина дифумарат (или диэтансульфонат). Синоним: Methophenazin.

Фармакологическое действие. Нейролептическое средство с психостимулирующим и умеренно выраженным антипсихотическим действием. В малых дозах обладает транквилизирующими свойствами.

Показания к применению. Шизофрения с психомоторной заторможенностью, апатоабулическими расстройствами, отказом от еды. Неврозы и неврозоподобные состояния с тревогой, депрессией, вялостью, снижением аппетита.

Способ применения и дозы. Внутрь и внутримышечно по 0,005 г 2 раза в день с последующим повышением дозы до 0,06 г.

Побочное действие. Тошнота, головокружение, бессонница, отечность лица, экстрапирамидные расстройства.

Противопоказания. Тяжелые заболевания печени и почек, заболевания сердца с нарушением проводимости, эндокардит.

Форма выпуска. Драже по 0,005 г, в упаковке 50 штук, ампулы по 1 мл 0,5% раствора, в упаковке 5 штук.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности. Таблетки 5 лет, ампулы 2 года.

Поставляется из Венгрии.

ФРИЗИУМ (Frisium). Синоним: клобазам.

Фармакологическое действие. Выступает в роли транквилизатора: уменьшает напряженность, перераздражение, возбуждение, агрессивность, позволяет добиться полной психической стабильности.

Показания к применению. Чувство страха, напряжения, внутреннее беспокойство, возбуждение, раздражительность, агрессивность,

Отредактировал: ledi24

нервное истощение. Эмоциональные нарушения сна, головная боль, мигрень, функциональные нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и мочеполовых путей. Применяется как дополнительная терапия при лечении антидепрессантами и нейролептиками, при кожных и ревматологических заболеваниях, до и после хирургических вмешательств.

Способ применения и дозы. Лечение обычно начинают с 20 мг в день, оптимальный эффект достигается при дозе 30 мг в день в течение 2—4 недель. Фризиум не следует назначать детям младше трехлетнего возраста; в первом триместре беременности, если для этого не существует прямых показаний, а после родов при его назначении надо прекратить кормление ребенка грудью. Фризиум может усиливать действие транквилизаторов, снотворных препаратов, антидепрессантов типа имипрамина и спиртных напитков. Принимая его, нельзя водить автомобиль.

Побочное действие. В начале терапии может возникать чувство усталости, которое в дальнейшем проходит. В редких случаях наблюдаются головокружение, сухость во рту или тремор пальцев рук.

Противопоказания. Миастения, повышенная чувствительность к препарату.

Форма выпуска. В одной упаковке 10 таблеток по 10 мг клобазама.

Срок годности 5 лет.

Производится фирмой «Hoechst», Германия.

ФТАЗИН (Phthazinum). 3-Метокси-6-(N^4-фталилсульфаниламидо)-пиридазин.

Фармакологическое действие. Сульфаниламидный препарат длительного действия.

Показания к применению. Дизентерия, гастроэнтериты, энтероколиты, колиты.

Способ применения и дозы. Внутрь 1-й день по 1 г 2 раза в день, в последующие 5—6 дней по 0,5 г 2 раза в день. Курсовая доза 7—8 г. Детям дозу уменьшают в соответствии с возрастом.

Побочное действие. В отдельных случаях диспептические явления, аллергические реакции.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к сульфаниламидным препаратам.

Форма выпуска. Таблетки по 0,5 г, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

ФТАЛАЗОЛ (Phthalazolum). 2-(пара-Фталиламинобензолсульфамидо)-тиазол. Синонимы: Phthalylsulfathiazolum, Sulfathalidine, Thalazol.

Фармакологическое действие. Сульфаниламидный препарат.

Показания к применению. Дизентерия, колиты, гастроэнтериты, операции на кишечнике (для предупреждения гнойных осложнений).

Способ применения и дозы. Внутрь по 1 г 4—6 раз в сутки в течение 5—7 дней. Детям дозу уменьшают соответственно возрасту. Высшие дозы для взрослых внутрь: разовая 2 г, суточная 7 г.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к сульфаниламидным препаратам.

Форма выпуска. Порошок, таблетки по 0,5 г, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности. Порошок 10 лет, таблетки 10 лет.

Отредактировал: ledi24

ФТИВАЗИД (Phthivazidum). 3-Метокси-4-оксибензилиденгидразид изоникотиновой кислоты. Синонимы: Ftivazidum, Vanizide.

Фармакологическое действие. Обладает высокой бактериостатической активностью в отношении микобактерий туберкулеза.

Показания к применению. Туберкулез (различные формы и локализации).

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,5 г 2—3 раза в день, детям из расчета 0,03—0,04 г/(кг·сут) в 3 приема (но не более 1,5 г/сут). При туберкулезной волчанке 0,25—0,3 г 3—4 раза в день; на курс лечения 40—60 г. Курс лечения повторяют 2—3 раза с месячными перерывами. Высшие дозы для взрослых внутрь: разовая 1 г, суточная 2 г.

Побочное действие. Переносится лучше, чем изониазид, но возможны те же побочные явления, что и при применении изониазида.

Противопоказания. Стенокардия, декомпенсация сердечно-сосудистой системы, органические заболевания центральной нервной системы, заболевания почек нетуберкулезного характера, сопровождающиеся нарушением выделительной функции.

Форма выпуска. Порошок, таблетки в упаковках по 100 штук по 0,1 г, 0,3 г и 0,5 г.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности. Порошок 5 лет, таблетки 4 года.

ФТОРАФУР (Phthorafurum). N′-(2-Фуранидил)-5-фторурацил.

Фармакологическое действие. По фармакологическим свойствам близок к 5-фторурацилу, но менее токсичен и несколько лучше переносится больными.

Показания к применению. Рак прямой и толстой кишки, рак желудка, рак молочной железы.

Способ применения и дозы. Внутривенно через каждые 12 ч по 1,2—2 г (30 мг/кг) На курс лечения 30—40 г препарата, в отдельных случаях 50—60 г. Лечение проводят через 1 мес. после предшествующего лучевого и химиотерапевтического лечения.

Побочное действие. В момент введения возможно головокружение. При длительном применении, введении больших доз и повышенной чувствительности больного развиваются тошнота, рвота, стоматит, диарея, лейкопения и тромбоцитопения.

Противопоказания. Терминальные стадии болезни; заболевания печени и почек; лейкопения (менее $3 \cdot 10^9$/л) и тромбоцитопения (менее $100 \cdot 10^9$/л).

Форма выпуска. В ампулах по 10 мл 4% раствора, в упаковке 10 штук; в капсулах по 0,4 г, в упаковке 100 штук.

Условия хранения. Список А. В защищенном от света месте при температуре не выше 5°С.

Срок годности. Ампулы 3 года, капсулы 3 года.

ФТОРАЦИЗИН (Phthoracizinum). 2-Трифтор-10-(3-диэтиламино-пропионил)-фенотиазина гидрохлорид.

Фармакологическое действие. Усиливает и пролонгирует действие фенамина, устраняет каталепсию, вызванную нейролептиками, потенцирует наркотическое действие гексенала. Обладает также центральной и периферической м-холинолитической активностью.

Показания к применению. Депрессивные состояния различной этиологии (шизофрения, маниакально-депрессивный психоз, инволюционная депрессия, циклотимия, реактивные состояния и др.), в том числе

Отредактировал: ledi24

сопровождающиеся чувством тревоги, страха и напряженности. Эффективный корректор при нейролептической терапии.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,025—0,05 г/сут с последующим увеличением до 0,075—0,2 г, внутримышечно вводят по 2 мл 1,25% раствора 3—6 раз в день.

Побочное действие. Сухость во рту, нарушение аккомодации, задержка мочеиспускания, тошнота, боль в мышцах.

Противопоказания. Глаукома, аденома предстательной железы, атония мочевого пузыря.

Форма выпуска. Таблетки, покрытые оболочкой, по 0,025 г, в упаковке 50 штук, ампулы по 1 мл 1,25% раствора.

Условия хранения. Список Б. В сухом, защищенном от света месте.

Срок годности. Таблетки 2 года, ампулы 1 год.

ФТОРОКОРТ (Phthorocort). Триамцинолона ацетонид.

Фармакологическое действие. Оказывает антиаллергическое, антиэкссудативное и противозудное действие.

Применение. При экземе, воспалительных и аллергических кожных заболеваниях, ограниченном псориазе и др. наружно в виде 0,1% мази.

Противопоказания те же, что и для применения флуцинара.

Форма выпуска. Мазь 0,1% по 15 г в тубах.

Условия хранения. В прохладном месте.

Срок годности 2 года.

Поставляется из Венгрии.

ФТОРОТАН (Phthorotanum). 1,1,1-Трифтор-2-хлор-2-бром-этан. Синоним: Narcotan.

Фармакологическое действие. Мощное наркотическое средство.

Показания к применению. Для газового наркоза при различных хирургических вмешательствах, диагностических исследованиях и в стоматологии.

Способ применения и дозы. В смеси с кислородом или закисью азота и кислорода с помощью наркозных аппаратов (для вводного наркоза 3—4 об.% во вдыхаемой газовой смеси, для поддержания хирургической стадии 0,5—1,5 об.%).

Побочное действие. После длительного наркоза небольшая гипотермия, при передозировке гипотония, брадикардия вплоть до фибрилляции желудочков сердца; иногда тошнота, рвота, головная боль.

Противопоказания. Феохромоцитома, выраженный гипертиреоз, повышение содержания адреналина в крови. Необходима осторожность при нарушении функции печени, гипотонии, аритмиях.

Форма выпуска. Во флаконах по 50 мл.

Условия хранения. Список Б. В сухом прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 1 год.

ФТОРУРАЦИЛ (Phthoruracilum). 2,4-Диоксо-5-фторпиримидин, или 5-фторурацил. Синоним: Fluorouracilum.

Фармакологическое действие. Относится к группе антиметаболитов нуклеинового обмена. В отличие от многих противоопухолевых препаратов эффективен при опухолях желудочно-кишечного тракта. Токсичен, особенно сильно угнетает функции костного мозга и желудочно-кишечного тракта.

Показания к применению. Иноперабельные формы, рецидивы и метастазы рака желудка, опухоли различных отделов толстой кишки и поджелудочной железы.

Отредактировал: ledi24

Способ применения и дозы. Внутривенно (медленно) ежедневно по 19—15 мг/кг в день до появления побочных реакций со стороны желудочно-кишечного тракта (понос, рвота и др.). Иногда препарат вводят в тех же дозах ежедневно в течение 4 дней и при отсутствии побочных реакций через день: на 6-й, 8-й, 10-й и 12-й день по 5—7,5 мг/кг. Курс лечения 12 дней (3—7 г), суточная доза не более 1 г. При хорошей переносимости через 4—6 нед. курс лечения повторяют.

Побочное действие. Лейкопения, тромбоцитопения, тошнота, рвота, понос, язвенный стоматит, язвенные поражения слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, алопеция.

Противопоказания. Терминальные стадии заболевания, кахексия, лейкопения, тромбоцитопения, тяжелые поражения печени и почек. Не следует вводить препарат ранее чем через 3—4 нед. после сложных хирургических вмешательств и ранее чем через 1 мес. после лучевой терапии и лечения другими противоопухолевыми препаратами, а также при обширных метастазах в костный мозг.

Форма выпуска. В ампулах по 5 мл 5% раствора, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список А. В защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

ФУБРОМЕГАН (Fubromeganum). 1-Метил-3-диэтиламинопропилового эфира 5-бромфуран-2-карбоновой кислоты.

Фармакологическое действие. Обладает выраженным периферическим н- и м-холинолитическим свойством. Прерывает проведение нервных импульсов на уровне межнейронных синапсов.

Показания к применению. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, бронхиальная астма и ряд других заболеваний, сопровождающихся спастическим состоянием гладких мышц (печеночная, почечная и кишечная колика); спазмы коронарных сосудов.

Способ применения и дозы. Внутрь. Лечение начинают с 30 мг, затем дозу постепенно увеличивают до 60—100 мг на прием 2—3 раза в день. Курс лечения 2—3 нед. Для сохранения достигнутых результатов в стадии ремиссии необходимо проводить 2—4 курса в год.

Побочное действие. В отдельных случаях головная боль и боль в области сердца, которая исчезает при снижении дозы или отмене препарата.

Противопоказания. Глаукома, беременность.

Форма выпуска. Таблетки по 0,03 г, в упаковке 50 штук.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности 2 года.

ФУЗИДИН-НАТРИЙ (Fusidinum-natrium). Антибиотик, получаемый из культуральной жидкости Fusidium coccineum. Синонимы: Fusidin, Fucidin.

Фармакологическое действие. Высокоактивен в отношении стафилококков, в том числе устойчивых к действию других антибиотиков. Хорошо всасывается, в связи с чем обеспечивается высокое и длительное содержание его в крови; проникает в легкие, печеночную ткань, кости, плевральный экссудат, хрящевую и соединительную ткань, кожу, спинномозговую жидкость. Выделяется из организма с желчью. Малотоксичен.

Показания к применению. Заболевания, вызванные устойчивыми к другим антибиотикам стафилококками (сепсис, эндокардит, остеомиелит, фурункулез, отит, пневмония, инфекция кожи и мягких тканей), а также инфицированные ожоги и раны.

Способ применения и дозы. Внутрь 3 раза в сутки по 0,5—1 г с жид-

Отредактировал: ledi24

кой пищей или молоком. Детям до 1 года 60—80 мг/кг (в виде суспензии на сахарном сиропе), от 1 года до 4 лет 40—60 мг/кг, от 4 до 14 лет 20—40 мг/кг (кг· сут.). Курс лечения 7—10 дней.

Побочное действие. Боль в животе, тошнота, рвота, диарея; в редких случаях аллергические реакции.

Форма выпуска. Таблетки в упаковке по 20 штук по 0,125 г и по 0,25 г; 2% гель в упаковке по 15 г; гранулы 2,5 г активного вещества (фузидиевой кислоты), в упаковке 70 г для суспензии, для детей; диски по 10 мкг, в упаковке 100 штук.

Условия хранения. Список Б. В сухом месте при температуре не выше 25°С.

Срок годности. Таблетки 1 год, гель и гранулы 2 года.

ФУРАГИН (Furaginum). N-(5-Нитрофурил-2)-акрилиденаминотидантоин.

Фармакологическое действие. Оказывает антибактериальное действие в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий. Эффективен в отношении микроорганизмов, устойчивых к сульфаниламидам и антибиотикам.

Показания к применению. Воспалительные заболевания мочевыводящих путей, гнойные раны, ожоги; свищи; в акушерско-гинекологической практике, офтальмологии (конъюнктивиты, кератиты) и др.

Способ применения и дозы. Внутрь для лечения болезней мочевыводящих путей после еды по 0,1—0,2 г 2—3 раза в день в течение 7—10 дней. Местно в изотоническом растворе натрия хлорида (1:13 000). В офтальмологической практике в виде глазных капель (2 капли водного раствора 1:13 000 4—6 раз в день).

Побочное действие. Угнетение аппетита, тошнота, рвота, головокружение, аллергические сыпи. При длительном применении могут развиваться невриты.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к производным нитрофуранового ряда. Необходима осторожность при нарушении функции почек.

Форма выпуска. Таблетки по 0,05 г, в упаковке 30 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности. Порошок 5 лет, таблетки 4 года.

ФУРАГИН РАСТВОРИМЫЙ (Furaginum solubile). N-(5-Нитрофурил-2)-акрилиденаминогидантоина калиевая соль. Порошок, содержащий 10% фурагина растворимого и 90% натрия хлорида. Синоним: Furaginum-Kalium.

Фармакологическое действие. По антимикробной активности сходен с фурагином.

Показания к применению. Тяжелые формы инфекционных заболеваний: сепсис, раневые и гнойные инфекции, пневмонии, воспалительные заболевания мочевыводящих путей, анаэробная инфекция; в комплексе с другими антибактериальными препаратами при брюшном тифе и паратифах.

Способ применения и дозы. Внутривенно, интратрахеально, внутрь полости, интрабронхиально или местно.

Внутривенно вводят 1% раствор капельно, медленно в течение 3—4 ч. Суточная доза для взрослых 300—500 мл. Курс лечения — 3—7 вливаний. Интратрахеально вводят при проведении лечебной или лечебно-диагностической санации бронхов 100—300 мл 1% раствора. Курс лечения — 13—14 вливаний. При бронхофиброскопии вводят подогретый до 36—39°С 0,5% или 1% раствор фракционно в дозах 20—60 мл. При промывании бронха вводят подогретый до

Отредактировал: ledi24

36—39° С 0,5% раствор фракционно по 50—100 мл в общей дозе 500—800 мл с одновременным отсасыванием вводимой жидкости. Промывание можно повторять.

Для промывания полостей при перитоните, эмпиеме, плевры, нагноении суставных полостей, а также местно при лечении ожогов применяют 1% раствор. Для приготовления 0,5% и 1% раствора 0,5 г или 1 г препарата соответственно растворяют в 100 мл горячей воды для инъекций. Раствор сразу фильтруют, разливают в стеклянные флаконы из нейтрального стекла и стерилизуют водяным паром при 100°С в течение 30—45 мин или при 110°С в течение 15—20 мин.

Побочное действие. Головная боль, шум в ушах, тошнота.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к производным нитрофуранового ряда.

Форма выпуска. Порошок в упаковке 100 г.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 2 года. Используются свежеприготовленные стерильные растворы.

ФУРАДОНИН (Furadoninum). N-(5-Нитро-2-фурфурилиден)-1-аминогидантоин. Синонимы: Furadantin, Nitrofurantoinum.

Фармакологическое действие. Обладает противомикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий.

Показания к применению. Инфекционные заболевания мочевыводящих путей, урологические операции (для предупреждения инфекций).

Способ применения и дозы. Применяют внутрь по 0,1—0,15 г 3—4 раза в день. Курс лечения 5—8 дней. Высшие дозы для взрослых внутрь: разовая 0,3 г, суточная 0,6 г.

Побочное действие. Возможны аллергические сыпи, потеря аппетита, тошнота, изжога, иногда рвота.

Противопоказания. Тяжелые заболевания сердца, печени и почек. Повышенная чувствительность к производным нитрофурана.

Форма выпуска. Порошок; таблетки, в упаковках 20 штук по 0,05 г и по 0,1 г; таблетки, растворимые в кишечнике, по 0,03 г, в упаковке 30 штук для детей и по 0,1 г, в упаковке 20 штук.

Условия хранения. В защищенном от света месте.

Срок годности. Порошок и таблетки 4 года, таблетки, растворимые в кишечнике, 2 года.

ФУРАЗОЛИДОН (Furazolidonum). N-5-Нитро-2-фурфурилиден)-3-аминооксазолидон-2. Синонимы: Nifulidone, Trichofurin.

Фармакологическое действие. Обладает противомикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, трихомонад и лямблий. Наиболее чувствительны к фуразолидону возбудители дизентерии, брюшного тифа и паратифов.

Показания к применению. Дизентерия, паратиф, пищевые токсикоинфекции, заболевания, вызванные трихомонадами, лямблиоз.

Способ применения и дозы. Внутрь после еды. При дизентерии, паратифе, пищевых токсикоинфекциях по 0,1—0,15 г 4 раза в сутки в течение 5—10 дней. Дозы для детей уменьшают соответственно возрасту. Длительность лечения зависит от тяжести инфекции. Не рекомендуется применять препарат свыше 10 дней подряд.

При лямблиозе по 0,1 г 4 раза в сутки. Детям 10 мг/кг в день (в 3—4 приема).

При трихомонадных инфекциях по 0,1 г 3—4 раза в день в течение 3 дней; кроме того, в течение 7—14 дней проводят местное лечение: ежедневно вводят во влагалище 5—6 г порошка (фура-

Отредактировал: ledi24

золидон и молочный сахар 1:400—1:500); per rectum суппозитории, содержащие 0,004—0,005 г фуразолидона.

Высшие дозы для взрослых внутрь: разовая 0,2 г, суточная 0,8 г

Побочное действие. Возможны тошнота, рвота, снижение аппетита, аллергические реакции.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к производным нитрофурана; необходима осторожность при нарушении функции почек.

Форма выпуска. Порошок; таблетки по 0,05 г, в упаковке 20 штук; гранулы в упаковке по 50 г для детей.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности. Порошок и таблетки 3 года, гранулы 2 года.

ФУРАПЛАСТ (с перхлорвинилом) (Furaplastum cum perchlorvinilo). Состав: фурацилина 0,25 г, диметилфталата 25 г, перхлорвиниловой смолы 100 г, ацетона 400 мл, хлороформа 475 мл.

Фармакологическое действие. Обладает противомикробной активностью.

Показания к применению. Мелкие травмы кожи (ссадины, царапины, трещины, порезы и т. д.).

Способ применения и дозы. Наносят тонким слоем на поврежденный участок кожи. Препарат быстро высыхает и образует плотную эластичную пленку, которая не смывается водой и держится 1—3 сут. При повреждениях пленки фурапласт наносят повторно.

Противопоказания. Нагноившиеся и воспаленные раны, пиодермия, кровотечения.

Форма выпуска. Во флаконах по 25 мл.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте вдали от огня.

Срок годности 2 года.

ФУРАЦИЛИН (Furacilinum). 5-Нитрофурфурола семикарбазон. Синонимы: Chemofuran, Furacin, Nitrofuran.

Фармакологическое действие. Обладает противомикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий.

Показания к применению. Гнойно-воспалительные процессы, раневая инфекция, бактериальная дизентерия.

Способ применения и дозы. При гнойно-воспалительных процессах наружно в виде водного раствора (1:5000), спиртового раствора (1:1500) и 0,2% мази. При острой бактериальной дизентерии назначают внутрь после еды по 0,1 г 4—5 раз в сутки в течение 5—6 дней. Высшие дозы для взрослых внутрь: разовая 0,1 г, суточная 0,5 г.

Побочное действие. В отдельных случаях дерматиты. Иногда при приеме внутрь потеря аппетита, тошнота, рвота, головокружение, аллергические сыпи; длительное применение может вызвать невриты.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к производным нитрофурана. Внутрь назначают с осторожностью при нарушении функции почек.

Форма выпуска. Порошок; таблетки по 0,02 г, в упаковке 10 штук, для наружного применения; таблетки по 0,1 г, в упаковке 12 штук, для внутреннего применения; мазь 0,2% в упаковке по 25 г; паста защитная в упаковке по 1 кг.

Условия хранения. Список Б. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности. Порошок 9 лет, мазь и таблетки для внутреннего применения 4 года, таблетки для наружного применения 5 лет.

Отредактировал: ledi24

ФУРОСЕМИД (Furosemidum). 4-Хлор-N (2-фурилметил)-5-сульфамоилантраниловая кислота. Синонимы: Lasix, Furanthril, и др.

Фармакологическое действие. Быстродействующий диуретик (салуретик). Диуретический эффект связан с угнетением реабсорбции ионов Na и Cl как в проксимальных, так и в дистальных участках извитых канальцев и в восходящих отделах петли Генле. Реабсорбция калия угнетается в меньшей степени. Препарат одинаково эффективен в условиях ацидоза и алкалоза. Фуросемид не уменьшает клубочковой фильтрации, в связи с чем его можно применять при почечной недостаточности; препарат не угнетает карбоангидразу. Благодаря расширению периферических сосудов и диуретическому эффекту оказывает гипотензивное действие. Препарат ослабляет реакции организма на прессорные амины и может усиливать действие курареподобных средств.

При внутривенном введении диуретический эффект отмечается через 15—20 мин и продолжается в течение 3 ч, при приеме внутрь — через 30—50 мин, сохраняется до 4 ч.

Показания к применению. Застойные явления в малом и большом круге кровообращения, связанные с сердечной недостаточностью; циррозы печени с портальной гипертензией, хроническая и острая почечная недостаточность, отек легких и мозга, отравления барбитуратами, эклампсия.

Фуросемид показан больным с тяжелыми формами артериальной гипертонии, при которых другие салуретические препараты не эффективны, а также для купирования тяжелых гипертонических кризов.

Способ применения и дозы. Назначают внутрь, внутримышечно или внутривенно. Внутрь принимают обычно по 40 мг 1 раз в день (утром). При необходимости суточную дозу можно увеличить до 80—160 мг; в этом случае препарат принимают 1—2 раза в день с интервалом 6 ч. При тяжелой почечной недостаточности доза может быть увеличена до 240—320 мг/сут. После уменьшения отеков дозу постепенно снижают до минимально эффективной, а интервалы между приемами увеличивают до 1—2 дней. При гипертонической болезни фуросемид назначают по 20—40 мг 1 раз в сутки, при сочетании с сердечной недостаточностью суточную дозу можно увеличить до 80 мг.

При невозможности или нецелесообразности назначения фуросемида внутрь препарат вводят внутримышечно или внутривенно (медленно струйно) по 20—60 мг 1—2 раза в сутки, в случае необходимости доза может быть увеличена до 120 мг. Препарат вводят в течение 7—10 дней и более. Затем переходят на прием препарата внутрь.

Побочное действие. Возможны тошнота, понос, гиперемия кожи, зуд, гипотония, обратимое ухудшение слуха, интерстициальный нефрит. Вследствие усиленного диуреза наблюдаются головокружения, депрессия, мышечная слабость, жажда. Возможно развитие гипокалиемии, гиперурикемии, урикозурии, гипергликемии.

При появлении побочных реакций следует уменьшить дозу или прекратить применение препарата.

Нецелесообразно сочетать фуросемид с цефалоспоринами, гентамицином и другими препаратами, оказывающими нефротическое действие. Лечение фуросемидом должно проводиться на фоне диеты, богатой калием, или с применением солей калия.

Противопоказания. Первая половина беременности, гипокалиемия, печеночная кома, терминальная стадия почечной недостаточности, механическая непроходимость мочевых путей.

Форма выпуска. Таблетки по 40 мг, в упаковке 50 таблеток, 1% раствор в ампулах по 2 мл, в упаковке 5 ампул, 10 ампул, 25 ампул.

Отредактировал: ledi24

Из Болгарии поступает фуросемид в таблетках, а из Индии лазикс в ампулах.

Условия хранения. В сухом, защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

ХВОЩА ПОЛЕВОГО ТРАВА (Herba Equiseti arvensis). Содержит сапонины, кремниевую кислоту, органические кислоты, дубильные вещества, флавоновые гликозиды (изокверцитрин, 5-гликозидлютеолин, эквицетрин).

Применение. Как мочегонное средство при заболеваниях сердца и других болезнях, сопровождающихся застойными явлениями, в виде настоя (20,0:200,0) или чая по $^1/_4$ стакана 3—4 раза в день.

Противопоказания. Нефриты и нефрозонефриты.

Форма выпуска. В картонных коробках по 100 г; резаная прессованная по 100 г; брикеты по 70 г.

Условия хранения. В сухом прохладном месте.

Срок годности 4 года.

ХИМОПСИН (Chymopsinum). Препарат поджелудочной железы убойного скота (смесь α-химотрипсина и трипсина).

Фармакологическое действие. По биологическим свойствам сходен с α-химотрипсином и трипсином.

Показания к применению. Гнойные раны, пролежни, ожоги III степени, язвы роговицы, кератиты, воспалительные заболевания верхних дыхательных путей и легких.

Способ применения и дозы. Наружно (25—50 мг препарата растворяют в 10—50 мл 0,25% раствора новокаина); в офтальмологии ванночки с 0,2% раствором или капли (0,25% раствор) 3—4 раза в день; ингаляции 25—30 мг в 5 мл изотонического раствора хлорида натрия или воды для инъекций.

Побочное действие. Аллергические реакции; иногда охриплость голоса после ингаляций; кратковременное повышение температуры до субфебрильных цифр; раздражение и отечность тканей глаза.

Противопоказания те же, что и для трипсина.

Форма выпуска. Порошок во флаконах по 0,05 г.

Условия хранения. В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 10°С.

Срок годности 3 года.

ХИМОТРИПСИН КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ (Chymotrypsinum crystallisatum). Протеолитический фермент, получаемый из поджелудочной железы крупного рогатого скота.

Показания к применению, способ применения, побочное действие, противопоказания и условия хранения те же, что и для трипсина кристаллического.

Форма выпуска. Порошок во флаконах по 0,01 г.

Срок годности 3 года.

ХИНИДИНА СУЛЬФАТ (Chinidini sulfas). Правовращающий изомер хинина.

Фармакологическое действие. Антиаритмическое средство.

Показания к применению. Пароксизмальная тахикардия, пароксизм мерцательной аритмии, стойкая мерцательная аритмия, экстрасистолия.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,1 г 4—5 раз в день, при необходимости дозу увеличивают до 0,8—1,6 г/сут.

Побочное действие. При передозировке и повышенной индивидуальной чувствительности угнетение сердечной деятельности, тошнота,

Отредактировал: ledi24

рвота, понос, аллергические реакции, в отдельных случаях фибрилляция предсердий.

Противопоказания. Идиосинкразия к препарату, декомпенсация сердечно-сосудистой системы, беременность.

Форма выпуска. Порошок.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности 2 года.

ХИНИНА ДИГИДРОХЛОРИД (Chinini dihydrochloridum). [6′-Метоксихинолил-(4′)]-[5-винилхинуклидил-(2)]-карбонол.

Фармакологическое действие. Оказывает антипротозойное действие на бесполые эритроцитарные формы всех видов плазмодиев малярии.

Показания к применению. Малярийная кома.

Способ применения и дозы. Глубоко в подкожную клетчатку вводят по 2 мл 50% раствора двукратно с перерывом между инъекциями 6—8 ч или внутривенно (медленно) 1 мл в 20 мл 40% раствора глюкозы или изотонического раствора натрия хлорида, затем 1 мл глубоко в подкожную клетчатку и через 6—8 ч еще 2 мл подкожно.

Побочное действие. Шум в ушах, головокружение, рвота, сердцебиение, дрожание рук, бессонница. При идиосинкразии к хинину — эритема, крапивница, повышение температуры тела, маточные кровотечения, гемоглобинурийная лихорадка.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к хинину, заболевания среднего и внутреннего уха, гемоглобинурийная лихорадка, декомпенсация сердечной деятельности, поздние месяцы беременности.

Форма выпуска. Раствор 50% для инъекций в ампулах по 1 мл, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. В защищенном от света месте.

Срок годности 5 лет.

ХИНИОФОН (Chiniofonum). Смесь 7-йод-8-окси-5-хинолинсульфокислоты (3 части) с гидрокарбонатом натрия (1 часть). Синонимы: ятрен, Abitrene, Avlochin.

Фармакологическое действие. Оказывает антипротозойное действие на дизентерийную амебу, а также антимикробное и антигрибковое действие.

Показания к применению. Амебная дизентерия, язвенный колит, кишечные инфекции.

Способ применения и дозы. Внутрь. При амебной дизентерии и язвенном колите внутрь взрослым по 0,5 г 3 раза в день в течение 8—10 дней. Повторный курс через 10 дней. Высшая разовая доза для взрослых внутрь 1 г, суточная 3 г. Детям дозы устанавливают в соответствии с возрастом.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к йоду.

Форма выпуска. Порошок, таблетки по 0,25 г, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В сухом, защищенном от света месте в банках оранжевого стекла.

Срок годности 10 лет.

ХИНОЗОЛ (Chinosolum). 8-Оксихинолина сульфат. Синонимы: Cryptonol, Oxiguinol.

Фармакологическое действие. Оказывает антисептическое и спорматоцидное действие. Малотоксичен.

Показания к применению. Для промывания ран, язв, дезинфекции рук, спринцеваний.

Способ применения и дозы. Наружно в виде растворов (1:1000—1:2000), присыпок (1—2%) и мазей (5—10%).

Отредактировал: ledi24

Форма выпуска. Порошок.
Условия хранения. В хорошо укупоренной таре.
Срок годности 10 лет

ХИНОКСИДИН (Chinoxydinum). 1,4-Ди-N-окись-2,3-бис-(ацетоксиметил)-хиноксалина.

Фармакологическое действие. Обладает антимикробным свойством в отношении вульгарного протея, синегнойной палочки, палочки Фридлендера, эшерихий, шигелл, сальмонелл, стафилококков, стрептококков, возбудителей газовой гангрены. Действует на штаммы, устойчивые к антибиотикам и другим химиотерапевтическим препаратам.

Показания к применению. Тяжелые формы гнойных воспалительных заболеваний (пиелит, пиелоцистит, холецистит, холангит, абсцесс легких, эмпиема плевры, кишечные дисбактериозы, тяжелые септические заболевания); инфекция, вызванная синегнойной палочкой, протеем.

Способ применения и дозы. Назначают только взрослым по 0,25 г 3 раза в день после еды. Курс лечения 7—14 дней. При хорошей переносимости можно назначать по 0,25 г 4 раза в день. Максимальная суточная доза 1 г. Повторные курсы назначают с перерывом не менее 1 мес.

Побочное действие. Диспептические явления, головокружение, головная боль, аллергическая сыпь, судорожные сокращения мышц. Для предупреждения и снятия побочных реакций назначают антигистаминные препараты и препараты кальция, а также внутрь кофеин или 20—30 мл 0,25% раствора новокаина. При стойком побочном действии дозу препарата снижают или прекращают его дальнейшее применение. При длительном назначении хиноксидина может развиться кандидоз.

Противопоказания. Индивидуальная непереносимость.

Форма выпуска. Таблетки по 0,25 г, покрытые оболочкой, в упаковке 20 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

ХИНОТИЛИН (Chinotilinum). Дийодид бис-(β-хинолиноэтил) сукцината.

Фармакологическое действие. Обладает выраженной антихолинэстеразной активностью и прекращает антидеполяризующую нервно-мышечную блокаду, вызванную периферическими миорелаксантами. Продолжительность действия хинотилина меньше, чем у прозерина, а острая токсичность при внутривенном введении хинотилина в 17 раз ниже, чем токсичность прозерина.

Показания к применению. Применяют для снятия остаточного антидеполяризующего блока нервно-мышечной передачи.

Способ применения и дозы. Внутривенно в дозе 2—4 мг (4—8 мл 0,05% раствора или 1—2 мл 0,2% раствора). Предварительно вводят в вену атропин (0,5—2 мг). Для продления эффекта хинотилина препарат можно комбинировать с небольшими дозами (0,5 мг) прозерина.

Побочное действие. Возможны побочные явления, связанные с перевозбуждением холинорецепторов: гиперсаливация, боль и урчание в животе в связи с усиленной перистальтикой кишечника, миоз, тошнота, понос, частое мочеиспускание, подергивание мышц языка и скелетной мускулатуры. Эти явления менее выражены, чем при применении прозерина, и предотвращаются введением атропина и других м-холинолитических препаратов.

Противопоказания. Эпилепсия, гиперкинезы, бронхиальная астма, стенокардия, атеросклероз.

Отредактировал: ledi24

Форма выпуска. Ампулы по 2 мл по 10 штук 0,05% раствора и 0,2% раствора.

Условия хранения. Список А. В сухом, защищенном от света месте.

Срок годности 2 года

ХИНОЦИД (Chinocidum). 6 Метокси-8-(4-аминопентил)-аминохинолина дигидрохлорид. Синоним: Quinocidum.

Фармакологическое действие. Действует на параэритроцитарные тканевые формы малярийного паразита, которые обусловливают отдаленные рецидивы.

Показания к применению. Для предупреждения отдаленных рецидивов трехдневной и четырехдневной малярии. Препарат оказывает гамотропное действие в отношении половых форм всех видов плазмодиев.

Способ применения и дозы. При тропической малярии назначают после окончания лечения препаратами, не действующими на гамонты, для предупреждения распространения малярии через комара. Доза на курс лечения для взрослых 0,3 или 0,28 г. При курсовой дозе 0,3 г назначают по 0,03 г в день в течение 10 дней подряд (схема 1). При курсовой дозе 0,28 г назначают по 0,02 г в день в течение 14 дней (схема 2) Высшие дозы для взрослых внутрь: разовая и суточная 0,03 г Детям хиноцид назначают в течение 10 или 14 дней в следующих дозах.

Возраст	Суточная доза, г	
	продолжительность курса лечения	
	10 дней (схема 1)	14 дней (схема 2)
До 1 года	0,0025	0,0015
1—2 »	0,005	0,0025
2—4 »	0,0075	0,005
4—7 лет	0,01	0,0075
7—12 »	0,015	0,01
12—15 »	0,02	0,015
Старше 15 лет	0,03	0,02

Назначают препарат в 1—2 приема после еды.

Побочное действие. Тошнота, головная боль, цианоз губ и ногтевого ложа, раздражение почек и мочевого пузыря, лекарственная лихорадка, небольшой гемолиз, лейкопения или лейкоцитоз.

Противопоказания. Заболевания крови и органов кроветворения, заболевания почек, стенокардия. Нельзя назначать одновременно с другими противомалярийными препаратами; соблюдать осторожность при назначении лицам пожилого возраста и ослабленным больным.

Форма выпуска. Таблетки, покрытые оболочкой, по 0,01 г, в упаковке 50 штук.

Условия хранения. Список Б. В хорошо укупоренных банках темного стекла.

Срок годности 5 лет.

Отредактировал: ledi24

ХЛОДИТАН (Chloditanum). 1-(орто-Хлорфенил)-1-(пара-хлорфенил)-2,2-дихлорэтан.

Фармакологическое действие. Ингибитор функции коры надпочечников. Подавляет секрецию кортикостероидов, блокирует стероидогенное действие АКТГ и может вызвать деструктивные изменения нормальной и опухолевой ткани надпочечников.

Показания к применению. Болезнь Иценко — Кушинга, неоперабельные опухоли коры надпочечников с клиникой синдрома Иценко — Кушинга; с целью профилактики после удаления кортикостером (без видимых метастазов и при сохранении высокого уровня глюкокортикоидов в организме)

Способ применения и дозы. Внутрь (самостоятельно и в сочетании с хирургическим лечением) из расчета 0,1 г/(кг·сут) —6—10 г в 3 приема через 15—20 мин после еды. На курс лечения 200—300 г Высшая разовая доза 5 г, суточная 15 г. Лечение проводят под контролем содержания кортикостероидов в крови или моче.

Побочное действие. Возможны понижение аппетита, головная боль, сонливость, диспептические явления.

Форма выпуска. Таблетки по 0,5 г, в упаковке 100 штук.

Условия хранения. Список Б. В сухом, защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

ХЛОЗЕПИД (Chlozepidum). 7-Хлор-2-метиламино-5-фенил-3Н-1,4-бензодиазепино-4-окись. Синонимы: Timazin, Elenium, Librium и др.

Фармакологическое действие. Оказывает успокаивающее действие на центральную нервную систему, вызывает миорелаксацию, дает слабый противосудорожный эффект, потенцирует действие алкоголя, снотворных и анальгетиков.

Показания к применению. Невротические состояния, сопровождающиеся тревогой, возбуждением, повышенной раздражительностью, бессонницей. Неврозо- и психопатоподобные расстройства у больных с атеросклерозом сосудов мозга, органическим поражением головного мозга. При абстиненции у больных алкоголизмом и наркоманией, вегетососудистых дисфункциях у больных неврозами, психопатиями и при патологическом развитии личности. В психиатрии — при шизофрении с неврозоподобной симптоматикой.

Способ применения и дозы. Дозы подбирают индивидуально. Обычно назначают взрослым внутрь, постепенно повышая дозу до получения терапевтического эффекта. Разовая доза составляет 0,005—0,01 г (5—10 мг), для детей —0,0025—0,005 г (2,5—5 мг) Средняя суточная доза для взрослых 0,02—0,03 г (20—30 мг). Постепенно суточную дозу можно довести до 0,045—0,06 г, распределяя ее на 2—4 приема. Высшая разовая доза для взрослых 0,015 г, высшая суточная 0,06 г Препарат отменяют постепенно, снижая дозу. Курс лечения не должен превышать 75 дней. Повторный курс можно проводить через 3 нед.

Побочное действие. Сонливость, вялость, тошнота, атаксия, кожный зуд, шелушение кожи, нарушение менструального цикла, понижение либидо.

Противопоказания. Тяжелая форма миастении, острые заболевания печени и почек, беременность; работа, требующая быстрой психической и двигательной реакции.

Форма выпуска. Таблетки, покрытые оболочкой, по 0,005 г, в упаковке 10 штук.

Отредактировал: ledi24

Этот препарат под названием «Элениум» («Elenium») в драже по 0,01 г, в упаковке 50 штук, поступает из Польши.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности хлозепида 2 года, элениума 3 года.

ХЛОКСИЛ (Chloxylum). Гексахлор-пара-ксилол.

Фармакологическое действие. Антигельминтное средство.

Показания к применению. Гельминтозы печени (описторхоз, фасциолез, клонорхоз).

Способ применения и дозы. Внутрь по 5—10 г в день (2 г через каждые 10 мин). Курс лечения 2—5 дней. На курс лечения 10—20 г препарата.

Побочное действие. Боль в области печени, головокружение, сонливость, аллергические реакции.

Противопоказания. Заболевания печени, поражения миокарда, беременность.

Форма выпуска. Порошок.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности 2 года.

ХЛОРАКОН (Chloraconum). N-Бензил-β-хлорпропионамид. Синоним: Beclamidum.

Фармакологическое действие. Оказывает выраженное противосудорожное действие.

Показания к применению. Эпилепсия (преимущественно с большими судорожными припадками); психомоторное возбуждение эпилептической этиологии; частые судорожные припадки (в сочетании с другими противосудорожными средствами). Можно назначать больным эпилепсией во время беременности и перенесшим болезни печени.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,5 г 3—4 раза в день, при необходимости до 4 г/сут; детям по 0,25—0,5 г 2—4 раза в день (в зависимости от возраста).

Побочное действие. Раздражающее действие на слизистую оболочку желудка у больных, перенесших желудочно-кишечные заболевания. При длительном лечении необходимо следить за функцией печени, почек, картиной крови.

Форма выпуска. Таблетки по 0,25 г, в упаковке 50 штук.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности 5 лет.

ХЛОРАЛГИДРАТ (Chlorali hydras). 2,2,2-Трихлорэтандиол 1,1.

Фармакологическое действие. Способен вызывать легкую анальгезию, дает седативный, снотворный и в больших дозах наркотический эффект.

Показания к применению. Как успокаивающее, аналгезирующее, снотворное и противосудорожное средство (спазмофилия, столбняк, эклампсия)

Способ применения и дозы. Внутрь с обволакивающими веществами по 0,2—1 г на прием, а также в клизмах. Высшие дозы: разовая 2 г, суточная 6 г.

Побочное действие. При передозировке рвота, падение АД, при длительном применении привыкание.

Противопоказания. Выраженные нарушения функции печени и почек, заболевания сердечно-сосудистой системы.

Форма выпуска. Порошок.

Отредактировал: ledi24

Условия хранения. Список Б. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 8 лет.

ХЛОРБУТИН (Chlorbutinum). 3-[пара-Бис-(α-хлорэтил) аминофенил]-масляная кислота. Синонимы: Chlorambucilum, Leukeran.

Фармакологическое действие. Обладает противоопухолевой активностью и угнетает кроветворение, подавляя преимущественно лимфопоэз.

Показания к применению. Хронический лимфолейкоз (преимущественно лейкемическая форма), лимфогранулематоз.

Способ применения и дозы. Внутрь при хроническом лимфолейкозе 0,002—0,01 г в зависимости от числа лейкоцитов. Курс лечения 3—6 нед, общая доза 0,2—0,4 г. При уменьшении числа лейкоцитов до $25 \cdot 10^9$/л—$20 \cdot 10^9$/л препарат дают в поддерживающих дозах (0,002 г через день или 2 раза в неделю). При лимфогранулематозе ежедневно назначают по 0,02 г, к концу курса лечения дозу уменьшают до 0,01 г. На курс 0,4—0,5 г. Применять препарат после лечения другими цитостатическими препаратами или лучевой терапии можно не ранее чем через $1^1/_2$—2 мес.

Побочное действие. Лейкопения (при передозировке значительная, вплоть до панцитопении), анемия, тромбоцитопения, боль в эпигастральной области, иногда тошнота, рвота.

Противопоказания. Тяжелые заболевания печени и почек, острые заболевания желудочно-кишечного тракта; период непосредственно после рентгенотерапии и применения других цитостатических препаратов; лейкопения и тромбоцитопения, анемия.

Форма выпуска. Таблетки, в упаковке 100 штук по 0,002 г и 0,005 г.

Условия хранения. Список А. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 1 год.

ХЛОРГЕКСИДИН БИГЛЮКОНАТ (Chlorhexidini bigluconas) 1,6-Бис[5-(пара-хлорфенил) бигуанидо]-гексан. Синоним: Hibitane.

Фармакологическое действие. Бактерицидное и антисептическое средство, эффективное в отношении многих грамположительных и грамотрицательных бактерий. Обладает фунгистатической активностью (in vitro) против грибов рода Candida, дерматофитов и трихофитонов.

Показания к применению. Для обработки операционного поля и рук оперирующего персонала, стерилизации хирургического инструментария, а также для промывания мочевого пузыря при циститах.

Способ применения и дозы. В виде 0,5% спиртового раствора (20% водный раствор разводят 70% этиловым спиртом в отношении 1:40) для обработки операционного поля (2 раза с интервалом 2 мин), мытья рук (2—3 мин) и быстрой (2 мин) стерилизации инструментов; для медленной стерилизации 0,02% водный раствор (30 мин). Для промывания мочевого пузыря 0,02% водный раствор (простерилизованный в автоклаве в течение 30 мин) 1 раз в день от 4 до 12 процедур (300—400 мл раствора на процедуру).

Побочное действие. Возможны проходящие сухость и зуд кожи, дерматит.

Противопоказания. Аллергические заболевания, дерматиты.

Формы выпуска. В упаковке по 5 л 20% раствор, 0,05% раствор по 100 мл в упаковке.

Условия хранения. В темном месте. После вскрытия упаковки раствор пригоден к употреблению в течение 7 дней.

Отредактировал: ledi24

Срок годности. 20% раствор 5 лет, 0,05% раствор 3 года.

ХЛОРИДИН (Chloridinum). 2,4-Диамино-5-пара-хлорфенил-6-этилпиримидин. Синонимы: Daraprim, Tindurin.

Фармакологическое действие. Эффективен в отношении эритроцитарных (шизонты и гамонты) форм всех видов возбудителей малярии. Оказывает химиотерапевтическое действие при токсоплазмозе.

Показания к применению. Малярия (в сочетании с хингамином, или делагилом и сульфаниламидами), токсоплазмоз (в сочетании с сульфадимезином).

Способ применения и дозы. Внутрь. Для лечения малярии взрослым по 0,03 г/сут в 2—3 приема в течение 3 дней. Для химиопрофилактики по 0,025 г 1 раз в неделю в течение эпидемического периода. Детям в меньших дозах в соответствии с возрастом. При остром токсоплазмозе взрослым по 0,025 г 2—3 раза в сутки, детям по 0,5—1 мг/кг массы тела в сутки. Одновременно назначают сульфадимезин. Проводят 3 курса лечения по 5—7 дней с интервалом 7—10 дней.

При хронических формах токсоплазмоза назначают один курс комбинированного лечения с последующей вакцинотерапией.

Побочное действие. Головная боль, головокружение, боль в области сердца, диспептические явления, анемия, лейкопения.

Противопоказания. Заболевания кроветворных органов и почек.

Форма выпуска. Таблетки по 0,01 г, в упаковке 10 штук.

Этот препарат под названием «Тиндурин» («Tindurin») в таблетках по 0,025 г, в упаковке 30 штук, поступает из Венгрии.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности хлоридина 4 года, тиндурина 5 лет.

ХЛОРИСТОВОДОРОДНАЯ КИСЛОТА РАЗВЕДЕННАЯ (Acidum hydrochloricum dilutum). Синоним: Acidum muriaticum dilutum.

Применение. При заболеваниях желудка, сопровождающихся пониженной кислотностью. Назначают внутрь по 10—15 капель в $^1/_2$ стакана воды 2—4 раза в день во время еды. При гипохромных анемиях применяют в комплексе с препаратами железа.

Форма выпуска. По 100 мл, по 30 мл.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности не ограничен.

ХЛОРОФИЛЛИПТ (Chlorophylliptum). Препарат из листьев эвкалипта шарикового, содержащий смесь хлорофиллов А и В.

Фармакологическое действие. Обладает антибактериальной активностью в отношении антибиотикоустойчивых стафилококков.

Показания к применению. Стафилококковый сепсис, перитонит, плеврит, пневмония, ожоги, флегмоны, трофические язвы, эрозии шейки матки, фаринголаринготрахеит. Санация при носительстве стафилококка.

Способ применения и дозы. При носительстве стафилококка в кишечнике 5 мл 10% спиртового раствора разводят в 30 мл воды и применяют внутрь по 25 капель 3 раза в день за 40 мин до еды ежедневно; в клизмах 20 мл 1% спиртового раствора в 1000 мл воды (доза одной клизмы). При септических состояниях вводят внутривенно (медленно) 2 мл 0,25% спиртового раствора в 38 мл изотонического раствора натрия хлорида 4 раза в сутки в течение 4—5 дней. Наружно применяют 1% спиртовой раствор с 0,25% раствором новокаина в разведении 1:5; при эрозиях шейки матки местно тампоны с 1% спиртовым или 2% масляным раствором.

Отредактировал: ledi24

Побочное действие. Возможны аллергические реакции.

Противопоказания. Идиосинкразия к препарату.

Форма выпуска. 0,25% спиртовой раствор в ампулах по 2 мл, в упаковке 10 штук, 1% спиртовой раствор во флаконах по 100 мл, 2% масляный раствор во флаконах по 20 мл.

Условия хранения. В сухом прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

ХЛОРОФОРМ (Chloroformium). Трихлорметан.

Показания к применению. Наружно в смеси для растираний, а также для лабораторных целей. При рвоте, боли в животе и икоте назначают внутрь по 3—5 капель на воде.

Форма выпуска. Во флаконах, весовой.

Условия хранения. Список Б. В хорошо укупоренных банках оранжевого стекла в прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 8 лет.

ХЛОРПРОПАМИД (Chlorpropamidum). N-(пара-Хлорбензолсульфонил)-N^1-пропилмочевина. Синонимы: Catanil, Diabinese.

Фармакологическое действие. Оказывает сахаропонижающее действие, аналогично бутамиду, но более активен.

Показания к применению. Сахарный диабет (легкая форма и средней тяжести), иногда вместе с инсулином для усиления действия последнего.

Способ применения и дозы. Внутрь до или во время завтрака 1 раз в день по 0,25—0,5 г, затем дозу понижают до 0,25—0,1 г в день. При плохой переносимости препарат применяют после еды. Высшая суточная доза 1 г

Побочное действие. Возможны аллергические реакции, лейкопения, тромбоцитопения, агранулоцитоз, диарея, временная холестатическая желтуха.

Противопоказания те же, что и для бутамида. Абсолютными противопоказаниями являются желтуха и нарушение функции печени.

Форма выпуска. Таблетки по 0,25 г, в трубке 20 штук.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности 4 года.

ХЛОРПРОТИКСЕН (Chlorprothixen). Транс-2-Хлор-9-(3-диметиламинопропилиден)-тиоксантена гидрохлорид. Синонимы: труксал, Tarasan, Vetacalm.

Фармакологическое действие. Транквилизирующее и антипсихотическое средство; усиливает действие снотворных и анальгетических средств.

Показания к применению. Психозы с тревогой и страхом, невротические состояния с чувством страха, беспокойством, агрессивностью, нарушениями сна: соматические заболевания, с неврозоподобными расстройствами; кожный зуд.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,025—0,05 г 3—4 раза в день, при необходимости 0,6 г/сут с последующим постепенным уменьшением дозы.

Побочное действие. Сонливость, тахикардия, гипотония, сухость во рту, в отдельных случаях экстрапирамидные расстройства.

Противопоказания. Отравление алкоголем и барбитуратами, склонность к коллапсу, эпилепсия, паркинсонизм, нарушения кроветворения, работа, требующая напряженного внимания (водители транспорта и др.)

Отредактировал: ledi24

Форма выпуска. Таблетки, в упаковках 50 штук, по 0,015 г и 0,05 г
Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.
Срок годности 3 года.
Поставляется из Чехо-Словакии

ХЛОРТРИАНИЗЕН (Chlortrianisenum). 1,1,2-Трианизил-2-хлорэтилен. Синонимы: Chlortrionisoestrolum, Trianisoestrol.

Фармакологическое действие. Синтетический эстроген. При введении внутрь оказывает более длительное действие, чем другие эстрогены; обладает минимальными феминизирующими свойствами.

Показания к применению. Рак предстательной железы.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,012 г 2—3 раза в день. Лечение проводят длительно. При метастазах дополнительно назначают преднизолон.

Побочное действие. Иногда набухание и боль в молочной железе, которые быстро исчезают.

Форма выпуска. Таблетки по 0,012 г, в упаковке 100 штук.
Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.
Срок годности 5 лет.

ХЛОРЭТИЛ (Aethylii chloridum). Синонимы: этилхлорид, Chelen.

Фармакологическое действие. Сильное наркотическое средство.

Применение. Для кратковременного ингаляционного наркоза («рауш-наркоз») в малой хирургии (вдыхание 3—4 об. % через 3—4 мин вызывает кратковременную стадию наркоза), для поверхностной анестезии кожи (вскрытие гнойников, панарициев и т. д.).

Побочное действие. Моторное возбуждение, тошнота, рвота, головная боль.

Противопоказания. Общее тяжелое состояние больного, заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, нарушение функции печени и почек.

Форма выпуска. В ампулах по 30 мл, в упаковке 10 штук.
Условия хранения. Список Б. В прохладном, защищенном от света месте.
Срок годности 10 лет.

«ХЛОСОЛЬ» — солевой раствор для инъекций («Chlosolum» solutio pro injectionibus). Состав: натрия ацетата 3,6 г, натрия хлорида 4,75 г, калия хлорида 1,5 г, воды для инъекций до 1 л.

Фармакологическое действие. Уменьшает гиповолемию, сгущение крови и метаболический ацидоз, улучшает капиллярное кровообращение, функциональную способность сердца и почек, оказывает дезинтоксикационное действие.

Показания к применению. Холера Эль-Тор (Инаба), острая дизентерия, пищевая токсикоинфекция.

Способ применения и дозы. Назначают внутривенно (струйно или капельно). При тяжелых формах заболевания (гиповолемический инфекционно-токсический шок, неадекватная капиллярная перфузия, декомпенсированный метаболический ацидоз, анурия) начинают со струйного введения препарата с последующим переходом к капельному. При более легких формах заболевания (интоксикация и обезвоживание организма, метаболический ацидоз, олигурия), можно ограничиться капельным введением препарата.

Неотложная регидратационная терапия для выведения больных из состояния гиповолемического шока заключается в 1—3-часовом струйном введении раствора, подогретого до 38—40°С. В течение 1-го часа

Отредактировал: ledi24

вводят раствор в количестве, соответствующем 7—10% массы тела больного. В дальнейшем струйное введение раствора заменяют капельным. Капельный раствор вводят в течение 24—48 ч со скоростью 40—120 капель в минуту. Препарат применяют под контролем лабораторных исследований.

Общее количество вводимого раствора должно соответствовать объему жидкости, потерянной с рвотными массами, калом, мочой и потом. Баланс введенной и потерянной жидкости определяют каждые 6 ч. При развитии гипокалиемии и ее последствий «Хлосоль» заменяют временно раствором «Дисоль» до нормализации электролитного баланса.

Форма выпуска. Во флаконах по 400 мл.

Условия хранения. При комнатной температуре.

Срок годности 2 года.

ХОЛАГОЛ (Cholagolum). Состав: красящего вещества корня куркумы 0,0225 г, эмодина из крушины 0,009 г, магния салицилата 0,18 г, эфирных масел 5,535 г, спирта 0,8 г, масла оливкового до 10 г.

Применение. Как желчегонное и спазмолитическое средство при гепатохолециститах, холециститах и желчнокаменной болезни по 5 капель (на сахаре) 3 раза в день за 30 мин до еды; при приступах желчной колики 20 капель на прием.

Форма выпуска. Во флаконах по 10 мл.

Условия хранения. В плотно укупоренной таре, в темном прохладном месте.

Срок годности 3 года.

Поставляется из Чехо-Словакии.

ХОЛЕНЗИМ (Cholenzymum). Препарат из желчи и ферментов поджелудочной железы и кишечника убойного скота.

Применение. Как желчегонное средство при гепатитах и холециститах, а также при заболеваниях желудочно-кишечного тракта по 1 таблетке 1—3 раза в день.

Форма выпуска. Таблетки по 0,3 г, покрытые оболочкой, в упаковке 50 штук.

Условия хранения. В сухом прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

ХОЛЕСТИРАМИН (Cholestyraminum). Полимеризат стирола и дивинилбензола с алифатически связанными четвертичными аммониевыми соединениями в форме хлорида. Синонимы: Colestyraminum, Questran.

Фармакологическое действие. При приеме per os не всасывается и в неизменненном виде выводится с калом. В кишечнике образует невсасываемые комплексы, что способствует усилению их выведения из организма и уменьшению всасывания холестерина в кишечнике.

Показания к применению. Зуд, вызванный застоем желчи в результате заболеваний печени (желчнокаменная болезнь, травматические послеоперационные стриктуры желчных путей, карцинома и др.); гиперхолестеринемия, отравления препаратами наперстянки.

Способ применения и дозы. Внутрь по 1 чайной ложке (4 г) 2 раза в день. Суточная доза может быть увеличена до 16 г (в 4 приема). Если необходимо назначить per os другие препараты, то после приема холестирамина требуется интервал не менее 4 ч.

Побочное действие. Возможны тошнота, рвота, понос или запоры. Лечение проводят под контролем протромбинового индекса

Отредактировал: ledi24

Форма выпуска. Порошок во флаконах по 500 г.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Германии.

ХОЛИНА ХЛОРИД (Cholini chloridum). (2-Оксиэтил) триметил-аммоний хлорид. Синонимы: Bilineurine, Luridine.

Фармакологическое действие. Входит в состав фосфолипида лецитина. Играет существенную роль в синтезе фосфолипидов и в обмене их в печени. Холин — источник свободных метильных групп — является липотропным фактором. Недостаток холина приводит к жировой инфильтрации печени, геморрагической дегенерации печени и почек.

Показания к применению. Жировая дистрофия печени, цирроз печени. Гипотиреоз, цистинурия. Атеросклероз. Хронический алкоголизм.

Способ применения и дозы. Внутрь 20% раствор по 1 чайной ложке (5 мл) 3—5 раз в день в течение 2—3 нед; внутривенно (капельно) 1% раствор на изотоническом растворе хлорида натрия или 5—10% растворе глюкозы.

Побочное действие. При приеме внутрь диспептические явления; при внутривенном введении ощущение жара, тошнота, рвота, брадикардия, падение АД; возможен коллапс.

Форма выпуска. Порошок, ампулы по 10 мл 20% раствора, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. В плотно укупоренной таре в сухом месте.

Срок годности 1 год.

ХОЛОСАС (Cholosasum). Сироп, приготовленный из сгущенного водного экстракта плодов шиповника и сахара.

Применение. При холецистите и гепатите по 1 чайной ложке (детям по $^1/_4$—$^1/_2$) 2—3 раза в день.

Форма выпуска. Во флаконах по 300 мл.

Условия хранения. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

ХОНСУРИД (Chonsuridum). Препарат, получаемый из гиалиновых хрящей убойного скота.

Фармакологическое действие. Входящая в состав хонсурида хондроитинсерная кислота участвует в построении основного вещества соединительной ткани.

Показания к применению. Длительно не заживающие, вяло гранулирующие и медленно эпителизирующиеся раны после травм и оперативных вмешательств; трофические язвы, пролежни (в стадии гранулирования).

Способ применения и дозы. Наружно: 0,05 г препарата разводят в 5 мл 0,5% раствора новокаина или изотонического раствора натрия хлорида; содержимое флакона тщательно взбалтывают и образующийся при этом вязкий раствор равномерно распределяют на поверхности стерильной марлевой салфетки. Повязки меняют 1 раз в 2—3 дня.

Противопоказания. Острые воспалительные процессы в области раны, распространенный некроз тканей, избыточные грануляции.

Форма выпуска. Во флаконах по 0,05 г.

Условия хранения. В сухом, защищенном от света месте при температуре от 5 до 10°С.

Срок годности $1^1/_2$ года.

Отредактировал: ledi24

ХРОМОЛИМФОТРАСТ (Chromolymphotrastum). Содержит 1,4-диокси-5,8-ди (пара-толуидино) антрахинон- и 1-бензоиламиноантрахинон по 0,0275 г в 100 мл йодолипола.

Фармакологическое действие. При эндолимфатическом введении препарат длительно задерживается в лимфатических узлах, окрашивая их в густо травянисто-зеленый цвет, благодаря чему они легко различимы на фоне окружающих тканей. Обладает также рентгеноконтрастными свойствами.

Показания к применению. Для контроля за полнотой удаления лимфатических узлов при оперативном удалении опухолей.

Способ применения и дозы. Вводят эндолимфатически за 3—7 дней до операции (или раньше); окрашивание лимфатических узлов сохраняется не менее 30 дней. В соответствующий лимфатический сосуд вводят 5—10 мл препарата (при необходимости введения в лимфатические сосуды обеих конечностей —20 мл) Вводят медленно —1 мл в течение 10 мин.

Противопоказания. Тромбофлебит, варикозное расширение вен нижних конечностей, сердечно-сосудистая недостаточность, тяжелые поражения печени и почек, идиосинкразия к препаратам йода.

Форма выпуска. Ампулы по 10 мл для инъекций, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. В защищенном от света месте при температуре не выше 15°С.

В случае выпадения осадка ампулу нагревают в горячей воде температуры 70—80°С при энергичном встряхивании в течение 15—20 мин. Препарат пригоден для применения, если осадок полностью растворится.

Срок годности 3 года

ЦЕЛАНИД (Celanidum). Синоним: изоланид. Гликозид, полученный из листьев наперстянки шерстистой (Digitalis lanata Ehrh).

Фармакологическое действие. Действует на сердце подобно другим гликозидам наперстянки, дает быстрый эффект и мало кумулирует.

Показания к применению. Острая и хроническая недостаточность кровообращения, I, II и III стадии, тахиаритмическая форма мерцания предсердий, пароксизмальная тахикардия.

Способ применения и дозы. Внутрь по 1 таблетке (0,25 мг) 2—3 раза в день; внутривенно по 1—2 мл 0,02% раствора 1—2 раза в сутки.

Побочное действие и противопоказания те же, что и для других гликозидов наперстянки.

Форма выпуска. Таблетки по 0,25 мг, в упаковке 30 штук; ампулы по 1 мл 0,02% раствора, в упаковке 10 штук; флаконы по 10 мл 0,05% раствора.

Условия хранения. Список А. В защищенном от света месте.

Срок годности. Таблетки 3 года, ампулы 1 год, капли 2 года.

Этот препарат под названием «Изоланид» («Isolanid») в ампулах по 2 мл 0,02% раствора, в упаковке 5 штук, и флаконы по 10 мл 0,05% раствора поступают из Венгрии.

Срок годности 3 года.

ЦЕЛИАЗА (Celyasa). Препарат, содержащий фермент стрептокиназу. Получают из культуры β-гемолитического стрептококка группы «С».

Фармакологическое действие. Близка к препаратам — авелизину, стрептазе, кабикиназе. Целиаза активирует содержащийся в крови

Отредактировал: ledi24

фибринолитический профермент — плазминоген, который превращается в плазмин. Способна проникать внутрь тромба и вызывает его растворение.

Показания к применению. Системные и локальные артериальные и венозные тромбозы. Препарат наиболее эффективен при его применении в первые 7 дней заболевания.

Способ применения и дозы. Внутривенно капельно или внутриартериально. Содержимое ампулы растворяют в 1—2 мл растворителя (полное растворение происходит в течение 1—2 мин, наличие взвесей, мути, осадка не допускается). В качестве растворителя используют реополиглюкин, изотонический раствор хлорида натрия, 5% раствор глюкозы. После полного растворения содержимое ампулы шприцем переносят во флакон с одним из перечисленных выше растворителей. Раствор сохраняет специфическую активность в течение 24 ч.

Лечение целиазой проводят по специальной схеме только в стационарных условиях.

Побочное действие. Резорбтивная лихорадка, связанная с поступлением в кровоток продуктов распада тромба. Возможны реакции в виде гипертермии, озноба, головной боли, боли в области поясницы, тошнота, обусловленные наличием в препарате гетерогенного белка.

Противопоказания. Заболевания и состояния, предрасполагающие к кровотечениям (геморрагические диатезы, язвенные поражения желудочно-кишечного тракта, тяжелые формы сепсиса, геморрагический инсульт, туберкулез легких с кавернозным процессом, активный ревматический процесс и другие инфекции стрептококковой этиологии); острая алкогольная интоксикация, ранний (до 3 сут) послеоперационный, послеродовой период, беременность. Стойкая артериальная гипертония, при тяжелых формах сахарного диабета применение целиазы возможно только по жизненным показаниям.

Форма выпуска. В ампулах в лиофилизированном виде по 250 000 МЕ, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б. При температуре от 2°С до 10°С.

Срок годности 2 года.

ЦЕРЕБРОЛИЗИН (Cerebrolysinum). Гидролизат мозгового вещества, содержащий 18 аминокислот.

Фармакологическое действие. Способствует улучшению обмена веществ в мозговой ткани.

Показания к применению. Заболевания, сопровождающиеся нарушением функции центральной нервной системы (энцефалит, операция на головном мозге, отсталость умственного развития у детей, психические заболевания, сопровождающиеся рассеянностью, ослаблением памяти; травмы мозга и др.).

Способ применения и дозы. Внутримышечно по 1—2 мл через 2—3 дня. Курс лечения 20—40 инъекций.

Форма выпуска. В ампулах по 1 и 5 мл 5% раствора.

Условия хранения. В сухом месте.

Срок годности 5 лет

ЦЕРИГЕЛЬ (Cerigelum). Состав: поливинилбутираля 4 г, цетилпиридиния хлорида 0,2 г, спирта этилового 96% 100 г.

Фармакологическое действие. Антисептик.

Показания к применению. Для дезинфекции рук перед операциями и медицинскими манипуляциями, при массовой заготовке крови в стационарных и выездных условиях, при производстве бактерийных препаратов и кровезаменителей.

Отредактировал: ledi24

Способ применения и дозы. На сухую кожу рук наносят 3—4 г препарата и в течение 8—10 с тщательно растирают ладонные и тыльные поверхности, межпальцевые промежутки и нижнюю треть предплечий. По высыхании на коже рук образуется пленка, которую по окончании операции снимают этиловым спиртом.

Форма выпуска. Во флаконах по 400 мл.

Условия хранения. Обычные.

Срок годности 3 года.

ЦЕРНИЛТОН (Cernilton). Состав: 60 мг цернитина (экстракта сухой пыльцы) и 3 мг цернитина GB XI (экстракта пыльцы диализ.)

Фармакологическое действие. Цернилтон обладает общетонизирующим эффектом, способен повышать устойчивость организма к инфекциям и воспалениям. Может применяться в лечении частых рецидивов инфекций и воспалений, а также в качестве дополнения к антибиотикам и химиотерапевтическим средствам, но не заменяет эти способы.

Цернитин — общее название группы микробиологически ферментированных экстрактов пыльцы специфических видов растений. Данные экстракты содержат (во фракциях, соответствующих их наличию в природе) 21 различную аминокислоту, энзимы, кофакторы, все известные витамины за исключением B_{12}, дезоксирибозиды, углеводы и ряд других биофакторов. Кроме того, цернитин содержит минералы Ca, Fe, Si, K, Cu, Mg, Zn, Mn, Ti, Mo, S, R и B. Предполагают, что фармакологический эффект экстрактов группы цернитин происходит от синергизма различных входящих компонентов.

Показания к применению. Частые рецидивы инфекций и воспалений, например хронический простатит и рецидивы заболевания неспецифическим уретритом, хроническим бронхитом, другие рецидивы воспаления верхних дыхательных путей — как профилактика.

Способ применения и дозы. 2—4 таблетки ежедневно. Детям назначается полдозы. При необходимости можно применять двойное количество.

Побочное действие. Цернилтон не имеет и не вызывает никаких побочных эффектов, может приниматься регулярно в течение длительного времени. Применение не приводит к привыканию.

Форма выпуска. Флаконы, содержащие 100, 250 и 1000 таблеток.

Условия хранения. В защищенном от света месте.

Срок годности 5 лет.

Производится фирмой «КРКА», Словения.

ЦЕРУКАЛ (Cerucalum). N-(2-Диэтиламиноэтил)-2-метокси-4-амино-5-хлорбензамида гидрохлорид. Синонимы: метоклопрамид, реглан.

Фармакологическое действие. Регулирует моторную функцию желудочно-кишечного тракта, оказывает противорвотное действие.

Показания к применению. Нарушения моторной функции, атония и гипотония (после резекции желудка) желудочно-кишечного тракта, для облегчения диагностики (рентгеноскопия, зондирование желудка и двенадцатиперстной кишки), тошнота и рвота различной этиологии (неукротимая рвота беременных, уремия, непереносимость препаратов наперстянки, противотуберкулезных, цитостатических и др.).

Способ применения и дозы. Внутрь до еды по 1—2 таблетки 2—3 раза в день, внутримышечно или внутривенно 2—6 мл/сут Детям дозы уменьшают соответственно возрасту.

Побочное действие. У детей до 14 лет в отдельных случаях акинетический дистонический синдром (область плеч, шеи и головы), иногда двигательное беспокойство.

Отредактировал: ledi24

Форма выпуска. Таблетки, содержащие 10 мг препарата, в упаковке 50 штук, ампулы по 2 мл (в 1 мл 0,005 г препарата), в упаковке 10 штук.

Условия хранения. В прохладном месте.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Германии.

ЦЕФАЛЕКСИН (Cephalexinum). Моногидрат-[7(D-α-аминофенилацетамидо)-3-метил-3-цефем-4-карбоновой кислоты)]. Синонимы: Ceporex, Ceflon, Keflex и др.

Фармакологическое действие. Антибиотик широкого спектра действия. Оказывает бактерицидное действие на многие виды грамположительных и грамотрицательных микробов. Действует на пенициллиноустойчивые пенициллиназообразующие штаммы стафилококков (штаммы не чувствительны к метициллину, обычно не чувствительны и к цефалексину). Действует на стрептококки, пневмококки, палочки дифтерии, менингококки, гонококки, эшерихии, шигеллы и сальмонеллы. Малоэффективен в отношении протея, микобактерий туберкулеза, синегнойной палочки

Показания к применению. Заболевания мочеполовой системы (пиелонефрит, цистит, простатит, эндометрит); инфекции легких и верхних дыхательных путей (пневмония, бронхопневмония, эмпиема и абсцесс легких, тонзиллит, фарингит, отит, синуит и др.); гнойные инфекции кожи и мягких тканей (фурункулез, абсцессы, лимфаденит и др.); острый и хронический остеомиелит; гонорея и другие болезни, вызванные чувствительными к препарату микроорганизмами.

Способ применения и дозы. Внутрь, независимо от приема пищи. Разовая доза для взрослых 0,25—0,5 г, суточная 1—2 г. Детям назначают из расчета 25—50 мг/(кг·сут). При тяжелом течении болезни доза для взрослых может быть увеличена до 4 г/сут (максимально), для детей до 100 мг/кг. Продолжительность лечения 7—14 дней.

Побочное действие. Иногда отмечаются тошнота, рвота, боль в животе, редко — понос; возможны аллергические реакции (сыпь, крапивница, ангионевротический отек). При длительном лечении наблюдается обратимая нейтропения. Могут возникнуть дисбактериоз и суперинфекция (кандидоз). Во время приема цефалексина возможна ложная положительная реакция на сахар в моче при использовании медьсодержащих реактивов.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к антибиотикам группы цефалоспоринов.

Форма выпуска. Капсулы по 0,25 г, в упаковке 30 штук; порошок по 2,5 г (активного вещества) в банках емкостью 150 мл для суспензий.

Условия хранения. Список Б. При комнатной температуре, в защищенном от света месте. Водную суспензию — при комнатной температуре не более 6 дней.

Срок годности. Капсулы 2 года, порошок для суспензии 2 года.

ЦЕФАЛОТИН (Cephalotinum). Натриевая соль (7R)-7-(2-тиенилацетамидо)-цефалоспорановой кислоты. Антибиотик из группы цефалоспоринов. Синоним: кефлин.

Фармакологическое действие. Обладает широким спектром антимикробного действия. Активен в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов (индолположительные штаммы протея устойчивы к цефалотину).

При внутримышечном введении максимальное содержание анти-

Отредактировал: ledi24

биотика в крови отмечается через 30 мин — 1 ч. При парентеральном введении цефалотин хорошо проникает и обнаруживается в терапевтических концентрациях в почках, миокарде, коже, мышцах, печени, легких и плевральной жидкости; плохо проникает через гематоэнцефалический барьер. Цефалотин практически не всасывается при приеме внутрь.

При нарушении выделительной функции почек содержание цефалотина в крови увеличивается, а время выведения его с мочой удлиняется.

Показания к применению. Гнойно-воспалительные заболевания, вызываемые чувствительными к его действию микроорганизмами (сепсис, перитонит, эндокардит, пневмония, эмпиема плевры, абсцесс легкого, бронхиты, ангина и др.), инфекции мочеполовой системы (пиелонефрит, цистит, простатит, эндометрит, вульвовагинит и др.), гнойные инфекции кожи, мягких тканей и костей (фурункулез, абсцессы, лимфаденит, инфицированные ожоги, остеомиелит и др.). Используется также для профилактики послеоперационных гнойных осложнений.

Способ применения и дозы. Перед назначением цефалотина следует определить чувствительность к нему выделенных возбудителей.

Цефалотин вводят внутримышечно или внутривенно (капельно или струйно).

Разовая доза препарата для взрослых 0,5—1 г, суточная 2—6 г (делят на 4—6 введений). При тяжелом течении гнойно-воспалительных процессов разовая доза может быть увеличена до 2 г (только внутривенно) с интервалом между введениями 4 ч. Максимальная суточная доза 12 г.

Детям препарат назначают в суточной дозе 100 мг/кг. Новорожденным цефалотин вводят с интервалом 8 ч (только внутривенно); детям всех остальных возрастных групп (внутривенно или внутримышечно) с интервалом 6 ч.

Дозы антибиотика при почечной недостаточности уменьшают. Первая доза для взрослых составляет 0,5—1 г, при тяжелом течении инфекции 2 г/сут, последующие дозы назначают с учетом степени нарушения выделительной функции почек и тяжести инфекционного процесса.

Максимальные дозы для взрослых больных с почечной недостаточностью

Клиренс креатинина, мл/мин	Максимальная доза каждые 6 ч
80—50	2 г
50—25	1,5 г
25—10	1 г
10—2	0,5 г

Для внутримышечного введения раствор антибиотика готовят ex temporе, добавляя к содержимому флакона (0,5 или 1 г) соответственно 2 и 4 мл воды для инъекций, и вводят глубоко в мышцу. Растворы указанной концентрации должны быть бесцветны.

Для внутривенного струйного введения 0,5 г или 1 г препарата растворяют соответственно в 5 или 10 мл изотонического раствора хлорида натрия и вводят медленно в течение 3—5 мин.

Для внутривенного капельного введения 2 г препарата растворяют

Отредактировал: ledi24

в 10 мл воды для инъекций и добавляют к 250 мл 5% раствора глюкозы или изотонического раствора хлорида натрия и вводят со скоростью 60—80 капель в минуту.

Длительность лечения 7—10 дней и более.

Побочное действие. Возможны аллергические реакции, проявляющиеся в виде кожной сыпи и зуда, эозинофилии, тромбоцитопении, нейтропении, редко — гемолитической анемии. Эти реакции отмечаются обычно у больных с повышенной чувствительностью к препаратам группы пенициллина. При аллергических реакциях прекращают введение препарата и проводят десенсибилизирующую терапию.

Цефалотин может оказывать нефротическое действие (повышение содержания азота мочевины и креатинина в сыворотке крови). Эти осложнения отмечаются, как правило, у больных с предшествующими изменениями функции почек. Препарат в таких случаях рекомендуется применять под контролем функции почек (не реже 1 раза в неделю).

Возможно транзиторное повышение активности аминотрансфераз и щелочной фосфатазы в крови больного.

При внутривенном введении больших доз препарата (более 6 г) могут наблюдаться флебиты и перифлебиты, при внутримышечном — болезненность и образование инфильтратов в области введения.

При назначении цефалотина в дозе 12 г/сут возможна гипернатриемия.

Противопоказания. Повышенная чувствительность больного к препаратам группы цефалоспоринов.

Форма выпуска. Во флаконах по 1 г.

Условия хранения. В сухом, защищенном от света месте при комнатной температуре.

Срок годности 2 года.

«ЦЕФЕКОН» СУППОЗИТОРИИ (Suppositoria «Cefeconum»). Состав: салициламида 0,6 г, амидопирина и фенацетина по 0,2 г, кофеина или кофеин-бензоата натрия 0,05 г.

Фармакологическое действие. Жаропонижающее, анальгетическое, противовоспалительное средство.

Показания к применению. В качестве болеутоляющего, жаропонижающего, противовоспалительного средства при невозможности введения внутрь средств, входящих в состав суппозиториев.

Способ применения и дозы. По 1 суппозитории 1—3 раза в день.

Побочное действие. Зуд и боль в прямой кишке, головокружение; при длительном применении возможны гранулоцитопения и агранулоцитоз, аллергические реакции, возбуждение.

Противопоказания. Повышенная возбудимость, бессонница, гипертоническая болезнь II—III стадии, органические заболевания, сердечно-сосудистой системы, старческий возраст, глаукома.

Форма выпуска. Суппозитории ректальные, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. В защищенном от света месте при температуре не выше 8°С.

Срок годности 2 года.

ЦЕФОБИД (Cefobid). Состав: 7-[D(-)-α-(4-этил-2, 3-диоксо-1-пиперазинкарбоксамидо)-α-(4-гидроксифенил ацетамидо]-3-[(1-метил-1Н-тетразол-5-ил) тиометил]-3-цефем-4-карбоксилическая кислота. Представляет собой натриевую соль цефоперазона и является полусинтетическим цефалоспориновым антибиотиком, обладающим широким спектром действия. Применяется исключительно парентерально.

Фармакологическое действие. Активен in-vitro против большого

Отредактировал: ledi24

числа различных грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов. В то же время проявляет резистентность к разрушающему действию на него многих β-лактамазов. Активен против анаэробов.

Показания к применению. Инфекционные заболевания, вызываемые чувствительными к данному препарату микроорганизмами: инфекции верхней и нижней части дыхательного тракта; инфекции верхней и нижней части мочевого тракта; перитониты, холециститы, холангиты и другие внутрибрюшные инфекции; септицемия; менингиты; инфекции кожных покровов и мягких тканей; костные и суставные инфекции; воспалительные заболевания тазовых органов, эндометрит, гонорея и другие инфекционные заболевания полового тракта.

Способ применения и дозы. Обычная суточная доза для взрослых колеблется в пределах от 2 до 4 г и делится на равные части, которые вводятся через каждые 12 часов. При тяжело протекающих инфекциях ежедневная доза может быть увеличена до 8 г, и равные части этой дозы вводятся через каждые 12 часов. При неосложненном гонококковом уретрите рекомендуется одноразовое внутримышечное впрыскивание 500 мг препарата. Ввиду того что почки — не главный путь удаления цефобида, больным с почечными поражениями обычная суточная доза (2—4 г) может быть назначена без корректировки. У больных со скоростью фильтрации почечного клубочка ниже 18 мл/мин или с серозным уровнем креатинина выше 3,5 мг/дцл суточная доза не должна превышать 4 г.

При лечении младенцев и детей суточная доза — от 50 до 200 мг на 1 кг массы тела, она вводится в два приема каждые 12 часов. Новорожденным (моложе 8 дней) лекарство надо вводить через каждые 12 часов.

Всем больным, в анамнезе которых отмечалась склонность к различным аллергическим реакциям, и в особенности к лекарственной аллергии, антибиотики должны назначаться с осторожностью. То же относится к кормящим матерям. У пациентов с нарушенной функцией печени и сопутствующим повреждением почек необходимо проводить мониторное наблюдение за концентрацией препарата в сыворотке крови и установить нужную дозировку. При отсутствии такого контроля доза не должна превышать 2 г в сутки.

Растворы цефобида и аминогликозида не следует смешивать, поскольку между ними существует физическая несовместимость.

Побочное действие. Во время лечения были зарегистрированы внезапный прилив крови к лицу, потливость, головная боль и тахикардия, вызванные алкогольными напитками, принятыми одновременно с введением препарата или самое позднее — на пятый день после.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к цефалоспориновому классу антибиотиков.

Форма выпуска. Флаконы, содержащие 1 г натриевой соли цефоперазона.

Условия хранения. В сухом прохладном месте.

Срок годности 2 года.

Поставляется фирмой «Pfizer».

ЦИАНОКОБАЛАМИН (Cyanocobalaminum). Имеет сложное строение: молекула содержит атом кобальта и цианогруппу. Синоним: витамин B_{12}.

Фармакологическое действие. Обладает высокой биологической активностью. Необходим для нормального кроветворения (способствует созреванию эритроцитов). Участвует в синтезе лабильных метильных групп, образовании метионина, нуклеиновых кислот, холина.

Отредактировал: ledi24

Показания к применению. Анемия Аддисона — Бирмера. Алиментарная макроцитарная анемия. Железодефицитная, постгеморрагическая, апластическая анемии; анемии, вызванные токсическими веществами и лекарственными препаратами. Заболевания печени. Фуникулярный миелоз. Полиневриты, радикулиты, невралгии, невралгия тройничного нерва. Боковой амиотрофический склероз. Детский церебральный паралич. Болезнь Дауна. Кожные заболевания. Травмы периферических нервов.

Способ применения и дозы. Вводят преимущественно парентерально, так как при приеме внутрь плохо всасывается. При анемии Аддисона — Бирмера по 100—200 мкг через день. При анемии Аддисона — Бирмера с явлениями фуникулярного миелоза и при макроцитарных анемиях с нарушением нервной системы 400—500 мкг на инъекцию. В период ремиссии поддерживающая терапия по 100 мкг 2 раза в неделю. При железодефицитных и острых геморрагических анемиях 30—100 мкг 2—3 раза в неделю. При апластических анемиях (особенно у детей) по 100 мкг до наступления улучшения. При алиментарной анемии у детей в раннем возрасте и у недоношенных по 30 мкг в день в течение 15 дней. При нарушениях нервной системы по 200—400 мкг 2—4 раза в месяц. При заболеваниях центральной и периферической нервной системы по 200—500 мкг на инъекцию. Курс лечения 2 нед. При травмах периферической нервной системы по 200—400 мкг через день в течение 40—45 дней. При гепатитах и циррозах печени 30—60 мкг в день или 100 мкг через день в течение 25—40 дней. При дистрофиях у детей раннего возраста, болезни Дауна и детском церебральном параличе 15—30 мкг через день. При фуникулярном миелозе, боковом амиотрофическом склерозе, рассеянном склерозе нередко вводят в спинномозговой канал по 15—30 мкг (увеличивая постепенно дозу до 200—250 мкг на инъекцию).

Побочное действие. Аллергические реакции, нервное возбуждение, боль в области сердца и тахикардия требуют прекращения лечения и в дальнейшем применения меньших доз (15—30 мкг).

Противопоказания. Тромбоэмболия, стенокардия. Нельзя вводить в одном шприце растворы цианокобаламина, тиамина бромида и рибофлавина, так как кобальт разрушает другие витамины.

Форма выпуска. В ампулах по 1 мл, в упаковке 10 штук с содержанием 30 мкг, 100 мкг, 200 мкг и 500 мкг цианокобаламина; таблетки, покрытые оболочкой, содержащие 0,00005 г цианокобаламина и 0,0008 г фолиевой кислоты, в упаковке 50 штук.

Условия хранения. В защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

ЦИГЕРОЛ (Cygerolum). (±)-DL-2-Циклогексил-5,9-диметил-△-4,8-каприновая кислота.

Фармакологическое действие. Оказывает антисептическое и ранозаживляющее действие.

Показания к применению. Гранулирующие и некротические раны, трофические язвы, ожоги и др.

Способ применения и дозы. Наружно (наносят на раневую поверхность или смачивают салфетки) per se, при больших раневых поверхностях в смеси со стерильным растительным маслом (1:5).

Побочное действие. Ощущение жжения при больших раневых поверхностях.

Форма выпуска. Во флаконах по 50 г.

Условия хранения. В защищенном от света месте.

Срок годности 10 лет.

Отредактировал: ledi24

ЦИКВАЛОН (Cycvalonum). 2,6-Диванилал-циклогексанон.

Фармакологическое действие. Желчегонное и противовоспалительное средство.

Показания к применению. Хронические холециститы, холангиты, желчнокаменная болезнь и др.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,1 г 3—4 раза в день в течение 3—4 нед. Курс лечения при необходимости повторяют через месяц.

Побочное действие. Возможны чувство тяжести в области печени, горечь во рту.

Противопоказания. Обтурация желчных протоков.

Форма выпуска. Таблетки по 0,1 г, в упаковке 20 штук.

Условия хранения. В сухом, защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

ЦИКЛОДОЛ (Cyclodolum). 1-Фенил-1-циклогексил-3-(N-пиперидино)-пропанола-1-гидрохлорид. Синонимы: Artane, Parkopan, Romparkin.

Фармакологическое действие. Оказывает выраженное центральное и периферическое холинолитическое действие.

Показания к применению. Паркинсонизм различной этиологии и другие заболевания экстрапирамидной системы, сопровождающиеся повышением мышечного тонуса и гиперкинезами.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,001—0,002 г в день; в зависимости от переносимости препарата дозу постепенно повышают до 0,002—0,004 г 3 раза в день.

Высшие дозы для взрослых внутрь: разовая 0,01 г, суточная 0,02 г.

Побочное действие. Сухость во рту, нарушение аккомодации, учащение пульса, при передозировке головокружение.

Противопоказания. Глаукома, фибрилляция предсердий. Необходима осторожность при заболеваниях печени и почек, гипертонической болезни, выраженном атеросклерозе.

Форма выпуска. Таблетки по 0,002 г, в упаковке 50 штук.

Условия хранения. Список А.

Срок годности 4 года.

ЦИКЛОМЕТИАЗИД (Cyclomethiazidum). 3-Циклопентил-метил-6-хлор-7-сульфамоил-3,4-дигидро-1,2,4-бензотиадиазин-1,1-диоксид. Синонимы: Cyclopenthiazidum, Navidrex.

По составу и действию на организм близок к дихлотиазиду (гипотиазид) и применяется в тех же случаях.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,00025—0,0005 г в день (в тяжелых случаях дозу увеличивают до 0,002 г) в течение 3—7 дней. Длительность лечения зависит от состояния больного.

Форма выпуска. Таблетки по 0,0005 г, в упаковке 20 штук.

Условия хранения. Список Б. В хорошо укупоренной таре.

Срок годности 4 года.

ЦИКЛОФОСФАН (Cyclophosphanum). N′-бис-β-Хлор-этил)-N′, О-триметиленовый эфир диамида фосфорной кислоты. Синонимы: Endoxan, Cyclophosphamide.

Фармакологическое действие. Цитостатический препарат; оказывает терапевтическое действие при опухолевых процессах. Подобно другим производным ди(2-хлорэтил)амина угнетает кроветворение.

Показания к применению. Рак яичников, рак молочной железы, рак легкого, лимфогранулематоз, лимфосаркома, ретикулосаркома,

Отредактировал: ledi24

множественная миелома, хронический лимфолейкоз, острый лейкоз.

Способ применения и дозы. Внутривенно, внутримышечно, внутриплевральио и внутрибрюшинно (в зависимости от показаний). Внутривенно или внутримышечно по 0,2 г ежедневно, 0,4 г через день или 0,6 г через 2 дня. Ослабленным больным при ухудшении показателей крови или плохой переносимости дневную дозу уменьшают до 0,2 г. На курс лечения 8—14 г; затем препарат назначают в поддерживающих дозах; внутривенно или внутримышечно по 0,1—0,2 г 2 раза в неделю.

Во время лечения исследуют кровь 2 раза в неделю.

Побочное действие. Лейкопения, тромбоцитопения, тошнота, рвота, алопеция; иногда боль в мышцах и костях, головная боль; в редких случаях токсический гепатит, цистит.

Противопоказания. Кахексия с резкой анемией, лейкопения, тромбоцитопения, сердечная недостаточность и тяжелые заболевания печени и почек.

Форма выпуска. Порошок во флаконах по 0,2 г для инъекций.

Условия хранения. Список А. В сухом прохладном (не выше 10°С), защищенном от света месте.

Срок годности. Для инъекций 3 года.

ЦИМЕЗОЛЬ (Cimesolum). В состав препарата входят: тримекаин 4 г, циминаль 0,1 г, порошок окисленной целлюлозы 2,5 г, препарат ОС-20 1,5 г, первичные синтетические жирные спирты 1,5 г, диметилсульфоксид 1,5 г, пропиленгликоль 20 г, вода дистиллированная 18,9 г, дихлордифторметан (хладон-12) 10 г, заключенные в аэрозольный баллон.

Фармакологическое действие. Оказывает бактерицидное действие на стафилококк, эшерихии, протей, палочку сине-зеленого гноя в виде монокультур и микробных ассоциаций, включая микрофлору, нечувствительную к антибиотикам. Обладает кровоостанавливающими и анестезирующими свойствами.

Показания к применению. Для лечения и профилактики гнойных осложнений, для анестезии и остановки капиллярных кровотечений при открытых повреждениях мягких тканей, гнойных ранах, пролежнях, трофических язвах, одонтогенных воспалительных процессах, для лечения ран после хирургической обработки острогнойных очагов (флегмоны, абсцессы, панариции, гаймориты), при ожогах I и II степени.

Способ применения и дозы. Перед применением баллон встряхивают. Препарат наносят на раневую поверхность из аэрозольного баллона. В течение 1—2 с выделяется 20—40 $см^3$ пены, что соответствует 2—4 г препарата. Количество препарата, необходимое для одноразового применения, зависит от площади раневой поверхности, так как рана должна полностью покрываться пеной. Перевязка ран производится через 2—3 сут до тех пор, пока не появится грануляция.

Форма выпуска. Аэрозольный баллон, содержащий 60 г препарата, с клапаном непрерывного действия, снабженный насадкой и предохранительным колпачком.

Условия хранения. В прохладном месте при температуре не выше 35°С. Оберегать от механических повреждений и воздействия прямых солнечных лучей и тепла.

Срок годности 2 года.

ЦИМИНАЛЬ (Ciminalum). пара-Нитро-α-хлоркоричный альдегид.

Фармакологическое действие. Антисептическое средство. Способствует эпителизации и заживлению ран.

Отредактировал: ledi24

Показания к применению. Пиодермия, инфицированные раны и трофические язвы, ожоги II степени.

Способ применения и дозы. Наружно в виде присыпки (5 мг на 1 $см^2$ поврежденной поверхности).

Побочное действие. При длительном применении дерматиты, чувство жжения и зуд.

Противопоказания. Глубокие ожоги и экземы.

Форма выпуска. Присыпка в упаковке по 5 г.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 5 лет.

ЦИНК-КОРТИКОТРОПИН СУСПЕНЗИЯ (Suspensio Zinc-corticotropini). Содержит в 1 мл 20 ЕД кортикотропина.

Фармакологическое действие. Физиологический стимулятор коры надпочечников, повышает биосинтез и выделение в ток крови кортикостероидных гормонов, в основном глюкокортикоидов. Одновременно уменьшает содержание в надпочечниках аскорбиновой кислоты и холестерина.

Показания к применению. При вторичной гипофункции коры надпочечников, для предупреждения атрофии надпочечников и предупреждения «синдрома отмены» после длительного лечения кортикостероидными препаратами, а также для лечения ревматизма, инфекционных неспецифических полиартритов, бронхиальной астмы, острого лимфобластного и миелобластного лейкоза, нейродермита, экземы, различных аллергических и других заболеваний.

Способ применения и дозы. Внутримышечно по 10, 20 или 40 ЕД (0,5, 1 или 2 мл) 1 раз в сутки. Для поддерживающей терапии назначают 2—3 раза в неделю в дозе, не превышающей 20 ЕД (для взрослого).

Побочное действие. Отеки, повышение АД, тахикардия.

Противопоказания. Тяжелая форма гипертонической болезни и болезни Иценко — Кушинга, беременность, недостаточность кровообращения III стадии, острый эндокардит, психозы, нефрит, остеопороз, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, недавно перенесенные операции, сифилис, активная форма туберкулеза, сахарный диабет, аллергические реакции.

Форма выпуска. Суспензия по 5 мл во флаконе по 20 ЕД в 1 мл для инъекций.

Условия хранения. Список Б. В сухом, защищенном от света месте при температуре от 1°С до 10°С. Не допускается замораживание препарата.

Срок годности 2 года.

ЦИНКОВАЯ МАЗЬ (Unguentum Zinci). Состав: окиси цинка 1 часть, вазелина 9 частей.

Применение. В качестве антисептического, вяжущего и подсушивающего средства при кожных заболеваниях.

Форма выпуска. В упаковке по 30 г, ангро.

Условия хранения. В хорошо укупоренной таре.

Срок годности 8 лет.

ЦИНКОВАЯ ПАСТА (Pasta Zinci). Состав: окиси цинка 25 г, крахмала 25 г, вазелина 50 г.

Применение. В качестве антисептического, вяжущего и подсушивающего средства при кожных заболеваниях.

Отредактировал: ledi24

Форма выпуска. В упаковке по 25 г, ангро.
Условия хранения. В хорошо укупоренной таре.
Срок годности 10 лет.

ЦИНКА СУЛЬФАТ (Zinci sulfas).
Применение. В качестве антисептического и вяжущего средства при конъюнктивитах, хроническом катаральном ларингите, уретритах, вагинитах наружно в виде 0,1%, 0,25% и 0,5% растворов; в качестве рвотного средства внутрь по 0,1—0,3 г на прием (высшая разовая доза 1 г).
Форма выпуска. Порошок; 0,25% раствор в тюбик-капельнице с 2% раствором борной кислоты 1,5 мл, в упаковке по 2 штуки.
Условия хранения. Список Б.
Срок годности. Порошок — не ограничен; капли с борной кислотой во флаконах 2 года, в тюбик-капельницах $2^1/_2$ года.

«ЦИНКУНДАН» («Zincundanum»). Состав: цинка ундециленовокислого 10 г, ундециленовой кислоты 10 г, анилида салициловой кислоты 10 г, этилцеллозольва 5 г, эмульгатора № 1 6 г, метилцеллюлозы 1,2 г, воды 57,8 г.
Фармакологическое действие. Обладает противогрибковой активностью.
Показания к применению и способ применения те же, что и для ундецина.
Форма выпуска. Мазь в упаковке по 25 г.
Условия хранения. В прохладном месте.
Срок годности 2 года.

ЦИННАРИЗИН (Cinnarizinum). транс-1-Циннамил-4-дифенилметилпиперазин. Синоним: стугерон.
Фармакологическое действие. Препарат избирательно улучшает мозговое кровообращение, расслабляет гладкую мускулатуру сосудов. Является антагонистом кальция.
Показания к применению. Ишемические нарушения мозгового кровообращения, связанные с гипертонической болезнью и церебральным атеросклерозом; мигрень; климактерические сосудистые расстройства; нарушения периферического кровообращения (перемежающаяся хромота).
Способ применения и дозы. Внутрь по 0,025—0,05 г 2—3 раза в день в качестве сосудорасширяющего и спазмолитического средства.
Форма выпуска. Таблетки по 0,025 г, в упаковке 50 штук.
Условия хранения. Список Б.
Срок годности 2 года.
Поставляется из Болгарии и Венгрии.

ЦИПРИНОЛ (Ciprinol).
Фармакологическое действие. Синтетический химиотерапевтический препарат, относящийся к группе производных хинолона и обладающий ингибирующим воздействием на бактериальную ДНК-гиразу. Эффективен в отношении многочисленных грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, включая микроорганизмы, резистентные к действию других антибиотиков.
Показания к применению. Инфекции, вызванные чувствительными к ципрофлоксацину микроорганизмами: инфекции мочевых и дыхатель-

Отредактировал: ledi24

ных путей, уха, горла, носа, инфекции в гинекологии, брюшной полости, печени и желчных путей, костей и суставов, кожи, септикемия.

Способ применения и дозы. Больные должны проглатывать таблетки, не разжевывая и запивая небольшим количеством жидкости, лучше — натощак. Внутривенное вливание (в течение около 30 минут) — наилучший способ внутривенного введения препарата. В случае осложненных и тяжелых инфекций надо руководствоваться специальной инструкцией. При лечении острой гонореи достаточно одноразового приема 250 мг через рот или 100 мг внутривенно. Для пожилых больных доза должна быть как можно более низкой. Больным с нарушениями функции почек доза препарата вводится только один раз в день или дважды по $^1/_2$ дозы. Следует соблюдать предосторожности при приеме ципринола во время управления автотранспортом либо работы на станках и машинах.

Побочное действие. Тошнота, рвота, боль в желудке, метеоризм, анорексия, диарея (при тяжелой диарее в ходе лечения необходима отмена терапии), головокружение, ощущение усталости, головная боль, сенсорные нарушения, возбуждение, ощущение беспокойства, редко — ухудшение зрения, судороги.

Противопоказания. Гиперчувствительность к препарату, беременность и кормление грудью, период полового созревания у детей.

Форма выпуска. Таблетки по 250 мг —10 штук в упаковке; таблетки по 500 мг —10 штук в упаковке; ампулы по 100 мг/10 мл —5 штук в упаковке.

Срок годности 3 года.

Поставляется фирмой «КРКА», Словения.

ЦИСТАМИНА ДИГИДРОХЛОРИД (Cystamini dihydrochloridum). Дигидрохлорид бис-(β-аминоэтил) дисульфида.

Фармакологическое действие. Предупреждает и уменьшает лучевую реакцию, возникающую при действии на организм больших доз рентгеновых лучей или γ-лучей. Защитный эффект продолжается до 5 ч. При развившейся лучевой болезни неэффективен. Цистамина дигидрохлорид оказывает также гипотензивное действие.

Показания к применению. Для профилактики лучевой болезни при терапии злокачественных новообразований большими дозами радиации.

Способ применения и дозы. Внутрь за 1 ч до облучения по 0,2—0,8 г ежедневно или через день на протяжении всего курса лучевой терапии.

Побочное действие. Иногда тошнота, ощущение жжения в пищеводе, изредка боль в подложечной области, которая не требует отмены препарата. В дозе 0,4—0,6 г препарат может вызвать значительное и длительное снижение АД.

Противопоказания. Острые заболевания желудочно-кишечного тракта; острая недостаточность сердечно-сосудистой системы и печени.

Форма выпуска. Таблетки по 0,2 г, в упаковке 6 штук.

Условия хранения. Список Б. В сухом прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 6 лет.

ЦИСТЕИН (Cysteinum). L-α-Амино-β-меркаптопропионовая кислота.

Фармакологическое действие. Аминокислота, принимающая участие в обмене веществ хрусталика глаза.

Показания к применению. Начальные формы катаракты.

Способ применения и дозы. В виде 5% раствора на дистиллированной воде (для электрофореза).

Отредактировал: ledi24

Противопоказания. Чашеобразная форма катаракты, повышение внутриглазного давления.

Форма выпуска. Порошок.

Условия хранения. В сухом прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 4 года.

ЦИСТЕНАЛ (Cystenal). Состав: настойки корня марены красильной 0,0093 г, магния салицилата 0,14 г, эфирных масел 5,75 г, спирта этилового 0,8 г, оливкового масла до 10 мл.

Фармакологическое действие. Спазмолитическое, противовоспалительное и диуретическое средство.

Показания к применению. Мочекаменная болезнь.

Способ применения и дозы. Внутрь за 30 мин до еды по 3—4 капли (при приступе 20 капель) на кусочке сахара; при частых приступах 10 капель 3 раза в день.

Противопоказания. Гломерулонефрит, выраженное нарушение функции почек, язвенная болезнь желудка.

Форма выпуска. Во флаконах по 10 мл.

Условия хранения. В обычных условиях.

Срок годности 3 года.

Поступает из Чехо-Словакии.

ЦИТАРАБИН (Citarabinum). 4-Амино-1-β-D-арабинофуранозил-2 (1-Н)-пиримидинон, или 1-β-D-арабинофуранозилцитозин. Синонимы: Alexan, Cytosar, Cytarabine.

Фармакологическое действие. Относится к группе антиметаболитов пиримидинового обмена и обладает противолейкозной активностью. Его биохимический механизм действия связи с ингибированием биосинтеза ДНК. Противолейкозную активность препарат приобретает после его фосфорилирования, протекающего в миелобластах, лимфобластах, лимфоцитах, в меньшей степени в гранулоцитах, эритроцитах, тромбоцитах. Угнетает костномозговое кроветворение. Препарат дезаминируется и выводится из организма.

Показания к применению. Острые лейкозы (преимущественно нелимфобластные формы) и бластные кризы хронического миелолейкоза.

Способ применения и дозы. Вводят внутривенно (капельно или медленно струйно), подкожно или интратекально (интралюмбально).

Суточная доза цитарабина составляет 100 мг/м^2, курсовая доза при всех путях введения —500—1000 мг. У больных пожилого возраста или с пониженными резервами кроветворения применяют 50—75 мг/м^2.

Непосредственно перед употреблением содержимое флакона растворяют изотоническим раствором хлорида натрия или водой для инъекций (для внутривенного введения в 400 мл, для подкожного и интратекального в 1 мл).

Внутривенно суточную дозу (100 мг/м^2) вводят в виде двух капельных трансфузий медленно (3 ч) с интервалом 10 ч. Суточную дозу препарата можно вводить в виде непрерывной внутривенной инфузии в течение 24 ч.

Под кожу вводят по 20 мг/м^2 2—3 раза в сутки.

Цитарабин назначают ежедневно в течение 4—7 дней (максимально 10 дней).

Интратекально для профилактики нейролейкозов препарат вводят 1 раз в 3 дня в течение 15 дней в однократной дозе 20 мг/м^2 (обычно в сочетании с метотрексатом в дозе 12,5 мг/м^2). Для определения инди-

Отредактировал: ledi24

видуальной переносимости препарата в этих случаях можно постепенно повышать разовую дозу с 3 мг/м^2 до 20 мг/м^2. Проводят 4—7 курсов. Интервалы между курсами 10—14 дней.

Цитарабин применяют самостоятельно или в комбинации с другими цитостатическими средствами (циклофосфан, винкристин, L-аспарагиназа, рубомицин, карминомицин) и преднизолоном.

Лечение проводят под контролем числа лейкоцитов в периферической крови (ежедневно или через день), функции костного мозга (до и после каждого курса терапии), печени (не реже одного раза в неделю), выделительной функции почек (до начала и после окончания курса терапии).

Побочное действие. Возможны: лейкопения, тромбоцитопения, анемия, мегалобластоз, тошнота, рвота, потеря аппетита, боль в животе, диарея, воспаление и изъязвление слизистой оболочки полости рта, тромбофлебиты, нарушение функции печени, реже — почек. В этом случае следует уменьшить дозу или отменить препарат.

Противопоказания. Индивидуальная непереносимость препарата, угнетение костного мозга, тяжелые нарушения функции печени и почек, беременность.

Форма выпуска. Лиофилизированный порошок по 0,1 г, в упаковке 10 флаконов.

Условия хранения. При температуре не выше +5°С.

Срок годности 2 года.

ЦИТИТОН (Cytitonum) —0,15% раствор алкалоида цитизина.

Фармакологическое действие. Рефлекторно возбуждает дыхательный центр, стимулирует сосудодвигательный центр, симпатические ганглии и надпочечники, что приводит к повышению АД.

Показания к применению. Асфиксия (в том числе и у новорожденных), шок, коллапс, остановка дыхания (при операциях, травмах и т. д.), угнетение дыхания и кровообращения при инфекционных болезнях и др. В связи с кратковременностью действия и появлением специфических антагонистов опиатов и барбитуратов в настоящее время цититон имеет ограниченное применение при отравлениях.

Способ применения и дозы. Внутривенно и внутримышечно по 0,5—1 мл. Высшая разовая доза 1 мл, суточная 3 мл.

Побочное действие. Замедление сердечного ритма, тошнота, рвота.

Противопоказания. Гипертоническая болезнь, атеросклероз, отек легких, внутренние кровотечения и кровотечения из крупных сосудов.

Форма выпуска. 0,15% раствор в ампулах по 1 мл, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности 5 лет.

ЦИТОХРОМ-С (Cytochromum-C). Ферментный препарат, получаемый путем экстракции из ткани сердец крупного рогатого скота.

Фармакологическое действие. Принимает участие в процессах тканевого дыхания. Железо, содержащееся в простетической группе цитохрома-С, обратимо переходит из окислительной формы в восстановленную и ускоряет окислительные процессы.

Показания к применению. Для улучшения тканевого дыхания при асфиксии новорожденных, при астматических состояниях, хронической пневмонии, сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца, вирусном гепатите, старческой дегенерации сетчатки глаза, при интоксикациях и других состояниях, сопровождающихся нарушением окислительных процессов в организме.

Отредактировал: ledi24

Способ применения и дозы. Внутрь, внутримышечно и внутривенно. Перед применением инъекционной формы обязательно определяют индивидуальную чувствительность к препарату. Для этого внутрикожно вводят 0,1 мл (0,25 мг) препарата. Если в течение 30 мин не наступает реакция (покраснение лица, зуд, крапивница), то можно приступать к лечению.

Препарат вводят внутривенно или внутримышечно по 4—8 мл (10—20 мг) 1—2 раза в день. Курс лечения 10—14 дней.

При заболеваниях сердца препарат в этой же дозе вводят в 200 мл изотонического раствора хлорида натрия или 5% раствора глюкозы внутривенно капельно (30—40 капель в минуту) в течение 6—8 ч. За сутки вводят 12—32 мл (30—80 мг).

В послеоперационном периоде и при хронической коронарной недостаточности вводят внутривенно 2 раза в день по 4 мл (10 мг) на инъекцию. При тяжелом состоянии (травма, шок, печеночная кома, отравление снотворными, окисью углерода) назначают внутривенно 20—40 мл (50—100 мг). При асфиксии новорожденных вводят в пупочную вену на протяжении первых 2 мин после рождения в дозе 10 мг.

При бронхиальной астме назначают внутримышечно 2 раза в день по 5—10 мг на инъекцию. Курс лечения 14—25 дней в зависимости от фазы в стадии заболевания.

Таблетки цитохрома-С принимают внутрь для предупреждения и снятия побочных явлений, связанных с повышенными нагрузками на организм, а также при вирусном гепатите независимо от приема пищи по 80 мг/сут (по 20 мг 4 раза в день). Курс лечения 5—10 дней в зависимости от тяжести гипоксии. При значительных стрессовых нагрузках рекомендуется применять за 2 ч до нагрузки в дозе 60—100 мг одномоментно.

Побочное действие. При быстром внутривенном введении возможен озноб с повышением температуры тела.

Противопоказания. Индивидуальная непереносимость.

Форма выпуска. Ампулы 0,25% раствора (в изотоническом 0,9% растворе натрия хлорида) по 4 мл, в упаковке 10 штук и таблетки, покрытые оболочкой, растворимые в кишечнике, по 0,01 г, в упаковке 50 штук.

Условия хранения. В защищенном от света месте при температуре не выше 25°С.

Срок годности. Ампулы 2 года; таблетки, растворимые в кишечнике, 2 года.

ЦИТРАЛЬ (Citralum). Алифатический непредельный альдегид (смесь цис- и транс-изомеров линоленной и терпиноленной форм).

Применение. Как противовоспалительное и болеутоляющее средство при конъюнктивитах и кератитах по 1—2 капли водно-спиртового раствора (1:10 000).

Форма выпуска. Во флаконах.

Условия хранения. В прохладном месте в хорошо укупоренной таре.

Срок годности 6 мес.

«ЦИТРАМОН» («Citramonum»). Состав: кислоты ацетилсалициловой 0,24 г, кофеина 0,03 г, фенацетина 0,18 г, порошка какао 0,03 г, лимонной кислоты 0,02 г, сахара 0,5 г.

Применение. В качестве анальгезирующего средства при головной

Отредактировал: ledi24

боли, невралгии и жаропонижающего при простудных заболеваниях по 1 таблетке 2—3 раза в день.

Форма выпуска. В упаковке по 6 штук.

Условия хранения. Список Б. В сухом, защищенном от света месте.

Срок годности 5 лет.

ЦИТРОГЛЮКОФОСФАТ (Citroglucophosphatum). Состав: кислоты лимонной х. ч. в пересчете на 100% безводную кислоту 10 г, глюкозы безводной 30 г, натрия фосфата трехзамещенного ч.д.а. 7,5 г, раствора едкого натра до pH 5,5—5,9, воды для инъекции — до 1 л.

Показания к применению. Консервирование донорской крови.

Способ применения и дозы. При заготовке крови в соответствии со специальными инструкциями донорскую кровь помещают в простерилизованные флаконы, содержащие цитроглюкофосфат в соотношении 1:4.

Форма выпуска. Стерильные растворы в герметически укупоренных флаконах вместимостью 50, 100, 250 и 450 мл, содержащих соответственно 0, 20, 50 и 75 мл цитроглюкофосфата и 100 мл.

Условия хранения. В сухом темном месте при комнатной температуре.

Срок годности 2 года.

ЦЭФЕДРИН (Cephedrinum). 2-1-Фенил-2-метил-(β-цианэтил)-амино-пропанола-1 гидрохлорид.

Фармакологическое действие. Обладает антидепрессивной активностью; усиливает эффекты симпатомиметических веществ, снимает каталепсию, вызванную нейролептиками.

Показания к применению. Депрессивные состояния различной этиологии; эндогенная депрессия в рамках маниакально-депрессивного психоза и циклотимии, депрессии, сопровождающие различные формы шизофрении, связанные с органическими заболеваниями головного мозга, психопатии, неврозы и особенно депрессии, сопровождающиеся моторной и идеаторной заторможенностью.

Способ применения и дозы. Внутрь, начиная с 25 мг 2—3 раза в день, затем дозу постепенно повышают до 200—300 мг/сут. (в отдельных случаях до 400—500 мг/сут.). После достижения терапевтического эффекта дозу постепенно уменьшают и переходят на поддерживающую терапию 0,025—0,05 г (25—50 мг) в день.

В амбулаторных условиях при нерезко выраженной депрессии назначают по 50—75 мг/сут. (в 2—3 приема), доза не должна превышать 150 мг (0,15 г) в день. Длительность основного курса лечения 3—6 нед.

Высшие дозы для взрослых внутрь: разовая 0,2 г (200 мг), суточная 0,5 г (500 мг).

Побочное действие. Сухость во рту, склонность к запорам. Неприятные ощущения в области желудка, нарушения аккомодации. При повышенной чувствительности к препарату возможны возбуждение, нарушение сна. Препарат не следует назначать перед сном.

Противопоказания. Ажитированное состояние; почечная и печеночная недостаточность, тяжелое заболевание сердца, беременность.

Форма выпуска. Таблетки по 0,025 г, в упаковке 50 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

ЧАБРЕЦА ТРАВА (Herba Serpylli). Содержит эфирное масло (0,5—1%), в состав которого входит цимол, карвакрол, тимол; дубильные вещества.

Применение. Как отхаркивающее и бактерицидное средство при

Отредактировал: ledi24

бронхитах и заболеваниях верхних дыхательных путей в виде настоя (15,0:200,0) по 1 столовой ложке 2—3 раза в день или жидкого экстракта по 1 чайной ложке 3—4 раза в день.

Форма выпуска. Трава в упаковке по 100 г; жидкий экстракт (Extractum Serpylli fluidum) массой 100 г.

Условия хранения. В сухом прохладном месте.

Срок годности. Трава и экстракт жидкий 2 года.

ЧАГА — БЕРЕЗОВЫЙ ГРИБ (Fungus Betulinus). Содержит 20% хромогенный полифенолкарбоновый комплекс, агариципновую кислоту, тритерпеноид инотодиол, значительное количество марганца.

Применение. Как симптоматическое средство при хронических гастритах, злокачественных новообразованиях различной локализации (иноперабельные случаи) в виде настоя (20,0:100,0). Измельченный гриб заливают кипяченой водой (температура 50—60°С) на 48 ч. Затем жидкость сливают, а остаток отжимают через несколько слоев марли. Принимают по стакану 1—3 раза в день по назначению врача. При приеме настоя чаги рекомендуется преимущественно молочно-растительная диета.

Противопоказания. Применение пенициллина, внутривенное введение глюкозы.

Форма выпуска. Весовой.

Условия хранения. В сухом прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

ЧЕРЕДЫ ТРАВА (Herba Bidentis). Содержит флавоноиды, каротиноиды, дубильные вещества, аскорбиновую кислоту.

Применение. Как противовоспалительное и противоаллергическое средство при различных диатезах и гнойничковых заболеваниях кожи в виде настоя (10,0:200,0) внутрь по 1 столовой ложке 2—3 раза в день; наружное обмывание.

Форма выпуска. В упаковке по 100 г; в брикетах по 75 г.

Условия хранения. В сухом прохладном месте.

Срок годности 2 года.

ЧЕРЕМУХИ ПЛОДЫ (Fructus Pruni racemosae). Содержат дубильные вещества пирокатехиновой группы, органические кислоты, сахар, аскорбиновую кислоту; в семенах гликозид амигдалин.

Применение. Как вяжущее средство при поносах в виде настоя или отвара (1 столовая ложка плодов на стакан кипящей воды) по $^1/_4$ стакана 2—3 раза в день.

Форма выпуска. В упаковке по 50 г.

Условия хранения. В сухом, хорошо проветриваемом месте.

Срок годности не установлен.

ЧЕРНИКИ ПЛОДЫ (Fructus Myptilli). Содержат дубильные вещества пирокатехиновой группы (5—7%), сахар (5—20%), антоцианы, пектиновые вещества, органические кислоты, витамин B_2, гликозид миртиллин.

Применение. Как вяжущее средство при поносах в виде настоя (1—2 чайные ложки на стакан кипятка) по $^1/_2$ стакана 2—3 раза в день или в виде киселя.

Форма выпуска. В упаковке по 50 г.

Условия хранения. В сухом, хорошо проветриваемом помещении.

Срок годности 2 года.

Отредактировал: ledi24

ЧИЛИБУХИ НАСТОЙКА (Tinctura Strychni). Синоним: Tinctura nucis vomicae.

Применение. Как общетонизирующее средство и как горечь для возбуждения аппетита по 3—10 капель на прием. Высшая разовая доза для взрослых 15 капель, суточная 30 капель.

Форма выпуска. Весовой 100 мл.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности 5 лет.

ЧИСТЕЦА БУКВИЦЕЦВЕТНОГО ЭКСТРАКТ ЖИДКИЙ (Extractum Stachydis betonicae florae fluidum). Спиртовое извлечение 1:1 на 40% спирте из надземных частей чистеца буквицецветного.

Фармакологическое действие. Усиливает сокращение матки.

Применение. При субинволюции матки после родов и абортов, при функциональных маточных кровотечениях (воспалительного характера), кровотечениях на почве фибромиом по 20—30 капель 3—4 раза в день.

Противопоказания. Беременность.

Форма выпуска. Во флаконах по 50 мл.

Условия хранения. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности $2^1/_2$ года.

ШАЛФЕЯ ЛИСТЬЯ (Folium Salviae). Содержат эфирное масло (0,5—2%), дубильные вещества, урсоловую и олеаноловую кислоты.

Применение. Как вяжущее и противовоспалительное средство при заболеваниях полости рта, зева, глотки и гортани для полосканий в виде настоя (10,0:200,0).

Форма выпуска. В упаковке по 50 г.

Условия хранения. В сухом прохладном месте.

Срок годности. Содержание эфирного масла проверяется ежегодно.

ШИПОВНИКА ПЛОДЫ (Fructus Rosae). Содержат аскорбиновую кислоту (до 6%), витамины B_2, К, Е (в семенах), флавоноиды с Р-витаминной активностью, каротиноиды, дубильные и пектиновые кислоты, лимонную кислоту, сахар.

Применение. Как средство, содержащее аскорбиновую кислоту, в виде настоя (10,0:200,0) из плодов 2 раза в день по $^1/_4$—$^1/_2$ стакана для взрослых, по $^1/_8$—$^1/_4$ стакана для детей; для профилактических целей в виде витаминного сиропа из плодов по 1 чайной ложке 1 раз в день (сироп следует запивать водой); для лечебных целей 2—3 раза в день.

Форма выпуска. Плоды в коробке по 100 г

Условия хранения. В сухом, хорошо проветриваемом помещении.

Срок годности 2 года.

ШИПОВНИКА МАСЛО (Oleum Rosae pingue). Маслянистая жидкость, в состав которой входят насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты, а также каротиноиды, токоферолы.

Применение. Наружно при трещинах и ссадинах сосков у кормящих женщин, при пролежнях, трофических язвах голени, дерматозах, озене; клизмы при неспецифическом язвенном колите.

Форма выпуска. Во флаконах по 100 мл.

Условия хранения. В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 20°С.

Срок годности 2 года.

Отредактировал: ledi24

ЭВКАЛИПТА ЛИСТ (Folium Eucalypti). Содержит эфирное масло (1—3%), дубильные вещества, органические кислоты и др.

Фармакологическое действие. Антисептическое, противовоспалительное и успокаивающее средство.

Показания к применению. Заболевания верхних дыхательных путей, ларингиты, трахеиты, свежие инфицированные раны, воспалительные заболевания женских половых органов.

Способ применения и дозы. Для полосканий и ингаляций назначают 1 столовую ложку отвара из листьев (10,0:200,0) на стакан воды, масло и настойку (10—20 капель на стакан воды), внутрь — настойку 15—20 капель на прием (как успокаивающее средство).

Форма выпуска. Листья резаные в упаковке по 100 г, масло (Oleum Eucalypti) во флаконах, настойка (Tinctura Eucalypti) по 25 мл, аптро.

Условия хранения. В сухом прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности. В листьях содержание эфирного масла проверяется ежегодно. Настойка 5 лет.

«ЭВКАТОЛ» КАПЛИ (Guttae «Eucatolum»). Состав: ментола 0,15 г, настойки эвкалипта 20 мл, спирта этилового 90% до 40 мл.

Фармакологическое действие. Обладает противовоспалительным и слабым антисептическим свойством.

Показания к применению. Воспалительные заболевания верхних дыхательных путей.

Способ применения и дозы. По 5—10 капель на стакан воды для полосканий.

Форма выпуска. В стеклянных флаконах по 40 мл.

Условия хранения. В прохладном месте.

Срок годности 1 год.

ЭГЛОНИЛ (Eglonyl). N-[(Этил-1-пирролидинил-2)-метил]-метокси-2-сульфамоил-5-бензамид. Синонимы: Sulpirid, Dogmatil.

Фармакологическое действие. Оказывает регулирующее действие на функции вегетативной нервной системы, воздействуя на бульбарные центры, сетчатое образование и ядра подбугорья, способствует значительному улучшению микроциркуляции в области пищеварительного тракта, ускоряет заживление язвы и улучшает перистальтику кишечника.

Является нейролептиком с незначительным антипсихотическим и противорвотным действием. Психотропная активность препарата определяется его способностью оказывать стимулирующее, психорегулирующее действие, активировать моторно-волевую и эмоциональную сферу.

Препарат не вызывает привыкания. Можно назначать больным сахарным диабетом.

Показания к применению. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Депрессивные состояния, состояния невротического торможения, инволюционные старческие психозы, острые психозы, шизофрения, маниакально-депрессивные психозы, тяжелые психозы у детей и подростков.

Способ применения и дозы. Назначают внутрь и внутримышечно. Дозы подбирают в зависимости от показаний и тяжести заболевания.

Форма выпуска. Ампулы по 2 мл, в упаковке 30 штук; таблетки по 0,2 г, в упаковке 12 штук.

Срок годности. Таблетки 3 года, ампулы 4 года.

Поставляется из Югославии.

Отредактировал: ledi24

ЭЗЕРИНА САЛИЦИЛАТ (Eserini salicylas). Синоним: Physostigmini salicylas.

Фармакологическое действие. Препарат антихолинэстеразного действия.

Показания к применению. Для сужения зрачка и понижения внутриглазного давления при глаукоме; нервно-мышечные заболевания; парез кишечника.

Способ применения и дозы. В конъюнктивальный мешок по 1—2 капли 0,25—1% раствора 1—6 раз в день; подкожно по 0,5—1 мл 0,1% раствора.

Форма выпуска. Порошок.

Условия хранения. Список А. В защищенном от света месте.

Срок годности 5 лет.

ЭКДИСТЕН (Ecdistenum). Природное соединение стероидной структуры.

Фармакологическое действие. Оказывает тонизирующее действие, способствует усилению биосинтеза белка в организме. Препарат ослабляет действие снотворных, повышает физическую работоспособность. В отличие от анаболических стероидов экдистен не обладает андрогенным, антигонадотропным, тимолитическим эффектом, не влияет на функциональные возможности коры надпочечников.

Показания к применению. Как тонизирующее средство при астенических и астенодепрессивных состояниях, связанных с ослаблением белоксинтезирующих процессов, при длительных интоксикациях, инфекциях, неврастении, неврозах, гипотонии, у спортсменов во время интенсивных тренировок при дисфункциях сердечно-сосудистой системы, особенно с выраженными признаками перенапряжения миокарда и усилением белкового катаболизма, а также как средство, повышающее скоростно-силовые качества в период подготовки к соревнованиям.

Способ применения и дозы. Принимают внутрь до еды по 0,005—0,01 г 3 раза в день. Курс лечения (15—20 дней) при необходимости может быть повторен после 1—2-недельного перерыва.

В спортивной медицине препарат применяют по 0,01—0,02 г 3 раза в день в течение 2—3 нед.

Высшие дозы для взрослых внутрь: разовая 0,025 г (25 мг), суточная 0,1 г (100 мг).

Для достижения эффекта одновременно с применением экдистена больной должен получать с пищей адекватные количества белков, жиров, углеводов, витаминов и минеральных веществ.

Побочное действие. У больных с лабильной нервной системой возможны бессонница, повышение АД. В этих случаях уменьшают дозу или прекращают прием препарата вечером.

Противопоказания. Нервное возбуждение, бессонница, гипертоническая болезнь, эпилепсия и гиперкинезы.

Форма выпуска. В таблетках по 0,005 г (5 мг).

Условия хранения. Список Б. В сухом, защищенном от света месте.

Срок годности 2 года.

ЭКТЕРИЦИД (Ectericidum). Препарат, получаемый из рыбьего жира. Содержит альдегиды, жирные кислоты и перекиси.

Фармакологическое действие. Антибактериальный препарат. Активен в отношении пиогенной микрофлоры (протей, стафилококки, синегнойная палочка, эшерихии).

Показания к применению. Раны, осложненные пиогенной флорой,

Отредактировал: ledi24

фурункулы, карбункулы, ожоги, нагноившиеся трофические язвы; для санации при носительстве менингококка.

Способ применения и дозы. Наружно (орошения раневой поверхности, повязки). Повязки меняют через 3—4 дня; при ожогах препарат применяют с 0,5% раствором новокаина (10 мл новокаина на 50 мл эктерицида). При носительстве менингококка орошают носоглотку (25—30 мл препарата), закапывают в нос по 4—5 капель и закладывают турунды в каждую половину носа на 20—25 мин; санацию проводят под бактериологическим контролем.

Форма выпуска. Во флаконах по 250 мл.

Условия хранения. При температуре от 4 до 10°С.

Срок годности 2 года.

ЭЛЕУТЕРОКОККА ЭКСТРАКТ ЖИДКИЙ (Extractum Eleutherococci fluidum). В медицинской практике используют корни, которые содержат производные кумарина.

Фармакологическое действие. Стимулятор центральной нервной системы.

Применение. Как общеукрепляющее и тонизирующее средство, повышающее физическую и умственную работоспособность, ежедневно внутрь в виде спиртового экстракта по 20—40 капель за 30 мин до еды в течение 25—30 дней.

Противопоказания. Лихорадочные состояния, острые инфекционные болезни.

Форма выпуска. Экстракт жидкий во флаконах по 50 мл.

Условия хранения. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 4 года.

ЭМЕТИНА ГИДРОХЛОРИД (Emetini hydrochloridum).

Фармакологическое действие. Эффективен в отношении возбудителя амебной дизентерии и некоторых трематод.

Показания к применению. Амебная дизентерия.

Способ применения и дозы. Парентерально (под кожу или в мышцу) взрослым по 1,5 мл 1% раствора 2 раза в сутки ежедневно в течение 6—8 дней. Высшие дозы для взрослых: разовая 0,05 г (5 мл 1% раствора), суточная 0,1 г (10 мл 1% раствора). Дозы для детей уменьшают в соответствии с возрастом. В острый период заболевания проводят 1—2 цикла лечения с интервалом 7—10 дней.

Побочное действие. Возможны тошнота, рвота, боль в мышцах конечностей, сердечная слабость, полиневриты.

Противопоказания. Детям до 6 мес. не назначают.

Форма выпуска. В ампулах по 1 мл 1% раствора, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 5 лет.

ЭНАП (Enap). Состав: 1 таблетка содержит 10 мг эналаприлмалеата и 25 мг гидрохлортиазида.

Фармакологическое действие. При пероральном приеме в желудочно-кишечном тракте всасывается около 60% эналаприла, который в организме человека гидролизуется до эналаприлата, обладающего способностью ингибировать ангиотензинпревращающий фермент (АСЕ) В результате снижается концентрация ангиотензина II в плазме и уменьшается выделение альдостерона. Одновременно незначительно повышается содержание калия в сыворотке. Вследствие тормозящего действия на ренин-ангиотензин-альдестероновую систему снижается повышенное кровяное давление и у больных с низкой концентрацией

Отредактировал: ledi24

ренина. Максимальная концентрация эналаприла в крови достигается через 3—4 часа после приема препарата и держится 24 часа. Гидрохлортиазид обладает диуретическими и антигипертоническими свойствами; увеличивает выделение ренина. В сочетании гидрохлортиазид и эналаприл-малеат оказывают более интенсивное гипотензивное действие, чем каждая составная часть в отдельности, и одновременно уменьшают потерю калия вследствие присутствия тиазида.

Показания к применению. Эссенциальная гипертензия любой степени тяжести, где есть необходимость в комбинированном лечении.

Способ применения и дозы. Обычная дозировка — 1, максимум 2 таблетки 1 раз в день независимо от еды, но в зависимости от восприимчивости индивидуального больного.

Больным, которые принимают диуретик, рекомендуется прекращение лечения или снижение дозы за 3 дня до начала терапии эналом, чтобы предупредить быстрое падение давления. Предварительно необходимо контролировать функцию почек. Не следует начинать лечение с назначения фиксированной комбинации; оно не зависит от продолжительности приема.

Осторожность требуется в отношении больных с ослабленной функцией почек (клиренс креатинина от 30 до 80 мл/мин) и больных, которые лечатся препаратами, уменьшающими иммунологическую реакцию (аллопуринол или комбинации с ним), а также при инсулинозависимом сахарном диабете. В случае резкого падения давления больного надо положить строго горизонтально и произвести коррекцию объема плазмы: дать перорально раствор поваренной соли либо внутривенно ввести физиологический раствор. Когда нормальное давление будет восстановлено, можно продолжить прием энапа.

К снижению кровяного давления приводит одновременный прием других антигипертензивных препаратов, барбитуратов, трициклических антидепрессантов, лития, фенотиазинов, алкоголя. Комбинированный прием энапа с калиесберегающими препаратами (амилорид) может увеличить концентрацию калия в крови. Анальгетики, антифлогистики и большое содержание соли в крови уменьшают действие энапа. Одновременный прием цитостатиков, иммунодепрессантов и системных кортикостероидов может привести к пониженному содержанию лейкоцитов. Осторожность необходима и при приеме дигиталиса.

Побочное действие. Оно обычно носит незначительный и обратимый характер и не требует отмены терапии. Отмечаются нарушения пищеварения, головокружение, головная боль, мышечные спазмы, кашель и кожные высыпания. При идиосинкразии (ангиоотеке с отеком языка и горла) лечение прекращается и по необходимости вводится субкутанно раствор норадреналина 1:1000 (0,3 до 0,5 мл). Если увеличивается содержание мочевины в крови и сыворотке, лечение прерывается до появления стабилизации, тогда терапию можно продолжать при условии систематического лабораторного контроля.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к одной из составных частей препарата: стеноз почечной артерии (в результате может нарушиться функция почек), клиренс креатинина ниже 30 мл/мин или сывороточный креатинин выше 1,8 мг/100 мл, острый гломерулонефрит, нарушенная функция печени, патология митральных клапанов и клапанов аорты, беременность и лактация, первичный гиперальдостеронизм.

Форма выпуска. Упаковка по 20 таблеток.

Производится фирмой «КРКА», Словения.

Отредактировал: ledi24

ЭНТЕРОДЕЗ (Enterodesum). Низкомолекулярный (молекулярная масса 12 600±2700) поливинилпирролидон.

Фармакологическое действие. Обладает дезинтоксикационными свойствами, связывает токсины, образующиеся в организме или поступающие в желудочно-кишечный тракт, и выводит их через кишечник. Лечебный эффект развивается через 15—20 мин после приема препарата.

Показания к применению. Для дезинтоксикации у взрослых при токсических формах острых инфекционных желудочно-кишечных заболеваниях (дизентерия, сальмонеллезы и др.), пищевая токсикоинфекция, интоксикации другого происхождения, обострения хронических энтероколита и энтерита, печеночная недостаточность.

Способ применения и дозы. Внутрь. Перед употреблением 5 г порошка (1 чайная ложка) растворяют в 100 мл кипяченой воды. Для улучшения вкусовых качеств в раствор добавляют сахар или фруктовый сок. Принимают внутрь по 100 мл приготовленного раствора 1—3 раза в сутки в течение 2—7 дней (до исчезновения симптомов интоксикации).

Побочное действие. Возможны быстро проходящие тошнота и рвота.

Форма выпуска. Порошок в полиэтиленовых пакетах в расфасовке по 5 г и по 50 г.

Условия хранения. В сухом, защищенном от света месте при температуре от —10 до +30°С. Приготовленный раствор не более 3 дней при температуре 4°С.

Срок годности 2 года.

ЭПИЛИНОВЫЙ ПЛАСТЫРЬ (Emplastrum Epilini). Состав: эпилина (пара-β-диэтиламино-этокси)-фенилфенетилкетона цитрата 4 г, пластыря свинцового простого 54 г, воска 5 г, ланолина безводного 22 г, воды 15 г.

Фармакологическое действие. Оказывает эпилирующее действие.

Применение. Наружно для удаления волос при лечении грибковых заболеваний волосистой части головы. Пластырь накладывают дважды на 10 дней. Дозу на одну процедуру определяют из расчета 0,2 г пластыря на 1 кг массы тела.

Побочное действие. Возможны фолликулярный гиперкератоз, подострый конъюнктивит, сухость красной каймы губ, головная боль, тошнота, в редких случаях следы белка в моче.

Противопоказания. Заболевания почек, суставов, лихорадочное состояние, желудочно-кишечные расстройства, гипертиреоз, головная боль, спазмофилия, заболевания нервной системы. Не следует применять детям в возрасте до 1 года.

Форма выпуска. Во флаконах по 100 г

Условия хранения. Список Б. В прохладном месте.

Срок годности. Порошок 4 года.

ЭРГОКАЛЬЦИФЕРОЛ (Ergocalciferolum). 2,4-Метил-9,10-секохолестерин-5,7,10(19), 22-тетраен-3-β-ол. Синонимы: витамин D_2, кальциферол.

Фармакологическое действие. Регулирует обмен фосфора и кальция в организме, всасывание их в кишечнике и отложение в костях. Предохраняет от рахита (авитаминоза D) и излечивает рахит.

Показания к применению. Рахит. Нарушение функции околощитовидных желез. Тетания. Остеомаляция. Остеопороз. Туберкулез костей. Туберкулезная волчанка.

Отредактировал: ledi24

Способ применения и дозы. Внутрь для профилактики рахита по 0,0125 мкг (500 МЕ), для лечения 10 000—15 000 МЕ в день в течение 30—60 дней (на курс лечения 500 000—600 000 МЕ). При тяжелой форме рахита до 1 000 000 МЕ в течение 45—60 дней, при стертых формах рахита 2000—3000 МЕ в день. При волчанке кожи и слизистых оболочек назначают по 100 000 МЕ/сут. Детям до 16 лет по 25 000—75 000 МЕ/сут в зависимости от возраста. При лечении большими дозами рекомендуется одновременно назначать ретинола ацетат 10 000—15 000 МЕ/сут., токоферола ацетат, аскорбиновую кислоту и витамины группы В.

Побочное действие. При применении больших доз возможен гипервитаминоз D, сопровождающийся потерей аппетита, тошнотой, головной болью, общей слабостью, повышением температуры, появлением в моче белка, цилиндров, лейкоцитов, а также повышением содержания кальция в крови и выделением его с мочой, отложением кальция в почках, легких и кровеносных сосудах.

Противопоказания. Необходима осторожность при назначении эргокальциферола лицам преклонного возраста и больным, находящимся на постельном режиме. Эргокальциферол может способствовать развитию атеросклероза. Препарат способен накапливаться в организме.

Форма выпуска. Драже по 500 МЕ (масса 0,5 г) в упаковке по 50 г (100 штук); спиртовой 0,5% раствор (200 000 ЕД в 1 мл) во флаконах по 5 мл, масляный 0,125% раствор (50 000 МЕ в 1 мл) во флаконах по 10 мл; масляный 0,0625% раствор (25 000 МЕ в 1 мл) во флаконах по 10 мл.

Условия хранения. Список Б. В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 10°С.

Срок годности. Порошок, капсулы, растворы в масле и спирте 2 года.

ЭРГОМЕТРИНА МАЛЕАТ (Ergometrini maleas). Малеат-β-пропаноламида лизергиновой кислоты. Синонимы: Ergotrate maleate, Panergal

Фармакологическое действие. Повышает тонус и увеличивает частоту сокращений матки.

Показания к применению. Маточные кровотечения (после ручного отделения последа, непосредственно после родов и в послеродовом периоде, после кесарева сечения, аборта и др.).

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,0002—0,0004 г; парентерально (внутримышечно и внутривенно) по 0,5—1 мл 0,02% раствора.

Противопоказания. Беременность, I и II период родов.

Форма выпуска. Таблетки по 0,0002 г, в упаковке 20 штук; ампулы по 1 мл 0,02% раствора, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте при температуре не выше 10°С.

Срок годности. Ампулы 3 года, таблетки 2 года.

Из Чехо-Словакии препарат поступает в ампулах по 1 мл 0,02% раствора, в упаковке 5 штук.

ЭРГОТАЛ (Ergotalum). Смесь фосфатов алкалоидов спорыньи.

Фармакологическое действие. Повышает тонус мускулатуры матки и увеличивает частоту ее сокращений.

Показания к применению. Маточные кровотечения, вызванные атонией матки; для ускорения обратного развития матки в послеродовом периоде.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,0005—0,001 г 2—3 раза

Отредактировал: ledi24

в день, подкожно и внутримышечно по 0,5—1 мл 0,05% раствора.

Противопоказания. Беременность, I и II период родов.

Форма выпуска. Таблетки по 0,001 г, в упаковке 10 штук, ампулы по 1 мл 0,05% раствора, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте при температуре не выше 5°С.

Срок годности. Таблетки 2 года, ампулы 1 год.

ЭРГОТАМИН (Ergotamin). Алкалоид спорыньи Secale cornutum В медицинской практике применяется эрготамина гидротартрат

Фармакологическое действие. Увеличивает частоту и амплитуду сокращений матки, а также обладает симпатолитическими и седативными свойствами.

Показания к применению. Маточные кровотечения, атония матки, неполный аборт; мигрень.

Способ применения и дозы. Внутрь по 10—20 капель или по 1 драже (0,001 г) 2—3 раза в день; подкожно или внутримышечно по 0,5—1 мл 0,05% раствора.

Побочное действие. Возможны диспептические явления; при повышенной нервной возбудимости побледнение лица, похолодание конечностей, парестезии.

Противопоказания. Беременность, I и II период родов, заболевания печени, почек, сепсис, выраженный атеросклероз.

Форма выпуска. Драже по 0,001 г, в упаковке 25 штук; во флаконах (20 капель соответствуют 1 мг) по 10 мл.

Условия хранения. Список А. В защищенном от света месте.

Срок годности. Драже 4 года, капли 2 года.

Поставляется из Чехо-Словакии.

ЭРИНИТ (Erynitum). Тетранитропентаэритрин. Синонимы: Nitropenton, Pentrit, Dilcoran-80.

Фармакологическое действие. Оказывает коронарорасширяющее действие; сравнительно с нитроглицерином медленнее всасывается.

Показания к применению. Хроническая коронарная недостаточность (для предупреждения приступов).

Способ применения и дозы. Внутрь или сублингвально по 0,01—0,02 г 2—3 раза в день.

Побочное действие. Иногда понос, очень редко головная боль, шум в ушах, головокружение.

Противопоказания те же, что и при назначении нитроглицерина.

Форма выпуска. Таблетки по 0,01 г, в упаковке 50 штук.

Условия хранения. Список Б. В прохладном, защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

ЭРИТРОМИЦИН (Erythromycinum). Синонимы: Erythrocyn, Pantomicina.

Фармакологическое действие. Активен в отношении стафилококков, стрептококков, гонококков, менингококков, дифтерийной и столбнячной палочек, анаэробов и вирусов группы пситтакоза и трахомы. Быстро всасывается в кровь; не оказывает кумулятивного действия. Малотоксичен.

Показания к применению. Инфекции, вызванные чувствительными микроорганизмами (пневмонии различной этиологии; бронхоэктатическая болезнь, скарлатина, тонзиллит, сепсис, гнойные отиты), раневые инфекции, гнойничковые поражения кожи, пролежни, трофи-

Отредактировал: ledi24

ческие язвы, ожоги II и III степени, инфекции слизистой оболочки, глаз, трахома и др.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,25—0,5 г 4—6 раз в сутки за 1—1½ ч до еды; детям 50 мг/(кг·сут). Местно применяют в виде 1% мази.

Побочное действие. Иногда тошнота, рвота, понос и аллергические реакции.

Противопоказания. Повышенная индивидуальная чувствительность к препарату и тяжелые нарушения функции печени.

Форма выпуска. Порошок (1 000 000 ЕД). Таблетки по 0,1 и по 0,25 г, в упаковке 10 штук; по 0,2 г, в упаковке 16 штук. Мазь (в 1 г 10 000 ЕД) в тубе по 7 и по 15 г.

Условия хранения. Список Б. В сухом, защищенном от света месте при комнатной температуре.

Срок годности. Порошок и таблетки 3 года, мазь 2 года.

ЭРИТРОМИЦИНА ФОСФАТ (Erythromycini phosphas).

Фармакологическое действие, показания к применению, побочное действие, противопоказания и условия хранения те же, что и для эритромицина основания.

Способ применения и дозы. Внутривенно 2—3 раза в сутки по 200 мг Суточная доза может быть увеличена до 1 г. Для детей 20 мг/(кг·сут). Вводят медленно (в течение 3—5 мин) после разведения водой для инъекций или стерильным изотоническим раствором хлорида натрия из расчета 5 мг/мл. Допускается капельное введение в изотоническом растворе хлорида натрия или в 5% растворе глюкозы в концентрации не более 1 мг в 1 мл растворителя.

Форма выпуска. Порошок по 0,1 г (100 000 ЕД) активного вещества для инъекций.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте при температуре не выше 20°С.

Срок годности 2 года.

ЭРИЦИКЛИН (Erycyclinum). Смесь эритромицина и окситетрациклина дигидрата в виде гранул. В каждой капсуле содержится по 0,125 г эритромицина и окситетрациклина дигидрата.

Фармакологическое действие. Обладает широким спектром действия по отношению к грамположительным микробам. Эффективен в отношении микрофлоры, устойчивой к пенициллину, стрептомицину

Показания к применению. Гнойно-воспалительные заболевания различной этиологии (ангина, пневмония, бронхит, холецистит, инфекции мочевыводящих путей, дизентерия, раневая инфекция, пиодермия и др.)

Способ применения и дозы. Внутрь по одной капсуле каждые 4—6 ч (через 30—40 мин после еды). Максимальная суточная доза 8 капсул (2 г) Курс лечения 7—10 дней и более в зависимости от тяжести заболевания.

Побочное действие. Понижение аппетита, тошнота, рвота, понос, при длительном применении возможны желтуха, аллергические кожные реакции, отек Квинке и др.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к эритромицину и окситетрациклину дигидрату, грибковые заболевания; с осторожностью назначают при нарушениях функции печени и почек, при лейкопении.

Форма выпуска. Капсулы по 0,25 г, в упаковке 10 штук.

Отредактировал: ledi24

Условия хранения. Список Б. В сухом, защищенном от света месте при комнатной температуре.

Срок годности 2 года.

ЭСКУЗАН (Aescusan). Стандартизованный водно-спиртовой раствор сапонинов из семян растения Aesculus hippocastanum.

Фармакологическое действие. Повышает тонус кровеносных сосудов и понижает свертываемость крови.

Показания к применению. Для профилактики тромбозов, при венозном застое, расширении вен и др.

Способ применения и дозы. Внутрь до еды по 12—15 капель 3 раза в день.

Форма выпуска. Во флаконах по 20 мл, драже № 100.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности 5 лет.

Поступает из Германии.

ЭСПЕРАЛЬ (Esperal). Синонимы: Antabus, Teturam. Пролонгированная лекарственная форма тетурама.

Фармакологическое действие. Действие препарата основано на его способности влиять на обмен алкоголя в организме, приводя к увеличению после приема алкоголя концентрации ацетальдегида в крови. При этом появляются неприятные ощущения: затруднение дыхания, шум в голове, сердцебиение, чувство страха, понижение АД.

Показания к применению. Для лечения больных хроническим алкоголизмом.

Способ применения и дозы. Эспераль нельзя принимать без предварительного врачебного обследования, а также в состоянии алкогольного опьянения и не ранее чем через 24 ч с момента принятия алкоголя внутрь по 1—2 таблетки в день, затем дозу постепенно уменьшают до $^1/_2$—$^1/_4$ таблетки в день. Таблетки для подкожных и внутримышечных имплантаций стерильны. Вводят обычно по 8—10 таблеток путем внутримышечной имплантации в верхне-наружную область ягодиц или вшивают в подкожную жировую клетчатку области спины, нижней части живота. Внутримышечную имплантацию повторяют через 6 мес.

Противопоказания. Заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, эпилепсия, беременность.

Форма выпуска. Стерильные таблетки для внутримышечных и подкожных имплантаций, содержащие 0,1 г препарата, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности 3 года.

Отечественный аналог — таблетки для приема внутрь под названием «Тетурам» (см.).

ЭССЕНЦИАЛЕ (Essentiale). Эссенциале форте (Essenciale forte). Состав эссенциале: фосфолипиды, витамины B_1, B_2, B_6, B_{12}, E, никотинамид.

Фармакологическое действие. Оказывает нормализующее действие на метаболизм жиров, белков и на детоксицирующую функцию печени; обладает липотропным свойством.

Показания к применению. Острый и хронический гепатит, цирроз печени, токсические поражения печеночной паренхимы, жировая дистрофия печени различного происхождения, лучевой синдром, псориаз.

Способ применения и дозы. По 2—3 капсулы 3 раза в сутки

Отредактировал: ledi24

перед или вместе с едой. При лечении рекомендуется комбинировать прием препарата внутрь с парентеральным введением препарата. Затем по мере улучшения самочувствия переходят на прием капсул внутрь. Курс лечения 3 мес.

Форма выпуска. Капсулы, в упаковке 50 штук; ампулы по 5 мл, в упаковке 5 штук.

Условия хранения. При температуре 2—8°С.

Срок годности. Ампулы 3 года (при температуре 2—8°С) Эссенциале форте, капсулы 3 года (при обычных условиях хранения).

Поставляется из Югославии.

ЭСТИМАЛ (Estimalum). 5-Этил-5-изоамилбарбитуровая кислота. Синонимы: амитал, амобарбитал.

Фармакологическое действие. Оказывает успокаивающее и снотворное действие. Сон наступает в течение 15—30 мин и длится 6—8 ч.

Показания к применению. Как снотворное средство при различных видах бессонницы.

Способ применения и дозы. Внутрь перед сном по 0,1—0,2 г на прием.

Побочное действие. Повышенная чувствительность к эстималу может вызвать кожные аллергические реакции.

Противопоказания. Заболевания печени и почек.

Форма выпуска. Таблетки по 0,1 г, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В сухом месте.

Срок годности 2 года.

ЭСТОЦИН (Aesthocinum). β-Диэтиламиноэтилового эфира α, α-дифенил-α-этоксиуксусной кислоты гидрохлорид. Синоним: Lokarin.

Фармакологическое действие. Обладает аналгезирующей и противокашлевой активностью, оказывает умеренное противовоспалительное действие. По аналгезирующему действию менее активен, чем морфин и промедол, но меньше угнетает дыхание, не повышает тонус блуждающего нерва; оказывает умеренное спазмолитическое и холиполитическое действие; уменьшает спазмы кишечника и бронхов, не вызывает запоров.

Показания к применению. Боль, связанная со спазмами гладкой мускулатуры; премедикация и послеоперационная боль. Используют также при обезболивании родов.

Способ применения и дозы. В качестве аналгезирующего средства назначают внутрь взрослым по 0,03—0,06 г 2—3 раза в день. Как противокашлевое средство применяют при заболеваниях дыхательных путей и легких, в том числе при бронхоспазме. Назначают внутрь взрослым по 0,015 г 2—3 раза в день. Детям старше 2 лет по 0,005—0,01 г в зависимости от возраста.

Побочное действие. При длительном применении возможны привыкание и пристрастие.

Противопоказания. Угнетение дыхания.

Форма выпуска. Таблетки по 0,015 г, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список А. В сухом месте.

Срок годности 2 года

ЭСТРАДИОЛА ДИПРОПИОНАТ (Oestradioli dipropionas). 1, 3, 5 (10)-Эстратриендиола-3, 17 β-дипропионат Синонимы: Diovocyclin, Synformon.

Фармакологическое действие. Оказывает сильное и продолжительное эстрогенное действие.

Отредактировал: ledi24

Применение. В тех же случаях, что и фолликулин, внутримышечно в виде 0,1% масляного раствора по 1 мл 2—3 раза в неделю.

Побочное действие и противопоказания те же, что и для фолликулина.

Форма выпуска. В ампулах по 1 мл 0,1% масляного раствора, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

ЭСТРАДУРИН (Estradurin). Состав: полиэстрадиолфосфат 40 мг, мепивакаин (карбокаин) 5 мг, никотинамид 25 мг, ртуть-фенил нитрат 0,02 мг. Синоним: Polyesradiol phosphate.

Фармакологическое действие. Оказывает пролонгированное эстрогенное и ингибирующее действие на кислые и щелочные фосфатазы. Эстрогенный эффект сохраняется в течение 4 нед.

Показания к применению. Эстрогензависимая карцинома предстательной железы (при подозрении на резистентность к оральной эстрогенной терапии); иногда используют при климактерических расстройствах и аменорее.

Способ применения и дозы. Вводят глубоко внутримышечно, содержимое флакона растворяют непосредственно перед введением в 2 мл воды для инъекций и встряхивают до полного растворения. Взрослым вначале назначают по 80—160 мг препарата 1 раз в 4 нед в течение 2—3 мес, затем дозу уменьшают до 40—80 мг/мес.

Побочное действие. Возможны гинекомастия, феминизация. Желудочно-кишечных расстройств не вызывает.

Противопоказания такие же, как и для других эстрогенов; не рекомендуется назначать детям; с осторожностью применяют у больных с серьезными нарушениями функции печени или тромбоэмболическими сердечно-сосудистыми расстройствами.

Форма выпуска. Во флаконах, содержащих по 0,04 г действующего вещества с приложением растворителя (2 мл воды для инъекций).

Условия хранения. В защищенном от света месте, при комнатной температуре.

Срок годности 5 лет.

ЭСТРИОЛ (Oestriol). Синоним: эстроген.

Фармакологическое действие. Оказывает селективное действие на дистальные отделы полового тракта женщин с выраженным эффектом на вульве, влагалище и шейке матки. Незначительно действует на эндометрий по сравнению с другими производными эстрогена.

Показания к применению. Климактерические расстройства, зуд вульвы, язвы влагалища, старческий кольпит, недержание мочи легкой степени.

Способ применения и дозы. При климактерических расстройствах препарат принимают в течение 7—10 дней ежедневно по 1—2 таблетки, затем делают 20-дневный перерыв. Курс лечения 6 мес.

При старческом кольпите назначают по 1 таблетке 2 раза в день ежедневно, после улучшения состояния по 1 таблетке в день. При недержании мочи по 2 таблетки в день в течение 20 дней.

Форма выпуска. Таблетки по 0,5 мг, в упаковке 20 таблеток.

Условия хранения. В защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

Поставляется из Германии.

«ЭСФЛАЗИД» («Aesflazidum»). Препарат из каштана конского,

Отредактировал: ledi24

содержащий сапонин эсцин из плодов и сумму флавоноидов из листьев — флавазид.

Фармакологическое действие. Вазотропное средство.

Показания к применению. Флебиты, тромбофлебиты, геморрой.

Способ применения и дозы. Внутрь по 1 таблетке 1—2 раза в день в первые 2 дня лечения, затем по 3—4 раза в день. Курс лечения при заболеваниях вен конечностей 2 нед — 2—3 мес. При рецидивах курс лечения повторяют. При повышенной свертываемости крови можно назначать эсфлазид в сочетании с антикоагулянтами.

Побочное действие. У отдельных больных возможны диспептические явления, боль в области сердца, слезотечение.

Форма выпуска. Таблетки по 0,1 г, в упаковке 30 штук.

Условия хранения. Список Б. В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 20°С.

Срок годности 5 лет

ЭТАДЕН (Etadenum). 8-(2-Оксиэтил)-аминоаденина гидробромида гидрат.

Фармакологическое действие. Участвует в метаболизме нуклеиновых кислот. При парентеральном введении стимулирует репаративные процессы в эпителиальной и кроветворной тканях.

Показания к применению. Для стимулирования репаративных процессов (у взрослых) при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при термических и лучевых поражениях кожи, лейкопении на почве лучевого и лекарственного лечения, при длительно незаживающих гранулирующих ранах.

Способ применения и дозы. Внутримышечно. При язвенной болезни желудка и термических поражениях кожи — по 0,1 г ежедневно в течение 4—10 дней; при катаральных лучевых ректитах и циститах — по 0,1 г 2 раза в сутки через день в течение 12 дней; при эрозивно-десквамативных и язвенно-некротических ректитах — пресакрально по 0,2 г 1 раз в день с интервалом 5—6 дней в течение 15—30 дней (повторные курсы — по 0,1 г 1 раз в день через день в течение 30 дней); при лучевых эрозивных циститах — по 0,1 г 2 раза в сутки в течение 30 дней, а при язвенно-некротических циститах — внутримышечно по 0,1 г 2 раза в сутки через день в течение 30 дней в сочетании с эндовезикальным введением (по 0,2 г 3 раза в день с интервалом 5—6 дней). При введении этадена в полость мочевого пузыря содержимое ампулы растворяют в 100 мл 0,5% раствора новокаина. При лейкопенических состояниях препарат вводят внутримышечно 2 раза в сутки через день в течение 12—14 дней. Продолжительность курсов лечения зависит от характера и течения болезни.

Противопоказания. Острые и хронические лейкозы, нарушение проводимости сердечной мышцы, аллергические состояния и индивидуальная непереносимость.

Форма выпуска. Раствор 1% в ампулах по 5 мл, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В сухом месте. Замораживание не допускается.

Срок годности 2 года.

ЭТАЗОЛ (Aethazolum). 2-(пара-Аминобензолсульфамидо)-5-этил-1,3,4-тиадиазол. Синоним: Sulfaethidolum.

Фармакологическое действие. Сульфаниламидный препарат.

Показания к применению. Пневмония, рожистое воспаление, ангина, дизентерия, гнойные инфекции мочевыводящих путей, перитонит, раневая инфекция.

Отредактировал: ledi24

Способ применения и дозы. Внутрь по 1 г 4—6 раз в день (детям дозу уменьшают соответственно возрасту); в полость раны, в брюшную полость до 5 г (в виде пудры).

Побочное действие. Тошнота, рвота.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к сульфаниламидным препаратам.

Форма выпуска. Порошок, таблетки по 0,5 г, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности. Порошок 4 года, таблетки 5 лет.

ЭТАЗОЛ-НАТРИЙ (Aethazolum-natrium). 2-(пара-Аминобензолсульфамидо)-5-этил-1,3,4-тиадиазол-натрий.

Фармакологическое действие. Сульфаниламидный препарат.

Показания к применению те же, что и для этазола.

Способ применения и дозы. Внутримышечно или внутривенно (медленно) в виде 10% раствора из расчета 0,5—2 г препарата на введение.

Побочное действие и противопоказания те же, что и для этазола.

Форма выпуска. Порошок; ампулы по 5 мл и 10 мл 10% раствора препарата, в упаковке 10 штук; гранулы по 60 г в упаковке для детей.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности. Порошок 5 лет, гранулы и ампулы 3 года.

ЭТАКРИДИНА ЛАКТАТ (Aethacridini lactas). 2-Этокси-6,9-диаминоакридина лактат. Синонимы: Acricidum, Rivanolum.

Фармакологическое действие. Обладает противомикробной активностью (в основном в отношении кокков)

Показания к применению. Как профилактическое и лечебное антисептическое средство в хирургии, гинекологии, урологии, оториноларингологии, офтальмологии, дерматологии.

Способ применения и дозы. Наружно в виде 0,05%, 0,1% и 0,2% свежеприготовленных растворов; в дерматологии применяют также 2,5% присыпки, 1% мазь, 5—10% пасты. Иногда при колитах и энтероколитах назначают внутрь. Высшая разовая доза для взрослых внутрь 0,05 г, суточная 0,15 г.

Противопоказания. Заболевания почек, сопровождающиеся альбуминурией.

Форма выпуска. Порошок, таблетки, содержащие этакридина лактата 0,01 г и борной кислоты 0,09 г, в упаковке 20 штук.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности. Порошок 10 лет, мазь 1 год, таблетки с борной кислотой 2 года.

ЭТАМБУТОЛ (Ethambutolum). (+) N, N'-Бис-[1-(оксиметил)-пропил]-этилендиимина дигидрохлорид. Синоним: Diambutolum.

Фармакологическое действие. Обладает бактериостатической активностью в отношении микобактерий туберкулеза; в том числе и в отношении штаммов, устойчивых к другим противотуберкулезным препаратам.

Показания к применению. Различные формы туберкулеза.

Способ применения и дозы. Внутрь, 1 раз в день (после завтрака), первичным больным, ранее не принимавшим противотуберкулезные препараты,— по 15 мг/кг; больным, ранее принимавшим противотуберкулезные препараты,— по 25 мг/кг. Курс лечения 2 мес. Затем препарат назначают в поддерживающих дозах.

Побочное действие. Возможны ухудшения зрения, аллергические реакции.

Отредактировал: ledi24

Противопоказания. Неврит зрительного нерва, катаракта, воспалительные заболевания глаз, диабетическая ретинопатия, беременность.

Форма выпуска. Таблетки, в упаковках 100 штук по 0,1 г и по 0,4 г.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности 5 лет

Поставляется из Венгрии.

ЭТАМЗИЛАТ (Aethamzilatum). 2,5 Диоксибензол-сульфоната диэтиламмониевая соль. Синонимы: Dicynon, Cyclonamin и др.

Фармакологическое действие. Нормализует проницаемость сосудистой стенки, улучшает микроциркуляцию, оказывает гемостатическое действие.

Показания к применению. Для профилактики и остановки кровотечений при оперативных вмешательствах, травмах, геморрагических диатезах, метро- и меноррагиях, диабетических ангиопатиях, в экстренных случаях при кишечных и легочных кровотечениях, особенно показано применение препарата при нормальных показателях свертывающей системы крови.

Способ применения и дозы. Внутривенно, внутримышечно, подконъюнктивально, ретробульбарно и внутрь.

С профилактической целью препарат вводят внутривенно или внутримышечно за 1 ч до операции по 2—4 мл (1—2 ампулы) или дают внутрь 2—3 таблетки за 3 ч до операции. При необходимости во время операции вводят внутривенно 2—4 мл. При опасности послеоперационного кровотечения профилактически вводят 4—8 мл или дают внутрь 1,5—2 г равномерно в течение суток.

С лечебной целью в экстренных случаях этамзилат вводят по 2—4 мл внутривенно или внутримышечно, а затем через каждые 4—6 ч по 0,25 г парентерально или по 0,5 г внутрь.

Можно вводить в вену капельно, добавляя к обычным растворам для инфузий. Не следует смешивать препарат в одном шприце с другими препаратами.

При диабетических микроангиопатиях (ретинопатии с геморрагиями) назначают этамзилат курсами по 2—3 мес, давая по 1 таблетке 3 раза в день или вводят внутримышечно по 2 мл (1 ампула) 2 раза в день в течение 10—14 дней.

Подконъюнктивально и ретробульбарно вводят 1 мл раствора.

Противопоказания. Не следует применять при геморрагиях, вызванных антикоагулянтами.

Форма выпуска. Ампулы по 2 мл 12,5% раствора, в упаковке 10 штук и таблетки по 0,25 г, в упаковке 50 штук.

Условия хранения. Список Б. В сухом, защищенном от света месте.

Срок годности. Таблетки и ампулы 2 года.

Этот препарат под названием «Дицинон» («Dicynone») — ампулы по 2 мл 12,5% раствора, в упаковке 50 штук, поступает из Югославии.

Срок годности 5 лет.

ЭТАМИД (Aetamidum). 4-N,N′-Диэтиламид сульфобензойной кислоты.

Фармакологическое действие. Тормозит реабсорбцию мочевой кислоты в почечных канальцах, способствует выведению ее с мочой и уменьшению содержания в крови.

Показания к применению. Хроническая подагра, полиартриты с нарушением пуринового обмена, мочекаменная болезнь с образованием уратов.

Отредактировал: ledi24

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,7 г 4 раза в сутки в течение 10—12 дней. После 5—7-дневного перерыва лечение продолжают в течение 7 дней.

Побочное действие. Возможны диспептические и дизурические явления, проходящие самостоятельно.

Форма выпуска. Таблетки по 0,35 г, в упаковке 50 штук.

Условия хранения. В сухом месте.

Срок годности 4 года.

ЭТАМИНАЛ-НАТРИЙ (Aethaminalum-natrium). 5-Этил-5-(2-амил)-барбитурат натрия. Синонимы: Nembutal natrium, Pentobarbitalum, Natricum.

Фармакологическое действие. Снотворное средство.

Показания к применению. Бессонница.

Способ применения и дозы. Внутрь 0,1—0,2 г, детям 0,01—0,1 г, per rectum в суппозиториях и клизмах 0,2—0,3 г, внутривенно 5—10 мл 5% раствора. Высшая разовая доза для взрослых 0,3 г, суточная 0,6 г.

Противопоказания. Заболевания печени и почек с нарушением функции.

Форма выпуска. Порошок.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности 3 года.

ЭТАПЕРАЗИН (Aethaperazinum). 10-{3-[1-(β-Оксиэтил)-пиперазинил-4]-пропил}-2-хлор-фенотиазина дигидрохлорид. Синонимы: Chlorpiperazin, Fentazin.

Фармакологическое действие. Нейролептический препарат широкого спектра действия; значительно активнее аминазина; уступает ему по гипотермическому, адренолитическому действию и по способности потенцировать эффект снотворных и наркотических средств.

Показания к применению. Психические заболевания (шизофрения, экзогенно-органические и инволюционные психозы с апатоабулическими и галлюцинаторно-бредовыми явлениями); психопатии, неукротимая рвота (в том числе при беременности), икота, кожный зуд.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,004 г 3—4 раза в день; при необходимости дозу увеличивают до 0,06—0,1 г, а в случаях особой резистентности до 0,25—0,3 г.

Побочное действие. Возможны аллергические и сосудистые реакции, экстрапирамидные нарушения.

Противопоказания. Нарушения функции печени и почек, эндокардит, нарушение кроветворной функции.

Форма выпуска. Таблетки, покрытые оболочкой, по 0,01 г, в упаковках 10 и 50 штук; по 0,004 г, в упаковке 50 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности 3 года.

ЭТАЦИЗИН (Aethacizinum). 3-Карбэтоксиамино-10-(3-диэтиламинопропионил)-фенотиазина гидрохлорид.

Фармакологическое действие. Обладает антиаритмическими свойствами, увеличивает коронарный кровоток, улучшает функциональное состояние зоны ишемии, удлиняет время проведения и увеличивает продолжительность рефрактерных периодов предсердия, атриовентрикулярного узла, системы Гиса — Пуркинье. Обладает местноанестезирующей и спазмолитической активностью.

Показания к применению. Желудочковые и наджелудочковые экстрасистолии, пароксизмальные и непароксизмальные желудочковые

Отредактировал: ledi24

и наджелудочковые тахикардии, пароксизмы мерцательной тахиаритмии, при синдроме преждевременного возбуждения желудочков. При аритмиях различной этиологии, в том числе при инфаркте миокарда, осложненном нарушениями сердечного ритма.

Способ применения и дозы. Внутрь и внутривенно. Содержимое одной ампулы (2 мл 2,5% раствора — 50 мг) разбавляют 20 мл изотонического раствора хлорида натрия и вводят медленно со скоростью 10 мг/мин под контролем АД и желательно ЭКГ. Время введения не менее 5 мин. Применяют в стационаре.

Таблетки принимают независимо от приема пищи, по 1 таблетке 3—4 раза в день. Продолжительность лечения зависит от формы нарушения ритма и состояния больного.

Побочное действие. Головокружение, шум в ушах и в голове, онемение и ощущение жжения губ и кончика языка, «сетка» перед глазами. При приеме внутрь — пошатывание, нарушение аккомодации. В этих случаях надо прекратить прием препарата.

Противопоказания. Нарушения проводимости сердца: синоатриальная блокада II степени, атриовентрикулярная блокада II—III степени, блокада проведения по системе Гиса — Пуркинье, тяжелая сердечная недостаточность и гипотония.

Форма выпуска. Раствор 2,5% в ампулах по 2 мл, в упаковке 10 штук, таблетки по 0,05 г, покрытые оболочкой, в упаковке 50 штук.

Условия хранения. Список Б. В сухом, защищенном от света месте.

Срок годности. Ампулы 1½ года, таблетки 2 года.

ЭТИЛМОРФИНА ГИДРОХЛОРИД (Aethylmorphini hydrochloridum). Синонимы: Dionin, Diolan.

Фармакологическое действие. Аналогичен кодеину; при введении в конъюнктивальный мешок способствует купированию боли и рассасыванию экссудатов и инфильтратов при воспалительных заболеваниях тканей глаз.

Показания к применению. Как противокашлевое средство при бронхите, бронхопневмонии, плеврите и др.; в офтальмологии при паренхиматозном кератите, инфильтрате роговой оболочки, ирите, иридоциклите, травматической катаракте, помутнении стекловидного тела, миопическом хориоретините.

Способ применения и дозы. Внутрь взрослым по 0,01—0,03 г на прием; в офтальмологии применяют 1—2% раствор и мази.

Побочное действие и противопоказания те же, что и при применении морфина гидрохлорида.

Форма выпуска. Порошок, таблетки по 0,015 г, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список А.

Срок годности. Порошок 6 лет, таблетки 2 года.

ЭТИМИЗОЛ (Aethimizolum). 4,5-Бис-(метиламид)-1-этилимидазол-дикарбоновой кислоты.

Фармакологическое действие. Дыхательный аналептик.

Показания к применению. Для возбуждения дыхания после наркоза и предупреждения угнетения дыхания при барбитуровом наркозе, для профилактики пневмоний в послеоперационном периоде; в психиатрии при астенодепрессивных состояниях, при заболеваниях, сопровождающихся чувством тревоги.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,05—0,1 г 3 раза в день, внутривенно (медленно) по 2—3 мл, внутримышечно и подкожно по 4—5 мл 1,5% раствора.

Побочное действие. Тошнота, рвота, двигательное возбуждение.

Отредактировал: ledi24

Противопоказания. Возбуждение центральной нервной системы.

Форма выпуска. Таблетки по 0,1 г, в упаковке 50 штук, 1,5% раствор в ампулах по 3 мл, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности. Таблетки 4 года, ампулы 3 года.

ЭТИОНАМИД (Ethionamidum). Тиоамид α-этилизоникотиновой кислоты. Синонимы: Etionizina, Iridozin.

Фармакологическое действие. Обладает противомикробной активностью в отношении микобактерий туберкулеза, в том числе в отношении штаммов, устойчивых к изониазиду и стрептомицину.

Показания к применению. Различные формы туберкулеза.

Способ применения и дозы. Внутрь через 30 мин после еды по 0,25 г 3—4 раза в день, детям по 0,01—0,02 г/кг (не более 0,75 г/сут)

Побочное действие. Возможны тошнота, рвота, метеоризм, боль в животе, жидкий стул, ухудшение аппетита, похудание.

Форма выпуска. Драже по 0,25 г, в упаковке 50 штук; ампулы 0,5 г.

Условия хранения. Список Б.

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Венгрии

ЭТИОТРАСТ (Aethyotrastum). Этиловый эфир 10(пара-йодфенил)-ундекановой кислоты. Синонимы: миодил, этиодан, йофендилатум.

Фармакологическое действие. Рентгеноконтрастное средство.

Показания к применению. Применяется для миелографии (для диагностики опухолевых и воспалительных изменений спинного мозга, его оболочек и корешков, суставно-связочного аппарата позвоночника) и лимфографии (для первичного обследования больных при подозрении на метастазы в лимфатической системе, при различных нарушениях оттока лимфы, при повреждении лимфатических сосудов и др.).

Способ применения и дозы. Перед введением этиотраста исследуют чувствительность больного к йоду, используя для этого не этиотраст, а водорастворимый препарат (триомбраст или йодамид). Накануне исследования больному медленно вводят внутривенно 1—2 мл одного из этих препаратов. При наличии признаков повышенной чувствительности к йоду (кожные реакции, недомогание, тахикардия, головная боль) следует отказаться от исследования. Для лимфографии препарат вводят непосредственно в периферический лимфатический сосуд нижней или верхней конечности в дозе 0,15 мл/кг со скоростью 1 мл за 10 мин. Общее количество препарата не должно превышать 15 мл при введении в сосуды нижних конечностей и 7 мл в сосуды верхних конечностей.

Для исследования субарахноидального пространства спинного мозга (миелография) этиотраст вводят эндолюмбально в поясничной области или в затылочную цистерну. Препарат вводят в течение 10—15 с в дозе 1,5—3—6—9 мл. После окончания исследования этиотраст по возможности удаляют из спинномозгового канала (через иглу, насасывая его в шприц). Оставшийся препарат рассасывается очень медленно.

Побочное действие. Возможны повышение температуры, ощущение жара, головокружение, головная боль, тошнота, рвота, боль в позвоночнике или по ходу лимфатических путей, реакции аллергического характера; понижение АД. При передозировке отмечаются арахноидиты, судорожные припадки, пневмонии, легочные инфаркты, отек легкого, легочно-сердечная недостаточность, коллапс, тромбоз сосудов мозга.

Отредактировал: ledi24

Противопоказания. Идиосинкразия к йодистым препаратам, острые воспалительные процессы в головном и спинном мозге, наличие крови или билирубина в спинномозговой жидкости, тяжелые повреждения паренхимы печени, почек, миокарда, гипертиреоз, активный туберкулез, миеломная болезнь (множественная миелома), сердечно-сосудистая недостаточность, гипертоническая болезнь III стадии, легочная недостаточность, шок, общее тяжелое состояние больного, кахексия.

Форма выпуска. Ампулы по 3 мл, в упаковке 10 штук.

Этот препарат под названием «Миодил» («Myodil») в ампулах по 3 мл, в упаковке 3 штуки, поступает из-за рубежа.

Условия хранения. В защищенном от света месте.

Срок годности этиотраста 2 года, миодила 3 года.

ЭТМОЗИН (Aetmozinum). Этиловый эфир 2-карбаминовой кислоты 10-(3-морфолилпропионил)-фенотиазина гидрохлорид.

Фармакологическое действие. Дает умеренный коронарорасширяющий, спазмолитический, м-холинолитический эффект. Основной особенностью препарата является антиаритмическое действие.

Показания к применению. Экстрасистолии, приступы мерцательной, предсердной, пароксизмальной тахикардии. Особенно эффективен при аритмиях, вызванных передозировкой сердечных гликозидов.

Способ применения и дозы. Рекомендуется начинать прием препарата с дозы 75—200 мг/сут (25—50 мг 3—4 раза в день) в зависимости от формы аритмии и переносимости этмозина. Предсердные аритмии препарат купирует в меньших дозах, чем желудочковые. При отсутствии эффекта доза препарата может быть увеличена до 300—400 мг/сут, а при устойчивых аритмиях — до 600 мг/сут (по 100 мг 6 раз в день). При достижении лечебного эффекта можно перейти к поддерживающей терапии, уменьшив дозу на $^1/_3$. Курс лечения этмозином при приеме внутрь зависит от формы аритмии и составляет 7—45 дней.

Побочное действие. Возможны небольшая болезненность в эпигастральной области, легкое головокружение.

Противопоказания. Тяжелые нарушения проводящей системы сердца, выраженная гипотония, нарушения функции печени и почек.

Недопустимо одновременное применение ингибиторов моноаминоксидазы.

Форма выпуска. Таблетки, покрытые оболочкой, по 0,1 г, в упаковке 50 штук; 2,5% раствор в ампулах по 2 мл, в упаковке 10 штук.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности. Порошок 2 года, таблетки 5 лет, ампулы 2,4% раствор 2 года и 24% раствор 1 год.

ЭТОНИЙ (Aethonium). 1,2-Этилен-бис-(N-диметил-карбецилоксиметил)-аммония дихлорид.

Фармакологическое действие. Обладает бактериостатическим и бактерицидным свойством. Эффективен в отношении стрептококков, стафилококков и других микроорганизмов. Оказывает детоксицирующее действие на стафилококковый токсин. Обладает местноанестезирующей активностью, стимулирует заживление ран.

Показания к применению. В качестве антимикробного, обезболивающего и ускоряющего заживление средства при трофических гнойных язвах, трещинах сосков, прямой кишки, при лучевых поражениях кожи; при зудящих дерматозах; стоматитах, гингивитах; при язвах роговицы, кератитах, отитах и др.

Способ применения и дозы. Наружно. Для лечения ран, язв

Отредактировал: ledi24

и т. д. применяют в виде 0,02—1% растворов и 0,5—2% мази; для лечения язв роговицы, кератитов и других поражений глаз — 0,1% раствор (по 1—2 капли 3 раза в день в течение не более 10 дней); в этой же концентрации применяют при лечении гнойных отитов, тонзиллитов и др. (промывания, опрыскивание раствором). При лечении стоматитов — 0,5% раствор в виде аппликаций (по 15—20 мин 2—7 дней). При трофических язвах, пиодермии, зудящих дерматитах, термических, лучевых, химических ожогах и др. применяют 0,5—2% мази (курс лечения от 3 дней до $1^1/_2$ мес).

Паста этония (содержит 7 частей этония, 71 часть дентина и 22 части персикового масла) применяется в стоматологической практике при пломбировании зубов.

Побочное действие. Покраснение кожи или зуд. В этом случае применение препарата прекращают.

Противопоказания. Повышенная индивидуальная чувствительность к препарату.

Форма выпуска. Порошок, паста в упаковке по 20 г, мазь 0,5% по 25 г, 1% по 25 г.

Условия хранения. Порошок в хорошо укупоренных стеклянных банках; пасту в сухом месте при обычных условиях.

Срок годности. Порошок 3 года, паста 2 года.

ЭУФИЛЛИН (Euphyllinum). Теофиллин с 1,2-этилендиамином. Синонимы: Aminophyllinum, Diaphyllin.

Фармакологическое действие. Оказывает спазмолитическое и сосудорасширяющее действие.

Показания к применению. Бронхиальная астма, стенокардия и другие заболевания сердца, сопровождающиеся застойными явлениями, инсульт.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,1—0,2 г 2—3 раза в день; внутримышечно 2—3 мл 12% раствора или 1—1,5 мл 24% раствора, внутривенно 5—10 мл 2,4% раствора в 10—20 мл 40% раствора глюкозы; ректально в суппозиториях или микроклизмах по 0,2—0,4 г препарата.

Побочное действие. Диспептические явления, при внутривенном введении головокружение, гипотония, головная боль, сердцебиение, судороги, при ректальном применении раздражение слизистой оболочки.

Противопоказания. Инфаркт миокарда (острый период), выраженный коронароспазм, пароксизмальная тахикардия.

Форма выпуска. Порошок, таблетки по 0,15 г, в упаковке 30 штук, ампулы, в упаковках 10 штук по 10 мл 2,4% раствора и по 1 мл 24% раствора.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте.

Срок годности. Порошок 2 года, таблетки 5 лет, ампулы 2,4% раствор 2 года и 24% раствор 1 год.

«ЭФАТИН» («Ephatinum»). Аэрозольный препарат, содержащий атропина сульфат 0,02 г, эфедрина гидрохлорид 0,05 г, новокаин 0,04 г, спирт этиловый до 10 мл и хладон 12—20 г.

Фармакологическое действие. Благодаря мелкодисперсному (5—10 мкл) состоянию препарат проникает глубоко в легкие, вызывая расслабление бронхиальной мускулатуры, уменьшает секрецию бронхиальных и слюнных желез.

Показания к применению. Для купирования приступов удушья при бронхиальной астме с легким и средней тяжести течением заболевания, для снятия астматического состояния при бронхитах, пневмониях, бронхоэктатической болезни, эмфиземе легких и других хронических заболеваниях органов дыхания.

Отредактировал: ledi24

Способ применения и дозы. В виде ингаляций по 1—5 раз в сутки. Дозирующий клапан обеспечивает распыление при одном нажатии 0,1 мл раствора. Обычно производят 2—5 нажатий (в среднем 3 нажатия, что соответствует вдыханию 0,2 мг атропина сульфата, 0,5 мг эфедрина и 0,4 мг новокаина).

Побочное действие. Возможно появление першения в горле, кашля, сухости во рту, тошноты, сердцебиения. В этом случае препарат отменяют.

Противопоказания те же, что и для атропина и эфедрина: глаукома, стенокардия, выраженная гипертония.

Форма выпуска. Аэрозольный баллон емкостью 10 мл.

Условия хранения. Список А. При температуре 3—35°С, предохранять от ударов и падения.

Срок годности 1 год.

ЭФЕДРИНА ГИДРОХЛОРИД (Ephedrini hydrochloridum). 1-1-Фенил-2-метиламинопропанола-1 гидрохлорид. Синонимы: Ephetonin, Sanedrine.

Фармакологическое действие. Стимулятор α- и β-адренорецепторов. По сравнению с адреналином действует слабее, но продолжительнее.

Показания к применению. Бронхиальная астма, крапивница и другие аллергические заболевания, риниты, отравления снотворными и наркотиками, артериальная гипотония, энурез и др. Необходимость расширения зрачка (с диагностической целью в офтальмологической практике) и сужения сосудов в оториноларингологической практике.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,025 г 2—4 раза в день. Парентерально под кожу, в мышцу, в вену струйно медленно (0,5—1 мл 5% раствора) и капельно (2 мл 5% раствора в 500 мл 5% раствора глюкозы или изотонического раствора хлорида натрия), местно (2—5% раствор) в виде капель.

Побочное действие. Сердцебиение, тошнота, дрожание конечностей, усиленное потоотделение, бессонница, нервное возбуждение, задержка мочи.

Противопоказания. Бессонница, тяжелая артериальная гипертония, резко выраженный атеросклероз. Необходима особая осторожность при органических заболеваниях сердца.

Форма выпуска. Порошок; таблетки по 0,025 г, в упаковке 10 штук; таблетки по 0,01 г, в упаковке 10 штук для детей; таблетки эфедрина гидрохлорида по 0,01 г, димедрола по 0,01 г, в упаковке 10 штук для детей; ампулы 2%, 3% и 5% растворов.

Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте, порошок в хорошо укупоренной таре.

Срок годности. Порошок 5 лет, таблетки 3 года, растворы 2% и 3% 3 года, 5% для инъекций 5 лет, 5% в шприц-тюбиках 2 года.

Препарат в виде растворов, ампул, таблеток и в порошке отпускают из аптек строго по рецепту.

«ЭФКАМОН» МАЗЬ (Unguentum «Efcamonum»). Содержит: камфоры 10 г, масел гвоздичного и эфирного горчичного по 3 г, эвкалиптового 7 г, ментола 14 г, метилсалицилата 8 г, настойки стручкового перца 4 г, тимола и хлоралгидрата по 3 г, спирта коричного 1 г, парафина 4,4 г, спермацета и вазелина до 100 г.

Фармакологическое действие. Вызывает расширение поверхностных сосудов, гиперемию, ощущение теплоты и улучшение кровообращения в коже и подкожной клетчатке.

Показания к применению. Острый артрит, инфекционный неспеци-

Отредактировал: ledi24

фический полиартрит, миозиты, аллергический нейромиозит, люмбаго, ревматизм, пояснично-крестцовый радикулит, мигрень, ушибы, спондилез, ганглионит шейно-грудного отдела.

Способ применения и дозы. Втирают в кожу по 2—3 г 2—3 раза в день в область участка и покрывают теплой повязкой. Длительность лечения зависит от характера и тяжести заболевания. При слишком сильном раздражении кожи втирание прекращают.

Противопоказания. Мазь не следует наносить на поврежденную кожу.

Побочное действие. После неоднократного применения мази возможны местная парестезия, кожный зуд и гиперемия. В этих случаях мазь отменяют.

Форма выпуска. Мазь в упаковке по 10 г в тубах.

Условия хранения. В прохладном месте.

Срок годности $2^1/_2$ года.

ЮМЕКС (Jumex). L-(-)′-N′-Phenylisopropyl′-N′-propinylamin. Одна таблетка содержит 5 мг селегилина.

Фармакологическое действие. Увеличивает уровень допамина в поврежденных допаминергических нейронах путем торможения действия ферментов (серотонин, адреналин, норадреналин). Если назначать вместе с леводопой, то гарантирует бо́льшую концентрацию допамина в полосатом теле головного мозга.

Показания к применению. При болезни Паркинсона как вспомогательное средство для повышения терапевтического эффекта леводопы. В ряде случаев дозу леводопы можно уменьшать. Юмекс применяют во всех стадиях паркинсонизма, прежде всего при прогрессирующем паркинсонизме, когда состояние больных колеблется в течение суток.

Способ применения и дозы. Дозу подбирают в неврологическом стационаре. Обычно начальная доза составляет 5—10 мг (1—2 таблетки) 1—2 раза в сутки (только утром или утром и вечером). Через несколько недель дозу можно уменьшить на половину. После подбора индивидуальной дозы в стационарных условиях состояние больного необходимо контролировать через каждые 3 мес.

Побочное действие то же, что при передозировке леводопы. Если дозу леводопы не снижают, то при совместном применении возможны тревога, бессонница, галлюцинации, гиперкинез, а также усиление желудочно-кишечных дисфункций.

Противопоказания. Экстрапирамидные заболевания, не связанные с недостатком допамина (эссенциальный тремор, хорея Гентингтона и т. д.).

Форма выпуска. Таблетки по 5 мг, в упаковке 50 штук.

Условия хранения. В сухом месте при температуре 20—25°С

Срок годности 5 лет.

Поставляется из Венгрии.

Отредактировал: ledi24

УКАЗАТЕЛЬ ПРЕПАРАТОВ ПО ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКИМ ГРУППАМ

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ НЕРВНУЮ СИСТЕМУ

I. Средства для наркоза и снотворные средства

А. Средства для ингаляционного наркоза

Азота закись 27
Трихлорэтилен 449
Фторотан 482
Хлорэтил 497

Б. Средства для неингаляционного наркоза

Гексенал 113
Дроперидол 170
Калипсол (кеталар) 194
Натрия оксибутират 285
Сомбревин 404
Тиопентал-натрий 437
Фентанил 463

В. Снотворные средства

Барбитал 64
Барбитал-натрий 64
Бромизовал 87
Нитразепам (радедорм, эуноктин) 298
Реладорм 368
Фенобарбитал 461
Хлоралгидрат 493
Эстимал 528
Этаминал-натрий 533

II. Седативные, нейролептические и транквилизирующие средства

А. Седативные средства

Бромкамфора 87
Валерианы корневище с корнями 92
Валокормид 93
Калия бромид 195
Корвалол 223
Магния сульфат 257
Натрия бромид 284
Пассифлоры жидкий экстракт 329
Пиона настойка 337
Пустырника трава 364
Сбор успокоительный 387

Б. Нейролептические средства

Азалептин (лепонекс) 25
Аминазин 37
Галоперидол 109
ИМАП 177
Карбидин 204
Лития карбонат 251
— оксибутират 251
Мажептил 258
Метеразин 269
Модитен-депо 278
Неулептил 293
ОРАП 318
Пипортил L 337
Пирацетам (ноотропил) 339
Пиридитол (энцефабол) 339
Пропазин 359

Отредактировал: ledi24

Раунатин (раувазан) 365
Резерпин 367
Семап 388
Сигнопам 394
Сонапакс 405
Тизерцин 435
Триседил 447
Трифтазин (стелазин) 448
Френолон 479
Хлорпротиксен 496
Эглонил 519
Этаперазин 533

В. Транквилизаторы

Амизил 37
Грандаксин (тофизопам) 134
Мебикар 262
Мезапам (рудотель) 263
Мепробамат (андаксин) 266
Нозепам (тазепам) 303
Оксилидин 312
Пантогам 324
Сибазон (реланиум, седуксен) 391
Триоксазин 445
Феназепам 458
Фенибут 458
Фризиум 479
Хлозепид (элениум, либриум) 492

III. Аналгезирующие, жаропонижающие и противовоспалительные средства

А. Аналгезирующие и противокашлевые препараты группы опия и их синтетические заменители

Дипидолор 159
Кодеин 217
Кодеина фосфат 217
«Кодтерпин» 218
Морфина гидрохлорид 279
Омнопон 318
Промедол 358
Таблетки от кашля (с кодеином) 217
Эстоцин 528
Этилморфина гидрохлорид (дионин) 534

Б. Ненаркотические противокашлевые средства

Бронхолитин 88
Глауцина гидрохлорид (глаувент) 124
Либексин 244
Тусупрекс 452
Фалиминт 457

В. Аналгезирующие, жаропонижающие и противовоспалительные средства — производные салициловой кислоты и других соединений

Алором 32
Амидопирин 36
— с бутадионом 36
Анальгин 44
«Андипал» 47
Антипирин 49
Аспизоль 57
Ацетилсалициловая кислота 60
Баралгин 63
Бенальгин 69
Бенетазон 70
Билтрицид (празиквантель, ценариде) 80
Бутадион 90
Ибупрофен (бруфен) 175
Индовазин 180
Индометацин (метиндол) 180
«Капсин» 203
Кофицил 230
Линимент «Нафтальгин» 290
— «Санитас» 247
Метилсалицилат 271
Мефенаминовая кислота 274
Мукартрин 280
Напросин 283
Натрия салицилат 288
Наяксин 291
«Новомигрофен» 302
Ортофен (вольтарен) 320
Парацетамол 326
«Пенталгин» 331
«Пирамеин» 338
Пиркофен 341
Раверон 365
Румалон 381
«Салинимент» 382
Салициламид 382
«Седальгин» 388

Отредактировал: ledi24

Сургам 420
Темпалгин 426
Фенацетин 458
«Цефекон» 505
«Цитрамон» 515

Г. Потогонные средства

Бузины черной цветки 89
Липы цветки 251
Малины плоды 259
Сборы потогонные 387

IV. Противосудорожные средства

Антелепсин 48
Бензобамил 72
Бензонал 72
Гексамидин 112
«Глюферал» 129
Дидепил 154
Дифенин 164
Конвулекс 222
Метиндион 272
Мидокалм 275
Пуфемид 364
Сукцилеп 413
Тегретол 425
Триметин 444
Фали-лепсин 456
Финлепсин (тегретол) 425
Хлоракон 493

V. Препараты, применяемые при лечении паркинсонизма

Беллазон 67
Глудантан 127
Динезин 158
Левопа (L-Допа) 249
Мадопар 258
Мидантан 275
Наком 282
Норакин 305
Тропацин 451
Циклодол (паркопан, ромпаркин) 327, 508
Юмекс 539

VI. Средства, возбуждающие центральную нервную систему

А. Психостимулирующие средства

Кофеин 229
Кофеин-бензоат натрия 229
«Кофетамин» 230
Сиднокарб 394
Сиднофен 395

Б. Антидепрессанты

Авоксин 20
Азалептин (лепонекс) 25
Азафен 26
Анафранил (кломипрамин, гидифен) 45
Герфонал 118
Дамилена малеинат (амитриптилин, триптизол) 137
Инказан 181
Литий карбонат 251
— оксибутират 251
Людиомил 255
Мелипрамин (имизин) 265
Ниаламид (нуредал) 294
Петилил 335
Пиразидол 338
Фторацизин 481

В. Аналептические средства

Анабазина гидрохлорид 43
Бемегрид 68
Гамибазин 109
«Дента» капли 146
Камфора 200
Кордиамин 226
Лобелина гидрохлорид 252
«Лобесил» 252
Сульфокамфокаин 419
Цититон 514
Этимизол 534

Отредактировал: ledi24

Г. Препараты группы стрихнина

Секуринина нитрат 388
Стрихнина нитрат 413
Чилибухи настойка 518

Д. Разные средства, оказывающие возбуждающее влияние на центральную нервную систему

Аралии настойка 53
Женьшеня настойка 172
Заманихи настойка 173
Левзеи экстракт жидкий 237
Лимонника настойка 246
Пантокрин 324
Родиолы экстракт жидкий 376
Сапарал 384
Стеркулии настойка 409
Элеутерококка экстракт жидкий 521

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО НА ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ НЕЙРОМЕДИАТОРНЫЕ ПРОЦЕССЫ

I. Вещества, действующие преимущественно на органы, иннервируемые вегетативными нервами

А. Ацетилхолин и холиномиметические вещества

Ацеклидин 59
Ацетилхолина хлорид 60
Пилокарпина гидрохлорид 336

Б. Антихолинэстеразные вещества

Амиридин 40
Армин 53
Галантамина гидробромид 108
Дезоксипеганина гидрохлорид 141
Калимин 194
Оксазил 308
Прозерин 357
Стефаглабрина сульфат 410
Фосфакол 477
Хинотилин 490

В. Антихолинергические средства, блокирующие преимущественно периферические холинорецептивные системы

«Анузол» суппозитории 50
Апрофен 52
Арпенал 54
Атропина сульфат 58
«Аэрон» 62
«Бекарбон» 66
Беленное масло 67
«Беллалгин» 67
«Беллластезин» 67
«Беллатаминал» 68
«Беллоид» 68
«Бесалол» 75
«Бетиол» суппозитории 77
Гоматропина гидробромид 130
Желудочные таблетки с экстрактом красавки 171
Красавки препараты 231
Метацин 269
Платифиллина гидротартрат 344
Скополамина гидробромид 400
Спазмолитин 406
«Тепафиллин» 429
Торекан 440
Фубромеган 483

Г. Ганглиоблокирующие вещества

Бензогексоний 72
Гигроний 118
Димеколин 156
Имехин 178
Камфоний 200
Кватерон 209
Пахикарпин 330
Пентамин 332
Пирилен 341
Темехин 426

Отредактировал: ledi24

Д. Адреналин и адреномиметические вещества

Адреналина гидротартрат 23
— гидрохлорид 22
Ангиотензинамид 46
Астмопент (алупент) 57
Бородуал 74
Беротек 75
Бриканил 86
Галазолин 107
Дитэк 163
Дофамин (допмин) 169
Изадрин (новодрин эуспиран) 175
Мезатон 264
Нафтизин (санорин) 290
Норадреналина гидротартрат 304
Партусистен 75, 328
Сальбутамол 382
Солутан 402
Теопэк 427
Теотард 428
«Теофедрин» 428
Фетанол 468
«Эфатин» аэрозоль 537
Эфедрина гидрохлорид 538

Е. Курареподобные и антиадренергические вещества (адреноблокаторы)

Анаприлин (обзидан) 45
Бутироксан 91
Вискен 104
Дигидроэрготамин 152
Дигидроэрготоксин 153
Изобарин (октадин) 176
Корданум 224
Орнид 319
Пирроксан 342
Тразикор 441
Тропафен 450
Фентоламина гидрохлорид 463

Ж. Гистамин и антигистаминные препараты

Бикарфен 78
Гисманал (астемизол) 122
Гистазол 123
Гистамин 123
Диазолин 149
Димебон 155
Димедрол 155
Дипразин 160
Задитен 172
Интал 187
Мексамин 265
Перитол 333
Пипольфен 160
Серотонина адипинат 391
Супрастин 420
Тавегил 421
Фенкарол 460

II. Вещества, действующие преимущественно в области окончаний двигательных нервов

А. Антидеполяризующие мышечные релаксанты

Ардуан 53
Диоксоний 159
Диплацина дихлорид 160
Квалидил 208
Мелликтин 265
Тубокурарин-хлорид 451

Б. Деполяризующие мышечные релаксанты

Дитилин 162
Мио-релаксин 162

В. Реактиваторы холинэстеразы

Дипироксим 160
Изонитрозин 177

СРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО В ОБЛАСТИ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ НЕРВНЫХ ОКОНЧАНИЙ

I. Местноанестезирующие средства

Анестезин 47
«Анестезол» суппозитории 48
Дикаин 154
Димексид 156
Кокаина гидрохлорид 218
Лидокаина гидрохлорид 245

Отредактировал: ledi24

Меновазин 266
Мефенамина натриевая соль 274
Нео-анузол 292
Новокаин 301
Павестезин 322
Пиромекаин 342
Тримекаин 444
Ультракаин 452
Цимезоль аэрозоль 509

II. Обволакивающие и адсорбирующие средства

Алмагель 31
— «А» 31
Вентер (сукральфат) 94
Гастал 110
Глина белая 126
Даларгин 136
Де-Нол 145
Льна семя 255
Уголь активированный (карболен) 205
— — «КМ» 205
Ульфамид 454
Фосфалюгель 477

III. Вяжущие средства

А. Вяжущие средства растительного происхождения

Альцид-В 35
Дуба кора 170
Зверобоя трава 173
Кровохлебки корневище 232
Лапчатки корневище 237
Ольхи соплодия 317
Ромазулан 377
Ромашки цветки 377
Сальвин 383
Танин 422
«Тансал» 422
Череды трава 517
Черемухи плоды 517
Черники плоды 517
Шалфея листья 518

Б. Препараты, содержащие соли металлов

Бурова жидкость 90
«Викаир» 96
«Викалин» 96
Висмута нитрат основной 105
Дерматол 147
Квасцы жженые 209
Кровоостанавливающие карандаши 232
Ксероформ 233
Свинца ацетат 387

IV. Средства, действие которых связано преимущественно с раздражением нервных окончаний слизистых оболочек и кожи

А. Средства, содержащие эфирные масла

Бальзам «Золотая звезда» 63
«Бом-Бенге» 85
Боромептол 86
Валидол 93
Горчичники 132
Зубные капли 175
«Ингакамф» 179
«Ингалипт» 179
«Камфомен» 199
«Капситрин» 203
Мазь от обморожения 259
Ментол 266
Мяты перечной листья 281
— — настойка 281
Мятные таблетки 266
«Пектусин» 330
Перца стручкового настойка 334
Перцовый пластырь 334
Эвкалипта лист 519
«Эвкатол» капли 519
«Эфкамон» мазь 538

Б. Горечи

Аира корневище 28
Душицы трава 171
Золототысячника трава 174
Одуванчика корень 308

Отредактировал: ledi24

Полыни горькой трава 350
Сбор для возбуждения аппетита 385
Трилистника водяного лист 444

В. Средства, содержащие аммиак

Аммиака раствор 40

Г. Средства, содержащие дихлордиэтилсульфид и другие вещества, раздражающие кожу

«Антипсориатикум» мазь 49
«Псориазин» мазь 364

Д. Прочие вещества, раздражающие кожу

Метилсалицилат 271
Муравьиный спирт 281
Скипидарная мазь 400
Спирт камфорный 200

V. Отхаркивающие средства

Алтея корень 33
Аниса плоды 48
Апоморфина гидрохлорид 51
Ацетилцистеин 60
Багульника болотного трава 62
Бромгексин 87
Глицирам 126
Грудной эликсир 135
Девясила корневище с корнями 139
Диметпрамид 157
Душицы трава 171
Ледин 242
Ликвиритон 246
Ликорина гидрохлорид 246
Мать-и-мачехи лист 262
Мукалтин 280
Натрия бензоат 284
Нашатырно-анисовые капли 291
Пертуссин 334
Подорожника лист 346
Сборы грудные 386
Синюхи лазурной корневище 400
Солодки корень 402
Сосновые почки 405
Термопсиса трава 429
Терпингидрат 429
Фиалки трава 469
«Флакарбин» 472
Чабреца трава 516

VI. Слабительные средства

Агиолакс 21
Алоэ сок 32
Бисакодил 80
Вазелиновое масло 92
Глицериновые суппозитории 126
Гутталакс 135
Жостера плоды 172
«Изаман» таблетки 176
Изафенин 176
Капуста морская 203
Карловарская соль искусственная 205
— — натуральная 205
Касторовое масло 207
Кафиол 208
Крушины кора 232
Ламинарид 236
Рамнил 365
Ревеня корень 366
Регулакс (кафиол) 208
Сбор ветрогонный 386
— желудочный 386
— противогеморроидальный 387
— слабительный 387
Сенаде 389
Сенадексин 389
Сенны лист 390
— экстракт сухой, таблетки 390
Стальника настойка 407
Тмина плоды 439
Фенолфталеин 463
Фенхеля плод 464

Отредактировал: ledi24

VII. Средства для улучшения процесса заживления и трофики тканей при заболеваниях желудочно-кишечного тракта

Алантон 29
Алмагель 31
— «А» 31
Гастрофарм 110
Гастроцепин 111
Гистодил (циметидин, беломет, тагамет) 124
Имодиум 179
Калефлон 194
Кальмагин 196
Плантаглюцид 344
Сок подорожника 344
«Флакарбин» 472
Фосфалюгель 477
Церукал 502
Этаден 530

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ СРЕДСТВА

I. Сердечные гликозиды

Адонис-бром таблетки 22
Горицвета весеннего трава 131
Дигален-нео 152
Дигитоксин 153
Дигоксин 153
Зеленина капли 173
Капли ландышево-валериановые 236
Кардиовален 205
Коргликон 224
Кордигит 226
Ландыша настойка 236
Лантозид 236
Строфантин К 413
Целанид (изоланид) 500

II. Антиаритмические средства

Аймалин 28
«Аспаркам» (панангин) 56
Боярышника плоды и цветки 86
Кинилентин 213
Коргард (надодол) 224
Лопресор 253
Новокаинамид 302
Орнид 319
Ритмилен 374
Тразикор 441
Хинидина сульфат 488
Этацизин 533
Этмозин 536

III. Сосудорасширяющие и спазмолитические средства

А. Антиангинальные препараты

Амилнитрит 37
Карбокромен (интенкордин) 204
Кордарон 225
Курантил (персантин) 234
Миофедрин 277
Нитроглицерин 298
Нитро-мазь 299
Нитронг 299
Нитросорбид 300
Нонахлазин 303
Регитин 366, 463
Сензит 389
Сустак (нитро-мак) 420
Тринитролонг 444
Фенигидин (коринфар) 459
Финоптин (изоптин) 470
Эринит 525

Б. Препараты, улучшающие мозговое кровообращение и антигипертензивные средства

Адельфан-эзидрекс 21
Апрессин 52
Беталок 76
Винкапан 99
Винкатон 99
Вискальдикс 103
Допегит 169
Кавинтон 192
Клофелин (гемитон) 216
Кристепин 231

Отредактировал: ledi24

Нанипрус 282
Раунатин (раувазан) 365
Резерпин (рауседил) 367
Сермион 391
Сиднофарм (корватон) 394
Тирезид-К 446
Фловерин 473
Циннаризин (стугерон) 511

В. Спазмолитические средства разных групп

Галидор 108
Ганглерон 109
Датискан 139
Дибазол 150
Дипрофен 161
Дипрофиллин 161
Добутрекс (добутамин) 166
Ксантинола никотинат (теоникол, компламин) 232
«Никоверин» 295
Никошпан 297
Но-шпа 307
Папаверин 325
Папазол 326
Теобромин 427
«Теодибаверин» 427
«Теофедрин» 428
Теофиллин 428
Трентал 442
Феникаберан 459
Энап 521
Эуфиллин 537

Г. Спазмолитические препараты животного и растительного происхождения

Андекалин 47
Боярышника плоды 86
Бузины черной цветки 89
Липы цветки 251
Малины плоды 259
Сушеницы топяной трава 421

IV. Ангиопротекторы

Анавенол 44
Доксиум 167
Пармидин (продектин) 328
Эскузан 527
Эсфлазид 529
Этамзилат 532

СРЕДСТВА, УСИЛИВАЮЩИЕ ВЫДЕЛИТЕЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ ПОЧЕК

I. Диуретические и дегидратационные средства

Аммония хлорид 41
Березы почки 74
Брусники лист 89
Буфенокс 91
Василька синего цветки 94
Верошпирон 95
Гипотиазид 122
Диакарб 149
Леспенефрил 243
Маннит 259
Можжевельника плоды 278
Мочевина для инъекций 280
Оксодолин 314
Почечный чай 351
Сбор мочегонный 386
Толокнянки лист 440
Триампур-композитум 443
Урегит 455
Фурантрил 487
Фуросемид (лазикс) 487
Хвоща полевого трава 488
Циклометиазид 508

II. Средства, способствующие выделению мочевой кислоты и удалению мочевых конкрементов

Ависан 20
Аллопуринол 30
Блемарен 84, 401
Горца птичьего трава 132
Магурлит 257
«Марелин» 260
Марены красильной экстракт 261
Олиметин 317
Пинабин 336
«Солимок» 401

Отредактировал: ledi24

«Уродан» 455
Уролесан 456
Фитолизин 470
Цистенал 513
Этамид 532

ЖЕЛЧЕГОННЫЕ СРЕДСТВА И ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, УЛУЧШАЮЩИЕ ФУНКЦИЮ ПЕЧЕНИ

Аллохол 31
Берберина бисульфат 74
Бессмертника песчаного цветки 76
Билигнин 78
Вигератин 95
Зиксорин 173
Конвафлавин 221
Кукурузные рыльца 233
Легалон 241
Лив-52 244
Лиобил 247
Никодин 295
Розанол 376
Сбор желчегонный 386
Силибор 397
Флакумин 472
Фламин 473
Холагол 498
Холензим 498
Холосас 499
Циквалон 508
Эссенциале 527
— форте 527

СРЕДСТВА, СТИМУЛИРУЮЩИЕ МУСКУЛАТУРУ МАТКИ

I. Спорынья и ее алкалоиды

«Беллоид» 68
«Кофетамин» 230
Метилэргометрин 272
Эргометрина малеат 524
Эрготал 524
Эрготамина гидротартрат 525

II. Разные маточные средства, применяемые в акушерско-гинекологической практике

Барбариса листьев настойка 64
Гифотоцин 124
Дезаминоокситоцин 140
Котарнина хлорид (стиптицин) 229
Окситоцин 312
Партусистен 75, 328
Пастушьей сумки трава (экстракт) 329
Питуитрин 343
Простенон 361
Чистеца буквицецветного экстракт 518

СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОЦЕССЫ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ

I. Гормоны, их аналоги и антигормональные препараты

А. Гормоны гипофиза и препараты, действующие на функцию гипофиза

Адипозин 21
Адиурекрин 22
Адиуретин-СД 22
Гифотоцин 124
Гонадотропин менопаузный 131
— хорионический 130
Дезаминоокситоцин 140
Кломифенцитрат 215
Клостильбегит 215
Кортикотропин 227
«Кортомицетин» 229
Лактин 235
Окситоцин 312
Парлодел 327
Питуитрин 343
Префизон 355
Синактен-депо 398
Соматотропин человеческий для инъекций 403
Цинк-кортикотропин суспензия 510

Отредактировал: ledi24

Б. Препараты, влияющие на функции щитовидной и околощитовидной желез

Дигидротахистерол 152
Кальцитрин 196
Мерказолил 267
Паратиреоидин 326
Тахистин 424
Тиреоидин 438
Тиреокомб 439
Тиреотом 439
Трийодтиронина гидрохлорид 443

В. Препараты поджелудочной железы и синтетические гипогликемические препараты

Адебит 125
Букарбан 89
Бутамид 90
Глибутид (адебит, буформин, силубин) 125
Глюренорм (гликвидон) 129
Диформин-ретард (глюкофаг) 164
Изодибут 176
Инсулин 182
Манинил 259
Оранил 89
Предиан 353
Хлорпропамид 496

Г. Гормоны коры надпочечников и их синтетические аналоги

Беклomет (бекотид) 66
Гидрокортизона ацетат 120
— гемисукцинат 120
Глицерам 126
Дезоксикортикостерона ацетат (ДОКСА) 140
— триметилацетат 141
Дексаметазон 143
Дексаметазон офтан (глазные капли) 144
«Деперзолон» 146
«Дермозолон» 147
Кенакорт (триамцинолон, полькортолон) 209, 210
Кеналог-40 (триамцинолона ацетат) 210
Кортизона ацетат 227
Кортинефф (флоринеф, флюорокортизон ацетат) 228
Лоринден 253, 254
Местипред (урбазон) 273
Преднизолон 353
Преднизолона ацетат 354
— гемисукцинат 354
Пресоцил 355
Сикортен 396
Синафлан 398
«Сульфодекортэм» 419
«Флуцинар» (синалар) 398
Фторокорт 482

Д. Препараты женских половых гормонов и их синтетические аналоги

Антсовин 49
Бисекурин 81
Диане 149
Димэстрол 157
Климактерин 214
Кломифенцитрат (клостильбегит) 215
Микрофоллин-форте 277
Нон-овлон 304
Норколут 305
Норэтистерон 306
«Овидон» 308
Оксипрогестерона капронат 312
Постинор 351
Прегнин 352
Прогестерон 356
Ригевидон 372
Сигетин 393
Синэстрол 399
Туринал 451
Фолликулин (эстрон) 475
Эстрадиола дипропионат 528
Эстриол 529

Е. Препараты мужских половых гормонов (андрогены) и их синтетические аналоги

Депостат 146
Метилтестостерон 271
Омнадрен-250 (сустанон-250) 317
Пролотестон 358
Раверон 365
«Тестобромлецит» 430
Тестостерона пропионат 430
Тестэнат 431

Отредактировал: ledi24

Метандростенолон 268
Метиландростендиол 270
Нероболил 293, 462
Ретаболил 370
Силаболин 397
Феноболин (нероболил) 462
Хонван 478

СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО НА ПРОЦЕССЫ ТКАНЕВОГО ОБМЕНА

I. Витамины и их аналоги

Аскорбиновая кислота 55
Бенфотиамин 73
Видехол 96
Викасол (витамин К) 97
Витафтор 106
Витогепат 107
Галаскорбин 108
Дигидротахистерол 152
Кальция пангамат 198
— пантотенат 198
Карнитина хлорид 206
Кверцетин 209
Кобамамид 217
Кокарбоксилаза 218
Липамид 248
Липоевая кислота 249
Метилметионинсульфония хлорид (витамин U) 271
Никотинамид 295
Никотиновая кислота (витамин PP) 296
Оксикобаламин 311
Пантенол аэрозоль 324
Пиридоксальфосфат 340
Пиридоксина гидрохлорид (витамин B_6) 341
Ретинола ацетат (витамин А) 370
— пальмитат (витамин А) 371
Рибофлавин (витамин B_2) 372
Рибофлавина мононуклеотид 372
Рутин (витамин Р) и его препараты 106
Рябины плоды 381
Сирепар 400
Тиамина бромид (витамин B_1) 433
— хлорид (витамин B_1) 434
Тиодин 437
Токоферола ацетат (витамин Е) 440
Флавинат 471
Фолиевая кислота (витамин B_c) 474
Фосфотиамин 478
Холина хлорид 499
Цианокобаламин 506
Шиповника плоды 518
Эргокальциферол (витамин D_2) 523

Поливитаминные препараты

«Аевит» 24
Аекол 24
«Амитетравит» 55
«Аскорутин» 55
«Астинивит» 55
«Аэровит» 61
«Гексавит» 111
«Гендевит» 116
«Гептавит» 118
«Гипозоль» аэрозоль 121
«Глутамевит» 127
«Декамевит» 142
Каротолин 207
«Квадевит» 208
Липостабил 249
«Облекол», пленка 307
Облепиховое масло 308
«Пангексавит» 323
«Пентовит» 332
«Ревит» 371
Сборы витаминные 386
Смородины черной плоды 401
Тетравит 431
«Тетрафолевит» 432
«Ундевит» 454
Шиповника плодов сироп 518
— масло 518
Эссенциале 527

Отредактировал: ledi24

II. Ферментные препараты и вещества с антиферментной активностью

А. Ферментные препараты

Абомин 19
Авелизин (стрептолиаза) 19
Ацидин-пепсин 61
Бактисубтил 62
Дезоксирибонуклеаза 142
Желудочный сок натуральный 172
«Ируксол» мазь 188
Коллализин 219
Легалон 241
Лекозим 242
Лидаза 245
Лизоцим 245
Мезим-форте 264
Нигедаза 294
Ораза 318
Панзинорм-форте 323
Панкреатин 323
Пенициллиназа 331
Пепсидил 333
Пепсин 333
Рибонуклеаза 371
Ронидаза 377
Солизим 401
Сомилаза 404
Стрептаза 19, 409
Стрептодеказа 410
Террилитин 429
Трипсин 446
Триферment 448
Фестал (дигестал) 467
Фибринолизин 469
Химопсин 488
Химотрипсин кристаллический 488
Целиаза 500
Цитохром-С 514

Б. Препараты, обладающие антиферментной активностью

Аминокапроновая кислота 38
Артепарон 54
Гордокс 223
Контрикал 223
Памба 322

III. Средства, влияющие на свертывание крови

А. Средства, тормозящие свертывание крови

Гепарин 117
Гепариновая мазь 117
«Гепароид» мазь 118
Глюгицир 128
Неодикумарин 292
Пелентан 292
Синкумар 399
Стрептаза 19, 409
Фенилин 460
Фепромарон 464
Эскузан 527

Б. Антигеморрагические и гемостатические средства

Адроксон 24
Арники настойка 53
Гливенол 125
Горца почечуйного трава 131
Дицинон 165, 532
Доксиум 167
Каноксицел (салфетки) 202
Крапивы лист 230
Лагохилус опьяняющий 234
Марля кровоостанавливающая 261
Оксицелодекс 313
Пленка коллагеновая 345
— фибринная 345
Прокто-гливенол 357
Проктоседил 358
Протамина сульфат 361
Серотонина адипинат 391
Статизоль 408
Тысячелистника трава 452
Феракрил 465
Этамзилат 532

IV. Препараты гипохолестеринемического действия

Безамидин 66
Димефосфон 157
Мисклерон 278
Полиспонин 349
Трибуспонин 443
Холестирамин 498

Отредактировал: ledi24

V. Аминокислоты

Аминалон 38
Апонти 52
Берлофен 74
Гистидина гидрохлорид 123
Глутаминовая кислота 128
Левамин-70 237
Метионин 272
Нофелан 307
Церебролизин 501
Цистеин 512

VI. Плазмозамещающие растворы и средства для парентерального питания

А. Плазмозамещающие растворы

Гемодез 115
— «Н» 115
Желатиноль 171
Полиглюкин 347
Протеин 362
Реоглюман 368
Реополиглюкин 369
Энтеродез 523

Б. Солевые растворы

Альбумин 34
«Ацесоль» 59
«Дисоль» 162
«Лактасол» 234
Натрия хлорид 289
Рингера-Локка таблетки 373
«Санасол» 383
«Трисоль» 447
«Хлосоль» 497

В. Средства для парентерального питания

Альвезин «Новый» 34
Аминон (аминосол) 39
Вамин 94
Гидролизин 120
Казеина гидролизат 193
Липофундин (интралипид) 250
Полиамин 347
«Полифер» 349

Г. Консерванты крови

Глюгицир 128
Цитроглюкофосфат 516

VII. Препараты, применяемые для коррекции кислотно-основного и ионного равновесия в организме

А. Щелочи и кислоты

Кальция карбонат 198
Магния карбонат 257
Магния окись 257
Натрия гидрокарбонат 284
Трисамин 447
Хлористоводородная кислота 495

Б. Препараты кальция, калия и натрия

«Аспаркам» (панангин) 56
Калия-магния аспарагинат 56
Калия хлорид 195
Кальция глюконат 197
— лактат 198
— хлорид 199
Регидрон 366

В. Препараты, содержащие железо

Алоэ с железом сироп 32
«Гемостимулин» 116
Железа глицерофосфат 126
— лактат 171
Конферон 223
Оксиферрискорбон натрия 312
Ферамид 465
Фербитол 465
«Феррокаль» 466
«Ферроплекс» 466
«Ферроцерон» 467
Феррум Лек 467
«Фитоферролактол» 471

Отредактировал: ledi24

Г. Препараты, содержащие кобальт

Коамид 217

Д. Препараты, содержащие золото

Кризанол 231

Е. Препараты, содержащие йод и йодозаменители

«Антиструмин» 49
Дегмин 139
Дегмицид 140
Йод 190
Йода спиртовой раствор 190
Йодинол 191
Йодонат 191
Йодопирон 192
Калия йодид 195
«Микройод» 277
Натрия йодид 285
Хлоргексидин биглюконат 494
Церигель 501

Ж. Препараты, содержащие фосфор

Аденил 476
Глицерофосфат 126
Кальция глицерофосфат 197
Липоцеребрин 250
Натрия аденозитрифосфат 283
Фитин 470
«Фитоферролактол» 471
Фосфаден 476

З. Препараты, содержащие фтор

Витафтор 106

И. Препараты, содержащие мышьяк

«Дуплекс» 171
Мышьяковистый ангидрид 281
Натрия арсенат 284

К. Препараты, содержащие фенол

Ферезол 466

VIII. Препараты, стимулирующие метаболические процессы

А. Производные пиримидина, тиазолидина и гипоксантина

Аденил (фосфаден) 476
АТФ (фосфабион) 283
Калия оротат 195
Кетазон (кетофенилбутазон, кебузоне) 210
Лейкоген 242
Метилурацил (метацил) 271
Пентоксил 332
Рибоксин (инозие F) 371

Б. Препараты разных химических групп

Дипромоний 161
Карнитина хлорид (новаин) 206
Этаден 530

В. Сахара и их заменители

Глюкоза 128
Сахарин растворимый 385

Г. Биогенные стимуляторы

Алоэ линимент 32
— сок 32
— таблетки 32
— экстракт 33
— — для инъекций 33
Биосед 80
Вулнузан 107
Гумизоль 135
Каланхоэ сок 193
Пелоидин 330
Пелоидодистиллят 331
Плаценты взвесь 344
— экстракт 345
Торфот 441
ФиБС 469

Отредактировал: ledi24

Д. Разные биогенные препараты

Актовегин (солкосерил) 28
Апилак 50
Бефунгин 77
Гематоген 114
Желчь медицинская консервированная 172
Зимозана суспензия 174
Коллагеновая пленка 345
Пирогенал 342
Плазмол 343
Пропер-мил 359
«Пропосол» 360
Раверон 365
Румалон 381
Спленин 407
Стекловидное тело 409
Хонсурид 499
Цернилтон 502

Е. Препараты, содержащие яды пчел и змей

Апизартрон 50
«Апифор» 51
Випраксин 100
Випросал В 100
Наяксин 291
«Пропоцеум» 360

ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ

Азатиоприн (имуран) 26
Батриден 65
Декарис 143
Натрия нуклеинат 285
Пирогенал 342
Продигиозан 356
Тактивин 421
Тималин 435

ПРЕПАРАТЫ РАЗЛИЧНЫХ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ ГРУПП

I. Вещества, угнетающие аппетит

Фепранон 464

II. Противоядия и комплексоны

Аллоксим 30
Десферал 148
Дипироксим 160
Диэтиксим 165
Изонитрозин 177
Купренил (пеницилламин) 233
Натрия тиосульфат 288
Пентацин 332
Тетацин-кальций 431
Унитиол 454

III. Препараты для профилактики и лечения синдрома лучевой болезни

Батилол 65
Зимозан суспензия 174
Мексамин 265
Метилурацил 271
Натрия нуклеинат 285
Тезана линимент 426
Цистамина дигидрохлорид 512

IV. Фотосенсибилизирующие препараты

Аммифурин 40
Бероксан 75
Псоберан 363
Псорален 363
Пувален 364
«Фенкортозоль» 461
«Фогем» 474

V. Специальные средства для лечения алкоголизма

Инмекарб 181
Тетурам (антабус) 433
Эспераль 527

Отредактировал: ledi24

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ И ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ СРЕДСТВА

I. Химиотерапевтические средства

А. Антибиотики

а) Препараты группы пенициллина

Азлоциллин (секуропен, азлин) 27
Ампиокс натрия 41
Ампициллина натриевая соль (пентрексил) 41
тригидрат 42
Бензилпенициллина соль калиевая 71
— — натриевая 70
— — новокаиновая 71
Бициллин-1 83
— — -5 84
Далацин-Ц (клиндамицин) 136
Исипен 188
Карбенициллина динатриевая соль 203
Карфециллина натриевая соль 207
Кефзол (цефазолин, цефамезин) 212
Клафоран 214
Оксациллина натриевая соль 309
Феноксиметилпенициллин 462
Цефалексин (цепорекс) 503
Цефамезин (цефазолин, кефзол) 212
Цефобид 505

б) Тетрациклины и окситетрациклины

«Гиоксизон» мазь 121
Дитетрациклиновая глазная мазь 162
Доксициклина гидрохлорид (вибрамицин) 168
Метациклина гидрохлорид 268
«Оксициклозоль» аэрозоль 313
Олететрин 316
Тетраолеан 316
Тетрациклина гидрохлорид 432
— — с нистатином 432

в) Препараты группы стрептомицина

Стрептомицина сульфат 410
— хлор-кальциевый комплекс 411

г) Препараты группы левомицетина

«Ируксол» мазь 188
«Левовинизоль» аэрозоль 238
Левомеколь 238
Левомицетин (хлорамфеникол) 238
Левомицетина стеарат 239
— сукцинат натрия 239
«Левосин» мазь 241
Синтомицина линимент 399

д) Антибиотики-аминогликозиды

Амикацин (амикин) 37
Бруламицин 88
Гентамицина сульфат (гарамицин) 117
Канамицина сульфат 201
Мономицин 279
Неомицина сульфат 292
Сизомицина сульфат 395
Софрадекс 405

е) Антибиотики-макролиды

Олеандомицина фосфат 315
Олететрин 316
Рулид 380
Эритромицин 525
Эритромицина фосфат 526
Эрициклин 526

ж) Антибиотики разных групп

Азактам (азстреонам) 25
Гелиомициновая мазь 114
Грамицидин С 133
паста 133
Линкомицина гидрохлорид 247
Макроцид 277
Полимиксин М сульфат 348
— В сульфат 347
Ристомицина сульфат 373
Таривид 422
Фузидин-натрий 483

Отредактировал: ledi24

э) Противогрибковые антибиотики

Амфоглюкамин 42
Леворин 240
Леворина натриевая соль 241
Нистатин 297

Б. Сульфаниламидные и другие препараты

Бактрим 62
Бисептол 62
«Ингалипт» 179
Мафенида ацетат 262
Норсульфазол (сульфазол) 306
Норсульфазол-натрий 306
Салазодиметоксин 381
Салазопиридазин 381
Стрептоцид 412
— растворимый 412
Сульгин 414
Сульфадимезин 414
Сульфадиметоксин (мадрибон) 414
Сульфазин 415
Сульфален (келфизин) 415
Сульфален-меглюмин 416
Сульфамонометоксин 416
Сульфапиридазин 417
— натрий 417
Сульфасалазин 417
«Сульфатон» 418
Сульфацил-натрий (альбуцид) 418
«Супореф» 420
Уросульфан 456
Фтазин 480
Фталазол 480
Этазол 530
— натрий 531

В. Производные нитрофурана

«Лифузоль» аэрозоль 252
«Фастин» мазь 457
Фурагин 484
— растворимый 484
Фурадонин 485
Фуразолидон 485
Фурапласт (с перхлорвинилом) 486
Фурацилин 486

Г. Производные хиноксалина, 8-оксихинолина и разные химиотерапевтические препараты

Грамурин 133
«Дермозолон» 147
Диоксидин 158
Имодиум 179
Контрацептин Т 222
Невиграмон (неграм) 291
Нитроксолин (5-НОК) 299
Нолицин 303
Палин 322
Хиниофон (ятрен) 489
Хинозол 489
Хиноксидин 490
Ципринол 511

Д. Противотуберкулезные препараты

Изониазид (тубазид, ГИНК) 177
Метазид 268
Натрия пара-аминосалицилат (ПАСК) 288
Пасомицин 328
Протионамид 362
Рифампицин (бенемицин) 374
Салюзид растворимый 383
Солютизон 403
Стрептосалюзид 412
Тизамид 434
Тиоацетазон (тибон) 436
Флоримицина сульфат (виомицин) 473
Фтивазид 481
Этамбутол 531
Этионамид 535

Е. Противолепрозные препараты

Диафенилсульфон 150
Солюсульфон 402

Отредактировал: ledi24

Ж. Препараты для лечения протозойных инфекций

а) Противомалярийные препараты

Делагил (хингамин) 145
Плаквенил 343
Пресоцил 355
Примахин 356
Хинина дигидрохлорид 489
— сульфат 488
Хиноцид 491
Хлоридин (тиндурин) 495

б) Препараты для лечения трихомоноза, лейшманиоза, амебиаза и других протозойных инфекций

Аминохинол 39
Ваготил 92
Клион-D 214
Лютенурин 256
Нитазол 297
Солюсурьмин 403
Тинидазол (фасижин) 436
Трихомонацид 449
Трихопол (метронидазол, флагил) 449
Эметина гидрохлорид 521

З. Противосифилитические препараты

Бийохинол 77
Бисмоверол 81
Бициллины 83, 84
«Осарбон» 321
Осарсол (ацетарсол) 321
«Осарцид» 321

И Препараты для лечения грибковых заболеваний кожи

Гризеофульвин (грицин) 134
Декамин 143
Клотримазол (канестен) 215
«Микозолон» 276
Микосептин 276
Низорал 294
Нитрофунгин 300
Октицил 315
Ороназол (кетоконазол) 319
«Ундецин» 454
Фетимин (нафтифин) 468
«Цинкундан» 511
Эпилиновый пластырь 523

К. Противовирусные препараты

Бонафтон 85
Виролекс (ацикловир) 100
Госсипол 132
Интерлок 187
Интерферон 188
«Мегосин» 262
Метисазон 273
Оксолиновая мазь 314
Офтан-IDU 322
Ремантадин 368
Риодоксол 373
Теброфеновая мазь 424
Флореналевая мазь 473

Л Антигельминтные (противоглистные) средства

Вермокс (мебендазол) 95
Декарис 143
Дитразина цитрат 163
Дифезил 164
Нафтамон 290
Папоротника мужского экстракт 326
Пижмы цветки 335
Пиперазина адипинат 337
Пирантель (комбантрин) 338
Сера очищенная 390
Тимол 436
Тыквы семя 452
Фенасал 458
Хлоксил 493

Отредактировал: ledi24

ПРЕПАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ

I. Химиотерапевтические средства

Анандрон (нилутамид) 44
Белустин (ломустин) 68
Бензотэф 73
Гексафосфамид 112
Гидреа (литалир, гидроксимочевина, гидроксикарбамид, оксикарбамид) 119
Дибунол 151
Дипин 159
Допан 168
Имифос 179
Лофенал 254
Меркаптопурин 267
Метотрексат 273
Миелобромол 275
Миелосан 276
Натулан 289
Пафенцил 329
Проспидин 360
Сарколизин 385
Спиробромин 406
Тиофосфамид (ТиоТЭФ) 438
Фопурин 475
Фосфэстрол 478
Фотрин 479
Фторафур 481
Фторурацил 482
Хлорбутин 494
Циклофосфан (циклофосфамид) 508
Цитозар 513

II. Противоопухолевые антибиотики

Адриабластин (адрнамицин) 23
Блеомицетин 85
Брунеомицин 88
Дактиномицин 136
Карминомицина гидрохлорид 205
Оливомицина натриевая соль 316
Рубомицина гидрохлорид 379

III. Алкалоиды и другие вещества растительного происхождения, оказывающие противоопухолевое действие

Бефунгин 77
Винкристин 99
Колхамин мазь 220
Подофиллин 346
Розевин (винбластин) 376
Чага (березовый гриб) 517

IV. Ферментные и гормональные препараты, применяемые при лечении опухолей

L-Аспарагиназа (краснитин) 56
Дановал (даназол) 138
Депостат 146
Зитазониум (тамоксифен) 174
Медротестрона пропионат 263
Пролотестон 358
Фосфэстрол (хонван) 478
Хлодитан 492
Хлортрианизен 497
Эстрадурин 529

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Ацидотест 61
Бария сульфат для рентгеноскопии 65
Билигност (билиграфин) 79
Билимин (билоптин) 79
Гравимун-2 132
Индигокармин 180
Йодамид (300 и 380) 190
Йодолипол 191
Йопагност (холевид) 192
Миодил 535
Пентагастрин 331
Пропилйодон 359
Триомбраст (верографин, урографин) 445
Фалигност 456
Хромолимфотраст 500
Этиотраст (миодил) 535

Отредактировал: ledi24

АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ И СТОМАТОЛОГИИ

«Каметон» 199
«Камфомен» 199
Натрия флуорат 289
«Пропосол» 360
Сальвин 383
Фалимint 457
Фарингосепт 457

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ

Аренариновая глазная мазь 53
Армин, глазные капли 53
Атропин, глазные капли 58
Ацеклидин, глазные капли 59
Ацетилхолина хлорид, глазные капли 60
Бонафтон, глазная мазь 85
Витайодурол, глазные капли 105
Гидрокортизоновая глазная мазь 120
Гистазол 123
Гоматропина гидробромид, глазные капли 130
Дексаметазон-офтан, глазные капли 144
Дексона 144
Дикаин, пленки глазные 154
Дитетрациклиновая глазная мазь 162
Канамицина пленки глазные 201
Катахром-офтан, глазные капли 207
Клофелин, глазные капли 216
Оптимол (тимоптик), глазные капли 318
Офтан-IDU, глазные капли 322
Пилокарпин, глазные капли 336
— -офтан, глазные капли 336
Полудан, глазные капли 350
Преднизолона гидрохлорид, глазные капли 353
Прозерин, глазные капли 357
Сенкаталин, глазные капли 390
Софрадекс гидрохлорид, глазные капли 405
Сульфапиридазин-натрий, пленки глазные 417
Сульфацил-натрий, глазные капли 418
Тауфон, глазные капли 423
Тетрациклиновая глазная мазь 432
Физостигмина салицилат, глазные капли 520
Фосфакол, глазные капли 477
Хинотилин, глазные капли 490
Цитраль 515
Эритромициновая глазная мазь 525

АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

I. Группа галоидов, окислителей и альдегидов

Гексаметилентетрамин 112
Гидроперит 121
«Дермазин» 146
Йод 190
Йодоформ 192
Калия перманганат 195
«Кальцекс» 196
Пантоцид 325
«Уробесал» 455
Формидрон 476
Хлоргексидин биглюконат 494
Циминаль 509

II. Препараты кислот и щелочей

Бензилбензоат 70
Бензойная кислота 72
«Гальманин» 109
Мозольная жидкость 279
Мозольный пластырь 382
Пиоцид 337
Салициловая кислота 382
«Трацептин» 441

Отредактировал: ledi24

III. Группа тяжелых металлов

Колларгол 220
Мазь ртутная серая 379
Препараты свинца 388
— цинка 510
Протаргол 362
Ртути дихлорид 379
— монохлорид (каломель) 379
— окись желтая 379
Свинцовый пластырь 388
Цинка сульфат 511

IV. Антисептические препараты разных групп

Антисептическая жидкость Новикова 301
Бализ-2 63
Бальзамический линимент по Вишневскому 247
Бриллиантовый зеленый 87
Вилькинсона мазь 98
«Винизоль» 98
Винилин (бальзам Шостаковского) 99
Гексализ 111
Гелевин 113
Димексид 156
Ихтиол 189
Календулы цветки, настойка 193
Мазь Конькова 223
Мараславин 260
Метиленовый синий 270
Митрошина жидкость 278
Мыло зеленое 281
Натрия уснинат 288
Нефть нафталанская 293
Новоиманин 301
Полиминерол 349
Резорцин 368
Роцефин 378
Сальвин 383
Сангвиритрин 384
Сера и ее препараты 390
Солидоловая мазь 401
Софоры японской настойка 405
Спирт мыльный 407
Фенилсалицилат 460
Ферезол 466
Хлорофиллипт 495
Цигерол 507
Цитраль 515
Эктерицид 520
Этакридина лактат (риванол) 531
Этоний 536

Отредактировал: ledi24

УКАЗАТЕЛЬ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСНОВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Аборт угрожающий
Партусистен
Оксипрогестерона капронат
Прегнин
Норколут
Туринал
Спазмолитические средства
Токоферола ацетат

Авитаминозы (гиповитаминозы)
Витамины и их аналоги
Поливитаминные препараты

Абсцессы
Антибиотики
Сульфаниламидные препараты
Фурацилин

Акромегалия
Препараты женских половых гормонов
Препараты мужских половых гормонов (андрогены)
Парлодел (бромокриптин)

Актиномикоз
Препараты группы пенициллина
Калия йодид
Натрия йодид

Алкоголизм
Специальные средства для лечения алкоголизма
Апоморфина гидрохлорид
Нейролептики
Транквилизаторы
Пирацетам
Холина хлорид
Пиридитол
Бутироксан

Аллергические заболевания
Глюкокортикостероиды (гормоны коры надпочечников и их синтетические аналоги)
Кортикотропин
Синактен-депо
Антигистаминные препараты
Адреномиметические препараты
Препараты кальция
Паратиреоидин
Дигидротахистерол
Натрия тиосульфат
Вилозен
Гексаметилентетрамин
Витамин Р
Аскорбиновая кислота
Гистазол
Пенициллиназа
Гисманал
Череды трава

Алопеция гнездная (облысение)
Фотосенсибилизирующие препараты

Амебная дизентерия
Тетрациклины
Мономицин
Эметина гидрохлорид
Хиниофон
Осарсол

Аменорея
Препараты женских половых гормонов
Гормоны коры надпочечников
Гонадотропин хорионический
Гонадотропин менопаузный
Лактин
Кломифенцитрат (клостильбегит)
Парлодел

Ангина
Антибиотики
Сульфаниламидные препараты
Антисептические средства
Ципринол
Фурацилин
Йодинол

Отредактировал: ledi24

Анемия
Цианокобаламин
Оксикобаламин
Кобамамид
Витогепат
Кислота фолиевая
Препараты, содержащие железо
Коамид
Натрия арсенат
Пиридоксина гидрохлорид
Аскорбиновая кислота
Рибофлавин
Фитин
Гематоген
Серотонина адипинат

Анорексия
Горечи
Желудочный сок
Анаболические стероиды
Карнитина хлорид
Апилак

Арахноидит
Препараты группы пенициллина
Препараты группы стрептомицина
Гексаметилентетрамин
Бийохинол

Аритмии
Антиаритмические средства
Аллапинин
Адреноблокаторы:
— анаприлин
— тразикор
— вискен
— корданум
Сердечные гликозиды
Калия хлорид
Калия оротат
Кокарбоксилаза
Аспаркам (панангин)
Рибоксин
Апресор
Финоптин
Новокаин
Лидокаин
Кинилентин
Седативные средства

Артериальная гипотензия
Адреномиметические средства
Препараты группы стрихнина
Психостимулирующие средства
Аналептические средства
Разные средства, оказывающие возбуждающее действие на центральную нервную систему
Дезоксикортикостерона триметилацетат
Кофетамин

Артрит ревматоидный
Кислота ацетилсалициловая
Индометацин
Аспизоль
Артепарон
Ортофен
Ибупрофен
Гидрокортизон
Преднизолон
Преднизолонгемисукцинат
Преднизона ацетат
Кеналог-40
Кризанол
Сургам
Азатиоприн
Купренил
Напросин

Артриты
Анальгезирующие, жаропонижающие и противовоспалительные средства — производные салициловой кислоты и других соединений
Гормоны коры надпочечников и их синтетические аналоги
Вещества, раздражающие кожу
Препараты, содержащие яды пчел и змей
Биогенные препараты:
— гумизоль
— пелоидостиллят
— плаценты экстракт
— торфот
— фибс
— желчь консервированная медицинская
— плазмол
— румалон
Транквилизаторы

Аскаридоз
Пирантель
Пиперазина адипинат
Нафтамон
Вермокс (мебендазол)
Декарис
Пижмы цветки

Астенический синдром
Психостимулирующие средства

Отредактировал: ledi24

Ниаламид
Препараты группы стрихнина
Разные средства, оказывающие возбуждающее действие на центральную нервную систему
Препараты, содержащие мышьяк
Препараты, содержащие фосфор
Витамины
Анаболические стероиды
Дезоксикортикостерона ацетат
Бемитил
Экдистен

Атеросклероз
Препараты гипохолестеринемического действия
Холина хлорид
Липоевая кислота
Кавинтон
Липамид
Ангиопротекторы
Йод
Липантил (фенофибрат)
Циннаризин
Кислота никотиновая
Кальция пангамат
Липостабил
Аминалон
Препараты, улучшающие мозговое кровообращение
Стрихнина нитрат

Атония желудка и кишечника
Ацеклидин
Прозерин
Тиамина хлорид
Тиамина бромид
Стрихнина нитрат

Атония (гипотония) матки
Метилэргометрин
Эргометрина малеат
Эрготал
Эрготамина гидротартрат
Барбариса листьев настойка
Гифотоцин
Окситоцин
Пастушьей сумки трава (экстракт)
Питуитрин
Прегнантола гидрохлорид

Атония мочевого пузыря
Ацеклидин
Прозерин
Стрихнина нитрат

Ахилия желудка функциональная
Горечи
Ферментные препараты, улучшающие пищеварение:
— абомин
— ацедин-пепсин
— желудочный сок натуральный
— мезим-форте
— нигедаза
— ораза
— панзинорм-форте
— панкреатин
— пепсидил
— пепсин
— солизим
— фестал (дигестал)
— хлористоводородная кислота разведенная

Белковая недостаточность (гипопротеинемия)
Средства для парантерального питания
Левомин-70
Вамин

Бесплодие
Гонадотропин хорионический
Гонадотропин менопаузный
Препараты женских половых гормонов
Токоферола ацетат
Дановал

Бессонница
Снотворные средства
Седативные средства
Транквилизаторы
Нейролептические средства

Бластомикоз
Амфотерицин В
Амфоглюкамин

Блинорея
Препараты группы пенициллина
Левомицетин
Сульфацил-натрий
Норсульфазол-натрий
Серебра нитрат
Колларгол
Ртути монохлорид

Блефарит
Препараты группы пенициллина
Левомицетин
Тетрациклины

Отредактировал: ledi24

Сульфаниламидные препараты
Фурацилин
Колларгол
Бриллиантовый зеленый
Биогенные стимуляторы
Мазь ртутная желтая
Мазь гидрокортизона ацетат
Дексона

Болезнь Аддисона
Гормоны коры надпочечников:
— дезоксикортикостерона ацетат
— дезоксикортикостерона триметилацетат
— дексаметазон
— кортизона ацетат
Аскорбиновая кислота
Кортинефф
Анаболические стероиды

Болезни глазные
Лекарственные препараты, применяемые в офтальмологии
Интерлок
Гистазол

Болезнь гипертоническая
Диуретические средства
Адреноблокаторы:
— бутироксан
— вискен
— дигидроэрготоксин
— изобарин
— корданум
— орнид
— пирроксан
— тропафен
— фентоламина гидрохлорид
Вискальдикс
Антигипертензивные средства
Энап
Спазмолитические средства
Лопресор
Седативные средства
Транквилизаторы
Коргард
Ганглиоблокаторы:
— бензогексанит
— димеколин
— имехин
— камфоний
Бесталок
Капотен
Регитин

Болезнь Меньера
Торекан
Аэрон
Беллоид
Димедрол
Дипразин
Дифенин
Пирроксан

Болезнь Паркинсона
Препараты, применяемые для лечения паркинсонизма
Скополамина гидробромид
Амизин
Арпенал
Мелликтин
Димедрол
Пиридоксина гидрохлорид

Бронхиальная астма
Адреномиметические вещества:
— астмопент (алупент)
— беродуал
— беротек
— бриканил
— изадрин (новодрин, эуспиран)
— сальбутамол
— солутан
— теофедрин
— «Эфатин» аэрозоль
— эфедрина гидрохлорид
Гормоны коры надпочечников и их синтетические аналоги
Антигистаминные препараты
Антихолинергические средства, блокирующие преимущественно периферические холинореактивные системы
Бензогексоний
Дитэк
Кватерон
Теопэк
Спазмолитические средства
Теотард
Интал
Атровент

Бронхиты
Антибиотики
Сульфаниламидные препараты
Отхаркивающие средства
Ферментные препараты:
— трипсин
— химопсин
Далацин-Ц
Атровент

Бруцеллез
Препараты группы стрептомицина

Отредактировал: ledi24

Левомицетин
Тетрациклины

Вагинит
Левомицетин
Грамицидин
Сульфапиридазин-натрий
Фурацилин
Хинозол
Этакридина лактат
Масло облепиховое
Ваготил

Варикозное расширение вен
Эскузан
Троксевазин
Индовазин
Гливенол

Вегето-сосудистая дистония
Седативные средства
Транквилизаторы
Беллатаминал
Беллоид
Пикамилон

Воздушная болезнь (морская болезнь)
Скополамина гидробромид
Торекан
«Аэрон»
«Аэровит»
Валидол
Натрия гидрокарбонат

Волчанка красная системная
Гормоны коры надпочечников и их системные аналоги
Азатиоприн
Делагил
Плаквенил
Ацетилсалициловая кислота
Бутадион
Индометацин
Кризанол

Гастрит хронический гипоацидный
Кватерон
Ганглерон
Подорожника сок
Плантаглюцид
Кислота никотиновая
Кислота аскорбиновая
Пиридоксина гидрохлорид
Цианокобаламин
Ферментные препараты, улучшающие пищеварение
Кислота хлористоводородная разведенная

Гастрит хронический гиперацидный
Антихолинергические средства
Ганглиоблокаторы
Алмагель
Гастал
Алмагель А
Фосфалюгель
«Викаир»
«Викалин»

Гельминтозы
Антигельминтные средства
Билтрицид (празиквантель)

Геморрой
Слабительные средства
Местноанестезирующие средства:
— анестезин
— «Анестезол» суппозитории
— пео-анузол
— новокаин
«Бетиол» суппозитории
Индовазин
Бутадион мазь
Прокто-гливенол
«Ауробин» мазь
Проктоседил

Гепатит
Глюкоза
Тиамин бромид
Рибофлавин
Пиридоксина гидрохлорид
Никотиновая кислота
Фолиевая кислота
Аскорбиновая кислота
Анаболические стероиды
Преднизолон
Азатиоприн
6-меркаптопурин
Эссенциале
Витогепат
Сирепар
Лив-52
Панзинорм форте
Дипромоний

Герпетическая инфекция
Противовирусные препараты:
— бонафтон
— «Мегосин»
— метисазон

Отредактировал: ledi24

— оксолиновая мазь
— офтан-IDU
— «Риодоксол» мазь
Бриллиантовый зеленый
Алпизарин

Гипертония (см. болезнь гипертоническая)

Гипогликемия
Глюкоза

Гипопаратиреоз
Паратиреоидин
Препараты кальция
Дигидротахистерол
Анаболические стероиды
Тахистин
Сплепин

Гипотериоз
Тиреоидин
Тиреокомб
Тиреотом
Трийодтиронина гидрохлорид
Тиротропин

Гипофизарный нанизм
Анаболические стероиды
Соматотропин
Половые гормоны

Гломерулонефрит
Препараты группы пенициллина
Преднизолон
Азатиоприн
6-меркаптопурин
Делагил
Плаквенил
Индометацин
Гепарин
Исипеп
Кислота аминокапроновая
Фуросемид
Верошпирон
Полиглюкин
Анаболические стероиды
Рулид
Допегит
Адреноблокаторы
Антигипертензивные средства

Гонорея
Препараты группы пенициллина
Тетрациклины
Эритромицин
Сульфаниламидные препараты
Калия перманганат
Протаргол

Грибковые поражения кожи
Препараты для лечения грибковых заболеваний кожи
Кислота бензойная
Кислота салициловая
Ороназол
Резорцин
Дермазолон
Мазь Вилькинсона
Фстимин (нафтифин)

Грипп
Интерферон
Оксолиновая мазь
Ремантадин
Рутин
«Аскорутин»
Кварцетин
Аскорбиновая кислота
Бальзам «Золотая звезда»

Депрессии
Анафранил (кломипрамин)
Антидепрессанты
Людиомил
Нейролептические средства
Фризиум
Транквилизаторы
Авоксин

Дерматит
Вяжущие средства
Череды трава
Флуцинар
Синалар
Локакартен
Сикортен
Пиридоксин
Кальций пантотенат
Кальций пангамат
Антибиотики
Стероидные препараты
Дерматоп

Диабет несахарный
Адиурекрин
Адиуретин
Питуитрин
Хлорпропамид
Мисклерон
Финлепсин
Гипотиазид

Отредактировал: ledi24

Диабет сахарный
Препараты поджелудочной железы и синтетические гипогликемические препараты (противодиабетические средства)
Димефосфон
Глюренорм
Изодибут
Липостабил

Дизентерия бактериальная
Антибиотики
Сульфаниламидные препараты
Производные нитрофурана
Производные 8-оксихинолина
Витаминные препараты

Запоры
Агиолакс
Слабительные средства
Но-шпа
Спазмолитические средства
Холинолитические средства
Магния сульфат
Гутталакс

Злокачественные новообразования
Химиотерапевтические средства
Противоопухолевые антибиотики
Алкалоиды и другие вещества растительного происхождения, оказывающие противоопухолевое действие
Ферментные и гормональные препараты, применяемые при лечении опухолей
Белустин (ломустин)
Гидреа
Детицен
Анандрон

Зоб диффузный токсический (базедова болезнь)
Мерказолил
Препараты, содержащие йод

Инсульт
Средства, тормозящие свертывание крови
Эуфиллин
Фуросемид
Мочевина
Циннаризин
Пармидин

Инфаркт миокарда
Антиангинальные препараты
Липостабил
Промедол
Дроперидол
Анальгин
Димедрол
Натрия оксибутират
Гепарин
Стрептодеказа
Кальция хлорид
Глюкоза
Анаприлин
Ацетилсалициловая кислота
Миофедрин

Кандидоз
Низорал
Нистатин
Леворин
Витамины группы В
Кислота аскорбиновая
Амфотерицин В

Колит, энтероколит
Антибиотики
Сульфаниламидные препараты
Колибактерин
Бифидумбактерин
Бификол
Лактобактерин
Алоэ экстракт жидкий для инъекций
Пелоидин
Протаргол
Вяжущие средства
Обволакивающие и адсорбирующие средства
Ферментные препараты, улучшающие пищеварение

Колит язвенный неспецифический
Антибиотики
Сульфаниламидные препараты
Сульфасалазин
Салазопиридазин
Преднизолон
Гидрокортизон
Аминохинол

Контрацепция
Антеовин
Нон-Овлон
Диане
Овидон
Постинор
Ригевидон
Трацептин

Отредактировал: ledi24

Кровотечения
Антигеморрагические и гемостатические средства
Препараты кальция
Натрия хлорид
Плазмозаменяющие растворы
Викасол
Кислота аскорбиновая
Витамин Р
Гемацель
Глюкоза
Кислота аминокапроновая
Серотонина адипинат
Вискоза гемостатическая
Кровохлебки корневище и корень
Памба
Фитоменадион

Кровотечения маточные дисфункциональные
Средства, стимулирующие мускулатуру матки
Препараты женских половых гормонов:
— синэстрол
— прогестерон
— фолликулин
— кломифенцитрат
Андрогены:
— метилтестостерон
— тестостерон
См. также кровотечения.

Ларингит, фарингит
Ромашки цветки
Шалфея листья
Фалиминт
Эвкалипта лист
«Эвкатол»
Гексализ
Антибиотики
Фарингосепт
Сульфаниламидные препараты

Лейшманиоз
Солюсурмин
Антибиотики
Витамины

Лепра
Противолепрозные препараты:
— диафенилсульфон
— солюсульфон

Лишай опоясывающий
Анальгезирующие средства
Антигистаминные препараты
Транквилизаторы
Снотворные средства
Бриллиантовый зеленый
Оксолиновая мазь
«Флореналь» мазь

Лучевая болезнь
Препараты для профилактики и лечения синдрома лучевой болезни
Пиридоксина гидрохлорид
Мексамин

Лямблиоз
Трихопол
Тинидазол
Фуразолидон
Аминохинол

Малярия
Делагил
Хинина дигидрохлорид
Хиноцид
Примахин
Сульфапиридозин
Хлоридин

Менингит
Антибиотики
Сульфаниламидные препараты
Роцефин
Рулид (рокситромицин)

Миастения
Антихолинэстеразные вещества
Гидрокортизон
Кортизон
Азатиоприн

Мигрень
Дамилена малеинат
Анаприлин
Ацетилсалициловая кислота
Эрготамина гидротартрат
Кофеин
Кофетамин
Анальгезирующие средства
Транквилизаторы
Антигистаминные препараты
Дексаметазон
Фризиум
Диваскан

Насморк
Нафтизин
Галазолин

Отредактировал: ledi24

Эфедрин
«Ингакамф»
«Камфомен»
Сульфаниламидные препараты
Пенициллин
Бальзам «Золотая звезда»
«Санорин»

Невралгии
Тегретол
Анальгезирующие противовоспалительные средства
Промедол
Меновазин
Препараты с ядами пчел и змей

Неврастения
Транквилизаторы
Нейролептические средства
Антидепрессанты
Снотворные средства

Невриты
Анальгезирующие противовоспалительные средства
Витамины B_1, B_6, B_{12}
Кокарбоксилаза
Кальция пантотенат
Кислота липоевая
Пиридоксин
Амиридин
Рибоксин
Новокаин
Гексаметилентетрамин
Галантамин
Прозерин
Оксазил
Дибазол

Ожирение
Фепранон
Тиреоидин
Адипозин
Диуретические средства

Остеомиелит
Антибиотики
Сульфаниламидные препараты
Витамины
Трипсин кристаллический
Химотрипсин кристаллический

Отеки
Диуретические и дегидратационные средства
Сердечные гликозиды
Теофиллин
Эуфиллин
Глюкоза
Натрия хлорид
Препараты кальция

Отит
Антибиотики
Сульфаниламидные препараты
Фурацилин
Йоднол
Протаргол
Трипсин кристаллический
Химотрипсин кристаллический
Лидаза
Ципринол
Гидрокортизон

Отравления
Алкалоидами:
— уголь активированный
— танин
Аконитом:
— калия перманганат
Анальгетиками:
— аналептические средства
— глюкоза
— калия перманганат
Антихолинэстеразными препаратами:
— антихолинергические средства
— амизил
— тропацин
— реактиваторы холинэстеразы
— аллоксим
— диэтиксим
Барбитуратами:
— бемегрид
— анолептические средства
— стрихнин
— кофеин
— цитохром С
— маннит
— фуросемид
Барием:
— магния сульфат
Бензолом:
— батилол
пентоксил
Бромидами:
— натрия тиосульфат
Йодом:
— натрия тиосульфат
Мышьяком, ртутью:
— унитиол
— натрия тиосульфат

Отредактировал: ledi24

Тяжелыми металлами:
— танин
— уголь активированный
— тетацин-кальций
Фосфором:
— калия перманганат
Цианидами:
— амилнитрит
— натрия тиосульфат
— глюкоза
— аналептические средства
Железом:
— десферал
Радионуклидами:
— пентацин

Панкреатит
Контрикал
Метилурацил
Пентоксил
Антибиотики
Анальгезирующие средства
Антихолинергические средства
Спазмолитические средства
Панкреатин
Фестал
Панзинорм-форте
Ораза
Солизим
Трифермент
Витаминные препараты

Педикулез
Ниттифор

Перитонит
Антибиотики
Сульфаниламидные препараты
Цефобид
Ципринол

Пиелонефрит
Азлоциллин (секуропен, азлин)
Производные нитрофурана
Исипен
Невиграмон
Нитроксолин
Сульфаниламидные препараты
Антибиотики

Пневмония
Антибиотики
Далацин Ц
Сульфаниламидные препараты
Роцефин
Гемодез Н
Рулид
Отхаркивающие средства
Трипсин кристаллический
Ципринол
Химотрипсин кристаллический
Цефобид
Димефосфон

Подагра
Ортофен
Кетазон
Бутадион
Индометацин
Аллопуринол
Этамид

Почечнокаменная болезнь
Средства, способствующие выделению мочевой кислоты и удалению мочевых конкрементов
Спазмолитические средства
Антихолинергические средства
Анальгезирующие средства
Горца птичьего трава

Простатит
Цернилтон
Анальгезирующие средства
Раверон
Антибиотики

Псориаз
Антигистаминные препараты
Препараты кальция
Витамины B_6, B_{12}, A, C
Кокарбоксилаза
Седативные средства
Салициловая мазь
«Флуцинар» мазь
Фторокорт
Лоринден А
Кортизона ацетат
Дерматоп
Гидрокортизон
Метотрексат
«Антипсориатинум» мазь
«Псориазин» мазь

Радикулит
Алором
Анальгезирующие средства
«Капситрин»
Перца стручкового настойка
Перцовый пластырь
Метилсалицилат
Спирт муравьиный

Отредактировал: ledi24

Спирт камфорный
Препараты, содержащие яды пчел и змей
Новокаин
Спазмолитин
Витамины B_1, B_6, B_{12}

Раны гнойные, раневые инфекции
Антибиотики
Аминон (аминосол)
Сульфаниламидные препараты
Гелевин
Антисептические препараты
Азактам
Ферментные препараты:
— трипсин кристаллический
— химотрипсин кристаллический
— рибонуклеаза
Актовегин (солкосерил)
Альгипор
Аекол
Ацемин
«Ливиан» аэрозоль
Далацин Ц
Линетол
Азлоциллин (секуропен, азлин)
Циминаль

Рахит
Эргокальциферол
Видехол
Кальция глицерофосфат
Фитин
Натрия нуклеинат

Ревматизм
Преднизолон
Ортофен
Индометацин
Препараты группы пенициллина
Делагил
Сургам
Плаквенил
Витамины Р, С

Сифилис
Препараты группы пенициллина
Эритромицин
Бийохинол
Бисмоверол
Осарбон
Осарсол
«Осарцид»
Пентабисмол
Витамины
Биогенные стимуляторы

Склеродермия системная
Преднизолон
Пеницилламин
Делагил
Плаквенил
Коринфар
Лидаза
Андекалин

Склероз рассеянный
Тегретол

Спазмы гладкой мускулатуры
Спазмолитические средства
Антихолинергические средства
Седативные средства
Анальгезирующие средства

Стенокардия
Антиангинальные препараты
Липостабил
Анаприлин
Лопресор
Гепарин
Добутрекс (добутамин)
Ацетилсалициловая кислота
Седативные средства
Финоптин
Коргард
Коринфар (фенигидин)
Регитин
Миофедрин
Анальгезирующие средства
Витаминные препараты

Стоматит афтозный
Антигистаминные препараты
Аскорбиновая кислота
Препараты кальция
Антибиотики
Интерферон
Оксолиновая мазь

Тиреотоксикоз
Мерказолил
Резерпин
Седативные средства
Анаприлин

Тканевая несовместимость
Азатиоприн
Батриден
Циклофосфан
Хлорбутин
Тиофосфамид
Проспидин

Отредактировал: ledi24

Меркаптопурин
Фторурацил
Дактиномицин
Кортизона ацетат
Гидрокортизона ацетат

Трахеит
Противокашлевые средства
Отхаркивающие средства
Трипсин кристаллический
Химотрипсин кристаллический
Антибиотики
Сульфаниламидные препараты

Трихомонадоз
Трихомонацид
Трихопол
Нитазол
Осарсол
Осарцид
Осарбон
Клион Д

Тромбозы, тромбоэмболии, тромбофлебит
Средства, тормозящие свертывание крови
Стрептодеказа
Стрептаза
Фибринолизин
Трипсин кристаллический
Химотрипсин кристаллический
Реополиглюкин
Доксиум
Пармидин
Ацетилсалициловая кислота
Бутадион мазь

Туберкулез легких
Противотуберкулезные препараты
Препараты группы стрептомицина
Канамицина сульфат
Витамины

Фенилкетонурия
Апонти
Берлофен
Нофелан

Холецистит
Антибиотики
Сульфаниламидные препараты
Спазмолитические средства
Антихолинергические средства
Анальгезирующие средства
Желчегонные средства

Цистит
Антибиотики
Сульфаниламидные препараты
Цефобид
Ципринол
Азактам
Невиграмон
Нолицин
Фурагин
Рулид
Фурадонин

Чесотка
Мазь Вилькинсона
Натрия тиосульфат
Кислота хлористоводородная
Бензилбензоат

Шок
Плазмозамещающие растворы
Солевые растворы
Гемацель
Глюкоза
Адреномиметические вещества
Анальгезирующие средства
Антигистаминные препараты
Аналептические средства
Кортизона ацетат
Гидрокортизон

Шизофрения
Транквилизаторы
Нейролептические средства
Антидепрессанты
Инсулин

Экзема
Антигистаминные препараты
Седативные средства
Транквилизаторы
Диуретические средства
Препараты кальция
Аскорбиновая кислота
Дерматоп
Рутин
Этакридина лактат
Дерматол
Фурацилин
Нафталановая мазь
Деперзолон
Дермозолон
«Кортикомицин»
Лоринден
Метипред
Преднизолон

Отредактировал: ledi24

Синафлан («Флуцинар», «Синалар»)
Фторокорт
Препарат АСД
Префузин
Витамины

Энцефалит
Антибиотики
Виролекс
Натрия салицилат
Гексаметилентетрамин
Сиднокарб
Кофеин
Галантомин
Прозерин
Оксазил
Дибазол
Цианкобаломин
Аскорбиновая кислота

Эпилепсия
Фенобарбитал
Противосудорожные препараты
Сибазон
Нитрозепам
Тегретол
Антигистаминные препараты
Поливитамины
Дегидратационные средства

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки
Обволакивающие и адсорбирующие средства
Вяжущие средства
Магния окись
Ульфамид
Вентер (сукральфат)
Кальция карбонат
Антихолинергические средства
Спазмолитические средства
Ганглиоблокирующие вещества
Седативные средства
Транквилизаторы
Витамины группы В, А
Средства для улучшения процесса заживления и трофики тканей при заболеваниях желудочно-кишечного тракта
Метандростенолон
Ретаболил
Пентоксил
Метилурацил
Биогенные стимуляторы
Оксиферрискорбон натрия
Альцид В
Даларгин
Де-Нол
Гастал

Отредактировал: ledi24

СОДЕРЖАНИЕ

От составителей 3
Препараты, включенные в справочник 5
Краткое описание лекарственных средств 19
Указатель препаратов по фармакотерапевтическим группам . . . 540
Указатель препаратов для лечения основных заболеваний 562

Отредактировал: ledi24

Редактор-составитель
Михаил Алексеевич Клюев

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

Справочник

Редакторы *М. С. Поталова, М. С. Черникова*
Художественный редактор *А. П. Сафонов*
Технический редактор *Л. М. Самсонова*
Корректоры *М. Е. Козлова, Л. В. Дорофеева, Л. М. Логунова, А. З. Лазуткина, Н. Д. Бучарова*

ИБ № 5937

Сд. в набор 20.07.92. Подп. в печать 15.12.92. Формат 84×108$^{1}/_{32}$. Бум. № 2 тип. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 30,24. Усл. кр.-отт. 30,45. Уч.-изд. л. 48,56. Тираж 150 000 экз. Зак. 251. С100. Изд. инд. НА—6.

Издательство «Русская книга» Министерства печати и информации России. 123557, Москва, Б. Тишинский пер., 38.

Книжная фабрика № 1 Министерства печати и информации России. 144003, г. Электросталь Московской области, ул. Тевосяна, 25.

Отредактировал: ledi24